Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:11
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:11
Temps mis	30 s
Points	1,30/5,00
Note	**5,20** sur 20,00 (**26**%)

Énoncé général

Trois mois après l'épisode infectieux initial, un patient consulte pour une dyspnée persistante.

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

On peut évoquer les diagnostics suivants :

- a. Des séquelles tardives post COVID-19 ✔
- b. Une embolie pulmonaire ✔
- c. Une insuffisance cardiaque ✔
- d. Une thrombopénie ✖
- e. Une insuffisance veineuse ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Des séquelles tardives post COVID-19, Une embolie pulmonaire, Une insuffisance cardiaque

---

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Pour évaluer cette dyspnée :

- a. On recherche une limitation des activités par rapport à l'état de santé antérieur. ✔
- b. Il faut demander un bilan biologique hépatique. ✖
- c. On peut effectuer une mesure de la saturation en air au repos. ✔
- d. On peut effectuer un test d'effort comme un test de lever de chaise d'une minute. ✔
- e. Aucun examen n'est nécéssaire ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On recherche une limitation des activités par rapport à l'état de santé antérieur., On peut effectuer une mesure de la saturation en air au repos., On peut effectuer un test d'effort comme un test de lever de chaise d'une minute.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La saturation au repos de ce patient reste inférieure à 96% à l'effort. Quels examens complémentaires peuvent être réalisées ?

- a. Un dosage biologique des BNP ✔
- b. Une fibroscopie bronchique ✖
- c. Une échographie cardiaque ✔
- d. Un scanner thoracique ✔
- e. Un bilan hépatique ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un dosage biologique des BNP, Une échographie cardiaque, Un scanner thoracique

---

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la prise en charge des symptômes tardifs post infection COVID-19 :

- a. Les traitements actuels sont essentiellement symptomatiques. ✔
- b. La prise en charge de ces patients ne peut s'envisager qu'en hospitalisation. ✖
- c. La rééducation a une place centrale. ✔
- d. Un soutien psychologique est une prise en charge adaptée des troubles anxieux et dépressif ✔ sont à envisager.
- e. Aucune prise en charge n'est nécéssaire ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les traitements actuels sont essentiellement symptomatiques., La rééducation a une place centrale., Un soutien psychologique est une prise en charge adaptée des troubles anxieux et dépressif sont à envisager.

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant les étiologies de la dyspnée rencontrées au cours des manifestations prolongée de la COVID-19, on peut retrouver :

- a. Un asthme et/ou une hyperréactivité bronchique ✔
- b. Une embolie pulmonaire ✔
- c. Une pneumopathie interstitielle ✔
- d. On ne retrouve jamais de BPCO. ✖
- e. Une insuffisance cardiaque ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Un asthme et/ou une hyperréactivité bronchique, Une embolie pulmonaire, Une pneumopathie interstitielle, Une insuffisance cardiaque