Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:20
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:20
Temps mis	22 s
Points	2,50/4,00
Note	**12,50** sur 20,00 (**62,5**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Durant le développement de l'embryon :

- a. Le cœur est un des premiers organes fonctionnels durant l'embryogénèse. Il permet les échanges gazeux et le transport de éléments essentiels au développement de l'embryon. ✔
- b. Le myocarde dérive du mésoderme et des cellules des crêtes neurales. ✔
- c. L'unique tube cardiaque latéral gauche est à l'origine du cœur. ✖
- d. Le tube cardiaque primitif décrit des renflements qui correspondent successivement, de haut en bas, au tronc artériel, au conus, au ventricule primitif et à l'oreillette primitive. ✔
- e. Le tube cardiaque primitif va s'infléchir selon une courbure à convexité droite et antérieure. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le cœur est un des premiers organes fonctionnels durant l'embryogénèse. Il permet les échanges gazeux et le transport de éléments essentiels au développement de l'embryon., Le myocarde dérive du mésoderme et des cellules des crêtes neurales., Le tube cardiaque primitif décrit des renflements qui correspondent successivement, de haut en bas, au tronc artériel, au conus, au ventricule primitif et à l'oreillette primitive., Le tube cardiaque primitif va s'infléchir selon une courbure à convexité droite et antérieure.

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Au cours de la mise en place des structures cardiovasculaires :

- a. Le tube cardiaque primitif a une localisation rostrale et se dispose selon une orientation cranio-caudale. ✔
- b. L'extrémité céphalique est dévolue à la connexion artérielle avec les gros vaisseaux. ✔
- c. L'extrémité caudale correspond au sinus veineux qui reçoit les veines cardinales, vitellines et ombilicales qui sont au départ symétriques. ✔
- d. Après la boucle normale à droite (D-Loop), le ventricule droit se positionne en avant et à droite et l'autre ventricule en arrière et à gauche. ✔
- e. Après la boucle normale, les oreillettes communiquent avec le ventricule gauche par le canal atrioventriculaire. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Le tube cardiaque primitif a une localisation rostrale et se dispose selon une orientation cranio-caudale., L'extrémité céphalique est dévolue à la connexion artérielle avec les gros vaisseaux., L'extrémité caudale correspond au sinus veineux qui reçoit les veines cardinales, vitellines et ombilicales qui sont au départ symétriques., Après la boucle normale à droite (D-Loop), le ventricule droit se positionne en avant et à droite et l'autre ventricule en arrière et à gauche., Après la boucle normale, les oreillettes communiquent avec le ventricule gauche par le canal atrioventriculaire.

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelle proposition est fausse concernant l'embryogénèse cardiaque ?

- a. La boucle cardiaque est la première manifestation de la latéralisation gauche-droite chez l'embryon. ✖
- b. Au cours de la convergence qui suit la boucle cardiaque, la voie d'éjection (conus et tronc artériel) s'aligne avec les septa interventriculaire et interatrial en formation.
- c. Le premier septum interatrial à se mettre en place est le septum primum qui croît d'arrière en avant et de haut en bas.
- d. La deuxième membrane qui vient cloisonner les oreillettes est le septum secondum.
- e. Il reste normalement toujours une communication entre les oreillettes droite et gauche permettant la circulation du sang de l'oreillette gauche à l'oreillette droite.

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Il reste normalement toujours une communication entre les oreillettes droite et gauche permettant la circulation du sang de l'oreillette gauche à l'oreillette droite.

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pendant l'embryogénèse cardiaque, le pole veineux du tube cardiaque reçoit les veines cardinales, vitellines et ombilicales. Au moment de la convergence, les veines se déplacent vers la droite et s'incorporent à l'oreillette droite. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont vraies ?

- a. La veine ombilicale transporte le sang oxygéné par le placenta vers le cœur. ✔
- b. Certaines veines cardinales vont involuer complètement et disparaître. ✔
- c. Les veines cardinales droites vont être à l'origine des veines caves. ✔
- d. La malformation veineuse la plus fréquente est la persistance de la veine cave supérieure gauche. ✔
- e. Une autre malformation veineuse connue est l'interruption de la veine cave inférieure. Le drainage veineux cave inférieur se fait par la veine azygos. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : La veine ombilicale transporte le sang oxygéné par le placenta vers le cœur., Certaines veines cardinales vont involuer complètement et disparaître., Les veines cardinales droites vont être à l'origine des veines caves., La malformation veineuse la plus fréquente est la persistance de la veine cave supérieure gauche., Une autre malformation veineuse connue est l'interruption de la veine cave inférieure. Le drainage veineux cave inférieur se fait par la veine azygos.