Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:20
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:21
Temps mis	30 s
Points	1,60/6,00
Note	**5,33** sur 20,00 (**26,67**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les médicaments de l'hémostase :

- a. L'aspirine agit sur l'hémostase primaire ✔
- b. Les inhibiteurs de la voie de l'ADP inhibent l'agrégation plaquettaire ✔
- c. Les Anti vitamine K (AVK) inhibent les facteurs de coagulation ✔
- d. L'aspirine a un effet anti-agrégant plaquettaire uniquement à partir de 300 mg par jour ✖
- e. Le fondaparinux exerce une action thrombolytique ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : L'aspirine agit sur l'hémostase primaire, Les inhibiteurs de la voie de l'ADP inhibent l'agrégation plaquettaire, Les Anti vitamine K (AVK) inhibent les facteurs de coagulation

---

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les antiagrégants plaquettaires :

- a. L'effet anti-agrégant plaquettaire de l'aspirine est dû à son action inhibiteur de la COX2. ✖
- b. Le prasugrel est un antagoniste réversible du récepteur GPIIbIIIa ✖
- c. Le clopidogrel est un inhibiteur du récepteur GPIIbIIIa plaquettaire. ✖
- d. Le Clopidogrel est un pro-médicament activé par métabolisation hépatique. ✔
- e. L'aspirine a un effet anti-agrégant plaquettaire à faible dose. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le Clopidogrel est un pro-médicament activé par métabolisation hépatique., L'aspirine a un effet anti-agrégant plaquettaire à faible dose.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les anticoagulants :

- a. Le Rivaroxaban fait partie des anticoagulants oraux directs ✔
- b. Les héparines de bas poids moléculaire sont administrées par voie orale. ✖
- c. Les anti vitamine K (AVK) empêchent l'activation de plusieurs facteurs de coagulation ✔
- d. Le Clopidogrel est un anticoagulant par voie orale. ✖
- e. Le fondaparinux inhibe sélectivement le facteur Xa. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le Rivaroxaban fait partie des anticoagulants oraux directs, Les anti vitamine K (AVK) empêchent l'activation de plusieurs facteurs de coagulation, Le fondaparinux inhibe sélectivement le facteur Xa.

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant des Inhibiteurs de l'Enzyme de Conversion (IEC) :

- a. Ils exercent un effet vasodilatateur. ✔
- b. Ils peuvent entrainer comme effet indésirable une toux. ✔
- c. Ils sont imputés dans la survenue d'angioedèmes bradykiniques. ✔
- d. Ils sont hypokaliémiants. ✖
- e. Ils sont hypotenseurs. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ils exercent un effet vasodilatateur., Ils peuvent entrainer comme effet indésirable une toux., Ils sont imputés dans la survenue d'angioedèmes bradykiniques., Ils sont hypotenseurs.

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

A propos des antagonistes des récepteurs AT1 de l'angiotensine II :

- a. Ils sont hyperkaliémiants. ✔
- b. Ils augmentent la concentration plasmatique de l'angiotensine II. ✔
- c. Ils sont imputés dans la survenue d'angioedèmes bradykiniques. ✖
- d. Ils se fixent de façon non compétitive au récepteur à l'aldostérone. ✖
- e. Ils induisent une diminution du débit de filtration glomérulaire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ils sont hyperkaliémiants., Ils augmentent la concentration plasmatique de l'angiotensine II., Ils induisent une diminution du débit de filtration glomérulaire.

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

A propos des diurétiques de l'anse :

- a. Ils ont un effet natriurétique. ✔
- b. Ce sont les diurétiques les plus efficaces. ✔
- c. Ils sont indiqués pour traiter les hyponatrémies sévères. ✖
- d. Le chef de file est le furosemide. ✔
- e. Ils peuvent être associés à des médicaments ciblant le système Rénine Angiotensine Aldostérone. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ils ont un effet natriurétique., Ce sont les diurétiques les plus efficaces., Le chef de file est le furosemide., Ils peuvent être associés à des médicaments ciblant le système Rénine Angiotensine Aldostérone.