| | |
|---|---|
| **Commencé le** | mardi 27 octobre 2026, 08:23 |
| **État** | Terminée |
| **Terminé le** | mardi 27 octobre 2026, 08:23 |
| **Temps mis** | 32 s |
| **Points** | 1,70/9,00 |
| **Note** | **3,78** sur 20,00 (**18,89**%) |

**Question 1**

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la scintigraphie myocardique :

- a. Elle peut être couplée à un test d'effort. ✔
- b. Elle permet de bien déceler les zones infarcies. ✔
- c. L'analyse du muscle cardiaque est plus performante qu'au TDM. ✖
- d. Elle permet de dépister un thrombus dans le ventricule. ✖
- e. Elle est basée sur le principe du rayonnement X à faible énergie. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Elle peut être couplée à un test d'effort., Elle permet de bien déceler les zones infarcies.

---

**Question 2**

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant le muscle cardiaque :

- a. Il est un des organes les plus oxydatifs de l'organisme. ✔
- b. Les ventricules se dilatent à sa chaque diastole. ✔
- c. La diastole est toujours plus longue que la systole. ✔
- d. La pression intra-cavitaire augmente peu lors de la contraction iso-volumique. ✖
- e. Le remplissage actif du VG dépend de l'onde P. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : Il est un des organes les plus oxydatifs de l'organisme., Les ventricules se dilatent à sa chaque diastole., La diastole est toujours plus longue que la systole., Le remplissage actif du VG dépend de l'onde P.

---

**Question 3**

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant le muscle cardiaque, il consomme principalement:

- a. du glycogène au repos ✖
- b. de l'acide lactique au repos ✖
- c. des acides gras au repos ✔
- d. du glycogène à l'effort ✖
- e. de l'acide lactique à l'effort ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : des acides gras au repos, de l'acide lactique à l'effort

---

**Question 4**

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la radiographie thoracique :

- a. Elle pourrait permettre de visualiser une fracture de clavicule. ✔
- b. C'est mieux de faire la radiographie au lit du patient. ✖
- c. L'incidence oblique antérieure gauche est la plus utilisée à l'hôpital. ✖
- d. L'incidence oblique antérieure droite est la plus utilisée dans les cabinets de radiologie. ✖
- e. Le principe de cet examen est connu depuis plus d'un siècle. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Elle pourrait permettre de visualiser une fracture de clavicule., Le principe de cet examen est connu depuis plus d'un siècle.

---

**Question 5**

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les cellules nodales :

- a. Elles représentent 1/10 des cellules myocardiques. ✖
- b. Elles représentent 1/100 de la masse cardiaque totale. ✖
- c. Elles sont capables de dépolarisation spontanée. ✔
- d. La pente diastolique est liée au courant calcique. ✖
- e. Le franchissement du potentiel seuil permet de déclencher le potentiel d'action. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Elles sont capables de dépolarisation spontanée., Le franchissement du potentiel seuil permet de déclencher le potentiel d'action.

---

**Question 6**

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant la tomodensitométrie cardiaque :

- a. Les techniques d'analyse post-traitement (VRT, MIP) sont très utiles pour visualiser les artères. ✔
- b. Les calcifications coronaires sont bien visibles au scanner. ✔
- c. L'évaluation du degré de sténoses coronaires est plus difficile lorsqu'elles sont très calcifiées. ✔
- d. Le coro-TDM cardiaque permet de mieux visualiser les coronaires que la coronarographie . ✖
- e. Les anomalies de naissance coronaire sont recherchées par un scanner cardiaque. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les techniques d'analyse post-traitement (VRT, MIP) sont très utiles pour visualiser les artères., Les calcifications coronaires sont bien visibles au scanner., L'évaluation du degré de sténoses coronaires est plus difficile lorsqu'elles sont très calcifiées., Les anomalies de naissance coronaire sont recherchées par un scanner cardiaque.

---

**Question 7**

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant les différents types d'imagerie, le(s)quel(s) de ces examens est(sont) irradiant(s) :

- a. Le scanner cardiaque ✔
- b. La scintigraphie myocardique ✔
- c. L'échographie couplée au Doppler ✖
- d. La coronarographie ✔
- e. La radiographie thoracique ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le scanner cardiaque, La scintigraphie myocardique , La coronarographie, La radiographie thoracique

---

**Question 8**

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la radiographie thoracique :

- a. Les tissus mous apparaissent moins opaques que les tissus osseux. ✔
- b. Les poumons apparaitront opaques en fin d'expiration forcée. ✖
- c. L'os diffuse le rayonnement X. ✖
- d. L'arc antérieur des côtes est généralement bien visualisé. ✖
- e. Le bord gauche du cœur inclut la Veine Cave Supérieure. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Les tissus mous apparaissent moins opaques que les tissus osseux.

---

**Question 9**

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant l'IRM cardiaque :

- a. L'analyse des coronaires en IRM est moins performante qu'au TDM. ✔
- b. L'analyse du muscle cardiaque est plus performante qu'au TDM. ✖
- c. Elle permet de bien évaluer les diagnostics différentiels des infarctus du myocarde. ✔
- d. Elle permet de dépister un thrombus dans le ventricule. ✔
- e. Les reconstructions en 3D peuvent être très utiles. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : L'analyse des coronaires en IRM est moins performante qu'au TDM., Elle permet de bien évaluer les diagnostics différentiels des infarctus du myocarde., Elle permet de dépister un thrombus dans le ventricule.