Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:24
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:25
Temps mis	53 s
Points	3,60/17,00
Note	**4,24** sur 20,00 (**21,18**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Les diurétiques oraux peuvent:

- a. Inhiber la réabsorption de sodium au niveau du tube contourné proximal ✖
- b. Inhiber la réabsorption de potassium au niveau de l'anse descendante ✖
- c. Inhiber la réabsorption de chlore au niveau de l'anse ascendante ✔
- d. Inhiber l'expression du transporteur ENac ✔
- e. Etre prescrits en association avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Inhiber la réabsorption de chlore au niveau de l'anse ascendante, Inhiber l'expression du transporteur ENac, Etre prescrits en association avec un inhibiteur de l'enzyme de conversion

---

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la vasculo-génèse :

- a. Elle est induite par l'hypoxie. ✔
- b. Elle fait intervenir le facteur de croissance VEGF. ✔
- c. Elle fait intervenir les mêmes signaux moléculaires pour les artères et pour les veines. ✖
- d. Elle est à l'origine de la formation successive des arcs aortiques. ✔
- e. Elle est ralentie dans les tissus tumoraux. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle est induite par l'hypoxie., Elle fait intervenir le facteur de croissance VEGF., Elle est à l'origine de la formation successive des arcs aortiques.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Les statines :

- a. Inhibent l'HMGCoA réductase ✔
- b. Réduisent la synthèse hépatique du cholestérol ✔
- c. Augmentent l'expression génique du récepteur aux LDL ✔
- d. Inhibent l'absorption intestinale du cholestérol ✖
- e. Inhibent la dégradation du récepteur aux LDL ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Inhibent l'HMGCoA réductase, Réduisent la synthèse hépatique du cholestérol, Augmentent l'expression génique du récepteur aux LDL

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Une plaque athérosclérotique stable contient:

- a. Des cellules musculaires lisses contractiles ✖
- b. Des macrophages spumeux ✔
- c. Des érythrocytes ✖
- d. Des lipides ✔
- e. Des LDL oxydés ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Des macrophages spumeux, Des lipides, Des LDL oxydés

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les artères :

- a. Les artères élastiques sont celles de plus gros diamètre. ✔
- b. Les artères musculaires sont très contractiles. ✔
- c. Les artérioles n'ont qu'une couche de cellules musculaires lisses. ✖
- d. Elles répondent aux stimuli vaso-actifs. ✔
- e. Les artérioles ont une adventice relativement épaisse. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les artères élastiques sont celles de plus gros diamètre., Les artères musculaires sont très contractiles., Elles répondent aux stimuli vaso-actifs.

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant l'embryologie cardiaque:

- a. Les cellules cardiaques primitives dérivent de l'endoderme splanchnique. ✖
- b. Les cellules cardiaques primitives se regroupent en arc de cercle. ✔
- c. Le tube cardiaque primitif contient les ébauches des oreillettes. ✔
- d. L'inflexion cardiaque s'opère avant le 17ème jour de grossesse. ✖
- e. La communication inter-auriculaire disparait au 3ème mois de grossesse ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les cellules cardiaques primitives se regroupent en arc de cercle., Le tube cardiaque primitif contient les ébauches des oreillettes.

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Une lésion athéromateuse peut être à l'origine:

- a. D'un infarctus ✔
- b. D'un AVC ✔
- c. D'une artériopathie oblitérante ✔
- d. D'une sténose ✔
- e. D'une thrombose ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : D'un infarctus, D'un AVC, D'une artériopathie oblitérante, D'une sténose, D'une thrombose

---

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'athérosclérose :

- a. Est un processus pathophysiologique concernant les adultes ✖
- b. Est une atteinte de la paroi intimale de certains territoires artériels ✔
- c. Est caractérisée par une dysfonction endothéliale ✔
- d. Est une cause fréquente d'AVC hémorragique ✖
- e. Est un processus inflammatoire à bas bruit ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Est une atteinte de la paroi intimale de certains territoires artériels , Est caractérisée par une dysfonction endothéliale

---

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les veines :

- a. A diamètre égal, elles ont une lumière plus grande que celle des artères. ✔
- b. Elles contiennent toujours des valves ou des valvules. ✖
- c. L'insuffisance des valvules est à l'origine de varices au niveau des membres inférieurs. ✔
- d. Elles s'anastomosent entre elles au niveau des membres. ✖
- e. Elles transportent du sang pauvre en oxygène et en nutriments. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : A diamètre égal, elles ont une lumière plus grande que celle des artères., L'insuffisance des valvules est à l'origine de varices au niveau des membres inférieurs.

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les capillaires :

- a. Leur endothélium est continu dans le foie. ✖
- b. Leur endothélium est fenestré dans l'intestin. ✔
- c. Ils forment des sinusoïdes dans la rate. ✔
- d. Ils sont dépourvus de cellules musculaires lisses. ✖
- e. Leur diamètre moyen est de 100 micromètres. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Leur endothélium est fenestré dans l'intestin., Ils forment des sinusoïdes dans la rate.

Question 11

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le système lymphatique:

- a. Assure le drainage des liquides extra cellulaires ✔
- b. Contient un liquide lymphatique non turbide ✖
- c. Rejoint la circulation artérielle thoracique ✖
- d. Est impliqué dans la réponse immunitaire ✔
- e. Transporte le chyle au niveau intestinal ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Assure le drainage des liquides extra cellulaires, Est impliqué dans la réponse immunitaire, Transporte le chyle au niveau intestinal

---

Question 12

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Pour abaisser la pression artérielle, on peut prescrire :

- a. Un diurétique de l'anse ✔
- b. Un diurétique thiazidique ✔
- c. Un inhibiteur de l'enzyme de conversion ✔
- d. Un antagoniste du recepteur AT1 à l'angiotensine ✔
- e. Un inhibiteur de la rénine ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Un diurétique de l'anse, Un diurétique thiazidique, Un inhibiteur de l'enzyme de conversion, Un antagoniste du recepteur AT1 à l'angiotensine, Un inhibiteur de la rénine

---

Question 13

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les médicaments suivants:

- a. L'altéplase (rtPA) inhibe la formation de fibrine ✖
- b. Le plavix (clopidogrel) inhibe la transformation du fibrinogène en fibrine ✖
- c. Les bêta-bloquants sont cardiosélectifs ✖
- d. Le ticagrelor (brilique) favorise l'hémostase ✖
- e. Aucune de ces propositions n'est exacte ✔

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Aucune de ces propositions n'est exacte

---

Question 14

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les anti-coagulants, on trouve :

- a. Le warfarin (anti vitamine K) ✔
- b. Les héparines ✔
- c. Le plavix (clopidogrel) ✖
- d. Le brilique (ticagrelor) ✖
- e. L'alteplase (rtPA) ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le warfarin (anti vitamine K), Les héparines

---

Question 15

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le coeur :

- a. Il est constitué de trois couches: le péricarde, l'épicarde et le myocarde. ✖
- b. Il contient des cellules mésothéliales pavimenteuses. ✔
- c. L'épicarde est richement vascularisé. ✔
- d. Le myocarde est le plus fin dans les oreillettes. ✔
- e. Le myocarde est le plus épais dans le ventricule droit. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il contient des cellules mésothéliales pavimenteuses., L'épicarde est richement vascularisé., Le myocarde est le plus fin dans les oreillettes.

Question 16

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'aspirine :

- a. Est utilisée comme antiagrégant plaquettaire à la dose de 100 mg/jour ✔
- b. Est utilisée comme anti-coagulant à la dose de 1g/jour ✖
- c. Inhibe la cyclo-oxygénase ✔
- d. Diminue la production de thromboxane A2 dans les plaquettes ✔
- e. Diminue la sécrétion d'ADP par les plaquettes ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Est utilisée comme antiagrégant plaquettaire à la dose de 100 mg/jour, Inhibe la cyclo-oxygénase, Diminue la production de thromboxane A2 dans les plaquettes

---

Question 17

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Pour abaisser le LDL cholestérol, on peut prescrire :

- a. Un agoniste du récepteur à l'aldostérone (Aldactone) ✖
- b. Un inhibiteur de PCSK9 (Repatha) ✔
- c. Un inhibiteur de NPC1L1 (Ezetimibe) ✔
- d. Un bêta-bloquant (Propranolol) ✖
- e. Un inhibiteur de la vitamine K (Coumadine) ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Un inhibiteur de PCSK9 (Repatha), Un inhibiteur de NPC1L1 (Ezetimibe)