Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:31
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:31
Temps mis	21 s
Points	0,70/2,00
Note	**7,00** sur 20,00 (**35**%)

Énoncé général

Un patient, de 32 ans, hypertendu traité par losartan/hydrochlorothiazide, consulte aux urgences pour une asthénie progressive.

À l'examen :

- TA: 130/80 mmHg
- FC: 98/min
- Réflexes ostéotendineux (ROT) faibles

Biologie :

- Na+: 138 mmol/L
- K+: 2,7 mmol/L
- Créatinine: 110 µmol/L (DFG 45 mL/min)
- Glycémie 5,8 mmol/L

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelle(s) proposition(s) est(sont) exacte(s) concernant ce patient ?

- a. La prise d'hydrochlorothiazide pourrait expliquer l'hypokaliémie par pertes rénales de potassium. ✔
- b. Une acidose métabolique est fréquemment associée à l'hypokaliémie liée aux thiazidiques. ✖
- c. Une hypomagnésémie peut aggraver l'hypokaliémie en favorisant les pertes urinaires de K+. ✔
- d. Il est probable que le losartan participe à l'hypokaliémie ✖
- e. L'ECG pourrait montrer des ondes T aplaties et des ondes U. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La prise d'hydrochlorothiazide pourrait expliquer l'hypokaliémie par pertes rénales de potassium., Une hypomagnésémie peut aggraver l'hypokaliémie en favorisant les pertes urinaires de K+., L'ECG pourrait montrer des ondes T aplaties et des ondes U.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quels sont les 2 examens à demander en priorité (QRP) ?

– 2 réponses sont attendues –

- [x] a. Dosage du rapport Rénine / Aldostérone ✖
- [x] b. Ionogramme urinaire (K+ urinaire) ✔
- [ ] c. Cortisol libre urinaire
- [ ] d. ECG immédiat
- [ ] e. Dosage de la créatine kinase (CK)

Vous en avez sélectionné correctement 1.
Les réponses correctes sont : Ionogramme urinaire (K+ urinaire), ECG immédiat