Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:33
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:35
Temps mis	2 min 43 s
Points	7,50/35,00
Note	**4,29** sur 20,00 (**21,43**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

La filtration glomérulaire :

- a. est bidirectionnelle sous l'effet de la pression glomérulaire. ✖
- b. est un processus physique par lequel l'eau et les solutés dissous dans le plasma passent vers l'espace urinaire. ✔
- c. aboutit à la formation de l'urine définitive. ✖
- d. se fait au travers de la membrane basale glomérulaire. ✔
- e. Aucune de ces propositions n'est juste. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : est un processus physique par lequel l'eau et les solutés dissous dans le plasma passent vers l'espace urinaire., se fait au travers de la membrane basale glomérulaire.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant la protéinurie :

- a. La bandelette urinaire permet la détection d'albumine. ✔
- b. L'albuminurie physiologique est inférieure à 30 mg/24h. ✔
- c. La présence d'une microalbuminurie est associée à une majoration du risque cardiovasculaire chez le diabétique de type 2. ✔
- d. La protéinurie physiologique est supérieure à 500 mg/j. ✖
- e. Elle doit être recherchée au minimum tous les ans chez le diabétique de type 2. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : La bandelette urinaire permet la détection d'albumine., L'albuminurie physiologique est inférieure à 30 mg/24h., La présence d'une microalbuminurie est associée à une majoration du risque cardiovasculaire chez le diabétique de type 2., Elle doit être recherchée au minimum tous les ans chez le diabétique de type 2.

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Lors d'une visite médicale, vous réalisez une bandelette urinaire qui revient positive « 3 croix » pour la protéinurie :

- a. Il peut s'agir de présence de protéine de l'urothélium. ✖
- b. Il peut s'agir de présence de protéine de Tamm Horsfall dans les urines. ✖
- c. Il peut s'agir de présence d'albumine dans les urines. ✔
- d. Il peut s'agir de présence de chaines légères d'immunoglobuline dans les urines. ✖
- e. Une confirmation par un ECBU est nécessaire. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Il peut s'agir de présence d'albumine dans les urines.

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les situations suivantes, quelles sont celles qui peuvent engendrer une hyponatrémie iso-osmolaire ou une hyponatrémie hyperosmolaire ?

- a. Hyperprotidémie ✔
- b. Potomanie ✖
- c. Hyperglycémie ✔
- d. Hyperlipidémie ✔
- e. Tea and toast syndrom ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Hyperprotidémie, Hyperglycémie, Hyperlipidémie

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les éléments suivants, lesquels orientent vers une hématurie urologique ?

- a. L'existence de douleurs lombaires ✔
- b. L'existence de brûlures urinaires ✔
- c. La présence de GR déformés ✖
- d. La présence de caillots ✔
- e. La présence de cylindres hématiques ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : L'existence de douleurs lombaires, L'existence de brûlures urinaires, La présence de caillots

---

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi ces différentes situations proposées, quelles sont celles évocatrices d'une pathologie glomérulaire ?

- a. Protéinurie = 4 g/l, Electrophorèse des protéines urinaires = 80% d'albumine ✔
- b. Protéinurie = 2 mg/mmol ✖
- c. Protéinurie = 40 mg/mmol, Bandelette urinaire négative pour les « PROT » ✖
- d. Albuminurie = 3500 mg/g ✔
- e. Protéinurie = 400 mg/mmol , Albuminurie = 50 mg/mmol ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Protéinurie = 4 g/l, Electrophorèse des protéines urinaires = 80% d'albumine, Albuminurie = 3500 mg/g

---

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le tubule contourné distal :

- a. On l'appelle également le segment de dilution. ✔
- b. Il est imperméable au sel. ✖
- c. Il est imperméable à l'eau. ✔
- d. Son action est inhibée par les diurétiques épargneurs de potassium. ✖
- e. En cas d'inhibition, l'osmolarité urinaire a tendance à augmenter. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : On l'appelle également le segment de dilution., Il est imperméable à l'eau., En cas d'inhibition, l'osmolarité urinaire a tendance à augmenter.

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Vous prenez en charge un patient de 38 ans, il pèse 70 kg, il n'a pas d'antécédent connu.

Voici son bilan :

- [Na+] = 128 mmol/l
- Osmolarité plasmatique mesurée: 268 mosmol/l
-

Vous calculez son osmolarité urinaire que vous estimez à 85 mosmol/l. Cliniquement, il semble euvolémique, sans signe de déshydratation ou d'hyperhydratation extracellulaire.

Quelles sont vos hypothèses diagnostiques ?

- a. Syndrome de sécrétion inapproprié d'ADH (SIADH) ✖
- b. Hypothyroïdie ✖
- c. Potomanie ✔
- d. Syndrome des buveurs de bières ✔
- e. Il existe une hyperhydratation intracellulaire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Potomanie, Syndrome des buveurs de bières, Il existe une hyperhydratation intracellulaire.

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les diurétiques :

- a. Les diurétiques de l'anse sont les plus utilisés en situation de surcharge hydrosodée. ✔
- b. Les diurétiques thiazidiques font partie des traitements anti-hypertenseurs de première intention. ✔
- c. Les principaux diurétiques disponibles inhibent la réabsorption proximale du sodium. ✖
- d. L'augmentation de la diurèse est liée à une inhibition directe par le diurétique de la réabsorption d'eau tubulaire. ✖
- e. Ils augmentent la diurèse en augmentant la filtration glomérulaire. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les diurétiques de l'anse sont les plus utilisés en situation de surcharge hydrosodée., Les diurétiques thiazidiques font partie des traitements anti-hypertenseurs de première intention.

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'HTA :

- a. est favorisée par l'inhibition du système rénine angiotensine aldostérone. ✖
- b. est en lien avec une rétention hydrosodée, notamment dans l'insuffisance rénale. ✔
- c. est en lien avec l'activation du système nerveux sympathique. ✔
- d. a une prévalence qui diminue avec l'âge. ✖
- e. est favorisée par la rigidité artérielle. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : est en lien avec une rétention hydrosodée, notamment dans l'insuffisance rénale., est en lien avec l'activation du système nerveux sympathique., est favorisée par la rigidité artérielle.

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Vous prenez en charge un patient de 45 ans pour une acidose métabolique simple.

Voici les résultats biologiques :

- [Na+] = 136 mmol/l
- [K+] = 4 mmol/l
- [Cl-] = 106 mmol/l
- [HCO3-] = 8 mmol/l
- Osmolarité plasmatique: 285 mosmol/l
- Lactatémie: 1,5 mmol/l
- [Ca++] = 2,5 mmol/l
- [Phosphore] = 1,5 mmol/l
- Hématocrite 45%

Quelle est la valeur du trou anionique plasmatique de ce patient (avec la formule prenant en compte le potassium) :

- a. Le trou anionique de ce patient est strictement inférieur 12 mmol/L. ✖
- b. Le trou anionique de ce patient est compris entre 12 et 18 mmol/l. ✖
- c. Le trou anionique de ce patient est compris entre 18 et 24 mmol/l. ✖
- d. Le trou anionique de ce patient est compris entre 24 et 30 mmol/l. ✔
- e. Le trou anionique de ce patient est augmenté. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le trou anionique de ce patient est compris entre 24 et 30 mmol/l., Le trou anionique de ce patient est augmenté.

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant la régulation des échanges hydrosodés trans-capillaires et la genèse des œdèmes :

- a. Elle est dépendante de la pression hydrostatique de part et d'autre de la paroi capillaire. ✔
- b. Le delta normal de pression oncotique trans-capillaire est en faveur d'un passage liquidien de l'interstitium vers la lumière capillaire. ✔
- c. Le coefficient de perméabilité varie en fonction des vaisseaux concernés. ✔
- d. La rétention rénale hydrosodée est toujours présente en cas d'apparition d'œdèmes étendus. ✔
- e. En cas d'œdèmes secondaires à une thrombose veineuse, le furosémide est le traitement à privilégier. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle est dépendante de la pression hydrostatique de part et d'autre de la paroi capillaire., Le delta normal de pression oncotique trans-capillaire est en faveur d'un passage liquidien de l'interstitium vers la lumière capillaire., Le coefficient de perméabilité varie en fonction des vaisseaux concernés., La rétention rénale hydrosodée est toujours présente en cas d'apparition d'œdèmes étendus.

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le calcium plasmatique :

- a. est le compartiment de stockage du calcium. ✖
- b. est sous 3 formes : ionisé, complexé, lié aux protéines. ✔
- c. La fraction active est mieux appréciée par la calcémie corrigée que la calcémie totale. ✔
- d. La fraction active est mieux apprécié par la calcémie ionisée que la calcémie totale. ✔
- e. représente 50% du calcium de l'organisme. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : est sous 3 formes : ionisé, complexé, lié aux protéines., La fraction active est mieux appréciée par la calcémie corrigée que la calcémie totale., La fraction active est mieux apprécié par la calcémie ionisée que la calcémie totale.

Question 14

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Vous recevez en consultation un patient âgé de 53 ans qui vous montre le bilan biologique suivant :

- Natrémie 138 mmol/L (135-145)
- Kaliémie 4 mmol/L (3.5-5)
- Créatininémie 110 µmol/L (60-115)
- Albuminémie 25 g/L (35-45)
- Protidémie 59 g/L (60-80)
- Protéinurie 4.2 g/24 h avec 85% d'albumine
- ECBU : Leucocytes < 5 /mm3
- Hématies 110 /mm3
- Culture stérile

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- a. Chez ce patient, l'hématurie oriente en premier lieu vers une cause urologique. ✖
- b. La protéinurie évoque une pathologie rénale tubulaire. ✖
- c. La présence de l'hématurie rend le syndrome néphrotique impur. ✔
- d. L'association de ce tableau à un dosage des Ac anti PLA2R positif rend très probable le diagnostic de GEM primitive. ✔ *item neutralisé car à la limite du programme du 1er semestre : la GEM est abordé au second semestre*
- e. L'association de ce tableau à un purpura vasculaire et des arthralgies peut faire évoquer un purpura rhumatoïde. ✔ *item neutralisé car à la limite du programme du 1er semestre : les néphropathies glomérulaire et vasculaire sont abordés au deuxième semestre*

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La présence de l'hématurie rend le syndrome néphrotique impur., L'association de ce tableau à un dosage des Ac anti PLA2R positif rend très probable le diagnostic de GEM primitive., L'association de ce tableau à un purpura vasculaire et des arthralgies peut faire évoquer un purpura rhumatoïde.

Question 15

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la physiologie tubulaire :

- a. La réabsorption de sel et d'eau est maximale au niveau du tube collecteur. ✖
- b. La réabsorption de sel au niveau du tube contourné proximal se fait sous l'action de l'Aldostérone. ✖
- c. La réabsorption de sel au niveau du tube contourné proximal se fait sous l'action de l'ADH. ✖
- d. La réabsorption d'eau au niveau du tube collecteur se fait sous l'action de l'ADH. ✔
- e. La réabsorption d'eau est plus quantitativement importante au niveau du tube contourné distal qu'au niveau du tube collecteur . ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La réabsorption d'eau au niveau du tube collecteur se fait sous l'action de l'ADH.

Question 16

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant la paroi de filtration glomérulaire :

- a. Elle comporte une membrane basale composée de 3 filtres en série. ✔ *Item neutralisé : jugé comme vrai par le rédacteur mais fausse. La barrière de filtration glomérulaire est faite de 3 couches : endothélium capillaire fenestré + membrane basale glomérulaire + les prolongements cytoplasmiques des podocytes*
- b. Elle est composée d'un épithélium capillaire fenestré, d'une membrane basale glomérulaire et d'une couche de cellules endothéliales ou podocytes. ✔ *Item neutralisé : jugé comme vrai par le rédacteur mais fausse. La barrière de filtration glomérulaire est faite de 3 couches : endothélium capillaire fenestré + membrane basale glomérulaire + les prolongements cytoplasmiques des podocytes*
- c. Les podocytes présentent des fins prolongements ou pédicelles formant les fentes de filtration. ✔
- d. Elle comporte du collagène de type 4. ✔
- e. Aucune de ces propositions n'est juste. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Elle comporte une membrane basale composée de 3 filtres en série., Elle est composée d'un épithélium capillaire fenestré, d'une membrane basale glomérulaire et d'une couche de cellules endothéliales ou podocytes., Les podocytes présentent des fins prolongements ou pédicelles formant les fentes de filtration., Elle comporte du collagène de type 4.

Question 17

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

La PTH (parathormone) :

- a. a une demi vie plasmatique courte de quelques minutes. ✔
- b. Sa sécrétion est stimulée par l'hypocalcémie. ✔
- c. stimule la résorption osseuse. ✔
- d. stimule la réabsorption tubulaire du calcium. ✔
- e. est composée de 84 acides aminés. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : a une demi vie plasmatique courte de quelques minutes., Sa sécrétion est stimulée par l'hypocalcémie., stimule la résorption osseuse., stimule la réabsorption tubulaire du calcium., est composée de 84 acides aminés.

Question 18

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant le tube contourné proximal en situation physiologique :

- a. Il permet une réabsorption importante d'albumine. ✖
- b. Il permet une réabsorption importante d'acide aminés. ✔
- c. Il permet à lui seul la réabsorption complète du glucose filtré. ✔
- d. Il permet à lui seul la réabsorption complète du bicarbonate. ✔
- e. Il permet une réabsorption de sel adapté aux besoins de l'organisme. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il permet une réabsorption importante d'acide aminés., Il permet à lui seul la réabsorption complète du glucose filtré., Il permet à lui seul la réabsorption complète du bicarbonate.

Question 19

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quelles sont les propositions justes :

- a. L'unité fonctionnelle rénale est le glomérule. ✖
- b. Le néphron est composé du glomérule et du tubule rénal. ✔
- c. Le tubule rénal est composé de 4 portions. ✔
- d. Le tubule est responsable de la formation de l'ultrafiltrat glomérulaire ou urine primitive. ✖
- e. Le glomérule modifie la composition de l'urine primitive pour aboutir à l'urine définitive. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le néphron est composé du glomérule et du tubule rénal., Le tubule rénal est composé de 4 portions.

Question 20

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels sont les éléments en faveur d'une cause rénale à des œdèmes ?

- a. Prédominance lombaire des œdèmes en position debout prolongée ✖
- b. Asymétriques ✖
- c. Indolores ✔
- d. Prenant le godet ✔
- e. Mobiles selon la position prolongée du patient ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Indolores, Prenant le godet, Mobiles selon la position prolongée du patient

---

Question 21

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la créatininémie :

- a. Sa valeur est dépendante de la masse musculaire. ✔
- b. Son dosage est facile à réaliser en routine. ✔
- c. Il s'agit du produit de dégradation de la carnitine. ✖
- d. Son élimination est pour 20% hépatique. ✖
- e. Son dosage permet de mesurer la fonction rénale par le DFG mesuré. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Sa valeur est dépendante de la masse musculaire., Son dosage est facile à réaliser en routine.

Question 22

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Vous prenez en charge un patient de 75 ans, hypertendu et diabétique.

Son bilan sanguin est le suivant :

- [Na+] = 125 mmol/l
- [K+] = 5,0 mmol/l
- [Cl-] = 108 mmol/l
- [HCO3-] = 23 mmol/l
- Lactatémie 1,5 mmol/l
- Glycémie = 4 mmol/l
- Urée = 12 mmol/l
- Créatinine = 80 µmol/l
- [Ca++] = 2,4 mmol/l
- [Phosphore] = 1,2 mmol/l
- Hématocrite 45%

Concernant l'osmolarité plasmatique calculée de ce patient ?

- a. L'osmolarité plasmatique calculée est inférieure à 250 mosmol/l.
- b. L'osmolarité plasmatique calculée est comprise entre 250 et 255 mosmol/l.
- c. L'osmolarité plasmatique calculée est comprise entre 256 et 260 mosmol/l. ✖
- d. L'osmolarité plasmatique calculée est comprise entre 261 et 265 mosmol/l.
- e. L'osmolarité plasmatique calculée est supérieur à 266 mosmol/l.

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : L'osmolarité plasmatique calculée est comprise entre 250 et 255 mosmol/l.

Question 23

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La régulation du débit de filtration glomérulaire :

- a. fait appel à des mécanismes d'autorégulation. ✔
- b. met en jeu les résistances artériolaires. ✔
- c. permet de préserver le débit de filtration glomérulaire en état de choc. ✖
- d. fait appel au rétrocontrôle tubulo-glomérulaire. ✔
- e. Aucune de ces propositions n'est juste. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : fait appel à des mécanismes d'autorégulation., met en jeu les résistances artériolaires., fait appel au rétrocontrôle tubulo-glomérulaire.

Question 24

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La microalbuminurie :

- a. est habituellement présente lors du diagnostic de diabète de type 1. ✖
- b. Elle prédit l'évolution vers une néphropathie diabétique dans le diabète de type 1. ✔
- c. Elle est dépistée avec une bandelette urinaire. ✖
- d. Elle peut diminuer sous l'effet d'un bloqueur du système rénine angiotensine aldostérone. ✔
- e. Elle peut diminuer sous Inhibiteur du cotransporteur Na/glucose (Glifozines). ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Question annulée car abordée surtout dans le chapitre "néphropathie diabétique" qui est traité au 2ème semestre

Les réponses correctes sont : Elle prédit l'évolution vers une néphropathie diabétique dans le diabète de type 1., Elle peut diminuer sous l'effet d'un bloqueur du système rénine angiotensine aldostérone., Elle peut diminuer sous Inhibiteur du cotransporteur Na/glucose (Glifozines).

Question 25

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La réabsorption du calcium filtré :

- a. se fait majoritairement au niveau du tubule proximal. ✔
- b. se fait majoritairement au niveau du tubule distal. ✖
- c. est régulée par le CaSR au niveau de l'anse de Henlé. ✔
- d. est régulée par la PTH et le calcitriol au niveau du tubulaire. ✔ *Item neutralisé car peut porter à confusion car 1) faute de frappe + 2) pas de précision sur la partie du tubule*
- e. Il n'existe pas de réabsorption tubulaire du calcium filtré. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : se fait majoritairement au niveau du tubule proximal., est régulée par le CaSR au niveau de l'anse de Henlé., est régulée par la PTH et le calcitriol au niveau du tubulaire.

Question 26

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quelles sont les propositions justes ?

- a. La clairance est le volume plasmatique complètement épuré d'une substance par unité de temps. ✔
- b. Le débit de filtration glomérulaire peut être mesuré ou estimé. ✔
- c. Le débit de filtration glomérulaire peut être estimé par la formule CKD EPI. ✔
- d. Il existe une relation linéaire entre la filtration glomérulaire et la créatinine. ✖
- e. Toutes les propositions sont justes. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La clairance est le volume plasmatique complètement épuré d'une substance par unité de temps., Le débit de filtration glomérulaire peut être mesuré ou estimé., Le débit de filtration glomérulaire peut être estimé par la formule CKD EPI.

Question 27

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Les Glomérulonéphrites rapidement progressives (GNRP) sont :

- a. caractérisées par des croissants extracapillaires à la biopsie rénale. ✔
- b. parfois secondaire à une polykystose rénale. ✖
- c. parfois secondaire à une vascularite à ANCA. ✔
- d. une urgence thérapeutique. ✔
- e. parfois associées avec des atteintes pulmonaires. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Question hors programme (néphropathies glomérulaires abordées au second semestre)

Les réponses correctes sont : caractérisées par des croissants extracapillaires à la biopsie rénale., parfois secondaire à une vascularite à ANCA., une urgence thérapeutique., parfois associées avec des atteintes pulmonaires.

Question 28

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le traitement du syndrome œdémateux secondaire à un syndrome néphrotique nécessite :

- a. Un régime normo sodé ✖
- b. La prescription d'un diurétique de l'anse (Furosemide) ✔
- c. La prescription d'un traitement anticoagulant si l'albumine est > 25g/l ✖
- d. La prescription d'une hémodialyse ✖
- e. La perfusion d'albumine 20% ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : La prescription d'un diurétique de l'anse (Furosemide)

Question 29

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Le système rénine angiotensine aldostérone :

- a. entraine une vasoconstriction de l'artériole efférente. ✔
- b. inhibe la réabsorption tubulaire de NaCl. ✖
- c. entraine la sécrétion d'aldostérone. ✔
- d. est stimulé par les osmorécepteurs de la macula densa en cas de diminution du contenu NaCl du tubule distal par le biais de la rénine. ✔
- e. La rénine est libérée par l'appareil juxta-glomérulaire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : entraine une vasoconstriction de l'artériole efférente., entraine la sécrétion d'aldostérone., est stimulé par les osmorécepteurs de la macula densa en cas de diminution du contenu NaCl du tubule distal par le biais de la rénine., La rénine est libérée par l'appareil juxta-glomérulaire.

Question 30

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Mme B., 52 ans, vient vous voir en consultation. Elle présente une HTA à 150/90 mm Hg depuis 6 mois, confirmée à son domicile. Elle est diabétique. Vous demandez un bilan complémentaire:

- a. Vous lui remettez une ordonnance pour réaliser un ECG et une échographie cardiaque transthoracique. ✖ *Manque de précision sur le caractère symptomatique ou non du patient ce qui modifie l'indication ou non de l'échographie cardiaque*
- b. Vous lui demandez de réaliser un dosage de kaliémie, de créatininémie et de protéinurie. ✔
- c. Vous lui demandez de réaliser un fond d'œil. ✖ *Oui car patient diabétique. Pas d'indication au fond d'oeil sur de l'HTA simple*
- d. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont classiquement les traitements de 1ère intention dans cette situation. ✔
- e. Vous lui expliquez les règles hygiéno-diététiques. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Vous lui demandez de réaliser un dosage de kaliémie, de créatininémie et de protéinurie., Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont classiquement les traitements de 1ère intention dans cette situation., Vous lui expliquez les règles hygiéno-diététiques.

Question 31

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Vous faites face à un patient de 60 ans, pesant 50 kg et mesurant 158 cm. Concernant la répartition de l'eau dans son corps :

- a. L'eau totale présente dans le corps du patient est d'environ 40 litres. ✖
- b. Le volume d'eau contenue dans les cellules est d'environ 20 litres. ✔
- c. Le volume d'eau contenue dans l'extra cellulaire peut être déduite à partir du dosage de la natrémie. ✖
- d. Le volume d'eau contenue dans les cellules peut être estimé à partir de l'osmolarité plasmatique. ✔
- e. La protidémie est le meilleur marqueur du volume extracellulaire. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Le volume d'eau contenue dans les cellules est d'environ 20 litres., Le volume d'eau contenue dans les cellules peut être estimé à partir de l'osmolarité plasmatique.

Question 32

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant l'osmolarité qui règne dans le tubule :

- a. L'osmolarité est d'environ 1200 mosmol/l juste après la filtration glomérulaire. ✖
- b. L'osmolarité est d'environ 300 mosmol/l au niveau du tube contourné proximal. ✔
- c. L'osmolarité est d'environ 1200 mosmol/l au niveau de la partie la plus médullaire de l'anse de Henlé. ✔
- d. Le tube contourné distal permet d'augmenter l'osmolarité jusqu'à 1200 mosmol/l. ✖
- e. L'osmolarité urinaire finale (dans les urines éliminées) doit être la plus proche possible de 300 mosmol/l pour assurer l'homéostasie du bilan hydrique. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : L'osmolarité est d'environ 300 mosmol/l au niveau du tube contourné proximal., L'osmolarité est d'environ 1200 mosmol/l au niveau de la partie la plus médullaire de l'anse de Henlé.

Question 33

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Le débit de filtration glomérulaire :

- a. dépend du débit cardiaque. ✔
- b. correspond à 20 % du débit plasmatique rénal. ✔
- c. est normalement proche de 120 mL/min. ✔
- d. dépend des mouvements de fluides gouvernés par la loi de starling. ✔
- e. est lié à la pression oncotique du capillaire glomérulaire. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : dépend du débit cardiaque., correspond à 20 % du débit plasmatique rénal., est normalement proche de 120 mL/min., dépend des mouvements de fluides gouvernés par la loi de starling., est lié à la pression oncotique du capillaire glomérulaire.

Question 34

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les situations suivantes, lesquelles correspondent à syndrome néphrotique impur ?

- a. Albuminémie 35 g/l, Protéinurie 350 mg/mmol, Hématurie 35 hématies/mm^3 ✗
- b. Albuminémie 24 g/l, Créatininémie 150 µmol/l, Protéinurie 80 mg/mmol ✗
- c. Albuminémie 26 g/l, Protéinurie 4 g/g, Tension Artérielle 155/90 mmHg ✓
- d. Albuminémie 18 g/l, Créatininémie 60 µmol/l, Tension artérielle 120/70 mmHg, Protéinurie 350 mg/mmol, Hématies 8/mm^3 ✗
- e. Albuminémie 22 g/l, Créatininémie 150 µmol/l, Tension artérielle 150/95 mmHg, Protéinurie 420 mg/mmol, Hématies 8/mm^3 ✓

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Albuminémie 26 g/l, Protéinurie 4 g/g, Tension Artérielle 155/90 mmHg, Albuminémie 22 g/l, Créatininémie 150 µmol/l, Tension artérielle 150/95 mmHg, Protéinurie 420 mg/mmol, Hématies 8/mm^3

Question 35

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Lesquels de ces paramètres biologiques pourraient être observés lors d'une acidose métabolique simple ?

- a. pH 7,24 ✓
- b. [$HCO3^-$] = 24 mmol/l ✗
- c. [$HCO3^-$] = 16 mmol/l ✓
- d. $PaCO_2$ = 48 mmHg ✗
- e. $PaCO_2$ = 32 mmHg ✓

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : pH 7,24, [$HCO3^-$] = 16 mmol/l, $PaCO_2$ = 32 mmHg