Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:37
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:38
Temps mis	40 s
Points	2,00/12,00
Note	**3,33** sur 20,00 (**16,67**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant la créatinine :

- a. Son taux sanguin est dépendant de la masse musculaire. ✔
- b. Son dosage est difficile à réaliser en routine. ✖
- c. Il s'agit du produit de dégradation de la créatine. ✔
- d. Son élimination est totalement urinaire. ✔
- e. Son dosage permet de mesurer précisément le débit de filtration glomérulaire. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Son taux sanguin est dépendant de la masse musculaire., Il s'agit du produit de dégradation de la créatine., Son élimination est totalement urinaire.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Le calcium plasmatique :

- a. Est le compartiment de stockage du calcium ✖
- b. Est lié à 40% aux protéines. ✔
- c. Est régulé par la Parathormone. ✔
- d. Les formes complexées et liées aux protéines correspondent au calcium ultrafiltrable. ✖
- e. Est mieux apprécié par la calcémie ionisée que corrigée. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Est lié à 40% aux protéines., Est régulé par la Parathormone., Est mieux apprécié par la calcémie ionisée que corrigée.

Question 3

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Le déclin annuel du débit de filtration glomérulaire est considéré comme physiologique si il est :

- a. De 1 mL/min/mois
- b. Après 40 ans, inférieur à 1mL/min/1.73m^2
- c. Entre 1 et 5 mL/min/1.73m^3 ✖
- d. Supérieur à 5 mL/min/1.73m^3
- e. De 0,5mL/min/mois

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Après 40 ans, inférieur à 1mL/min/1.73m^2

Question 4

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Indiquez quelle(s) est (sont) l'(es) affirmation(s) vraie(s) :

- a. Le tube rénal est composé de 3 portions : le tube proximal, l'anse de Henlé et le tube distal. ✔
- b. Le néphron se compose du glomérule et du tube rénal. ✔
- c. Chaque rein dispose à la naissance d'1 million de néphrons, qui correspondent chacun à une unité fonctionnelle rénale. ✔
- d. Le glomérule comporte un pôle urinaire et un pôle vasculaire. ✔
- e. Le filtre glomérulaire est composé de 3 couches : l'endothélium capillaire fenestré, la membrane basale glomérulaire et les podocytes. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Le tube rénal est composé de 3 portions : le tube proximal, l'anse de Henlé et le tube distal., Le néphron se compose du glomérule et du tube rénal., Chaque rein dispose à la naissance d'1 million de néphrons, qui correspondent chacun à une unité fonctionnelle rénale., Le glomérule comporte un pôle urinaire et un pôle vasculaire., Le filtre glomérulaire est composé de 3 couches : l'endothélium capillaire fenestré, la membrane basale glomérulaire et les podocytes.

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les situations suivantes, lesquelles sont des causes d'œdèmes généralisés ?

- a. Syndrome néphritique ✔
- b. Insuffisance cardiaque ✔
- c. Insuffisance hépatocellulaire ✔
- d. Thrombose aortique ✖
- e. Insuffisance respiratoire ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Syndrome néphritique, Insuffisance cardiaque, Insuffisance hépatocellulaire

---

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes ?

- a. Une protéinurie de 30 mg par jour est considérée comme physiologique. ✔
- b. Une albuminurie de 100 mg par jour est considérée comme physiologique. ✖
- c. Une bandelette urinaire négative exclut la présence de protéinurie. ✖
- d. Une bandelette urinaire négative élimine une pathologie rénale. ✖
- e. Il est indispensable de réaliser un examen des urines de 24h pour apprécier le dosage pondéral de la protéinurie. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Une protéinurie de 30 mg par jour est considérée comme physiologique.

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels sont les diurétiques qui favorisent une hypokaliémie ?

- a. Les thiazidiques, type hydrochlorothiazide. ✔
- b. Les diurétiques de l'anse de henlè, type furosemide ✔
- c. Les anti-aldostéroniques ✖
- d. Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (acétazolamide) ✔
- e. Les bloqueurs du canal sodium du tube contourné distal, type amiloride ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les thiazidiques, type hydrochlorothiazide., Les diurétiques de l'anse de henlè, type furosemide, Les inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (acétazolamide)

Question 8

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les éléments suivants, lesquelles peuvent être rattachés à un syndrome néphrotique pur ?

- a. Albuminémie à 25 g/l ✔
- b. Une tension artérielle à 145/85 mmHg ✖
- c. Rapport protéinurie/créatininurie à 35 mg/mmol ✖
- d. La présence d'hématies dans les urines à 75/mm^3 ✖
- e. Un œdème des paupières ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Albuminémie à 25 g/l, Un œdème des paupières

---

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Parmi les éléments suivants, lesquels orientent vers une hématurie néphrologique ?

- a. L'existence de douleurs lombaires ✖
- b. L'existence de brûlures urinaires ✖
- c. La présence dans les urines de Globules rouges déformés ✔
- d. La présence dans les urines de caillots ✖
- e. La présence dans les urines de cylindres hématiques ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La présence dans les urines de Globules rouges déformés, La présence dans les urines de cylindres hématiques

---

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Quel type de diurétique diminue la perte urinaire de calcium ?

- a. Thiazidiques ✔
- b. Diurétique de l'anse de henlè, type furosemide ✖
- c. Anti-aldostéroniques ✖
- d. Inhibiteurs de l'anhydrase carbonique (acetazolamide) ✖
- e. Bloqueurs du canal sodium du tube contourné distal, type amiloride ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : Thiazidiques

Question 11

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi ces critères, lesquels sont en faveur d'une Insuffisance rénale chronique ?

- a. Présence d'une anémie normochrome normocytaire arégénérative ✔
- b. Présence d'une hypocalcémie ✔
- c. Diminution de la taille des reins ✔
- d. Présence d'une hypernatrémie ✖
- e. Présence d'une hypokaliémie ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Présence d'une anémie normochrome normocytaire arégénérative, Présence d'une hypocalcémie, Diminution de la taille des reins

---

Question 12

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant le bilan du sodium :

- a. La rétention sodée favorise l'apparition d'œdèmes des membres inférieurs. ✔
- b. Le bilan sodé est ajusté pour permettre le maintien d'une natrémie normale. ✖
- c. L'apport de NaCl par l'alimentation doit être au moins de 8 grammes/jours. ✖
- d. En cas de perte digestive de NaCl, le système rénine-angiotensine-Aldostérone est activé pour limiter les sorties rénales. ✔
- e. En cas d'hypernatrémie, une suppression du sodium alimentaire permet de la corriger. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La rétention sodée favorise l'apparition d'œdèmes des membres inférieurs., En cas de perte digestive de NaCl, le système rénine-angiotensine-Aldostérone est activé pour limiter les sorties rénales.