Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:39
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:40
Temps mis	1 min 39 s
Points	8,20/29,00
Note	**5,66** sur 20,00 (**28,28**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'hypernatrémie :

- a. - est le plus souvent secondaire à un apport sodé excessif. ✖
- b. - traduit une difficulté d'accès à l'eau. ✔
- c. - entraîne un œdème cérébral. ✖
- d. - pour un homme de 50 ans, de 80 kg, se traite par un apport d'eau de 500 ml/jour. ✖
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : - traduit une difficulté d'accès à l'eau.

Question 2

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les troubles du potassium :

- a. Le gluconate de calcium ne modifie par le niveau d'hyperkaliémie. ✔
- b. L'administration d'insuline favorise le transfert extracellulaire de potassium. ✖
- c. L'alcalinisation favorise le transfert intracellulaire de potassium. ✔
- d. L'épuration extrarénale est le traitement de référence en cas d'hyperkaliémie sévère chez un patient oligoanurique avec nécrose tubulaire. ✔
- e. Une hypokaliémie sans signes ECG se traite par l'administration *per os* de chlorure de sodium. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Le gluconate de calcium ne modifie par le niveau d'hyperkaliémie., L'alcalinisation favorise le transfert intracellulaire de potassium., L'épuration extrarénale est le traitement de référence en cas d'hyperkaliémie sévère chez un patient oligoanurique avec nécrose tubulaire.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les examens suivants, le(les)quel(s) permet(tent) d'orienter l'étiologie d'une glomérulonéphrite rapidement progressive ?

- a. Recherche d'anticorps anti-myosine ✖
- b. Recherche d'anticorps anti-DNA ✔
- c. Recherche d'anticorps anti-cytoplasme de polynucléaires ✔
- d. Recherche d'anticorps anti-membrane basale glomérulaire ✔
- e. Recherche d'anticorps anti-HLA ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Recherche d'anticorps anti-DNA, Recherche d'anticorps anti-cytoplasme de polynucléaires, Recherche d'anticorps anti-membrane basale glomérulaire

---

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'insuffisance rénale chronique :

- a. - est responsable d'une anémie normochrome normocytaire. ✔
- b. - est responsable de lésions osseuses et d'hyperparathyroïdie secondaire ou tertiaire. ✔
- c. - est progressivement mortelle en l'absence de traitement de suppléance. ✔
- d. - atteint surtout les travailleurs de force dans les pays occidentaux. ✖
- e. - est prévenue par des boissons abondantes. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - est responsable d'une anémie normochrome normocytaire., - est responsable de lésions osseuses et d'hyperparathyroïdie secondaire ou tertiaire., - est progressivement mortelle en l'absence de traitement de suppléance.

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'atteinte rénale des vascularites :

- a. - se présente sous la forme d'une insuffisance rénale fonctionnelle. ✖
- b. - est associée à une protéinurie de rang glomérulaire. ✔
- c. - est associée à une hématurie. ✔
- d. - s'associe souvent à une hypotension artérielle. ✖
- e. - est une urgence diagnostique et thérapeutique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - est associée à une protéinurie de rang glomérulaire., - est associée à une hématurie., - est une urgence diagnostique et thérapeutique.

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Lors du traitement d'une acidose par perfusion de bicarbonate intraveineux :

- a. Il y a un risque d'œdème du poumon. ✔
- b. Il y a un risque d'hypokaliémie. ✔
- c. Il y a un risque de sur-correction, surtout en cas d'acidose a trou anionique. ✔
- d. Il y a un risque d'hypercalcémie. ✖
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il y a un risque d'œdème du poumon., Il y a un risque d'hypokaliémie., Il y a un risque de sur-correction, surtout en cas d'acidose a trou anionique.

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

En cas d'hypercalcémie d'origine parathyroïdienne :

- a. La parathormone peut être normale. ✔
- b. Il existe une hypercalciurie. ✔
- c. On retrouve un adénome simple dans 20 % des cas. ✖
- d. Il existe une augmentation de la résorption osseuse. ✔
- e. Il existe une baisse de l'absorption digestive de calcium. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La parathormone peut être normale., Il existe une hypercalciurie., Il existe une augmentation de la résorption osseuse.

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

L'atteinte rénale du myélome :

- a. - est secondaire au dépôt intra-rénal des chaines légères de l'immunoglobuline monoclonale. ✔
- b. - récupère, au moins partiellement, si elle est traitée rapidement. ✔
- c. - peut nécessiter une suppléance de la fonction rénale par dialyse. ✔
- d. - est souvent associé à une hypercalcémie. ✔
- e. - concerne principalement des sujets âgés de 25 à 40 ans. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - est secondaire au dépôt intra-rénal des chaines légères de l'immunoglobuline monoclonale., - récupère, au moins partiellement, si elle est traitée rapidement., - peut nécessiter une suppléance de la fonction rénale par dialyse., - est souvent associé à une hypercalcémie.

Question 9

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les éléments suivants, lesquels orientent vers une maladie rénale glomérulaire ?

- a. Hyponatrémie ✖
- b. Protéinurie supérieure à 3 g par jour ✔
- c. Présence d'un syndrome néphrotique ✔
- d. Hématurie macroscopique avec caillots ✖
- e. Insuffisance rénale rapidement progressive avec HTA ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Protéinurie supérieure à 3 g par jour, Présence d'un syndrome néphrotique, Insuffisance rénale rapidement progressive avec HTA

Question 10

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

L'hyperkaliémie :

- a. - est favorisée par les diarrhées importantes. ✖
- b. - entraîne un risque élevé de mort subite. ✔
- c. - est favorisée par les médicaments bloqueurs du système-rénine-angiotensine. ✔
- d. - est traitée rapidement par l'apport de glucose avec de l'insuline. ✔
- e. - est faussée lorsque le prélèvement sanguin est réalisé avec garrot et que le tube n'est pas traité rapidement par le laboratoire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - entraîne un risque élevé de mort subite., - est favorisée par les médicaments bloqueurs du système-rénine-angiotensine., - est traitée rapidement par l'apport de glucose avec de l'insuline., - est faussée lorsque le prélèvement sanguin est réalisé avec garrot et que le tube n'est pas traité rapidement par le laboratoire.

Question 11

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant les étiologies de dyskaliémies :

- a. Une hypokaliémie avec hypertension artérielle oriente vers un hyperaldostéronisme. ✔
- b. Une hypokaliémie avec une kaliurèse effondrée évoque une cause extra rénale. ✔
- c. Une lyse cellulaire massive se traduira par une hypokaliémie. ✖
- d. L'acidose métabolique favorise le transfert extracellulaire de potassium et l'hyperkaliémie. ✔
- e. L'insuffisance rénale est une situation particulièrement à risque d'hyperkaliémie. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une hypokaliémie avec hypertension artérielle oriente vers un hyperaldostéronisme., Une hypokaliémie avec une kaliurèse effondrée évoque une cause extra rénale., L'acidose métabolique favorise le transfert extracellulaire de potassium et l'hyperkaliémie., L'insuffisance rénale est une situation particulièrement à risque d'hyperkaliémie.

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les troubles suivants, lesquels sont observés en cas d'hypercalcémie ?

- a. Des troubles digestifs type nausées et vomissements ✔
- b. Une onde T ample et pointue ✖
- c. Une asthénie ✔
- d. Un tableau de polyuro-polydipsie ✔
- e. Un signe de Chvostek ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Des troubles digestifs type nausées et vomissements, Une asthénie, Un tableau de polyuro-polydipsie

---

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Les symptômes en faveur d'une néphropathie interstitielle sont :

- a. La présence d'une importante protéinurie, supérieure à 3 g par jour ✖
- b. La présence d'une polyurie ✔
- c. La présence d'une leucocyturie ✔
- d. La présence d'une hypoalbuminémie ✖
- e. La présence d'une acidose sans trou anionique ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La présence d'une polyurie, La présence d'une leucocyturie, La présence d'une acidose sans trou anionique

---

Question 14

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi ces traitements, lesquels sont pourvoyeurs d'hypokaliémie ?

- a. L'insuline ✔
- b. Les diurétiques thiazidiques ✔
- c. Les diurétiques de l'anse ✔
- d. Les anti-aldostérones ✖
- e. Les IEC/ARA2 ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : L'insuline, Les diurétiques thiazidiques, Les diurétiques de l'anse

---

Question 15

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La prise en charge d'une colique néphrétique :

- a. - nécessite de rechercher de la fièvre. ✔
- b. - chez la jeune femme, nécessite un test de grossesse. ✔
- c. - justifie la réalisation d'un ECBU (Examen Cytobactériologique des Urines). ✔
- d. - est traitée par paracétamol en monothérapie. ✖
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - nécessite de rechercher de la fièvre., - chez la jeune femme, nécessite un test de grossesse., - justifie la réalisation d'un ECBU (Examen Cytobactériologique des Urines).

Question 16

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

La polykystose rénale autosomique dominante :

- a. - est transmise de génération en génération, avec un risque de transmission de 25%. ✖
- b. - est caractérisée par des reins augmentés de taille avec de multiples kystes. ✔
- c. - est liée à la mutation de plusieurs gènes, avec une expression clinique variable. ✔
- d. - atteint souvent le foie. ✔
- e. - est associée à un risque accru d'hémorragie cérébrale. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - est caractérisée par des reins augmentés de taille avec de multiples kystes., - est liée à la mutation de plusieurs gènes, avec une expression clinique variable., - atteint souvent le foie., - est associée à un risque accru d'hémorragie cérébrale.

Question 17

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La sténose d'artère rénale :

- a. - peut toucher la femme jeune sans facteur de risque cardio-vasculaire. ✔
- b. - doit faire réaliser une échographie doppler des artères rénales. ✔
- c. Elle est toujours proximale. ✖
- d. Elle doit faire réaliser une angiographie en urgence pour revascularisation. ✖
- e. Elle peut entraîner une HTA résistante avec œdème aigu pulmonaire (OAP) flash. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - peut toucher la femme jeune sans facteur de risque cardio-vasculaire., - doit faire réaliser une échographie doppler des artères rénales., Elle peut entraîner une HTA résistante avec œdème aigu pulmonaire (OAP) flash.

Question 18

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Concernant les troubles de la natrémie :

- a. Une hyponatrémie à 116mmol/L est une hyponatrémie sévère. ✔
- b. Les vomissements dans un contexte d'hyponatrémie est un signe de sévérité de l'hyponatrémie. ✔
- c. Une hypernatrémie avec une polyurie est évocatrice d'un diabète insipide. ✔
- d. Une hyponatrémie correspond à une déshydratation extracellulaire. ✖
- e. Une hypernatrémie avec signes neurologiques est une hypernatrémie sévère. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une hyponatrémie à 116mmol/L est une hyponatrémie sévère., Les vomissements dans un contexte d'hyponatrémie est un signe de sévérité de l'hyponatrémie., Une hypernatrémie avec une polyurie est évocatrice d'un diabète insipide., Une hypernatrémie avec signes neurologiques est une hypernatrémie sévère.

Question 19

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

L'insuffisance rénale aiguë :

- a. - doit être traitée en urgence. ✔
- b. - récupère souvent si elle est prise en charge rapidement. ✔
- c. - à de multiples étiologies. ✔
- d. - nécessite le plus souvent des séances de dialyse. ✖
- e. - est une conséquence de la déshydratation extracellulaire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - doit être traitée en urgence., - récupère souvent si elle est prise en charge rapidement., - à de multiples étiologies., - est une conséquence de la déshydratation extracellulaire.

Question 20

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Une acidose métabolique :

- a. - comporte une diminution du bicarbonate sanguin. ✔
- b. - favorise l'apparition d'une hyperkaliémie. ✔
- c. - est une des complications de l'insuffisance rénale et comporte alors un trou anionique sanguin. ✔
- d. - est une des complications des vomissements. ✖
- e. - nécessite un apport de bicarbonate intraveineux, surtout en cas d'acido-cétose. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - comporte une diminution du bicarbonate sanguin., - favorise l'apparition d'une hyperkaliémie., - est une des complications de l'insuffisance rénale et comporte alors un trou anionique sanguin.

Question 21

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les reins lors de la grossesse normale :

- a. - augmentent leur débit de filtration glomérulaire. ✔
- b. - sont responsables d'une baisse de l'uricémie. ✔
- c. - diminuent de taille. ✖
- d. - voient leur débit sanguin augmenter. ✔
- e. Toutes les réponses ci-dessus sont fausses. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : - augmentent leur débit de filtration glomérulaire., - sont responsables d'une baisse de l'uricémie., - voient leur débit sanguin augmenter.

Question 22

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La créatinine :

- a. - est un produit de dégradation du métabolisme musculaire. ✔
- b. Son taux sanguin est augmenté en cas d'insuffisance rénale. ✔
- c. Son taux sanguin est élevé en cas d'insuffisance hépatique. ✖
- d. Son élévation est inversement proportionnelle au débit de filtration glomérulaire. ✔
- e. - est éliminée principalement par sécrétion tubulaire rénale. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - est un produit de dégradation du métabolisme musculaire., Son taux sanguin est augmenté en cas d'insuffisance rénale., Son élévation est inversement proportionnelle au débit de filtration glomérulaire.

Question 23

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

La néphropathie diabétique :

- a. - ne concerne que les diabétiques de type 1. ✖
- b. - est associée à une protéinurie. ✔
- c. - est une maladie glomérulaire. ✔
- d. - est précédée par l'apparition d'une HTA. ✔
- e. - peut être stabilisée par un bon équilibre glycémique et un traitement par bloqueurs du système rénine-angiotensine. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - est associée à une protéinurie., - est une maladie glomérulaire., - est précédée par l'apparition d'une HTA., - peut être stabilisée par un bon équilibre glycémique et un traitement par bloqueurs du système rénine-angiotensine.

Question 24

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'hypertension artérielle (HTA) maligne :

- a. - peut générer une rétinopathie hypertensive, une encéphalopathie hypertensive. ✔
- b. - peut générer une insuffisance rénale rapidement progressive. ✔
- c. - n'est pas associée à une protéinurie. ✖
- d. - peut se présenter comme un syndrome de Microangiopathie Thrombotique (MAT) avec anémie hémolytique mécanique. ✔
- e. - se définit par une pression artérielle systolique > 130 mmHg. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : - peut générer une rétinopathie hypertensive, une encéphalopathie hypertensive., - peut générer une insuffisance rénale rapidement progressive., - peut se présenter comme un syndrome de Microangiopathie Thrombotique (MAT) avec anémie hémolytique mécanique.

Question 25

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'hyponatrémie :

- a. - est responsable d'œdèmes des membres inférieurs. ✖
- b. - entraîne un retentissement cérébral proportionnel à sa vitesse d'installation. ✔
- c. - ne doit pas être corrigée rapidement. ✔
- d. - est principalement secondaire à une perte de sodium. ✖
- e. - est traitée en première intention par une restriction hydrique. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - entraîne un retentissement cérébral proportionnel à sa vitesse d'installation., - ne doit pas être corrigée rapidement., - est traitée en première intention par une restriction hydrique.

Question 26

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

La lithiase urinaire peut se manifester par :

- a. Une colique néphrétique ✔
- b. Une pyélonéphrite aiguë ✔
- c. Une insuffisance rénale chronique ✔
- d. Aucun symptôme et être asymptomatique ✔
- e. Aucune des propositions ci-dessus n'est exacte. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Une colique néphrétique, Une pyélonéphrite aiguë, Une insuffisance rénale chronique, Aucun symptôme et être asymptomatique

---

Question 27

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

La transplantation rénale :

- a. - nécessite un traitement immunosuppresseur au long court. ✔
- b. Le donneur décédé doit avoir donné son accord de son vivant. ✖
- c. La principale situation permettant le don d'organe en France est celle de la mort cérébrale. ✔
- d. Le donneur en mort cérébrale ne pourra être prélevé qu'après la mort cardiaque. ✖
- e. - concerne plusieurs milliers de patients en France. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - nécessite un traitement immunosuppresseur au long court., La principale situation permettant le don d'organe en France est celle de la mort cérébrale., - concerne plusieurs milliers de patients en France.

Question 28

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

L'insuffisance rénale terminale :

- a. Le diabète en est une des causes principales en France. ✔
- b. Son meilleur traitement de suppléance est la transplantation rénale. ✔
- c. - retentit sur le système neurologique. ✔
- d. - peut être retardée avec un traitement néphroprotecteur bien conduit. ✔
- e. - est associée à une hypertension artérielle par surcharge extracellulaire. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Le diabète en est une des causes principales en France., Son meilleur traitement de suppléance est la transplantation rénale., - retentit sur le système neurologique., - peut être retardée avec un traitement néphroprotecteur bien conduit., - est associée à une hypertension artérielle par surcharge extracellulaire.

Question 29

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant la protéinurie dans la néphropathie à cylindres myélomateux, elle est :

- a. Glomérulaire ✖
- b. Tubulaire ✔
- c. Constituée d'albumine ✖
- d. Constituée de chaines légères des immunoglobulines ✔
- e. Détectable par la bandelette urinaire ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Tubulaire, Constituée de chaines légères des immunoglobulines