Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:41
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:42
Temps mis	44 s
Points	4,40/14,00
Note	**6,29** sur 20,00 (**31,43**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'anémie liée à l'insuffisance rénale chronique :

- a. - est arégénérative. ✔
- b. - peut être importante, avec une hémoglobinémie < 6 g/dL. ✔
- c. - est responsable d'une augmentation du débit cardiaque. ✔
- d. - doit être traitée par érythropoïétine lorsque l'hémoglobine est < 11 g/dL. ✖
- e. - a pour cible une hémoglobine > 12 g/dL. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - est arégénérative., - peut être importante, avec une hémoglobinémie < 6 g/dL., - est responsable d'une augmentation du débit cardiaque.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les troubles acidobasiques en situation d'insuffisance rénale chronique :

- a. - sont liés principalement à une perte rénale de bicarbonates. ✖
- b. - sont associés à une diminution du trou anionique sanguin. ✖
- c. - participent au catabolisme musculaire exagéré des patients insuffisants rénaux. ✔
- d. - doivent être traités avec l'objectif d'une réserve alcaline plasmatique supérieure à 22 mmol/L. ✔
- e. - sont associés à une acidocétose. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : - participent au catabolisme musculaire exagéré des patients insuffisants rénaux., - doivent être traités avec l'objectif d'une réserve alcaline plasmatique supérieure à 22 mmol/L.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les signes suivants, lesquels peuvent être rattachés à l'insuffisance rénale chronique :

- a. Crampes ✔
- b. Anorexie ✔
- c. Paralysie faciale ✖
- d. Dyspnée ✔
- e. Douleurs lombaires ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Crampes, Anorexie, Dyspnée

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Afin de limiter les complications de l'insuffisance rénale chronique :

- a. Vous conseillez de boire au moins 2 litres/jour. ✖
- b. Vous vérifiez l'uricémie qui est souvent responsable de crises de goutte chez ces patients. ✖
- c. Vous contrôlez l'apport sodé qui joue un rôle majeur dans l'hypertension artérielle associée. ✔
- d. Vous interdisez les légumes frais. ✖
- e. Vous vérifiez l'absence de carence en vitamine D, qui aggrave les complications osseuses de l'urémie. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Vous contrôlez l'apport sodé qui joue un rôle majeur dans l'hypertension artérielle associée., Vous vérifiez l'absence de carence en vitamine D, qui aggrave les complications osseuses de l'urémie.

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Lorsque vous découvrez une anémie chez un patient en insuffisance rénale terminale :

- a. Vous demandez un dosage de la vitamine B12 sérique. ✔
- b. Vous demandez un dosage du taux de folates sanguins. ✔
- c. Vous demandez une électrophorèse de l'hémoglobine. ✖
- d. Votre objectif de stock martial est d'obtenir une ferritinémie > 200 ng/mL avec un coefficient de saturation de la transferrine > 20%. ✔
- e. Vous recherchez un syndrome inflammatoire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Vous demandez un dosage de la vitamine B12 sérique., Vous demandez un dosage du taux de folates sanguins., Votre objectif de stock martial est d'obtenir une ferritinémie > 200 ng/mL avec un coefficient de saturation de la transferrine > 20%., Vous recherchez un syndrome inflammatoire.

Question 6

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Vous prenez en charge un patient aux urgences pour une insuffisance rénale terminale :

- a. Vous le perfusez avec 3 litres de sérum physiologique afin d'éliminer une cause fonctionnelle surajoutée. ✖
- b. Vous le transfusez si son hémoglobinémie est inférieure à 10 g/dL. ✖
- c. Vous vérifiez sa kaliémie. ✔
- d. Vous demandez une échographie rénale. ✔
- e. Vous vérifiez qu'il ne présente pas d'œdème pulmonaire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Vous vérifiez sa kaliémie., Vous demandez une échographie rénale., Vous vérifiez qu'il ne présente pas d'œdème pulmonaire.

Question 7

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'ostéite fibreuse observée chez les insuffisants rénaux :

- a. - est liée à l'hyperparathyroïdie. ✔
- b. - se manifeste par des douleurs osseuses et des fractures pathologiques. ✔
- c. - est évoquée devant une baisse de la PTH. ✖
- d. - est responsable, sur le plan radiologique, de la résorption des extrémités osseuses. ✔
- e. - est liée à une baisse du taux de renouvellement osseux. ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - est liée à l'hyperparathyroïdie., - se manifeste par des douleurs osseuses et des fractures pathologiques., - est responsable, sur le plan radiologique, de la résorption des extrémités osseuses.

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Quels sont les facteurs biologiques qui participent à l'altération du métabolisme osseux chez les patients insuffisants rénaux ?

- a. Hypocalcémie ✔
- b. Acidose ✔
- c. Déficit en 1,25-Dihydroxy-Vitamin D ✔
- d. Déficit en phosphate ✖
- e. Hyperkaliémie ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Hypocalcémie, Acidose, Déficit en 1,25-Dihydroxy-Vitamin D

Question 9

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quels sont les facteurs qui participent aux lésions cardiovasculaires des patients insuffisants rénaux ?

- a. Anémie ✔
- b. Anomalies phosphocalciques ✔
- c. Hyperhomocystéinémie ✔
- d. Toxines urémiques ✔
- e. HTA ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Anémie, Anomalies phosphocalciques, Hyperhomocystéinémie, Toxines urémiques, HTA

Question 10

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Quels sont les secteurs de l'organisme altérés par l'insuffisance rénale chronique évoluée ?

- a. Cœur ✔
- b. Cerveau ✔
- c. Système digestif ✔
- d. Système immunitaire ✔
- e. Système nerveux périphérique ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Cœur, Cerveau, Système digestif, Système immunitaire, Système nerveux périphérique

---

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les troubles phosphocalciques secondaires à l'insuffisance rénale chronique :

- a. - comportent une hypocalcémie. ✔
- b. - comportent une hypophosphatémie. ✖
- c. - sont responsables de lésions osseuses et vasculaires. ✔
- d. - sont exceptionnels. ✖
- e. - ne sont observés qu'au stade 5 de l'insuffisance rénale. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : - comportent une hypocalcémie., - sont responsables de lésions osseuses et vasculaires.

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

L'hypertension artérielle liée à l'insuffisance rénale chronique :

- a. - apparait à un stade tardif de l'insuffisance rénale. ✖
- b. - est volo-dépendante. ✔
- c. - aggrave l'insuffisance rénale. ✔
- d. - se présente comme une HTA secondaire avec hypokaliémie. ✖
- e. - est responsable d'une part de l'atteinte cardiaque de ces patients. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.

Les réponses correctes sont : - est volo-dépendante., - aggrave l'insuffisance rénale., - est responsable d'une part de l'atteinte cardiaque de ces patients.

Question 13

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

L'athérosclérose des patients dialysés :

- a. - est une complication grave de l'insuffisance rénale chronique. ✔
- b. - n'est pas influencée par le tabagisme. ✖
- c. - est aggravée par une insulinorésistance liée à l'urémie. ✔
- d. - est responsable de la mort d'un patient sur 2. ✔
- e. - est associée à un triplement du risque d'infarctus du myocarde. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : - est une complication grave de l'insuffisance rénale chronique., - est aggravée par une insulinorésistance liée à l'urémie., - est responsable de la mort d'un patient sur 2., - est associée à un triplement du risque d'infarctus du myocarde.

Question 14

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les troubles digestifs de l'insuffisance rénale chronique :

- a. Les nausées sont fréquentes au stade évolué de l'insuffisance rénale. ✔
- b. La diarrhée est un signe d'insuffisance rénale terminale. ✖
- c. L'anorexie est inhabituelle. ✖
- d. Les nausées et vomissements sont améliorés par l'épuration extrarénale. ✔
- e. Les gastrites sont fréquentes et participent à l'anémie. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les nausées sont fréquentes au stade évolué de l'insuffisance rénale., Les nausées et vomissements sont améliorés par l'épuration extrarénale., Les gastrites sont fréquentes et participent à l'anémie.