Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 08:46
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 08:46
Temps mis	20 s
Points	1,40/5,00
Note	**5,60** sur 20,00 (**28**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) :

- a. Leurs effets antipyrétiques et antalgiques passent par l'inhibition de la Cyclooxygénase de type 2. ✔
- b. Les AINS sont des inhibiteurs spécifiques de la Cyclooxygénase de type 1. ✖
- c. Les effets des AINS vis-à-vis de la cyclooxygénases de type 2 (COX2) sont à l'origine de leur indication comme antiagrégant plaquettaire. ✖
- d. Le Celecoxib a été développé pour présenter une sélectivité vis-à-vis de la cyclooxygénases de type 2 (COX2). ✔
- e. L'inhibition de la synthèse des prostacyclines par les Coxib peut provoquer une induction de thromboxane A2 pro-agrégant plaquettaire. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Leurs effets antipyrétiques et antalgiques passent par l'inhibition de la Cyclooxygénase de type 2., Le Celecoxib a été développé pour présenter une sélectivité vis-à-vis de la cyclooxygénases de type 2 (COX2)., L'inhibition de la synthèse des prostacyclines par les Coxib peut provoquer une induction de thromboxane A2 pro-agrégant plaquettaire.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

A propos de l'aspirine :

- a. C'est un inhibiteur irréversible des cyclooxygénases. ✔
- b. A faible dose (< 160 mg), c'est un anti-inflammatoire. ✖
- c. A forte dose (> 500mg), c'est un antiagrégant plaquettaire. ✖
- d. C'est le seul antipyrétique indiqué au cours de la grossesse. ✖
- e. L'aspirine est responsable de saignements, d'ulcères ou de perforation de la paroi de l'estomac (PUS). ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : C'est un inhibiteur irréversible des cyclooxygénases., L'aspirine est responsable de saignements, d'ulcères ou de perforation de la paroi de l'estomac (PUS).

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les anti-inflammatoires stéroïdiens :

- a. Les glucocorticoïdes sont des molécules hydrophiles. ✖
- b. Les glucocorticoïdes sont des molécules hydrophobes. ✔
- c. Les corticoïdes inhibent indirectement la production d'acide arachidonique. ✔
- d. Les corticoïdes de synthèse exercent une action antiproliférative sur certains types de leucocytes. ✔
- e. Les glucocorticoïdes sont des inhibiteurs irréversibles de la cyclo-oxygénase 1 (COX1). ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les glucocorticoïdes sont des molécules hydrophobes., Les corticoïdes inhibent indirectement la production d'acide arachidonique., Les corticoïdes de synthèse exercent une action antiproliférative sur certains types de leucocytes.

Question 4

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les antiinflammatoires stéroïdiens :

- a. Les corticoïdes de synthèse présentent une activité anti-inflammatoire équivalente à celle du cortisol endogène. ✖
- b. Les corticostéroïdes de synthèse visent à être moins sélectifs du récepteur aux minéralo-corticoïdes. ✔
- c. Les corticoïdes de synthèse ont une demi-vie plasmatique très courte (<1h). ✖
- d. Les corticoïdes entrainent des troubles de la répartition des graisses. ✔
- e. Les corticoïdes de synthèse agissent uniquement sur la phase précoce de l'inflammation. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Les corticostéroïdes de synthèse visent à être moins sélectifs du récepteur aux minéralo-corticoïdes., Les corticoïdes entrainent des troubles de la répartition des graisses.

Question 5

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Concernant le mécanisme d'action des immunosuppresseurs :

- a. La ciclosporine inhibe l'interaction entre la cyclophiline et la calcineurine ✔
- b. Le tacrolimus inhibe l'interaction entre FKBP12 et calcineurine ✔
- c. Le belatacept est un inhibiteur des récepteurs CD80/CD86 de costimulation de la voie du CD28. ✔
- d. Le mycophénolate mofétil inhibe la prolifération des lymphocytes en bloquant la synthèse des bases de l'ADN. ✔
- e. Le methotrexate inhibe la prolifération des lymphocytes en bloquant la synthèse des bases de l'ADN. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : La ciclosporine inhibe l'interaction entre la cyclophiline et la calcineurine, Le tacrolimus inhibe l'interaction entre FKBP12 et calcineurine, Le belatacept est un inhibiteur des récepteurs CD80/CD86 de costimulation de la voie du CD28., Le mycophénolate mofétil inhibe la prolifération des lymphocytes en bloquant la synthèse des bases de l'ADN., Le methotrexate inhibe la prolifération des lymphocytes en bloquant la synthèse des bases de l'ADN.