Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 10:43
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 10:43
Temps mis	13 s
Points	1,20/3,00
Note	**8,00** sur 20,00 (**40**%)

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les immunosuppresseurs :

- a. Le Tacrolimus est un inhibiteur de la synthèse des purines et pyrimidines. ✖
- b. Le Sirolimus est un antagoniste du récepteur à l'IL-2. ✖
- c. La Ciclosporine est un inhibiteur de la calcineurine. ✔
- d. La Rapamycine est un inhibiteur de mTor. ✔
- e. Le Mycofénolate mofétil est un antagoniste du récepteur CD80. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : La Ciclosporine est un inhibiteur de la calcineurine., La Rapamycine est un inhibiteur de mTor.

Question 2

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Concernant les anti-inflammatoires stéroïdiens :

- a. Les corticoïdes de synthèse présentent une activité anti-inflammatoire supérieure à celle du cortisol endogène. ✔
- b. Les corticoïdes inhibent indirectement la production d'acide arachidonique. ✔
- c. Les corticoïdes entrainent des troubles de la répartition des graisses. ✔
- d. Les corticoïdes provoquent de l'ostéoporose. ✔
- e. Les corticoïdes sont hyperglycémiants et diabétogènes. ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : Les corticoïdes de synthèse présentent une activité anti-inflammatoire supérieure à celle du cortisol endogène., Les corticoïdes inhibent indirectement la production d'acide arachidonique., Les corticoïdes entrainent des troubles de la répartition des graisses., Les corticoïdes provoquent de l'ostéoporose., Les corticoïdes sont hyperglycémiants et diabétogènes.

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les molécules suivantes, lesquelles sont diminuées par l'action de l'aspirine ?

- a. Les leucotriènes ✖
- b. Les prostaglandines ✔
- c. Les tromboxanes ✔
- d. Les prostacyclines ✔
- e. Les interleukines 2 et 6 ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les prostaglandines, Les tromboxanes, Les prostacyclines