Commencé le	mardi 27 octobre 2026, 10:42
État	Terminée
Terminé le	mardi 27 octobre 2026, 10:43
Temps mis	52 s
Points	3,80/16,00
Note	**4,75** sur 20,00 (**23,75**%)

Question 1

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les polynucléaires basophiles (PNB) :

- a. Ce sont les moins nombreux des granulocytes. ✔
- b. Leurs granules cytoplasmiques sont riches en histamine et héparine. ✔
- c. Comme les mastocytes, ils contribuent à la réponse allergique dépendante des IgE. ✔
- d. Ce sont des phagocytes à activité antiparasitaire. ✖
- e. Ce sont des cellules essentiellement circulantes à durée de vie longue (plusieurs semaines à plusieurs mois) ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Ce sont les moins nombreux des granulocytes., Leurs granules cytoplasmiques sont riches en histamine et héparine., Comme les mastocytes, ils contribuent à la réponse allergique dépendante des IgE.

Question 2

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Remettez dans l'ordre chronologique la séquence du modèle unificateur de la signalisation des cytokines :

1. Phosphorylation du récepteur et STAT (Signal transducer and activator of transcription)

2. Translocation de STAT phosphorylé dans le noyau.

3. Activation de JAK (Janus activated kinase)

4. Activation de la transcription des gènes de la réponse immune

5. Dimérisation du récepteur.

- a. 43215 ✖
- b. 35142
- c. 14253
- d. 53124
- e. 12345

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : 53124

Question 3

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les récepteurs des cellules NK (NKR):

- a. Les NKR de type lectine reconnaissent davantage des protéines que des carbohydrates ✔
- b. Les NKR de type KIR sont des récepteurs de type Immunoglobuline. ✔
- c. Les NKR de type lectine interagissent avec les molécules HLA de classe I. ✖
- d. Les NKR de type KIR interagissent avec les molécules HLA de classe II. ✖
- e. Les NKR peuvent être de type activateur ou inhibiteur. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Les NKR de type lectine reconnaissent davantage des protéines que des carbohydrates, Les NKR de type KIR sont des récepteurs de type Immunoglobuline., Les NKR peuvent être de type activateur ou inhibiteur.

Question 4

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Concernant les mécanismes pouvant induire la dégranulation des mastocytes, il peut être déclenché par:

- a. La liaison croisée entre IgE et Fc-epsilon Récepteur I. ✔
- b. par la liaison entre IgE et Fc-epsilon Récepteur II ✖
- c. par la liaison entre IgG et Fc-epsilon Récepteur I ✖
- d. par l'action de l'anaphylatoxine C3a ✔
- e. par certains médicaments tel que la codéine ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : La liaison croisée entre IgE et Fc-epsilon Récepteur I., par l'action de l'anaphylatoxine C3a, par certains médicaments tel que la codéine

---

Question 5

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

L'immunité innée :

- a. se caractérise par la reconnaissance de motifs moléculaires partagés par des familles d'agents pathogènes. ✔
- b. n'induit aucune mémoire immunitaire. ✔
- c. prépare le déclenchement de l'immunité adaptative. ✔
- d. fait intervenir uniquement des cellules phagocytaires. ✖
- e. permet la défense de l'organisme contre les agents infectieux de façon immédiate. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : se caractérise par la reconnaissance de motifs moléculaires partagés par des familles d'agents pathogènes., n'induit aucune mémoire immunitaire., prépare le déclenchement de l'immunité adaptative., permet la défense de l'organisme contre les agents infectieux de façon immédiate.

Question 6

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les PAMPs (motifs moléculaires associés aux pathogènes) :

- a. sont produits par l'organisme-hôte en réponse à une infection par des microbes. ✖
- b. sont exprimés à la surface des cellules apoptotiques. ✖
- c. sont communs à de grandes classes d'agents infectieux. ✔
- d. mutent constamment pour échapper aux systèmes de reconnaissance immunitaire ✖
- e. Certains PAMPs peuvent être liés par des opsonines. ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : sont communs à de grandes classes d'agents infectieux. , Certains PAMPs peuvent être liés par des opsonines.

Question 7

Correct

Note de 1,00 sur 1,00

Parmi ces leucocytes, le(s)quel(s) est(sont) impliqué(s) dans le processus de cytotoxicité dépendant des anticorps ?

- a. NK ✔
- b. Monocyte ✔
- c. Neutrophile ✔
- d. Eosinophile ✔
- e. Macrophage ✔

La réponse est correcte.

Les réponses correctes sont : NK, Monocyte, Neutrophile, Eosinophile, Macrophage

---

Question 8

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Au sujet du TNF alpha :

- a. Il est produit par les phagocytes mononuclées, les lymphocytes T et les lymphocytes NK. ✔
- b. Le TNF retrouvé dans le sang est produit principalement par les glandes surrénales. ✖
- c. Il induit l'adhésion des plaquettes à l'endothélium vasculaire. ✔
- d. C'est le principal médiateur de la réponse aux infections bactériennes à bacilles et à bactéries gram négatif. ✔
- e. Les effets systémiques du TNF peuvent conduire à des hémorragies et à des défaillances multi-viscérales. ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Il est produit par les phagocytes mononuclées, les lymphocytes T et les lymphocytes NK., Il induit l'adhésion des plaquettes à l'endothélium vasculaire., C'est le principal médiateur de la réponse aux infections bactériennes à bacilles et à bactéries gram négatif., Les effets systémiques du TNF peuvent conduire à des hémorragies et à des défaillances multi-viscérales.

Question 9

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les molécules d'adhésion cellulaire (MAC):

- a. PECAM est une molécule d'adhésion cellulaire à liaison homotypique. ✔
- b. Leur expression est restreinte aux leucocytes et aux cellules de l'endothélium vasculaire. ✖
- c. Elles appartiennent à 5 familles de protéines (Sélectines, Mucines, Intégrines, Plasmines et Superfamille des Immunoglobulines). ✖
- d. Leur fonction est d'immobiliser les leucocytes au niveau de l'endothélium vasculaire. ✖
- e. Les MAC induisent la formation de complexes d'attaque membranaires. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : PECAM est une molécule d'adhésion cellulaire à liaison homotypique.

Question 10

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

L'immunité innée est un mécanisme de défense:

- a. dont la spécificité est liée à la nature de l'agent infectieux. ✖
- b. dont l'intensité croit avec la répétition des infections. ✖
- c. qui peut être impliqué dans l'élimination des cellules tumorales. ✔
- d. qui fait appel uniquement à des agents chimiques non spécifiques. ✖
- e. dont l'efficacité croit avec l'âge. ✖

La réponse n'est pas correcte.

La réponse correcte est : qui peut être impliqué dans l'élimination des cellules tumorales.

Question 11

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Les lymphocytes T gamma/delta :

- a. sont majoritairement CD4-/CD8-. ✔
- b. L'activation de leur TCR est restreinte au CMH de classe I. ✖
- c. expriment des récepteurs NK inhibiteur tel que le NKG2D. ✖
- d. correspondent à une sous population rare (moins de 10%) de lymphocytes T. ✔
- e. sont non-cytotoxique. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : sont majoritairement CD4-/CD8-., correspondent à une sous population rare (moins de 10%) de lymphocytes T.

Question 12

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

Quelle(s) est(sont) la(les) fonction(s) associée(s) au macrophage ?

- a. Phagocytose ✔
- b. Cytotoxicité ✔
- c. Présentation de l'antigène ✔
- d. Sécrétion de médiateurs agissant sur les lymphocytes ✔
- e. Sécrétion d'histamines ✖

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : Phagocytose, Cytotoxicité, Présentation de l'antigène, Sécrétion de médiateurs agissant sur les lymphocytes

---

Question 13

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les chimiokines :

- a. Ce sont majoritairement des petits polypeptides solubles (10-30kDa). ✔
- b. Leur seule fonction est d'induire le chimiotactisme. ✖
- c. Elles agissent par l'intermédiaire de récepteurs de la famille des RCPG. ✔
- d. Elles sont classées en fonction de leur mode d'action. ✖
- e. L'IL-8 est produite exclusivement par les neutrophiles. ✖

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : Ce sont majoritairement des petits polypeptides solubles (10-30kDa)., Elles agissent par l'intermédiaire de récepteurs de la famille des RCPG.

Question 14

Partiellement correct

Note de 0,50 sur 1,00

La signalisation intracellulaire des TLRs :

- a. nécessite des protéines adaptatrices qui interagissent avec le domaine TIR. ✔
- b. L'adaptateur le plus commun des TLRs est MyD88 qui en formant un complexe avec IRF3 conduit à la production d'interferon alpha. ✖
- c. fait intervenir des protéines kinases. ✔
- d. permet d'activer la voie des MAP kinases. ✔
- e. Permet d'induire une réponse immunitaire innée immédiate ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : nécessite des protéines adaptatrices qui interagissent avec le domaine TIR., fait intervenir des protéines kinases., permet d'activer la voie des MAP kinases., Permet d'induire une réponse immunitaire innée immédiate

---

Question 15

Incorrect

Note de 0,00 sur 1,00

Concernant les cellules NK, elles expriment :

- a. CD3 ✖
- b. CD19 ✖
- c. CD14 ✖
- d. CD16 ✔
- e. CD56 ✔

La réponse n'est pas correcte.

Les réponses correctes sont : CD16, CD56

Question 16

Partiellement correct

Note de 0,20 sur 1,00

Parmi les cytokines suivantes, indiquez celle(s) qui appartient(ennent) au groupe des chimiokines :

- a. CXCL8 ✔
- b. Interferon-beta ✖
- c. TGF-beta ✖
- d. RANTES ✔
- e. MIP-I ✔

Vous avez sélectionné trop d'options.
Les réponses correctes sont : CXCL8, RANTES, MIP-I