

Função Delta de Dirac, Funções de Green e Distribuições

Sandro Vitenti

Table of contents

Introdução	1
A Função Degrau de Heaviside	2
A Função Delta de Dirac	2
Delta como Derivada da Theta	2
Construindo a Theta a Partir de Funções Suaves	2
Aproximação Gaussiana para a Delta	3
Demonstração da Propriedade de Filtragem	3
Funções de Green em 1D	3
Dependência com a Dimensão	4
Interpretação Física	4
O Truque do Cálculo da Integral Gaussiana	4
Visualização: Sequência Delta Gaussiana	4
Exercícios	5
Exercício 1: A Função Degrau e Sua Derivada (Essencial)	5
Exercício 2: Filtragem e a Sequência Delta Gaussiana (Essencial)	6
Exercício 3: O Truque da Integral Gaussiana	6
Exercício 4: Função de Green em 1D (Essencial)	6
Exercício 5: Outras Sequências Delta	6
Exercício 6: Dependência com a Dimensão e Interpretação Física	6

Introdução

Nesta aula, vamos conectar o **Teorema Fundamental do Cálculo** à **função delta de Dirac** e às **funções de Green**. A ideia central é que a delta não é um objeto mágico — ela é uma generalização natural da derivada da função degrau (Heaviside).

OBSERVAÇÃO DO PROFESSOR: “Isso não tem nada a ver com gravitação ou eletromagnetismo em si. Na verdade, é uma consequência indireta do espaço ser euclidiano e de como as coisas se espalham no espaço de acordo com a dimensão.”

A Função Degrau de Heaviside

A função degrau (ou função de Heaviside) é definida como:

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

Características:

- É uma função com uma **descontinuidade** em $x = 0$.
 - Representa uma transição abrupta de 0 para 1.
-

A Função Delta de Dirac

A **delta de Dirac** $\delta(x)$ é definida pela **propriedade de filtragem** (ou “sifting”):

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) f(x_0) dx_0 = f(x)$$

Para qualquer função f suave (bem-comportada).

Interpretação: A delta “seleciona” o valor de f no ponto $x = x_0$.

Delta como Derivada da Theta

Usando o Teorema Fundamental do Cálculo:

$$\frac{d}{dx} \int_{-\infty}^x f(x_0) dx_0 = f(x)$$

Reescrevendo o limite superior com a função θ :

$$\int_{-\infty}^{\infty} \theta(x - x_0) f(x_0) dx_0 = \int_{-\infty}^x f(x_0) dx_0$$

Derivando ambos os lados:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} \theta(x - x_0) f(x_0) dx_0 = f(x)$$

Portanto:

$$\frac{d}{dx} \theta(x - x_0) = \delta(x - x_0)$$

Construindo a Theta a Partir de Funções Suaves

Podemos construir $\theta(x)$ usando a função módulo:

- Seja $g(x) = |x|$.
- A derivada de $g(x)$ é $\text{sgn}(x)$ (com ambiguidade em $x = 0$).
- Então:

$$\theta(x) = \frac{g'(x) + 1}{2}$$

Relação com o módulo:

$$|x| = \sqrt{x^2}$$

Assim:

$$\theta(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{d}{dx} \sqrt{x^2} + 1 \right)$$

Aproximação Gaussiana para a Delta

Considere a **Gaussiana** (distribuição normal):

$$G_\sigma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

Propriedades:

- Normalizada: $\int_{-\infty}^{\infty} G_\sigma(x) dx = 1$
 - Simétrica: $G_\sigma(-x) = G_\sigma(x)$
 - Quando $\sigma \rightarrow 0$, $G_\sigma(x)$ fica **mais estreita e mais alta**, concentrando-se em $x = 0$.
-

Demonstração da Propriedade de Filtragem

Para qualquer função $f(x)$ com série de Taylor:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + \dots$$

Temos:

$$\lim_{\sigma \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{\infty} G_\sigma(x) f(x) dx = f(0)$$

Por quê?

- Termos ímpares se anulam por simetria (função par vezes função ímpar).
 - Termos pares são proporcionais a potências positivas de σ , então vão a zero.
 - Apenas o termo constante $f(0)$ sobrevive.
-

Funções de Green em 1D

A função de Green em 1D satisfaz:

$$\frac{d^2}{dx^2} G(x, x_0) = \delta(x - x_0)$$

A solução é:

$$G(x, x_0) = \frac{1}{2} |x - x_0|$$

Dependência com a Dimensão

A função de Green depende da dimensionalidade do espaço:

Dimensão	Função de Green	Comportamento
1D	$\frac{1}{2} x - x_0 $	Cresce com a distância
2D	$\frac{1}{2\pi} \log x - x_0 $	Cresce logarithmicamente
3D	$\frac{1}{4\pi x - x_0 }$	Decai como $1/r$

Interpretação Física

- **Funções delta** representam **partículas pontuais** ou **impulsos instantâneos**.
- São **limites** de processos físicos suaves (ex.: aceleração instantânea é o limite de uma aceleração muito grande em um tempo muito curto).
- Isso é análogo a definir **números irracionais** como limites de sequências de números racionais.

O Truque do Cálculo da Integral Gaussiana

Para provar a normalização da Gaussiana, usamos o truque das coordenadas polares:

$$\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2} dx \right)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x^2+y^2)/2\sigma^2} dx dy$$

Em coordenadas polares (r, θ) :

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\infty} e^{-r^2/2\sigma^2} r dr d\theta = 2\pi\sigma^2$$

Portanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2\sigma^2} dx = \sqrt{2\pi}\sigma$$

Assim, o fator de normalização $1/\sqrt{2\pi}\sigma$ está correto.

Visualização: Sequência Delta Gaussiana

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-2, 2, 500)
sigmas = [1.0, 0.5, 0.2, 0.05]

plt.figure(figsize=(8, 5))
for sigma in sigmas:
    g = (1 / (np.sqrt(2 * np.pi) * sigma)) * np.exp(-(x**2) / (2 * sigma**2))
    plt.plot(x, g, label=f"σ = {sigma}")

plt.xlabel("x")
```

```
plt.ylabel("G (x)")
plt.title("Sequência Delta Gaussiana")
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.show()
```




Figure 1: Aproximação gaussiana da delta de Dirac para diferentes valores de sigma

Exercícios

Exercício 1: A Função Degrau e Sua Derivada (Essencial)

- Ref faça a derivação de $\frac{d}{dx}\theta(x-x_0) = \delta(x-x_0)$ partindo do Teorema Fundamental do Cálculo, explicitando cada passo.
- A partir de $g(x) = |x| = \sqrt{x^2}$, mostre que $g'(x) = \text{sgn}(x)$ para $x \neq 0$ e recupere $\theta(x) = \frac{g'(x) + 1}{2}$.
- Generalize o resultado de (a) para $\frac{d}{dx}[f(x)\theta(x-x_0)]$, com f suave.
- Por que a convenção do valor de $\theta(0)$ (0, 1/2 ou indefinido) raramente afeta cálculos físicos?

Exercício 2: Filtragem e a Sequência Delta Gaussiana (Essencial)

- a) Calcule $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x-3) x^2 dx$ e generalize o resultado para $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(ax) dx$.
- b) Verifique que $G_{\sigma}(x)$ é normalizada para qualquer $\sigma > 0$, e que $G_{\sigma}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ diverge quando $\sigma \rightarrow 0$.
- c) Refaça a demonstração da propriedade de filtragem via série de Taylor para uma função par $f(x) = \cos(x)$ até ordem x^2 , explicando por que apenas o termo constante $f(0)$ sobrevive no limite $\sigma \rightarrow 0$.

Exercício 3: O Truque da Integral Gaussiana

- a) Refaça a mudança para coordenadas polares na integral dupla e calcule explicitamente $\int_0^{\infty} e^{-r^2/2\sigma^2} r dr$.
- b) Use o resultado para verificar a normalização de $G_{\sigma}(x)$.

Exercício 4: Função de Green em 1D (Essencial)

- a) Verifique por substituição direta que $G(x, x_0) = \frac{1}{2}|x - x_0|$ satisfaz $\frac{d^2}{dx^2} G = \delta(x - x_0)$.
- b) Mostre que $G(x, x_0)$ não é única: some uma função linear $a + bx$ e verifique que a equação ainda é satisfeita. Que condições de contorno fixam essa constante de integração?
- c) Interprete $G(x, x_0)$ como o deslocamento de uma corda infinita sob uma força pontual em x_0 .

Exercício 5: Outras Sequências Delta

- a) Mostre que a função retangular $R_{\epsilon}(x) = \frac{1}{\epsilon}$ para $|x| < \epsilon/2$ e 0 caso contrário também converge para $\delta(x)$ quando $\epsilon \rightarrow 0$.
- b) Mostre que a Lorentziana $L_{\epsilon}(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}$ também é uma sequência delta válida.
- c) Compare a velocidade de convergência (na cauda, longe de $x = 0$) entre G_{σ} , R_{ϵ} e L_{ϵ} .

Exercício 6: Dependência com a Dimensão e Interpretação Física

- a) Verifique, por aplicação direta do laplaciano radial, que $G \propto \log|x - x_0|$ resolve a equação de Green em 2D e que $G \propto 1/|x - x_0|$ a resolve em 3D.
- b) O que você espera que aconteça com a função de Green em 4D? Justifique sem fazer a conta completa (o caso geral será tratado na próxima aula).
- c) Por que dizemos que a delta de Dirac “não é uma função” no sentido clássico? Em que sentido ela é, ainda assim, um objeto matemático rigoroso?