VIVIBIOTIC

GUIDA GRATUITA

Gengive che sanguinano: cosa significa e cosa fare

Una gengiva sana non sanguina. Ecco cosa sta succedendo davvero e come tornare indietro, finché sei in tempo.

> Dai contenuti di **«La bocca che cura»** della Dott.ssa Maria Francesca Cavaleri, farmacista e chimica, specializzata in microbiota orale.

Contenuto informativo. Non sostituisce il parere del dentista o del medico.

Il segreto che nessuno ti ha detto

Sputi e vedi un filo rosa nel lavandino. Passi il filo e si colora di rosso. E smetti di usarlo, perché «fa sanguinare».

È esattamente al contrario: **le gengive sanguinano proprio perché non passi il filo**. Sanguinano perché sono infiammate, cariche di batteri che si sono accumulati indisturbati tra un dente e l'altro. Il sangue non è un motivo per smettere: è la conferma che ne hai bisogno.

Cosa sta succedendo

La placca non è «sporco». È un **biofilm**: una comunità di batteri organizzata, con una sua struttura e i suoi sistemi di difesa. Se resta indisturbata per più di 24-48 ore, cambia composizione: le specie amiche lasciano spazio a quelle che infiammano.

Questa trasformazione non è improvvisa. È graduale e, se la interrompi in tempo, **reversibile**. Ogni volta che passi lo spazzolino e il filo non stai sterilizzando la bocca: stai interrompendo un processo e mantenendo un equilibrio.

Il «capomafia» della bocca

La parodontite non è un'infezione classica causata da un solo batterio: è una **disbiosi**, uno squilibrio dell'intero ecosistema. Alcune specie, come il *Porphyromonas gingivalis*, anche in piccole quantità riescono a manipolare le difese del corpo e a rendere aggressiva tutta la comunità. Per questo intervenire presto conta molto più di quanto il poco sangue visibile lasci pensare.

Perché non va ignorato

Se l'infiammazione diventa cronica può arrivare ai tessuti che sostengono i denti: le gengive si ritirano e i denti possono diventare mobili. E non resta in bocca: la ricerca ha trovato i batteri della parodontite nelle placche delle arterie e studia i legami tra gengive infiammate, salute del cuore e diabete. Una gengiva che sanguina è una piccola ferita aperta tra la bocca e il resto del corpo.

Cosa può peggiorare la situazione

- Saltare la pulizia tra i denti
- Spazzolare troppo forte, che fa ritirare le gengive
- I cambiamenti ormonali: pubertà, ciclo, gravidanza, perimenopausa, menopausa
- Dormire poco (meno di 6 ore), lo stress e il digrignare i denti di notte

- Respirare con la bocca aperta durante il sonno, che secca la bocca e rende il microbiota più aggressivo
- Il diabete e le malattie della tiroide (dillo sempre al dentista)

Cosa fare da oggi

1. Spazzola il bordo della gengiva, con delicatezza

Inclina lo spazzolino di circa **45° verso la gengiva**: le setole devono entrare leggermente nel solco tra gengiva e dente, dove si accumula la placca più pericolosa. Movimenti brevi, su 2-3 denti alla volta, per **2 minuti**. Non premere: se le setole si aprono a ventaglio dopo poche settimane, stai spingendo troppo. Con le gengive sensibili o infiammate uno spazzolino morbido o sonico è spesso la scelta migliore.

2. Pulisci tra i denti ogni giorno, prima dello spazzolino

Gli spazi tra i denti sono circa il 40% della superficie totale, e lo spazzolino non li raggiunge. Prendi circa 45 cm di filo, entra tra i denti con un leggero zig-zag, poi curvalo a **C** attorno al dente e fallo scorrere su e giù scendendo appena sotto il bordo della gengiva. Usa un tratto pulito per ogni spazio. In alternativa, gli scovolini della misura giusta: chiedi all'igienista quale fa per te.

3. Non scoraggiarti per il sangue dei primi giorni

Se non sei abituato, all'inizio è normale. Nel giro di **7-10 giorni** l'infiammazione si riduce e il sanguinamento diminuisce o scompare.

4. Rispetta l'ecosistema

Collutorio delicato senza alcol, come primo passaggio. La clorexidina solo per il periodo indicato dal dentista. Dopo lo spazzolino sputa senza sciacquare. Infine il nettalingua: la lingua può fare da «serbatoio» ai batteri delle gengive e ricolonizzarle anche dopo una pulizia professionale.

5. Prenota l'igiene professionale

Il tartaro non si toglie con lo spazzolino. A casa fai il mantenimento quotidiano, il professionista fa ciò che da soli non si può fare.

Il tuo piano di 4 settimane

Settimana	Obiettivo	Cosa osservare
Settimana 1	Due minuti pieni di spazzolino, due volte al giorno, a 45°. Usa un timer.	Quanto tempo spazzolavi prima?

Settimana 2	Aggiungi filo o scovolino ogni sera, anche dove sanguina.	Il sangue dei primi giorni deve diminuire entro 7-10 giorni.
Settimana 3	Aggiungi il nettalingua e un collutorio delicato.	Gengive più rosa e meno gonfie.
Settimana 4	Prenota l'igiene professionale se non la fai da tempo e racconta cosa stai facendo.	Confronta allo specchio con il primo giorno.

Lo sapevi che…

In uno studio presentato all'International Stroke Conference 2025, su oltre 6.000 persone seguite per 25 anni, chi usava il filo almeno una volta a settimana aveva un rischio di ictus ischemico più basso del 22%. Pochi centimetri di filo, ogni sera.

Vai dal dentista se

- dopo 10 giorni di filo usato regolarmente le gengive sanguinano ancora molto
- le gengive sembrano ritirarsi o i denti sembrano più lunghi
- senti un dente mobile, hai dolore, gonfiore o un cattivo sapore persistente

Il Kit Esoso Vivibiotic

Dentifricio e collutorio con **tecnologia biomimetica, esosomi vegetali e fosfolipidi**, pensati per chi desidera gengive più forti e un microbiota orale in equilibrio. Da usare con uno spazzolino ultra morbido, come il nostro 5460 setole.

Scopri il Kit Esoso su vivibiotic.it →

Questa guida ha scopo informativo e non sostituisce la visita, la diagnosi o i consigli del dentista o del medico. Contenuti tratti da «La bocca che cura» di Maria Francesca Cavaleri. © Vivibiotic