Hábitos Alimentarios de *Gymnogeophagus meridionalis* (Perciformes: Cichlidæ) en el Arroyo Martín (Buenos Aires, Argentina)

Yorojo, V.[1]; García, I.[1]; Colautti, D.[1] y Maroñas, M.[1]

[1]Instituto de Limnología "Dr. Raúl Ringuelet" - (CCT CONICET La Plata – UNLP)

Casilla de Correo 712 (1900) La Plata, Buenos Aires.

vyorojo@gmail.com

INTRODUCCIÓN

Gymnogeophagus meridionalis, es un pez de importancia ornamental, muy abundante en la cuenca del río de La Plata, región parano-platense, muy común en lagunas y arroyos. El objetivo de este estudio, es contribuir al conocimiento de la dieta de esta especie, en un arroyo del área suburbana, en los alrededores de la ciudad de La Plata, durante las estaciones de invierno y primavera de 2014 y verano de 2015.

Figura 1: Chanchita (*Gymnogeophagus meridionalis*)

METODOLOGÍA

El estudio se realizó el Arroyo Martín (Figura 2). El análisis de la dieta se realizó en la parte anterior del tracto digestivo de 173 individuos (entre 18 y 77 mm de longitud estándar). Los estómagos fueron conservados en alcohol al 70 % y los contenidos fueron examinados bajo microscopio estereoscópico. En cada ejemplar se determinaron los ítems alimentarios, hasta el menor nivel taxonómico posible, registrándose el número y el volumen mediante gradilla milimetrada. Para estimar la relevancia de los items en la dieta, se aplicó el Índice de Importancia Relativa (IRI) y la estrategia alimentaria fue analizada mediante el método gráfico de Amundsen.



Figura 2: Arroyo Martín, ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La figura 3 representa la estrategia alimentaria de *Gymnogeophagus meridionalis* de acuerdo con el método gráfico de Amúndsen, analizado según las estaciones del año.



(a) Invierno **(b)** Primavera **(c)** Verano

Figura 3: Estaciones del año

En la figura 3a se observa que en junio y agosto seis ítems alimentarios componen su dieta, resaltando que son los Quironómidos con mayor presencia y abundancia (>90 %), seguido por los Copépodos, aunque con baja presencia (<20 %); de los otros ítems se destaca que Ostrácodos y Anfípodos aparecen en agosto con menor abundancia(<10 %). En septiembre y noviembre (figura 3b) aumenta la riqueza de ítems alimentarios, pasando de seis ítems en invierno a nueve en primavera, incorporando Colémbolos, Rotíferos, Ácaros y Restos de Plantas Vasculares a su dieta; sin embargo son los Anfípodos quienes aumentaron significativamente su abundancia. En enero (figura 3c) son los Ostrácodos los de mayor consumo, siendo asi el ítem de mayor abundancia en la dieta (>90 %) al inicio de esta estación. El IRI (figura 4) muestra que Quironómidos es el ítem de mayor importancia; Anfípodos y Ostrácodos con similar importancia en noviembre y enero, ya que presentan un mismo órden de magnitud.



Figura 4: Índice de Importancia Relativa (IRI)

En general, once items alimentarios componen la dieta de esta especie en el arroyo Martín, durante el periodo estudiado, siendo los Quironómidos el componente más importante, seguido por los Copépodos. Anfípodos y Ostrácodos adquieren relevancia en primavera y verano, respectivamente. Estas variaciones podrían vincularse con los cambios estacionales en la oferta de alimento.

Gymnogeophagus meridionalis, exhibe una estrategia alimentaria micro-mesoanimalívoro (generalista).