

### • การจัดส่งวัคซีนถึงหน่วยบริการเป้าหมาย

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กระทรวงสาธารณสุขได้ส่งวัคซีนให้แก่จังหวัดเป้าหมายเบื้องต้นครบทั้ง 13 จังหวัด ระยะที่1 รอบแรก เป็นจำนวนวัคซีนรวม 116,520 โด๊ส (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564) และได้วางแผนการ จัดส่งเพิ่มเติมให้กับพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสมุทรสาคร ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

#### • ผลการให้บริการวัคซีนโควิด 19

- จำนวนผู้ได้รับวัคซีนรายใหม่ จำนวน 0 ราย (ไม่มีการให้บริการ)
- จำนวนผู้ได้รับวัคซีนสะสมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 27,497 ราย

### • ผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน

- มีรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนสะสม จำนวน 956 ราย (คิดเป็นร้อยละ 3.48 ของ ผู้รับวัคซีนทั้งหมด)

(มีอาการอักเสบบริเวณที่ฉีด 191 ราย (ร้อยละ 20), ปวดเมื่อยเนื้อตัว 173 ราย (ร้อยละ 18), คลื่นไส้ 116 ราย (ร้อยละ 12), ไข้ 73 ราย (ร้อยละ 8), อาเจียน 71 ราย (ร้อยละ 7), ปวดศีรษะ 71 ราย (ร้อยละ 7), ผื่น 66 ราย (ร้อยละ 7), ท้องเสีย 50 ราย (ร้อยละ 5), เหนื่อย 49 ราย (ร้อยละ 5), อื่น ๆ 96 ราย (ร้อยละ 10))

# จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ประจำวันที่ 7 มีนาคม 2564

เขต		จำนวนวัคซีน		าซีน (คน)				
สุขภาพ	จังหวัด	ที่ได้รับ	บุคลากรการแพทย์	เจ้าหน้าที่อื่น ๆ	บุคคล	ประชาชน	อยู่ระหว่าง	รวม
ที่		(โด๊ส)	/สาธารณสุข	ที่มีโอกาส	ที่มีโรค	ใน	ระบุ	
			และ อสม.	สัมผัสผู้ป่วย	ประจำตัว	พื้นที่เสี่ยง	กลุ่มเป้าหมาย	
1	เชียงใหม่	3,520	-	-	-	1	-	-
2	ตาก	5,000	-	-	-	ı	-	-
4	นนทบุรี	6,000	-	-	1	ı	-	-
	ปทุมธานี	8,000	-	-	-	ı	-	-
5	สมุทรสาคร	35,080	-	-	1	ı	-	-
	สมุทรสงคราม	2,000	-	-	-	ı	-	-
	ราชบุรี	2,520	-	-	-	-	-	-
	นครปฐม	3,560	-	-	-	-	-	-
6	สมุทรปราการ	6,000	-	-	-	ı	-	-
	ชลบุรี	4,720	-	-	-	-	-	-
11	ภูเก็ต	4,000	-	-	-	-	-	-
	สุราษฎร์ธานี	2,520	-	-	-	-	-	-
สปคม	กรุงเทพมหานคร	33,600	-	-	-	-	-	-
	รวม	116,520	-	-	-	-	-	-

### \*\*หมายเหตุ วันนี้ไม่มีการให้บริการวัคซีนโควิด 19

ผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน						
จำนวน	0	ไม่รุนแรง	รุนแรง			
		0	0			

## จำนวนผู้รับวัคซีนโควิด 19 สะสมรายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564

เขต		จำนวนวัคซีน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ	กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคชีน (คน)					
สุขภาพ	จังหวัด	ที่ได้รับ	กลุ่มเป้าหมาย	ผู้ได้รับการฉีด	เทียบกับ	บุคลากรการแพทย์	เจ้าหน้าที่อื่น ๆ	บุคคล	ผู้ที่มีอายุ	ประชาชน	อยู่ระหว่าง
ที่		(โด๊ส)	เข็มที่ 1	วัคซีน	กลุ่มเป้าหมาย	/สาธารณสุข	ที่มีโอกาส	ที่มีโรค	ตั้งแต่ 60 ปี	ใน	ระบุ
					เข็มที่ 1	และ อสม.	สัมผัสผู้ป่วย	ประจำตัว	ขึ้นไป	พื้นที่เสี่ยง	กลุ่มเป้าหมาย
1	เชียงใหม่	3,520	1,760	1,524	86,6	1,357	167	-	-	-	-
2	ตาก	5,000	2,500	1,057	42.3	1,035	20	-	-	-	2
4	นนทบุรี	6,000	3,000	2,107	70.2	2,076	10	-	-	-	21
	ปทุมธานี	8,000	4,000	1,902	47.6	1,446	395	-	-	61	-
5	สมุทรสาคร	35,080	35,080	7,886	22.5	6,667	1,137	52	-	30	-
	สมุทรสงคราม	2,000	1,000	759	75.9	555	73	-	-	-	131
	ราชบุรี	2,520	1,260	1,261	100.1	1,112	149	-	-	-	-
	นครปฐม	3,560	1,780	1,480	<i>83.1</i>	1,293	187	-	-	-	-
6	สมุทรปราการ	6,000	3,000	2,226	74.2	1,918	-	-	-	-	308
	ชลบุรี	4,720	2,360	2,296	97.3	2,296	-	-	-	-	-
	ฏเก็ต	4,000	2,000	1,289	64.5	1,280	9	-	-	-	-
	สุราษฎร์ธานี	2,520	1,260	968	76.8	365	603	-	-	-	-
13	กรุงเทพมหานคร	33,600	33,600	2,742	8.2	2,164	-	-	-	-	578
	รวม	116,520	92,600	27,497	29.7	23,564	2,750	52	-	91	1,040

ผลการเฝ้าระวังเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน					
จำนวนสะสม	956	ไม่รุนแรง	รุนแรง		
		956		0	