





The analysis note's (Q², x_B) cells, −t integrated (0.09-2.0 GeV²), ϕ integrated; cells with ≥ 300 events per arm after the full chain
B/A − 1 (%), A at one global mx2_cut = 0.140 GeV²
+12.3 ±8.4
-0.8 ±6.0
+14.9 ±8.0
-7.1 ±6.1
+5.5 ±7.6
+4.0 ±5.7
+18.6 ±8.0
+2.9 ±5.7
+12.7 ±4.6
-5.7 ±5.6
+8.1 ±4.0
-0.9 ±3.5
-6.6 ±5.8
-5.7 ±4.4
+8.3 ±4.1
+1.4 ±2.8
+2.8 ±4.3
-7.5 ±5.4
-6.1 ±3.3
+1.7 ±2.9
-1.4 ±2.5
-1.5 ±2.5
-1.3 ±2.7
-1.5 ±1.9
-0.2 ±1.8
-1.7 ±2.5
B/A − 1 (%)
mx2_cut at which A equals B (GeV²), with its 1σ range
0.49
0.13 (0.07-0.25)
>0.5
0.07
0.25 (0.11-0.49)
0.22 (0.11-0.39)
>0.5
0.19 (0.10-0.33)
>0.5
0.08
0.32 (0.22-0.46)
0.13 (0.09-0.19)
0.07
0.08
0.31 (0.21-0.43)
0.16 (0.12-0.22)
0.19 (0.12-0.30)
0.07
0.08 (0.06-0.11)
0.16 (0.12-0.22)
0.12 (0.09-0.16)
0.12 (0.09-0.16)
0.12 (0.10-0.16)
0.12 (0.10-0.14)
0.14 (0.11-0.16)
0.12 (0.09-0.15)
Q² (GeV²)
x_B


(Q², x_B) cells, −t integrated. Cell label: Q² | x_B
A: rc_factor, mx2_cut = 0.140
A, mx2_cut = 0.08
A, mx2_cut = 0.25
B: rad/Born MC, full chain
δ_RC (φ integrated)
1.05
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
χ² = 42 / 26 cells
B/A − 1 (%)
20
10
0
−10
−20
1.0-1.5 | 0.1-0.15
1.0-1.5 | 0.15-0.2
1.0-1.5 | 0.2-0.25
1.0-1.5 | 0.25-0.3
1.5-2.0 | 0.1-0.15
1.5-2.0 | 0.15-0.2
1.5-2.0 | 0.2-0.25
1.5-2.0 | 0.25-0.3
1.5-2.0 | 0.3-0.38
2.0-2.5 | 0.15-0.2
2.0-2.5 | 0.2-0.25
2.0-2.5 | 0.25-0.3
2.0-2.5 | 0.3-0.38
2.0-2.5 | 0.38-0.48
2.5-3.0 | 0.25-0.3
2.5-3.0 | 0.3-0.38
2.5-3.0 | 0.38-0.48
3.0-3.5 | 0.3-0.38
3.0-3.5 | 0.38-0.48
3.5-4.0 | 0.3-0.38
3.5-4.0 | 0.38-0.48
3.5-4.0 | 0.48-0.58
4.0-4.6 | 0.38-0.48
4.0-4.6 | 0.48-0.58
4.6-6.0 | 0.38-0.48
4.6-6.0 | 0.48-0.58


(Q^2, x_B, $-t$) cells. Cell label: Q^2 | x_B | $-t$
A: rc_factor, mx2_cut = 0.140
A, mx2_cut = 0.08
A, mx2_cut = 0.25
B: rad/Born MC, full chain
δ_{RC} (ϕ integrated)
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
χ^2 = 61 / 44 cells
B/A − 1 (%)
20
10
0
−10
−20
1.0-1.5 | 0.1-0.15 | 0.2-0.3
1.0-1.5 | 0.1-0.15 | 0.3-0.4
1.0-1.5 | 0.1-0.15 | 0.4-0.6
1.0-1.5 | 0.1-0.15 | 0.6-1.0
1.0-1.5 | 0.15-0.2 | 0.15-0.2
1.0-1.5 | 0.15-0.2 | 0.2-0.3
1.0-1.5 | 0.15-0.2 | 0.3-0.4
1.0-1.5 | 0.15-0.2 | 0.4-0.6
1.0-1.5 | 0.15-0.2 | 0.6-1.0
1.0-1.5 | 0.15-0.2 | 1.0-1.5
1.0-1.5 | 0.2-0.25 | 0.15-0.2
1.0-1.5 | 0.2-0.25 | 0.2-0.3
1.0-1.5 | 0.2-0.25 | 0.3-0.4
1.0-1.5 | 0.2-0.25 | 0.4-0.6
1.0-1.5 | 0.2-0.25 | 0.6-1.0
1.0-1.5 | 0.2-0.25 | 1.0-1.5
1.0-1.5 | 0.25-0.3 | 0.2-0.3
1.0-1.5 | 0.25-0.3 | 0.3-0.4
1.0-1.5 | 0.25-0.3 | 0.4-0.6
1.0-1.5 | 0.25-0.3 | 0.6-1.0
1.5-2.0 | 0.2-0.25 | 0.2-0.3
1.5-2.0 | 0.2-0.25 | 0.3-0.4
1.5-2.0 | 0.2-0.25 | 0.4-0.6
1.5-2.0 | 0.2-0.25 | 0.6-1.0
1.5-2.0 | 0.25-0.3 | 0.2-0.3
1.5-2.0 | 0.25-0.3 | 0.3-0.4
1.5-2.0 | 0.25-0.3 | 0.4-0.6
1.5-2.0 | 0.25-0.3 | 0.6-1.0
1.5-2.0 | 0.25-0.3 | 1.0-1.5
1.5-2.0 | 0.3-0.38 | 0.2-0.3
1.5-2.0 | 0.3-0.38 | 0.3-0.4
1.5-2.0 | 0.3-0.38 | 0.4-0.6
1.5-2.0 | 0.3-0.38 | 0.6-1.0
1.5-2.0 | 0.3-0.38 | 1.0-1.5
2.0-2.5 | 0.25-0.3 | 0.6-1.0
2.0-2.5 | 0.3-0.38 | 0.3-0.4
2.0-2.5 | 0.3-0.38 | 0.4-0.6
2.0-2.5 | 0.3-0.38 | 0.6-1.0
2.0-2.5 | 0.3-0.38 | 1.0-1.5
2.0-2.5 | 0.38-0.48 | 0.6-1.0
2.5-3.0 | 0.3-0.38 | 0.6-1.0
2.5-3.0 | 0.38-0.48 | 0.4-0.6
2.5-3.0 | 0.38-0.48 | 0.6-1.0
3.0-3.5 | 0.38-0.48 | 0.6-1.0


Where one cut fails: the deviation against the kinematic variables
B/A − 1 (%), mx2_cut = 0.140
−t integrated
per −t cell
y (cell centroid)
W (GeV, cell centroid)
−t (GeV², cell centroid)


Dotted: number of cells
2D: 26 cells
3D: 44 cells
best global
mx2_cut = 0.140
χ^2 of A against B
0
100
200
300
400
500
600
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
one mx2_cut for every cell (GeV^2)