

Санкт-Петербургский
Политехнический университет Петра Великого

**Отчет по лабораторным работам №1-2
по дисциплине
"Математическая статистика"**

Студент:	Скворцов Владимир Сергеевич
Преподаватель:	Баженов Александр Николаевич
Группа:	5030102/10201

Санкт-Петербург
2024

Содержание

1	Постановка задачи	2
1.1	Описательная статистика	2
1.2	Точечное оценивание характеристик положения и рассеяния	2
2	Теоретическое обоснование	2
2.1	Функции распределения	2
2.2	Характеристики положения и рассеяния	3
3	Описание работы	3
4	Результаты	4
4.1	Гистограммы и графики плотности распределения	4
4.2	Характеристики положения и рассеяния	6
5	Выводы	8

1 Постановка задачи

1.1 Описательная статистика

Для 5 распределений:

- Нормальное распределение $N(x, 0, 1)$
- распределение Коши $C(x, 0, 1)$
- Распределение Стьюдента $t(x, 0, 3)$ с тремя степенями свободы
- Распределение Пуассона $P(k, 10)$
- Равномерное распределение $U(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3})$

Сгенерировать выборки размером 10, 50, 1000 элементов.

Построить на одном рисунке гистограмму и график плотности распределения.

1.2 Точечное оценивание характеристик положения и рассеяния

Сгенерировать выборки размером 10, 50, 1000 элементов.

Для каждой выборки вычислить следующие статистические характеристики положения данных: \bar{x} , $med\ x$, z_Q , z_R , z_{tr} . Повторить такие вычисления 1000 раз для каждой выборки и найти среднее характеристик положения и их квадратов: $E(z) = \bar{z}$. Вычислить оценку дисперсии по формуле $D(z) = \overline{z^2} - \bar{z}^2$.

2 Теоретическое обоснование

2.1 Функции распределения

- Нормальное распределение

$$N(x, 0, 1) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-x^2}{2}} \quad (1)$$

- Распределение Коши

$$C(x, 0, 1) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{x^2 + 1} \quad (2)$$

- Распределение Стьюдента $t(x, 0, 3)$ с тремя степенями свободы

$$t(x, 0, 3) = \frac{6\sqrt{3}}{\pi(3 + t^2)^2} \quad (3)$$

- Распределение Пуассона

$$P(k, 10) = \frac{10^k}{k!} e^{-10} \quad (4)$$

- Равномерное распределение

$$U(x, -\sqrt{3}, \sqrt{3}) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{3}} & \text{при } |x| \leq \sqrt{3} \\ 0 & \text{при } |x| > \sqrt{3} \end{cases} \quad (5)$$

2.2 Характеристики положения и рассеяния

- Выборочное среднее

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (6)$$

- Выборочная медиана

$$\text{med } x = \begin{cases} x_{(l+1)} & \text{при } n = 2l + 1 \\ \frac{x_{(l)} + x_{(l+1)}}{2} & \text{при } n = 2l \end{cases} \quad (7)$$

- Полусумма экстремальных выборочных элементов

$$z_R = \frac{x_{(1)} + x_{(n)}}{2} \quad (8)$$

- Полусумма квартилей

Выборочная квартиль z_p порядка p определяется формулой

$$z_p = \begin{cases} x_{([np]+1)} & \text{при } np \text{ дробном} \\ x_{(np)} & \text{при } np \text{ целом} \end{cases} \quad (9)$$

Полусумма квартилей

$$z_Q = \frac{z_{1/4} + z_{3/4}}{2} \quad (10)$$

- Усечённое среднее

$$z_{tr} = \frac{1}{n-2r} \sum_{i=r+1}^{n-r} x_{(i)}, \quad r \approx \frac{n}{4} \quad (11)$$

- Среднее характеристики

$$E(z) = \bar{z} \quad (12)$$

- Оценка дисперсии

$$D(z) = \overline{z^2} - \bar{z}^2 \quad (13)$$

3 Описание работы

Лабораторные работы выполнены с использованием Python и его сторонних библиотек `numpy`, `pandas`, `matplotlib`, `seaborn` были построены гистограммы распределений и посчитаны характеристики положения.

Ссылка на GitHub репозиторий: <https://github.com/vladimir-skvortsov/spbstu-mathematical-statistics>

4 Результаты

4.1 Гистограммы и графики плотности распределения




Рис. 1: Нормальное распределение (1)




Рис. 2: Распределение Коши (2)




Рис. 3: Распределение Стьюдента (3)




Рис. 4: Распределение Пуассона (4)




Рис. 5: Равномерное распределение (5)

4.2 Характеристики положения и рассеяния

n = 10					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	-0.017466	-0.019283	-0.019494	-0.014486	-0.007937
$D(z)$ (13)	0.100879	0.142707	0.187775	0.115437	0.160836
n = 50					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	-0.007937	0.100879	0.142707	0.187775	0.115437
$D(z)$ (13)	0.009941	0.015535	0.095586	0.012392	0.020005
n = 1000					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	0.000038	-0.001779	-0.002971	0.001002	-0.000085
$D(z)$ (13)	0.000985	0.001682	0.061385	0.001243	0.001939

Таблица 1: Нормальное распределение

n = 10					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	-4.724165	-0.015986	-23.612109	-0.015176	-8.310631
$D(z)$ (13)	11477.749749	0.337081	286469.541418	1.163577	31698.450396
n = 50					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	0.781733	0.012225	37.029997	0.008637	0.857304
$D(z)$ (13)	431.900044	0.025323	1060046.375320	0.055008	167.707860
n = 1000					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	-0.336134	-0.001532	-129.057477	-0.001540	-0.049715
$D(z)$ (13)	240.553988	0.002310	50362265.313181	0.004735	174.261104

Таблица 2: Распределение Коши

n = 10					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	0.016265	0.004667	0.040925	0.014315	0.000750
$D(z)$ (13)	0.259126	0.183832	1.659319	0.184564	0.431912
n = 50					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	-0.002158	-0.001389	0.021238	0.003592	-0.016753
$D(z)$ (13)	0.026907	0.019051	9.893951	0.018478	0.052782
n = 1000					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	0.000335	-0.000238	-0.054818	0.000162	0.000679
$D(z)$ (13)	0.002898	0.001903	32.527888	0.001944	0.005656

Таблица 3: Распределение Стьюдента

n = 10					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	10.002500	9.874000	10.294500	9.917625	9.937000
$D(z)$ (13)	1.081944	1.477624	2.018020	1.283917	1.699309
n = 50					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	10.013690	9.855500	10.896000	9.945125	10.013560
$D(z)$ (13)	0.095748	0.197370	0.957184	0.139817	0.204837
n = 1000					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	10.005702	9.997000	11.627000	9.994000	10.004912
$D(z)$ (13)	0.010137	0.002991	0.634371	0.002964	0.020719

Таблица 4: Распределение Пуассона

n = 10					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	-0.005450	-0.006939	-0.005412	-0.007901	-0.015610
$D(z)$ (13)	0.104110	0.240206	0.044016	0.144291	0.172234
n = 50					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	-0.001915	-0.006312	-0.001349	0.001960	-0.004766
$D(z)$ (13)	0.010019	0.029723	0.000599	0.014276	0.018935
n = 1000					
	\bar{x} (6)	$med\ x$ (7)	z_R (8)	z_Q (10)	z_{tr} (11)
$E(z)$ (12)	0.000470	0.000924	-0.000133	-0.000355	-0.000387
$D(z)$ (13)	0.001014	0.003127	0.000005	0.001469	0.001887

Таблица 5: Равномерное распределение

5 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы был проведен анализ пяти уникальных распределений: нормальное, Коши, Стьюдента, Пуассона и равномерное. Были сгенерированы выборки разных объемов для каждого из них - 10, 50 и 1000 элементов. Были созданы гистограммы каждого распределения и нанесены на них графики плотности соответствующих распределений, что облегчило наглядное сопоставление формы распределения выборок с их теоретическими аналогами. Были также рассчитаны разные показатели положения и рассеяния для каждой выборки, включая выборочную среднюю величину, медиану, полусумму крайних элементов выборки, полусумму квартилей и усеченное среднее. Использовалась стандартная формула для оценки дисперсии.

На основании полученных данных были сделаны следующие выводы:

1. В случае нормального распределения, оценки показателей положения и рассеяния становятся ближе к их теоретическим значениям по мере увеличения размера выборки.
2. Для распределения Коши показатели положения и рассеяния менее стабильны и могут сильно отличаться от теоретических даже при больших размерах выборки.
3. Распределение Стьюдента при небольших размерах выборки также демонстрирует определенную нестабильность оценок, однако с увеличением размера выборки результаты становятся более точными.
4. Для распределения Пуассона и равномерного распределения, оценки показателей положения и рассеяния кажутся стабильными при любом объеме выборки.