
Clase 180 — Tests no paramétricos: Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis

Parte: 3 — Estadística Inferencial y Causal · Fuente: Bruce & Bruce, cap. 3 Resampling and Non-parametric Tests + Conover, Practical Nonparametric Statistics. Duración estimada: 70 min.

Clase 180 — Tests no paramétricos: Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis

Parte: 3 — Estadística Inferencial y Causal · Fuente: Bruce & Bruce, cap. 3 Resampling and Non-parametric Tests + Conover, Practical Nonparametric Statistics. Duración estimada: 70 min.

Objetivo

Aplicar las tres alternativas no paramétricas más usadas: Mann-Whitney U (= dos muestras independientes, análogo a Welch's t), Wilcoxon signed-rank (= pareado, análogo a ttest_rel) y Kruskal-Wallis (= ≥ 3 grupos, análogo a ANOVA one-way). Saber cuándo elegirlos sobre los paramétricos: muestras chicas con datos visiblemente asimétricos, datos ordinales (Likert, ranks), o presencia de outliers extremos.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Reconocer las 3 situaciones en que un test no paramétrico es preferible al paramétrico (n chico + asimetría, ordinal, outliers).
- Aplicar `scipy.stats.mannwhitneyu`, `wilcoxon`, `kruskal` con los argumentos correctos (`alternative`, `method='exact'` vs `'asymptotic'`).
- Interpretar que los no paramétricos testean distribuciones (estocásticamente iguales) o medianas, no medias.
- Reportar effect size no paramétrico: rank-biserial correlation (Mann-Whitney) o ϵ^2 / η^2_H (Kruskal-Wallis).
- Hacer post-hoc no paramétrico tras Kruskal con Dunn's test (`scikit-posthocs`) y corrección por múltiples comparaciones.

Temas

#	Test	Reemplaza a	Para qué
1	Mann-Whitney U (Wilcoxon rank-sum)	ttest_ind Welch	2 grupos independientes
2	Wilcoxon signed-rank	ttest_rel	Pareado / 1 muestra contra mediana
3	Kruskal-Wallis H	ANOVA one-way	≥ 3 grupos independientes
4	Dunn's test (post-hoc)	Tukey HSD	Pares post Kruskal
5	Cliff's δ / rank-biserial r	Cohen's d	Effect size no paramétrico

Definiciones y características

- Test no paramétrico: no asume forma específica de la distribución (no requiere normalidad). Trabaja sobre rangos de los datos.
- Mann-Whitney U: para cada par (x_i, y_j) cuenta cuántas veces $x_i > y_j$. Bajo H_0 de distribuciones iguales, U tiene distribución conocida. $H_0: P(X > Y) = P(X < Y) = 0.5$.
- Wilcoxon signed-rank: para datos pareados o una muestra contra mediana hipotética. Calcula la

diferencia d_i , las rankea por $|d_i|$, suma rangos con signo. Asume simetría de la distribución de diferencias.

- Kruskal-Wallis H: extiende Mann-Whitney a k grupos. $H = (12 / (n(n+1))) \cdot \sum R_i^2/n_i - 3(n+1)$. Bajo H (todas las distribuciones iguales), $H \sim \chi^2(k-1)$ asintóticamente.
- Rank-biserial correlation $r_{rb} = 1 - 2U / (n \cdot n)$: effect size para Mann-Whitney. Va de -1 a 1.
- Cliff's δ : equivalente, $\delta = (\#(x_i > y_j) - \#(x_i < y_j)) / (n \cdot n)$. Interpretación: < 0.147 small, < 0.33 medium, ≥ 0.474 large (Romano et al. 2006).
- Dunn's test: comparaciones pareadas no paramétricas tras Kruskal-Wallis, basadas en la diferencia promedio de rangos. Se ajusta por múltiples tests (Bonferroni, BH).

Dataset / recursos

- `seaborn.load_dataset('tips')`: tip por sex o day.
- Datos con outliers: precios de Airbnb (Kaggle) — cola larga a la derecha por mansiones.
- Likert ordinal: simular respuestas 1–5 con `rng.choice([1,2,3,4,5], p=...)`.
- Librerías: `scipy.stats`, `pingouin`, `scikit-posthocs` (pip install `scikit-posthocs`).

Ejercicios

1. Mann-Whitney: comparar tip entre sex con `scipy.stats.mannwhitneyu(a, b, alternative='two-sided')`. Compará el p con el del t-test del ejercicio 2 de la Clase 147. Calculá rank-biserial r.
2. Wilcoxon signed-rank: con el dataset simulado de presión arterial antes/después de la Clase 147, aplicá `scipy.stats.wilcoxon(antes, despues)`. Verificá supuesto de simetría con un histograma de las diferencias.
3. Outliers: a un dataset normal `rng.normal(50, 5, 100)` agregale 3 outliers de valor 200. Compará Welch's t-test vs Mann-Whitney contra otro grupo normal — el Mann-Whitney es mucho más robusto.
4. Kruskal-Wallis: aplicalo a `body_mass_g` por species en penguins. Comparalo con el ANOVA de la Clase 149.
5. Post-hoc Dunn: con `scikit_posthocs.posthoc_dunn(penguins, val_col='body_mass_g', group_col='species', p_adjust='holm')` identificá qué pares difieren.

Homework verifiable

Tomar el dataset de Airbnb por neighborhood (o un sintético equivalente con cola larga):

1. Verificar normalidad por grupo (Shapiro o KS). Mostrar que se rechaza.
2. Comparar precio entre 4 vecindarios con Kruskal-Wallis.
3. Post-hoc Dunn con corrección Holm.
4. Reportar mediana $\pm$ IQR por grupo (no mean $\pm$ SD, que es engañoso con asimetría).
5. Comparar conclusiones con las que daría un ANOVA clásico ingenuo.

Criterio de aceptación: el reporte debe usar mediana/IQR (no media/SD), identificar al menos un par significativo tras Dunn-Holm, y explicar en 2 líneas por qué ANOVA sería sospechoso aquí (cola larga inflando la varianza del grupo con outliers).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
-------------------	-----------------------

Aplico Mann-Whitney y reporto "la media di	El test no es sobre medias; es sobre la pr
Aplico Wilcoxon a diferencias muy asimétri	El signed-rank asume simetría de las difer
Uso Mann-Whitney con $n=10^6$ y se vuelve len	Es $O(n \log n)$ por el ranking, pero scipy l
Reporto Kruskal-Wallis sin post-hoc y digo	Kruskal solo te dice que al menos uno difi
Aplico no paramétrico "para ir a la segura	El t-test tiene más poder cuando sus supue

Preguntas frecuentes

¿Mann-Whitney testea medianas?

Solo si las distribuciones tienen la misma forma (mismo shape, distinto location). En general testea $P(X > Y) \neq 0.5$, que es una afirmación sobre superioridad estocástica, no sobre la mediana per se.

¿Wilcoxon o test de signos?

Wilcoxon usa magnitud de las diferencias (rangos) → más poderoso. Test de signos solo usa la dirección (positivo/negativo) → más robusto pero menos poderoso. Si dudás de la simetría, signos.

¿Cuánto poder pierdo usando no paramétrico cuando los supuestos se cumplen?

Para Mann-Whitney vs t-test con datos normales, la eficiencia asintótica relativa es $3/\pi \approx 0.955$ — perdés $\approx 5\%$ de poder. Si los datos son no normales, podés ganar mucho. Por eso "no paramétrico por default" no es una mala estrategia para n chico.

¿alternative='greater' significa lo mismo que en t-test?

Sí, pero referido a la dirección de la dominancia estocástica (no a la media). alternative='greater' en Mann-Whitney ↔ "la distribución de X tiende a producir valores mayores que la de Y".

¿Qué hago con datos ordinales (Likert 1–5)?

No paramétrico siempre. Ranks son la operación natural sobre escalas ordinales. Mann-Whitney para 2 grupos, Kruskal-Wallis para ≥ 3 .

Referencias

- Bruce & Bruce, cap. 3 — Resampling and Non-parametric Tests.
- Conover, W.J. (1999), Practical Nonparametric Statistics (3rd ed.) — referencia canónica.
- Romano et al. (2006) — interpretación de Cliff's δ .
- `scipy.stats.mannwhitneyu`, `wilcoxon`, `kruskal`.
- `scikit-posthocs` — Dunn, Conover, Nemenyi.

Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — ábrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

Siguiente clase

Clase 181 — Corrección de comparaciones múltiples (Bonferroni, FDR)

Apéndice: notebook (primer bloque)

H: $P(X > Y) = 0.5$. Trabaja sobre rangos, no sobre medias. El effect size es la rank-biserial $r = 1 - 2U/(n \cdot n)$.

```
import numpy as np
from scipy import stats
from statsmodels.stats.multitest import multipletests
import matplotlib.pyplot as plt

rng = np.random.default_rng(42)

a = rng.lognormal(1.0, 0.5, 80) # asimétricos: el t-test es dudoso
b = rng.lognormal(1.25, 0.5, 90)
U, p = stats.mannwhitneyu(a, b, alternative="two-sided")
r_rb = 1 - 2 * U / (len(a) * len(b))
print(f"Mann-Whitney U={U:.0f} p={p:.4f}")
print(f"rank-biserial r = {r_rb:.3f}")
print(f"medianas: a={np.median(a):.2f} b={np.median(b):.2f}")
assert p < 0.05
```

Archivos complementarios

- notebook.ipynb