

Тазовое дно

что норма, а что повод провериться

Это не диагноз и не повод тревожно искать у себя всё подряд, а спокойный ориентир. Тазовое дно бывает в двух противоположных состояниях: **слабое**, которое нужно укреплять, и наоборот **перенапряжённое**, зажатое, которое нужно расслаблять. Помощь в этих случаях прямо противоположная, поэтому так важно не гадать самой, а показаться специалисту. А спокойное дыхание из подкаста безопасно и полезно в обоих случаях, с него можно начинать всем.

1

Мышца, скорее всего, ослаблена

её укрепляют

- Подтекает моча при кашле, чихании, смехе, прыжках, беге или когда поднимаете тяжёлое
- Подтекают газы или стул, трудно их удержать
- Чувство тяжести, давления или будто что-то опускается или выпирает внизу, во влагалище
- Снизилась чувствительность во время близости, ощущение, что мышцы стали слабее
- Не держится тампон, выскальзывает
- Иногда выходит воздух из влагалища, например при движении или наклонах
- Менее явное: ноющая тяжесть внизу живота к концу дня, особенно после нагрузки

- Боль или дискомфорт во время близости, при проникновении
- Больно или сложно пользоваться тампонами
- Боль во время гинекологического осмотра
- Тянущая или ноющая боль, давление внизу живота и в тазу, иногда отдаёт в поясницу, бёдра или копчик
- Трудно начать мочиться, слабая или прерывистая струя
- Запоры, приходится тужиться, боль во время или после стула, боль когда отходят газы
- *Менее явное: постоянное чувство напряжения внизу, не получается расслабить эту зону, иногда жжение или дискомфорт в области промежности*

- Частые или резкие позывы в туалет, иногда не успеваете дойти
- Ощущение, что мочевого пузыря или кишечника опорожнились не до конца

Важно

Иногда у одного человека есть признаки сразу из обеих групп, так тоже бывает. Поэтому не ставьте диагноз себе сами: только специалист на осмотре поймёт, слабость у вас или зажатость, и подскажет верный путь. И без паники: всё это очень частые истории, и почти всегда они решаются мягко, без операции.