

1. Материальные уравнения в Фурье-представлении

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = -k\vec{r}_e(t) + e\vec{r}_e(t)$$

$\frac{d\vec{r}_e}{dt} = \frac{\vec{p}}{\gamma m} \Rightarrow B\vec{r}_e(t)$ в следствие инерции электрона аккумулируется история (память) о воздействии.

Электрическим полем в предыдущие моменты времени t' , а \vec{r}_e дает вклад в $\vec{P}(r, t)$. В общем случае линейная связь \vec{D} и \vec{E} полей имеет вид:

$$\vec{D}(\vec{r}, t) = \vec{E}(\vec{r}, t) + 4\pi\vec{P}(\vec{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iiint \varepsilon(\vec{r}, \vec{r}', t, t') \vec{E}(\vec{r}', t') d^3r' dt' \quad (t' < t)$$

Зависимость ε от \vec{r}' возникает в случае переноса в веществе заряженных частиц (или обладающих дипольным моментом) из других точек среды.

Упрощения:

1) Если среда стационарная и ее свойства зависят только от \vec{E} и \vec{H} и от ничего другого, то $\varepsilon(\vec{r}, \vec{r}', t, t') = \varepsilon(\vec{r}, \vec{r}', t - t')$

2) Если среда однородная $\varepsilon(\vec{r}, \vec{r}', t, t') = \varepsilon(\vec{r} - \vec{r}', t, t')$

Если среда однородная и стационарная, то

$$\vec{D}(\vec{r}, t) = \frac{1}{(2\pi)^2} \iiint \varepsilon(\vec{r} - \vec{r}', t - t') \vec{E}(\vec{r}', t') d^3r' dt' \quad (\text{свертка})$$

$$\hat{\vec{D}}(\vec{k}, \omega) = \varepsilon(\vec{k}, \omega) \vec{E}(\vec{k}, \omega); \quad \hat{\vec{B}}(\vec{k}, \omega) = \mu(\vec{k}, \omega) \vec{H}(\vec{k}, \omega)$$


$\frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon(\vec{k}, \omega) \mu(\vec{k}, \omega) = k^2$ - дисперсионное уравнение \rightarrow связь ω и \vec{k} в среде.

Далее рассматриваем только твердое тело $\Rightarrow \varepsilon$ и μ зависят только от ω

$$\frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon(\omega) \mu(\omega) = k^2$$

Для плазмы $\varepsilon(\omega) \simeq 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}$, $\omega_p^2 = \frac{4\pi n_p e^2}{m}$, $\mu(\varepsilon) = 1$

$$\frac{\omega^2}{c^2} \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2} \right) = k^2 \Rightarrow \omega^2 = \omega_p^2 + k^2 c^2$$



2. Частотная дисперсия показателя преломления сред. Фазовая групповая скорость

$$\vec{E}(z, t) = \vec{E}_0 e^{ikz - i\omega t}, \text{ где } \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon(\omega) \mu(\omega) = k^2$$

$$e^{ikz - i\omega t} = e^{ik(z - \frac{\omega}{k}t)}; \text{ фаза волны } kz - \omega t = \varphi(z, t)$$

$$\varphi(\vec{r}, t) = (\vec{k}, \vec{r}) - \omega t$$


$$\text{Если фаза } \varphi(z, t) = \text{const, то } \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k} = v_{\text{волны}} = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon(\omega)\mu(\omega)}} = \frac{c}{n(\omega)}$$

$n(\omega)$ - показатель преломления среды.

Ни энергия, ни информация не передается с v_{Φ} , которая может быть больше c

Рассмотрим немонохроматическую волну, состоящую из двух монохроматических плоских волн.

$$\begin{aligned} \vec{E}(z, t) &= \vec{E}_0 (\cos(kz - \omega t) + \cos((k + \Delta k)z - (\omega + \Delta\omega)t)) = \\ &= \vec{E}_0 2 \cos\left(\left(k + \frac{\Delta k}{2}\right)z - \left(\omega + \frac{\Delta\omega}{2}\right)t\right) \cos\left(\frac{\Delta k}{2}z - \frac{\Delta\omega}{2}t\right), \quad t = \text{const} \end{aligned}$$



Скорость движения огибающей:

$$\frac{\Delta k z}{2} - \frac{\Delta\omega t}{2} = \text{const} \Rightarrow \frac{dz}{dt} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{d\omega}{dk} = v_g - \text{ групповая скорость}$$

Соотношения Рэлея $\frac{\omega n(\omega)}{c} = k$ (дисперсионное уравнение) \Rightarrow


$$\begin{aligned} \frac{d}{d\omega}(\omega n(\omega)) &= \frac{dkc}{d\omega} \Rightarrow n(\omega) + \omega \frac{dn(\omega)}{d\omega} = \frac{dk}{d\omega} c \Rightarrow \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n(\omega) + \omega \frac{dn(\omega)}{d\omega}} = \\ &= \underbrace{\frac{c}{n(\omega)}}_{v_{\Phi}} \frac{1}{1 + \frac{\omega}{n(\omega)} \frac{dn}{d\omega}} \Rightarrow v_g = \frac{v_{\Phi}}{1 + \frac{\omega}{n} \frac{dn}{d\omega}} \end{aligned}$$

Если $\frac{dn}{d\omega} > 0$, то $v_g < v_{\Phi}$ - нормальная дисперсия

Если $\frac{dn}{d\omega} < 0$, то $v_g > v_\Phi$ - аномальная дисперсия

Движение одномерного волнового пакета в среде с дисперсией $\omega = \omega(k)$

Известно, что он движется по z




$$\vec{E}(z, 0) = \vec{E}_0(z) e^{ik_0 z}$$

$$\vec{E}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \underbrace{\vec{E}_0(z) e^{ik_0 z}}_{=\vec{E}(z,0)} e^{-ikz} dz = \hat{\vec{E}}_0(k - k_0)$$


Для электрического поля волны с k эволюция во времени описывается:

$$\vec{E}(k) e^{ikz - i\omega(k)t}$$

$$\vec{E}(z, k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \vec{E}(k) e^{ikz - i\omega(k)t} dk$$



Если $\lambda = \frac{2\pi}{k_0} \ll$ масштаб изменения $E_0(z)$ или длины пакета L_0



$$\Delta k L_0 \sim \pi \Rightarrow \Delta k \sim \frac{\pi}{L_0}$$

$$k \sim k_0 \sim \frac{2\pi}{\lambda} \Rightarrow \frac{\Delta k}{k_0} \ll 1$$

$$\omega(k) \simeq \underbrace{\omega(k_0)}_{\omega_0} + \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{k_0} (k - k_0) + \frac{1}{2} \left. \frac{d^2\omega}{dk^2} \right|_{k_0} (k - k_0)^2$$

1) Пусть $\omega(k) = \omega_0 + v_g(k - k_0)$; $\vec{E}(z, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \vec{E}(k) e^{ikz - \omega_0 t - i v_g t (k - k_0)} dk =$

$$= \frac{e^{ik_0 z - i\omega_0 t}}{\sqrt{2\pi}} \int E(k) e^{ik(z - v_g t)} dk = e^{ik_0 v_g t - i\omega_0 t} \vec{E}_0(z - v_g t) e^{ik_0(z - v_g t)} = \vec{E}_0(z - v_g t) e^{ik_0 z - i\omega_0 t}$$

- пакет без изменения формы движется по z

2) Учтем $\left. \frac{d^2\omega}{dk^2} \right|_k \frac{(k - k_0)^2}{2} \ll i \frac{\pi}{2} \Rightarrow \Delta t = \frac{\pi}{\Delta k^2 \omega''} \sim \frac{L_0^2}{\pi \omega''}$


Если $t \gg \Delta t$ $\frac{\Delta v_g}{\Delta k} \sim \frac{dv_g}{dk} = \frac{d\left(\frac{d\omega}{dk}\right)}{dk} = \omega''(k_0) \Rightarrow \Delta v_g \simeq \omega''(k_0) \Delta k$

Расплывания пакета: $\Delta L = \Delta v_g t \simeq \omega''(k_0) \Delta k t$

$$L(t) \simeq \sqrt{L_0^2 + \Delta L^2} = \sqrt{L_0^2 + (\omega''(k_0) \Delta k t)^2}$$


Примеры дисперсионных соотношений:

1) Электромагнитная волна, в вакууме, звук в среде $\omega = ka$, $a = \text{const}$




$$v_{\Phi} = \frac{\omega}{k} = a, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = a$$

2) $\omega = \sqrt{gk}$ - волны на поверхности жидкости:



$$v_{\Phi} = \sqrt{\frac{g}{k}}, \quad v_g = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{g}{k}} \Rightarrow v_g < v_{\Phi}$$

3) Электромагнитная волна в плазме: $\omega^2 = \omega_p^2 + k^2 c^2$



$$v_{\Phi} = \frac{\sqrt{\omega_p^2 + k^2 c^2}}{k}, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{2} \frac{2kc^2}{\sqrt{\omega_p^2 + k^2 c^2}} = \frac{c^2}{v_{\Phi}}, \quad v_g v_{\Phi} = c^2$$

$$v_{\Phi} = \operatorname{tg} \alpha, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = \operatorname{tg} \beta, \quad \operatorname{tg} \gamma = \frac{\omega}{k} = c$$

$\alpha > \gamma, \quad \beta < \gamma \Rightarrow \alpha > \beta$ — нормальная дисперсия