

Пугач



Пугач (лат. *Bubo bubo*) — хижий птах із сімейства совинок, один з найбільш великих представників загону совоподібних. Найбільш характерні риси включають в себе масивну «бочкоподібну» статуру, пухке оперення з переважанням рудих і вохристих відтінків, яскраво-помаранчеві очі і пучки подовженого пір'я над ними. Поширений в лісових і степових районах Євразії, де пристосовується до найрізноманітніших біотопів, де є достатня кормова база і важкодоступні місця для гніздування. Не цурається людини і іноді (частіше в Західній Європі) оселяється в межах міста. Осілий птах.

Полює на зайців, гризунів, їжаків, ворон, водоплавних і курячих птахів, а також безліч інших хребетних. Орієнтується на масову, доступну здобич, при необхідності легко переключається з одного виду корму на інший. До гніздування приступає один раз в рік взимку або ранньою весною, коли земля ще покрита сніговим покривом. Яйця відкладає в невелику ямку в ґрунті, як укріття часто використовуючи низькі гілки ялини, напромадження з каменів і повалених стовбурів, ущелини і виміюни. Сичоче займає уступи на крутих схилах гір і річкових долин.

Великий хижий птах, розмірами поступається Беркуту, але трохи крупніший білої сови. Ряд джерел називають його найбільшим представником совоподібних птахів, проте це не зовсім вірно: рибний пугач в середньому трохи масивніший звичайного, а білий витончена бородата сова трохи довша. За даними джерел, довжина птаха становить 60-75 см, розмах крил 160-190 см, маса самців 2,1-2,7 кг, маса самок 3,0-3,2 кг. Для порівняння, у що займає аналогічну екологічну нішу в Північній Америці виринського пугача маса найбільших підвидів не перевищує 2 кг. Відповідно до правила Бергмана, розміри тіла особин в популяціях зменшуються з півночі на південь: наприклад, маса птахів, що мешкають в Африці і на Близькому Сході, приблизно на 20% менше маси птахів, поширених в Північній і Західній Європі.

