

Colegiul Național de Informatică „Spiru-Haret” Suceava

Matrici

Referat la Matematică

Elev :

Profesor :

Anul școlar: 2008 - 2009

CUPRINS

1. MATRICI	pg. 3
-------------------------	--------------

1.1. Tabel matriceal. Mulțimi de matrice

1.2. Operații cu matrice

1.2.1. Adunarea matricelor

1.2.2. Înmulțirea matricelor cu scalari

1.2.3. Înmulțirea matricelor

1.2.4. Puterea unei matrice pătratice

1.2.5 Transpusa unei matrice

2. APLICAȚII.....	pg. 10
--------------------------	---------------

3. BIBLIOGRAFIE	pg. 23
------------------------------	---------------

MATRICI

Definiție. Se numește **matrice cu m linii și n coloane** (sau de tip $m \times n$) un tablou cu m linii și n coloane

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

ale cărui elemente a_{ij} sunt numere complexe.

1.1. Tabel matriceal. Mulțimi de matrice.

Să considerăm următorul enunț din domeniul economiei.

„Un depozit de materiale se aprovizionează eşalonat pe o perioadă de 4 luni cu un anumit produs după urmatorul plan:

- în prima lună se aprovizionează cu 100 de bucăți, la prețul unitar de 3 000 unități monetare (u.m.).
- În a doua lună se aprovizionează cu 120 bucăți la prețul unitar de 3 500 u.m.
- În luna a treia primește cu 10 bucăți mai puțin decât în luna precedentă, cu prețul pe unitate de produs de 3 200 u.m., iar în luna a patra comandă o cantitate dublă față de prima lună plătind 3 200 u.m. pe unitatea de produs.”

Pentru ținerea unei evidențe cât mai clare, aceste date pot fi ordonate și clasate în diverse moduri, astfel încât obținerea unor informații legate de acest proces de aprovizionare să se realizeze cât mai eficient.

Astfel, datele de mai sus pot fi grupate într-un tabel de forma:

Luna	1	2	3	4
Cantitate	100	120	110	200
Preț unitar	3 000	3 500	3 200	3 200

Într-un mod mai simplificat, aceste date pot fi reorganizate într-un tabel de forma:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 100 & 120 & 110 & 200 \\ 3000 & 3500 & 3200 & 32000 \end{pmatrix} \text{ sau } \begin{pmatrix} 100 & 120 & 110 & 200 \\ 3000 & 3500 & 3200 & 32000 \end{pmatrix}$$

Un astfel de tabel se numește **tabel matriceal**.

Primul tabel matriceal este format din 3 linii și 4 coloane (este de tipul 3×4), iar al doilea tabel matriceal este format din 2 linii și 4 coloane (este de tipul 2×4). Dacă se ia în considerare numai linia care conține cantitățile achiziționate lunar, se obține un tabel de forma (100 120 110 200) numit **tabel matriceal linie**.

Dacă se consideră numai datele care caracterizează fenomenul în luna a treia se obține un tabel de forma $\begin{pmatrix} 3 \\ 110 \\ 3200 \end{pmatrix}$ sau $\begin{pmatrix} 110 \\ 3200 \end{pmatrix}$, numit **tabel matriceal coloană**.

Așadar, prin organizarea unor date legate de un fenomen în asemenea tabele matriceale, se stabilește de fapt o corespondență între poziția ocupată de un număr din tabel și valoarea acestuia.

Poziția numărului din tabelul matriceal este ușor de identificat printr-o pereche ordonată de numere naturale (i, j) care arată că numărul se află pe linia i și pe coloana j a tabelului.

Generalizarea unei astfel de corespondențe, făcându-se abstracție de natura materială a datelor folosite, conduce la introducerea unei noi noțiuni matematice.

Cazuri particulare

1) O matrice de tipul $1 \times n$ (deci cu o linie și n coloane) se numește **matrice linie** și are forma

$$A = (a_1 \ a_2 \ \dots \ a_n).$$

2) O matrice de tipul $m \times 1$ (cu m linii și o coloană) se numește **matrice coloană** și are forma

$$B = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \dots \\ a_m \end{pmatrix}.$$

3) O matrice de tip $m \times n$ se numește **nulă (zero)** dacă toate elementele ei sunt zero. Se notează cu O

$$O = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

4) Dacă numărul de linii este egal cu numărul de coloane, atunci matricea se numește **pătratică**.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Sistemul de elemente $(a_{11} \ a_{22} \ \dots \ a_{nn})$ reprezintă **diagonala principală** a matricii A , iar suma acestor elemente $a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$ se numește **urma matricii A**

notată $Tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$. Sistemul de elemente $(a_{1n} \ a_{2n-1} \ \dots \ a_{n1})$ reprezintă **diagonala secundară a matricii A** .

Suma elementelor de pe diagonala principală a matricei A se numește **urma matricei A** și se notează **Tr (A)**.

Mulțimea acestor matrici se notează $M_n(C)$. Printre aceste matrici una este foarte importantă aceasta fiind

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

și se numește **matricea unitate** (pe diagonala principală are toate elementele egale cu 1, iar în rest sunt egale cu 0).

Egalitatea matricelor

Fie matricele $A, B \in M_{m,n}(C)$, $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$.

Definiție.

- Matricele A și B se numesc **matrice egale**, dacă $a_{ij} = b_{ij}$, pentru fiecare $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, $j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Problemă rezolvată

Să se determine $a, b, x, y, m \in \mathbb{R}$ astfel încât să aibă loc egalitatea de matrice $A=B$, pentru $A = \begin{pmatrix} a^2 + 5i & 2b + 1 \\ 2^x + 3^y & 2^x + 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 + mi & 7 \\ 31 & 6 \end{pmatrix}$.

Soluție

Din egalitatea $a_{11} = b_{11}$ rezultă $a^2 + 5i = 1 + mi$. Aplicând egalitatea a două numere complexe se obține $a^2 = 1$ și $m = 5$, deci $a \in \{-1, 1\}$, $m = 5$.

Din egalitatea $a_{21} = b_{21}$, rezultă $2b + 1 = 7$ și $b = 3$. Egalitățile $a_{21} = b_{21}$ și $a_{22} = b_{22}$ conduc la relațiile $2^x + 3^y = 31$ și $2^x + 2 = 6$. Se obține $x = 2$ și $y = 3$.

Observații

- Folosind proprietățile relației de egalitate pe mulțimea C, relația de egalitate pe mulțimea $M_{m,n}(C)$ are următoarele proprietăți:
 - Dacă $A=A$, $\forall A \in M_{m,n}(C)$ (**proprietatea de reflexivitate**).
 - Dacă $A=B$, atunci $B=A$, $\forall A, B \in M_{m,n}(C)$ (**proprietatea de simetrie**).
 - Dacă $A=B$ și $B=C$, atunci $A=C$, $\forall A, B, C \in M_{m,n}(C)$ (**proprietatea de tranzitivitate**).
- Dacă matricele A, B nu sunt egale, se scrie $A \neq B$.

1.2.1. Adunarea matricelor

Definiție. Fie $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}), C = (c_{ij}) \in M_{m,n}(C)$. Matricea C se numește **suma** matricelor A, B dacă:

$$c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}, (\forall) i = \overline{1, m}, (\forall) j = \overline{1, n}.$$

Observații

1) Două matrici se pot aduna dacă **sunt de același tip**, adică dacă au același număr de linii și același număr de coloane, deci $A, B \in M_{m,n}(C)$.

2) Explicit adunarea matricelor A, B înseamnă:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{m1} & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}.$$

Exemplu: Să se calculeze $A + B$ pentru:

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 5 & -3 \\ 10 & 1 & 5 \end{pmatrix};$

2. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$

R. 1. Avem

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 & -3 \\ 10 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & -1+5 & 2-3 \\ 3+10 & 0+1 & 1+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 13 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

2. Avem

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 1+1 \\ -1+1 & 1+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proprietăți ale adunării matricelor

A₁ (Asociativitatea adunării). Adunarea matricilor este **asociativă**, adică:

$$(A + B) + C = A + (B + C), (\forall) A, B, C \in M_{m,n}(C).$$

A₂ (Comutativitatea adunării). Adunarea matricelor este **comutativă**, adică:

$$A + B = B + A, (\forall) A, B \in M_{m,n}(C).$$

A₃ (Element neutru). Adunarea matricelor admite matricea nulă ca **element neutru**, adică $\exists O_{m,n} \in M_{m,n}(C)$ astfel încât $A + O_{m,n} = A, (\forall) A \in M_{m,n}(C)$.

A₄ (Elemente opuse). Orice matrice $A \in M_{m,n}(C)$ are un opus, notat $-A$, astfel încât

$$A + (-A) = O_{m,n}.$$

1.2.2. Înmulțirea matricelor cu scalari

Definiție. Fie $\lambda \in C$ și $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(C)$. Se numește **produsul dintre scalarul** $\lambda \in C$ **și matricea** A , matricea notată $\lambda A \in M_{m,n}(C)$ definită prin $\lambda A = (\lambda a_{ij})$.

Obs.: A înmulți o matrice cu un scalar revine la a înmulți toate elementele matricii cu acest scalar.

$$\text{Deci } \lambda A = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Exemplu Fie } A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -3 & 5 \\ 0 & \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}. \text{ Atunci } 6A = \begin{pmatrix} 3 & -18 & 30 \\ 0 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Proprietăți ale înmulțirii matricelor cu scalari

$$S_1 \quad \lambda(\mu A) = (\lambda\mu)A, (\forall) \lambda, \mu \in C, (\forall) A \in M_{m,n}(C);$$

$$S_2 \quad \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B, (\forall) \lambda \in C, (\forall) A, B \in M_{m,n}(C);$$

$$S_3 \quad (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A, (\forall) \lambda, \mu \in C, (\forall) A \in M_{m,n}(C);$$

$$S_4 \quad 1 \cdot A = A, 1 \in C, (\forall) A \in M_{m,n}(C);$$

1.2.3. Înmulțirea matricelor

Definiție. Fie $A = (a_{ki}) \in M_{m,n}(R)$, $B = (b_{ij}) \in M_{n,p}(R)$. **Produsul dintre matricele** A **și** B **(în aceasta ordine)**, notat AB este matricea $C = (c_{kj}) \in M_{m,p}(R)$ definită prin

$$c_{kj} = \sum_{i=1}^n a_{ki} b_{ij}, (\forall) k = \overline{1, m}, (\forall) j = \overline{1, n}.$$

Observații

1) Produsul AB a două matrici nu se poate efectua întotdeauna decât dacă $A \in M_{m,n}(R)$, $B \in M_{n,p}(R)$, adică **numărul de coloane ale lui** A **este egal cu numărul de linii ale lui** B , când se obține o matrice $C = AB \in M_{m,p}(R)$.

2) Dacă matricile sunt pătratice $A, B \in M_n(R)$ atunci are sens întotdeauna atât AB cât și BA , iar, în general, $AB \neq BA$ adică înmulțirea matricelor **nu este comutativă**.

Proprietăți ale înmulțirii matricelor

I₁ (Asociativitatea înmulțirii). Înmulțirea matricelor este asociativă, adică

$$(AB)C = A(BC), (\forall) A \in M_{m,n}(C), (\forall) B \in M_{n,p}(C), (\forall) C \in M_{p,s}(C).$$

I₂ (Distributivitatea înmulțirii în raport cu adunarea). Înmulțirea matricelor este distributivă în raport cu adunarea matricelor, adică

$(A+B)C = AC + BC, C(A+B) = CA + CB, (\forall) A, B, C$ matrici pentru care au sens operațiile de adunare și înmulțire.

I₃ Dacă $I_n \in M_n(C)$ este matricea unitate, atunci

$$I_n A = A I_n = A, (\forall) A \in M_n(C).$$

Se spune că I_n este **element neutru** în raport cu operația de înmulțire a matricelor.

1.2.4. Puterea unei matrice pătratice

Proprietatea de asociativitate a înmulțirii matricelor pătratice permite definirea puterii cu exponent natural a unei matrice pătratice.

Fie $A \in M_n(C)$. Definim $A^0 = I_n, A^1 = A, A^2 = A * A$. Pentru $n \in \mathbb{N}^*$ se definește puterea n a matricei A prin $A^n = A^{n-1} * A$.

Exemplu:

$$\text{Dacă } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \text{ atunci :}$$

$$A^2 = A * A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 * A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$$

$$A^4 = A^3 * A = \begin{pmatrix} -5 & -1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 4 \\ -8 & -7 \end{pmatrix}$$

1.2.5 Transpusa unei matrice

Definitii:

- Fie matricea $A = (a_{ij})_{m \times n}$. Se numește **transpusa** matricei A , matricea ${}^tA = (b_{kl})_{n \times m}$, unde $b_{kl} = a_{lk}$, pentru oricare $k \in \{1, 2, \dots, n\}$ și $l \in \{1, 2, \dots, m\}$.
- Operația prin care fiecărei matrice $A \in M_{m,n}(C)$ i se asociază matricea transpusă ${}^tA \in M_{n,m}(C)$ se numește **operația de transpunere a matricelor**.

Observatii:

1. Matricea transpusă tA se obține din matricea A prin schimbarea liniilor în coloane și a coloanelor în linii.
2. Dacă ${}^tA \in M_n(C)$, atunci ${}^tA \in M_n(C)$ și $\text{Tr}(A) = \text{Tr}({}^tA)$, unde $\text{Tr}(A)$ este urma matricei A .

APLICAȚII

I. Manual

Să se determine numerele reale x, y, z astfel încât să aibă loc egalitatea de matrici, în cazurile

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \begin{pmatrix} 1 & 2x-3y \\ -7x+6y & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & y-x-11 \\ 19 & 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow & \begin{cases} 1=1 \\ 2x-3y = y-x-11 \Rightarrow 3x = 4y-11 \Rightarrow x = \frac{4y-11}{3} \\ -7x+6y = 19 \Rightarrow -7 \cdot \frac{4y-11}{3} + 6y = 19 \Rightarrow 77-28y+18y = 57 \Rightarrow 10y = 20 \Rightarrow y = 2 \\ 0=0 \end{cases} \\ & \left. \begin{array}{l} x = \frac{4y-11}{3} \\ \text{dar } y = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow x = \frac{8-11}{3} \Rightarrow x = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad & \begin{pmatrix} 2x & 3x+y \\ x-7y & 2x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y+3 & 8-y \\ -5 & 4y \end{pmatrix} \\ \Rightarrow & \begin{cases} 2x = y+3 \Rightarrow 2 \cdot 2y = y+3 \Rightarrow 3y = 3 \Rightarrow y = 1 \\ 3x+y = 8-y \\ x-7y = -5 \\ 2x = 4y \Rightarrow x = 2y \end{cases} \\ & \left. \begin{array}{l} x = 2y \\ \text{dar } y = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow x = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & \begin{pmatrix} y+3x & -1 \\ 3 & y-x \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^2+1 & -1 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow & \begin{cases} y+3x = x^2+1 \Rightarrow 6+x+3x = x^2+1 \Rightarrow x^2-4x-5 = 0 \\ -1 = -1 \\ 3 = 3 \\ y-x = 6 \Rightarrow y = 6+x \end{cases} \end{aligned}$$

$$x^2-4x-5 = 0 \Rightarrow x^2-5x+x-5 = 0 \Rightarrow x(x-5) + (x-5) = 0 \Rightarrow (x-5)(x+1) = 0 \Rightarrow x_1 = 5$$

$$\Rightarrow x_2 = -1$$

- I.** dacă $x = 5$, atunci $y = 11$
II. dacă $x = -1$, atunci $y = 5$

$$\begin{aligned} \text{d)} \quad & \begin{pmatrix} xy & 0 \\ yz + yx & zx - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -xz - 5 & 0 \\ 4 & -zy \end{pmatrix} \\ \Rightarrow & \begin{cases} xy = -xz - 5 \Rightarrow x(y + z) + 5 = 0 \\ 0 = 0 \\ yz + yx = 4 \Rightarrow y(x + z) - 4 = 0 \Rightarrow y\left(x + \frac{3}{x + y}\right) = 4 \Rightarrow y\left(\frac{x^2 + xy + 3}{x + y}\right) = 4 \Rightarrow x^2y + y^2x + 3y = 4x + 4y \\ zx - 3 = -zy \Rightarrow z(x + y) - 3 = 0 \Rightarrow z = \frac{3}{x + y} \end{cases} \end{aligned}$$

2. Să se calculeze $A + B$ în cazurile:

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -5 & -3 \end{pmatrix}.$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+2 & -3+4 \\ 0+(-5) & 4+(-3) \end{pmatrix} \Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2) \quad A = \begin{pmatrix} 1+i & -i & 3i \\ 0 & -1-i & i \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1-3i & 2+i & 1 \\ i & 1+i & -i \end{pmatrix}$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1+i+(-1-3i) & -i+2+i & 3i+1 \\ 0+i & -1-i+1+i & i+(-i) \end{pmatrix} \Rightarrow A + B = \begin{pmatrix} -2i & 2 & 3i+1 \\ i & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Se consideră matricile

$$A = \begin{pmatrix} 2 & m & -2 & 2 \\ 4 & -1 & 2m & 5 \\ 2 & 10 & -12 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} n & m & 1 & -1 \\ -4 & 0 & 6 & -3 \\ -1 & -5 & 6 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -m & 2 \\ p & 5 & -6 & 1 \end{pmatrix}.$$

Să se determine m, n, p astfel încât $A + B = C$.

$$\Rightarrow \begin{cases} 2+n=-1 \Rightarrow n=-3 \\ m+m=-4 \Rightarrow 2m=-4 \Rightarrow m=-2 \\ 2m+6=-m \\ 2-1=p \Rightarrow p=1 \end{cases}.$$

$$\text{Deci } \begin{cases} n=-3 \\ m=-2 \\ p=1 \end{cases}$$

4. Se consideră matricile $A, B \in \mathbf{M}_{2,3}(C)$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i & -1 \\ 0 & 2 & 3i \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -i & 1 & 0 \\ 1 & i & i+1 \end{pmatrix}.$$

Să se calculeze: $3A - 2iB$, $iA + 2B$.

$$3A - 2iB = 3 \begin{pmatrix} 1 & i & -1 \\ 0 & 2 & 3i \end{pmatrix} - 2i \begin{pmatrix} -i & 1 & 0 \\ 1 & i & i+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3i & -3 \\ 0 & 6 & 9i \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & -2i & 0 \\ -2i & 2 & 2-2i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & i & -3 \\ -2i & 8 & 7i+2 \end{pmatrix}$$

$$iA + 2B = i \begin{pmatrix} 1 & i & -1 \\ 0 & 2 & 3i \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -i & 1 & 0 \\ 1 & i & i+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & -1 & -i \\ 0 & 2i & -3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2i & 2 & 0 \\ 2 & 2i & 2i+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i & 1 & -i \\ 2 & 4i & 2i-1 \end{pmatrix}$$

5. Calculați produsele de matrici $A \cdot B$, unde

a) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 6+2+1 & 2+1+0 \\ 9+0+1 & 3+0+0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 10 & 3 \end{pmatrix}$$

b) $A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

c) $A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ -2i & 0 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} i & -3i \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot i + i \cdot 0 & -3i \cdot 1 + i \cdot 1 \\ -2i \cdot i + 0 \cdot 0 & -2i \cdot (-3i) + 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i & -2i \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$$

d) $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & 6 \\ 5 & 2 & -7 \end{pmatrix}$ și $B = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} -5 \\ 52 \\ -33 \end{pmatrix}$$

$$e) A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 9 \\ 5 & -1 & 6 \\ 5 & 3 & 5 \end{pmatrix} \text{ și } B = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 4 \\ 8 & 9 & 7 \\ -4 & -5 & -3 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 11 & 9 & 13 \\ -22 & -27 & -17 \\ 29 & 32 & 26 \end{pmatrix}$$

6. Să se calculeze $f(A)$, dacă:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}; f(X) = X^2 - 5X + 7I_2$$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} f(A) &= \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} - 5 \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} + 7 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -5 & 5 \\ -10 & -5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -6 & -6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -6 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

7. Fie $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Să se calculeze A^n , $n \in N^*$.

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

\vdots

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Inducție matematică $P(k) \rightarrow P(k+1)$

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\mathbf{A})$$

Deci $A^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

8. Calculați determinanții de ordinul doi:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1 \cdot 3 - (-1) \cdot 2 = 3 + 2 = 5$$

$$2) \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} = (-1) \cdot (-2) - 1 \cdot 3 = 2 - 3 = -1$$

$$3) \begin{vmatrix} \sqrt{3} & 1 \\ -3 & -\sqrt{3} \end{vmatrix} = \sqrt{3} \cdot (-\sqrt{3}) - (-3) \cdot 1 = -3 + 3 = 0$$

9. Calculați determinanții de ordinul trei:

$$1) \begin{vmatrix} 2 & -1 & -2 \\ 6 & -1 & 1 \\ 4 & 5 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1) \cdot 3 + (-1) \cdot 1 \cdot 4 + 6 \cdot 5 \cdot (-2) - [(-2) \cdot (-1) \cdot 4 + 2 \cdot 1 \cdot 5 + (-1) \cdot 6 \cdot 3] =$$

$$= -6 - 4 - 60 - [8 + 10 - 18] =$$

$$= -70$$

$$2) \begin{vmatrix} 2 & 0 & -5 \\ 5 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 3 \cdot 6 + 0 \cdot 3 \cdot 0 + 5 \cdot 4 \cdot (-5) - [(-5) \cdot 3 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 0 \cdot 5 \cdot 6] =$$
$$= 36 + 0 - 100 - [0 + 24 + 0] =$$
$$= -64 - 24 =$$
$$= -88$$

$$3) \begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 3 & -1 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot (-2) + 3 \cdot 3 \cdot (-3) - [(-1) \cdot (-2) \cdot (-3) + 1 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 3] =$$

$$\begin{aligned}
&= -1 - 8 - 27 - [-6 + 6 + 6] = \\
&= -36 - 6 = \\
&= -42
\end{aligned}$$

10. Calculați determinanții următori:

$$\begin{aligned}
1) \quad & \begin{vmatrix} a+d & b+d & c+d \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} d & d & d \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b & c \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} + d \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0 + d \cdot 0 = 0 \\
2) \quad & \begin{vmatrix} a+b & b-a & b \\ b+c & c-b & c \\ c+a & a-c & a \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & -a & b \\ b & -b & c \\ c & -c & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & b & b \\ c & c & c \\ a & a & a \end{vmatrix} = -1 \begin{vmatrix} a & a & b \\ b & b & c \\ c & c & a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & b & b \\ c & c & c \\ a & a & a \end{vmatrix} = -1 \cdot 0 + 0 = 0
\end{aligned}$$

11. Să se rezolve ecuațiile:

$$1) \begin{vmatrix} 1 & x & x \\ x & 1 & x \\ x & x & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{aligned}
1 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x & x \\ x & 1 \end{vmatrix} + x \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} x & x \\ x & x \end{vmatrix} + x \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} x & 1 \\ x & x \end{vmatrix} &= 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & x \\ x & 1 \end{vmatrix} - x \begin{vmatrix} x & x \\ x & 1 \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} x & 1 \\ x & x \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow 1 - x^2 - x(x - x^2) + x(x^2 - x) &= 0 \Leftrightarrow 1 - x^2 - x^2 + x^3 + x^3 - x^2 = 0 \Leftrightarrow 2x^3 - 3x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow 2x^3 - 2x^2 - x^2 + 1 &= 0 \Leftrightarrow 2x^2(x - 1) - (x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow 2x^2(x - 1) - (x - 1)(x + 1) = 0 \Rightarrow \\
\Rightarrow (x - 1)(2x^2 - x - 1) &= 0 \Rightarrow (x - 1) = 0 \Rightarrow x_1 = 1 \\
&\Rightarrow 2x^2 - x - 1 = 0 \Rightarrow \Delta = 1 + 8 = 9 \Rightarrow x_2 = 1 \\
&\Rightarrow x_3 = -\frac{1}{2}
\end{aligned}$$

$$\text{Deci } x \in \left\{ -\frac{1}{2}, 1 \right\}.$$

12. Să se rezolve ecuațiile:

$$1) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & x \\ x & 0 & 1 & 1 \\ 1 & x & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$0 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x & 0 & 1 \\ 1 & x & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} x & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} + x \cdot (-1)^{1+4} \begin{vmatrix} x & 0 & 1 \\ 1 & x & 0 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow 0 - \begin{vmatrix} x & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & x & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & 0 & 1 \\ 1 & x & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} - x \begin{vmatrix} x & 0 & 1 \\ 1 & x & 0 \\ 1 & 1 & x \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow 0 - [(x \cdot 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot x \cdot 1) - (1 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot 1 + x \cdot 1 \cdot x)] + [x \cdot 0 \cdot x + 0 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 - (1 \cdot x \cdot 1 + 1 \cdot x \cdot 1 + 0 \cdot 0 \cdot 1)] - \\
&- x[(x \cdot x \cdot x + 0 \cdot 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1) - (1 \cdot x \cdot 1 + 1 \cdot 0 \cdot x + 1 \cdot 0 \cdot x)] = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow -(x + 1 - x^2) + (1 - 2x) - x(x^3 + 1 - x) = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow x^2 - x - 1 - 2x + 1 - x^4 - x + x^2 = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow -x^4 + 2x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow x^4 - 2x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow \\
&\Leftrightarrow x(x^3 - 2x + 4) = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \\
&\Rightarrow x^3 - 2x + 4 = 0
\end{aligned}$$

13. Fie $A, B \in \mathbf{M}_3(R)$ pentru care $\det(A) = \det(B) = \det(A+B) = \det(A-B) = 0$. Să se arate că $\det(xA + yB) = 0$, $(\forall) x, y \in R$.

$$\det(xA + yB) = P(x, y) = \lambda_1 x^3 + \lambda_2 x^2 y + \lambda_3 x y^2 + \lambda_4 y^4 = 0$$

Pentru $x = 0$ și $y = 1$

$$P(0, 1) = \det(B) = 0 \Rightarrow \lambda_4 = 0$$

Pentru $x = 1$ și $y = 0$

$$P(1, 0) = \det(A) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0$$

Pentru $x = 1$ și $y = 1$

$$P(1, 1) = \det(A + B) = 0 \Rightarrow \lambda_2 + \lambda_3 = 0$$

Pentru $x = 1$ și $y = -1$

$$P(1, -1) = \det(A - B) = 0 \Rightarrow \lambda_2 - \lambda_3 = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_2 = \lambda_3 = 0$$

Deci $\det(xA + yB) = 0$

2. Bacalaureat

1. Să se determine matricea X din ecuația

$$3X + \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 7 & 4 \\ -2 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ -9 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3X = \begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 14 & 8 \\ -4 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & 6 \\ -9 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 2 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$$

$$3X = \begin{pmatrix} -1 & 12 \\ 5 & 11 \\ -1 & 12 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$3X = \begin{pmatrix} -3 & 15 \\ 6 & 9 \\ -3 & 15 \end{pmatrix} \Rightarrow X = \begin{pmatrix} -1 & 5 \\ 2 & 3 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

2. a) Găsiți matricea $X \in \mathbf{M}_2(R)$ astfel încât

$$X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

b) Să se determine $m \in R$ astfel încât sistemul următor să fie compatibil și apoi rezolvați-l:

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x - 2y = -1 \\ 3x + y = m \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \\ \Rightarrow X \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \left\{ \begin{aligned} &\Rightarrow \begin{pmatrix} x \cdot 1 + y \cdot 0 & x \cdot 2 + y \cdot 1 \\ 2 \cdot z + t \cdot 0 & z \cdot 2 + t \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x & 2x + y \\ 2z & 2z + t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \\ &X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} \end{aligned} \right. \\ \Rightarrow \begin{cases} x = 3 \\ 2z = 0 \Rightarrow z = 0 \\ 2x + y = 1 \Rightarrow 6 + y = 1 \Rightarrow y = -5 \\ 2z + t = 4 \Rightarrow t = 4 \end{cases} \\ \text{Deci } X &= \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$\text{b) } \begin{cases} x + y = 1 \\ x - 2y = -1 \\ 3x + y = m \end{cases}$$

$$x + y = 1 \Rightarrow x = 1 - y$$

$$x - 2y = -1 \Rightarrow 1 - y - 2y = -1 \Rightarrow -3y = -2 \Rightarrow y = \frac{2}{3}$$

$$x = 1 - y = 1 - \frac{2}{3} \Rightarrow x = \frac{1}{3}$$

$$3x + y = m \Rightarrow 3 \cdot \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = m \Rightarrow m = 1 + \frac{2}{3} \Rightarrow m = \frac{5}{3}$$

3. a) Fie matricea $A \in \mathbf{M}_2(R)$; $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $a \neq 0$. Să se calculeze A^2 și

A^3 și apoi să se determine A^n , $n \in \mathbb{N}^*$ în funcție de n .

b) Să se afle x, y, u, v , numere reale astfel încât

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{a) } A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + a \cdot 0 & a \cdot 1 + a \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 2a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + 2a \cdot 0 & a \cdot 1 + 2a \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

\vdots

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Inducție matematică $P(k) \rightarrow P(k+1)$

$$A^{n+1} = \begin{pmatrix} 1 & (n+1)a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{n+1} = A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 1 + na \cdot 0 & a \cdot 1 + na \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 0 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0 \cdot a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & (n+1)a \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\mathbf{A})$$

$$\text{Deci } A^n = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{b) } \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x+u & y+v \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x+u=1 \Rightarrow x=0 \\ y+v=0 \Rightarrow y=-1 \\ u=1 \\ v=1 \end{cases}$$

$$\text{Deci } \begin{pmatrix} x & y \\ u & v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. a) Să se determine x, y, u, v , astfel încât:

$$\begin{pmatrix} -x & y \\ u+1 & v \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y & x \\ 3v & 1-2u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -8 & 2 \end{pmatrix}$$

b) Să se determine matricea A astfel încât:

$$2A + \begin{pmatrix} 4 & 10 & -5 \\ 6 & 12 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 11 \\ 12 & 1 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 4 & 21 & 4 \end{pmatrix}.$$

a)

$$\begin{pmatrix} -x & y \\ u+1 & v \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y & x \\ 3v & 1-2u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -8 & 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -x & y \\ u+1 & v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -y & -x \\ -3v & 2u-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -8 & 2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -x-y & y-x \\ u+1-3v & v+2u-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ -8 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} -(x+y) = -3 \Rightarrow x+y=3 \\ y-x=1 \\ u-3v+1=-8 \\ 2u+v-1=2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x=3-y \\ y-x=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=3-y \\ y+y-3=1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2y=4 \\ x=3-y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y=2 \\ x=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u-3v+1=-8 \\ 2u+v-1=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u=3v-9 \\ 2(3v-9)+v=3 \Rightarrow 7v=21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} v=3 \\ u=0 \end{cases}$$

$$\text{b) } 2A + \begin{pmatrix} 4 & 10 & -5 \\ 6 & 12 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 11 \\ 12 & 1 & 15 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 4 & 21 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow 2A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 13 \\ 16 & 22 & 19 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 & 10 & -5 \\ 6 & 12 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow 2A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & 13 \\ 16 & 22 & 19 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -4 & -10 & 5 \\ -6 & -12 & 3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 2A = \begin{pmatrix} 4 & -6 & 18 \\ 10 & 10 & 22 \end{pmatrix} \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 9 \\ 5 & 5 & 11 \end{pmatrix}.$$

5. Să se rezolve ecuația:

$$\begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} x & a & a & a \\ a & x & a & a \\ a & a & x & a \\ a & a & a & x \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & a & a & a \\ a & a & a & a \\ a & a & a & a \\ a & a & a & a \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} x-a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x-a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-a) \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} x-a & 0 & 0 \\ 0 & x-a & 0 \\ 0 & 0 & x-a \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (x-a)[(x-a)^3 - 0] = 0 \Rightarrow (x-a)^4 = 0 \Rightarrow x_{1,2,3,4} = a$$

6. Dacă x_1, x_2, x_3 sunt rădăcinile ecuației $x^3 - 2x^2 + 2x + 17 = 0$ să se

calculeze determinantul $d = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix}$.

$$x^3 - 2x^2 + 2x + 17 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = 2 \\ x_1x_2x_3 = -17 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix} = 3x_1x_2x_3 - (x_1^3 + x_2^3 + x_3^3)$$

$$x_1^3 - 2x_1^2 + 2x_1 + 17 = 0$$

$$x_2^3 - 2x_2^2 + 2x_2 + 17 = 0$$

$$\underline{x_3^3 - 2x_3^2 + 2x_3 + 17 = 0} \quad (+)$$

$$\left. \begin{aligned} x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 &= 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) - 2(x_1 + x_2 + x_3) - 51 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) \end{aligned} \right\} \Rightarrow x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 2(2-2) - 2 \cdot 2 - 51 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = -55$$

$$d = 3x_1x_2x_3 - (x_1^3 + x_2^3 + x_3^3) = 3 \cdot (-17) + 55 \Rightarrow \underline{d = 4}$$

7). Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^4}$

$$f(x) = (x-1)(x-3)(x-4)(x-7)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^4} = \frac{x^4 + \dots}{x^4} = 1$$

8). Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{f(x+1)}$, dacă $f(x) = x^2 + x$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{x^2 + x + x + 1} = 1$$

9). Să se calculeze $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2 - x}$

$$f(x) = (x-1)\arcsin x.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2 - x} = \frac{(x-1)\arcsin x}{(x-1)} = 1$$

3. Bacalaureat 2009

1).

Fie matricele $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$ și $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Definim matricele

$A = X \cdot Y^t$ și $B(a) = aA + I_3$, unde $a \in \mathbb{R}$ și Y^t este transpusa matricei Y .

a) Să se arate că matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix}$.

b) Să se calculeze determinantul matricei A .

c) Să se arate că matricea $B(a)$ este inversabilă, oricare ar fi $a \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{4} \right\}$.

a) $A = X \cdot Y^t = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 4 & -6 \\ 3 & 6 & -9 \end{pmatrix}$;

b) $\det A = -36 - 36 - 36 + 36 + 36 + 36 = 0$;

c) Obținem $B(a) = \begin{pmatrix} a+1 & 2a & -3a \\ 2a & 4a+1 & -6a \\ 3a & 6a & -9a+1 \end{pmatrix}$. Trebuie să aflăm dacă $\exists b \in \mathbb{C}$ astfel

încât $B(a) \cdot B(b) = I_3$. Prin calcul se obține că $B(a) \cdot B(b) = B(a+b-4ab)$; $I_3 = B(0)$;

$a+b-4ab=0$, $b = \frac{a}{4a-1}$. Deci B este inversabilă $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{4} \right\}$.

2).

Fie matricea $A(k) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & x_k & x_k^2 \\ -2 & x_k^2 & x_k \end{pmatrix}$, cu $k \in \{0, 1, 2\}$. $x_0 = 1$ și x_1, x_2 sunt soluțiile

ecuației $x^2 + x - 2 = 0$.

a) Să se calculeze determinantul matricei $A(0)$.

b) Să se determine matricea $A(1) + A(2)$.

c) Să se calculeze suma elementelor matricei $A(k)$, pentru fiecare $k \in \{0, 1, 2\}$.

$$\text{a) } \det A(0) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & x_0 & x_0^2 \\ -2 & x_0^2 & x_0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.$$

$$\text{b) } x^2 + x - 2 = 0, \quad x^2 + 2x - x - 2 = 0, \quad (x+2)(x-1) = 0 \Rightarrow x_1 = 1, \quad x_2 = -2.$$

$$A(1) + A(2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -4 & -1 & 5 \\ -4 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

3).

$$\text{Se consideră mulțimea } G = \left\{ \begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{Z} \right\} \text{ și matricele } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ și } O_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{a) Să se verifice că } B^2 = 3B, \text{ unde } B^2 = B \cdot B.$$

$$\text{b) Să se arate că } mI_3 + nB \in G, \text{ oricare ar fi } m, n \in \mathbb{Z}.$$

$$\text{c) Să se arate că, dacă } A \in G \text{ și } A^2 = O_3, \text{ atunci } A = O_3.$$

$$\text{a) } B^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = 3B.$$

$$\text{b) } mI_3 + nB = \begin{pmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & m \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} n & n & n \\ n & n & n \\ n & n & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m+n & n & n \\ n & m+n & n \\ n & n & m+n \end{pmatrix} \in G.$$

$$\text{Notăm } b = n, a = m + n \in \mathbb{Z} \Rightarrow mI_3 + nB \in G.$$

$$\text{c) } A^2 = \begin{pmatrix} a^2 + 2b^2 & 2ab + b^2 & 2ab + b^2 \\ 2ab + b^2 & a^2 + 2b^2 & 2ab + b^2 \\ 2ab + b^2 & 2ab + b^2 & a^2 + 2b^2 \end{pmatrix}; \text{ Dacă } A^2 = O_3, \text{ atunci } a^2 + 2b^2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$a = b = 0; \text{ deci și } 2ab + b^2 = 0. \text{ Rezultă că } A = O_3.$$

4).

$$\text{În mulțimea } M_3(\mathbb{Z}_8) \text{ fie matricele } A = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{3} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{5} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{2} & \hat{3} & \hat{0} \\ \hat{3} & \hat{7} & \hat{5} \end{pmatrix}, I_3 = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}.$$

$$\text{Se notează } X^2 = X \cdot X \text{ pentru } \forall X \in M_3(\mathbb{Z}_8).$$

$$\text{a) Să se arate că } A^2 = I_3.$$

$$\text{b) Să se rezolve ecuația matricială } A \cdot X = I_3, \text{ unde } X \in M_3(\mathbb{Z}_8).$$

$$\text{a) } A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 25 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

b) $AX = I_3$, adică $X = A^{-1} \cdot I_3 = A^{-1}$. Cum $A^2 = I_3$ avem $A \cdot A = I_3$, de unde $A^{-1} = A$, deci $X = A$.

$$\text{c) } B - A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 \end{pmatrix}; (B - A)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 3 & 7 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

5).

Se consideră determinantul $D(a) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & a & a^2 \end{vmatrix}$, unde a este număr real.

a) Să se calculeze valoarea determinantului $D(9)$.

b) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $D(a) = 0$.

c) Să se rezolve în mulțimea numerelor reale ecuația $D(3^x) = 0$.

$$\text{a) } D(9) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 9 & 9^2 \end{vmatrix} = 6 \cdot 8 \cdot 2 = 96.$$

$$\text{b) } D(a) = 0 \text{ dacă } \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & a & a^2 \end{vmatrix} = 0. \text{ Avem } 2a^2 - 8a + 6 = 0, 2(a-1)(a-3) = 0.$$

Se obțin soluțiile $a_1 = 1$ și $a_2 = 3$.

$$\begin{aligned} \text{c) } D(3^x) &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 3^2 \\ 1 & 3^x & 3^{2x} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3^2 - 1 \\ 1 & 3^x - 1 & 3^{2x} - 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 3^x - 1 & 3^{2x} - 1 \end{vmatrix} = 2(3^{2x} - 1) - 8(3^x - 1) = \\ &= 2(3^x - 1)(3^x + 1 - 4) = 2(3^x - 1)(3^x - 3). D(3^x) = 0 \text{ dacă } 3^x = 1 \text{ sau } 3^x = 3, \text{ adică } \\ &x = 0 \text{ sau } x = 1. \end{aligned}$$

7).

Fie determinantul $D(a, b, x) = \begin{vmatrix} 1 & x & ab \\ 1 & a & bx \\ 1 & b & ax \end{vmatrix}$, unde a, b și x sunt numere reale.

a) Să se calculeze $D(1, 1, 0)$.

b) Să se demonstreze că $D(a, a, x)$ nu depinde de numărul real x .

c) Să se rezolve ecuația $D(a, b, x) = 0$, unde a, b sunt numere reale distincte.

$$a) D(1, 1, 0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 1 - 1 = 0.$$

$$b) D(a, a, x) = \begin{vmatrix} 1 & x & a^2 \\ 1 & a & ax \\ 1 & a & ax \end{vmatrix} = 0, \text{ deoarece linia a II-a este egală cu linia a III-a.}$$

$$c) D(a, b, x) = \begin{vmatrix} 1 & x & ab \\ 0 & x-a & -b(x-a) \\ 0 & x-b & -a(x-b) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-a & -b(x-a) \\ x-b & -a(x-b) \end{vmatrix} = (x-a)(x-b) \begin{vmatrix} 1 & -b \\ 1 & -a \end{vmatrix} =$$

$$= (x-a)(x-b)(b-a); (x-a)(x-b)(b-a) = 0 \text{ dacă } x = a \text{ sau } x = b (a \neq b).$$

8).

Se consideră determinantul $\Delta = \begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}, a, b, c \in \mathbb{R}.$

a) Dacă $a = -1, b = 0$ și $c = 1$, să se calculeze determinantul Δ .

b) Să se arate că $\Delta = (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc), \forall a, b, c \in \mathbb{R}.$

c) Să se rezolve ecuația $\begin{vmatrix} 2^x & 1 & 1 \\ 1 & 2^x & 1 \\ 1 & 1 & 2^x \end{vmatrix} = 0, x \in \mathbb{R}.$

a) Pentru $a = -1, b = 0, c = 1$, obținem $\Delta = \begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -1 + 1 = 0.$

$$b) \Delta \stackrel{l_1+l_2+l_3}{=} \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix} =$$

$$= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca).$$

c) Din b), ecuația devine: $(2^x + 1 + 1)(2^{2x} + 1 + 1 - 2^x - 2^x - 1) = 0;$

$(2^x + 2)(2^{2x} - 2 \cdot 2^x + 1) = 0.$ Cum $2^x + 2 \neq 0$, atunci $2^{2x} - 2 \cdot 2^x + 1 = 0.$ Notăm $2^x = t,$

și obținem $t^2 - 2t + 1 = 0; t_1 = t_2 = 1; 2^x = 1, \text{ de unde } x = 0.$

9).

- a) Să se calculeze determinantul $\begin{vmatrix} \sqrt{2008}-1 & -1 \\ 1 & \sqrt{2008}+1 \end{vmatrix}$.
- b) Să se calculeze determinantul $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ -x_2 & x_1 \end{vmatrix}$, știind că x_1 și x_2 sunt soluțiile ecuației $x^2 - 4x + 2 = 0$.
- c) Fie matricele $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ și $O_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Să se arate că $A^3 + A^2 + A = O_3$, unde $A^2 = A \cdot A$ și $A^3 = A^2 \cdot A$.

- a) $d = (\sqrt{2008}-1)(\sqrt{2008}+1)+1 = 2008$.
- b) $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ -x_2 & x_1 \end{vmatrix} = x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4^2 - 2 \cdot 2 = 12$, deoarece, conform relațiilor lui Viète, $x_1 + x_2 = 4$ și $x_1 \cdot x_2 = 2$.
- c) $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; deci $A^3 + A^2 + A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = O_3$.

10).

Se consideră determinantul $d = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix}$, unde $x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ sunt soluțiile

ecuației $x^3 - 2x = 0$.

- a) Să se calculeze $x_1 + x_2 + x_3$.
- b) Să se calculeze $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$.
- c) Să se calculeze valoarea determinantului d .
- a) Din relațiile lui Viète avem $x_1 + x_2 + x_3 = 0$.
- b) Din relațiile lui Viète avem: $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = -2$. Avem $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = (x_1 + x_2 + x_3)^2 - 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3) = 4$.
- c) $d = 3x_1x_2x_3 - (x_1^3 + x_2^3 + x_3^3)$. Din relațiile lui Viète avem $x_1x_2x_3 = 0$ și $x_1 + x_2 + x_3 = 0$. Cum x_1, x_2 și x_3 sunt rădăcinile ecuației $x^3 - 2x = 0$ avem: $x_1^3 - 2x_1 = 0$, $x_2^3 - 2x_2 = 0$, $x_3^3 - 2x_3 = 0$. Adunând obținem: $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 = 2(x_1 + x_2 + x_3) = 0$. Rezultă că $d = 0$.

4). Olimpiada

O1). Să se rezolve sistemul:

$$\begin{cases} \log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{3}} y = 2 \\ \log_{\frac{1}{2}} x \cdot \log_{\frac{1}{3}} y \geq 1 \end{cases}$$

Rezolvare:

Condiții de existență: $x, y \in \mathbf{R}_+^*$

$$\log_{\frac{1}{2}} x + \log_{\frac{1}{3}} y = 2 \Rightarrow \log_{\frac{1}{3}} y = 2 - \log_{\frac{1}{2}} x$$

$$\log_{\frac{1}{2}} x \cdot \log_{\frac{1}{3}} y \geq 1 \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} x \left(2 - \log_{\frac{1}{2}} x \right) \geq 1 \Rightarrow 2 \log_{\frac{1}{2}} x - \left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)^2 - 1 \geq 0$$

$$\text{Ecuația atașată: } -\left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)^2 + 2 \log_{\frac{1}{2}} x - 1 = 0 \Rightarrow \Delta = 4 - 4 = 0 \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} x = \frac{-2}{-2} = 1$$

$\log_{\frac{1}{2}} x$	1
$-\left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)^2 + 2 \log_{\frac{1}{2}} x - 1$	- - - - - 0 - - - - -

$$-\left(\log_{\frac{1}{2}} x \right)^2 + 2 \log_{\frac{1}{2}} x - 1 \geq 0 \Rightarrow \log_{\frac{1}{2}} x = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{3}$$

Deci $x = \frac{1}{2}$
 $y = \frac{1}{3}$

O2) Să se găsească valorile lui x astfel încât:

$$\log_2(x+1) + \log_3(x+1) + \dots + \log_n(x+1) + n - 1 = \left(\frac{1}{2} \right)^x + \left(\frac{1}{3} \right)^x + \dots + \left(\frac{1}{n} \right)^x$$

Răspuns:

Se observă că $x=0$ este soluție

$$\underbrace{\log_2(x+1)}_0 + \underbrace{\log_3(x+1)}_0 + \dots + \underbrace{\log_n(x+1)}_0 + n - 1 = \underbrace{1 + 1 + 1 + \dots + 1}_{n-1 \text{ ori}} \Rightarrow n - 1 = n - 1(A)$$

Se consideră $f(x) = \log_2(x+1) + \log_3(x+1) + \dots + \log_n(x+1) + n-1$ și

$$g(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x + \left(\frac{1}{3}\right)^x + \dots + \left(\frac{1}{n}\right)^x$$

$\left. \begin{array}{l} f(x) \text{ este strict crescătoare pe } \mathbf{R} \\ g(x) \text{ este strict descrescătoare} \end{array} \right\} \Rightarrow \mathbf{x=0} \text{ este soluție unică a ecuației pe } \mathbf{R}$

O3) Fie $a \in \mathbf{R}$. Să se rezolve în \mathbf{R} ecuația: $(a^x)^{2x} = 4$

Rezolvare:

$$(a^x)^{2x} = 4 \Rightarrow a^{2x^2} = 4 \Rightarrow x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2}$$

O4) Să se rezolve sistemul:

$$\begin{cases} \log_3 x + \log_2 y = 2 \\ 3^x - 2^y = 23 \end{cases}$$

Rezolvare:

Condiții de existență: $x, y \in \mathbf{R}_+^*$

Observăm că $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$ este soluție a sistemului

Verificare:

$$\log_3 x + \log_2 y = 1 + 1 = 2$$

$$3^3 - 2^2 = 27 - 4 = 23$$

Cazul 1 $x \in (0; 3)$

$$\begin{cases} \log_3 x < 1 \\ \log_3 x + \log_2 y = 2 \end{cases} \Rightarrow \log_2 y > 1 \Rightarrow \log_2 y > 2^2 \Rightarrow y > 2(1)$$

$$\begin{cases} 3^x < 27 \\ 3^x - 2^y = 23 \end{cases} \Rightarrow 2^y < 4 \Rightarrow y < 2(2)$$

Din relațiile (1) și (2) \rightarrow contradicție \rightarrow nu există soluții pentru $x \in (0; 3)$ (3)

Cazul 2 $x \in (3; +\infty)$

$$\begin{cases} \log_3 x > 1 \\ \log_3 x + \log_2 y = 2 \end{cases} \Rightarrow \log_2 y < 1 \Rightarrow \log_2 y < 2^2 \Rightarrow y < 2(1)$$

$$\begin{cases} 3^x > 27 \\ 3^x - 2^y = 23 \end{cases} \Rightarrow 2^y > 4 \Rightarrow y > 2(2)$$

Din relațiile (1) și (2) → contradicție → nu există soluții pentru $x \in (3; +\infty)$ (4)

Din relațiile (3) și (4) → ecuația are soluție unică $\begin{cases} x = 3 \\ y = 2 \end{cases}$

O5) Să se rezolve ecuația:

$$4^x + 9^x + 25^x = 6^x + 10^x + 15^x$$

Răspuns:

Observăm că $x=0$ verifică ecuația.

Verificare: $1+1+1=1+1+1 \rightarrow 3=3$ (A)

Soluția 1:

Notăm $2^x = a$

$$3^x = b$$

$$5^x = c$$

ecuația $4^x + 9^x + 25^x = 6^x + 10^x + 15^x$ se poate scrie $a^2 + b^2 + c^2 = ab + ac + bc$

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

$$a^2 + c^2 \geq 2ac$$

$$b^2 + c^2 \geq 2bc$$

$$\frac{a^2 + b^2 + c^2}{2} \geq \frac{2ab + 2ac + 2bc}{2} \rightarrow a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ac$$

Egalitatea are loc dacă $a=b=c \rightarrow 3^x = 2^x = 5^x \rightarrow x=0$

Soluția 2

$$4^x + 9^x - 6^x = 10^x + 15^x - 25^x \quad / : 10^x$$

$$\left(\frac{4}{10}\right)^x + \left(\frac{9}{10}\right)^x - \left(\frac{6}{10}\right)^x = \left(\frac{10}{10}\right)^x + \left(\frac{15}{10}\right)^x - \left(\frac{25}{10}\right)^x$$

Definim următoarele funcții:

$$f(x) = \left(\frac{4}{10}\right)^x + \left(\frac{9}{10}\right)^x - \left(\frac{6}{10}\right)^x \text{ este strict descrescătoare}$$

$$g(x) = \left(\frac{10}{10}\right)^x + \left(\frac{15}{10}\right)^x - \left(\frac{25}{10}\right)^x \text{ este strict crescătoare pe}$$

$\left. \begin{array}{l} \text{pe } \mathbf{R} \\ \mathbf{R} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Soluția unică este } x=0$

O6) Să se rezolve ecuația:

$$(\cos \alpha)^x + (\sin \alpha)^x = 1,$$

$$\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

Rezolvare:

Observăm că $x=2$ este soluție a ecuației.

Verificare: $(\cos \alpha)^2 + (\sin \alpha)^2 = 1$

Definim următoarele funcții:

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = (\cos \alpha)^x, \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow f(x) \text{ este strict descrescătoare pe } \mathbf{R} \\ g(x) = (\sin \alpha)^x, \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow g(x) \text{ este strict crescătoare pe } \mathbf{R} \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$f(x) + g(x) = (\cos \alpha)^x + (\sin \alpha)^x \text{ este strict descrescătoare pe } \mathbf{R}$$

Deci $x=2$ este soluție unică.

BIBLIOGRAFIE

1. Marius Burtea și Georgeta Burtea, Manual de Matematică, clasa a XI-a, Editura Carminis.
2. C. Niță, C. Năstăsescu, M. Brandiburu, D. Joița, Culegere de probleme pentru liceu - algebra - clasele IX - XII (editie noua revizuita si adaugita), Editura Rotech Pro.
3. Carmen Angelescu, Nicolae Baci, Cătălin Zîrnă, Ismet Omer, Nicolae Buzduga, Ghid de recapitulare pentru BACALAUREAT 2009 - MATEMATICA M1+M2 , Editura Sigma.
4. Materia predată la oră, de către profesorul Oanea Călin.
5. Caietul de notițe, dar și de teme acasă.
6. Internet.