

# Алгоритмы и модели вычислений.

## Домашнее задание № 10

**Задача 1.** Докажите формулу обращения:  $(M_n(\omega))^{-1} = \frac{1}{n}M_n(\omega^{-1})$ . Вычислите также матрицу  $(M_n(\omega))^4$ .

**Решение.** Домножим обе части слева на  $M_n(\omega)$ , теперь имеем равенство

$$E = \frac{1}{n}M_n(\omega)M_n(\omega^{-1})$$

Нам надо доказать, что справа действительно получается единичная матрица. Для этого раскроем по определению произведения матриц, какой элемент стоит на  $i$ -й строчке в  $j$ -м столбце:

$$a_{ij} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{s=0}^{n-1} (w_n^i)^s (w_n^s)^{-j} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{s=0}^{n-1} (w_n^{i-j})^s$$

$$\bullet \ i \neq j: a_{ij} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{s=0}^{n-1} (w_n^{i-j})^s = \frac{(w_n^{i-j})^n - 1}{w_n^{i-j} - 1} = 0, \text{ так как } w \text{ — корень из единицы}$$

$$\bullet \ i = j: a_{ij} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{s=0}^{n-1} \exp\left(\frac{2\pi s(i-j)}{n}\right) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{s=0}^{n-1} \exp(0) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{s=0}^{n-1} 1 = 1$$

Таким образом матрица  $A = (a_{ij}) = \frac{1}{n}M_n(\omega)M_n(\omega^{-1})$  действительно является единичной, что доказывает формулу обращения  $(M_n(\omega))^{-1} = \frac{1}{n}M_n(\omega^{-1})$ .

Вычислим теперь матрицу  $(M_n(\omega))^4$ . Так как  $(M_n(\omega))^4 = (M_n(\omega))^2 \cdot (M_n(\omega))^2$ , то вычислим сначала  $(M_n(\omega))^2$ , для этого раскроем по определению произведения матриц, какой элемент стоит на  $i$ -й строчке в  $j$ -м столбце:

$$a_{ij} = \sum_{s=0}^{n-1} (w_n^i)^s (w_n^s)^j = \sum_{s=0}^{n-1} (w_n^{i+j})^s$$

Аналогично предыдущему пункту:

$$a_{ij} = \begin{cases} 0, & (i+j) \text{ не кратно } n \\ n, & (i+j) \text{ кратно } n \end{cases}$$

Таким образом, матрица  $(M_n(\omega))^2 = (a_{ij})$  имеет вид

$$(M_n(\omega))^2 = \begin{pmatrix} n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & n & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

И теперь легко видеть, что  $(M_n(\omega))^4 = (M_n(\omega))^2 \cdot (M_n(\omega))^2 = n^2 \cdot E$

**Задача 2.** Найдите произведение многочленов  $A(x) = x^3 + 3x + 2$  и  $B(x) = 3x^3 + 3x^2 + 2$  с помощью алгоритма быстрого преобразования Фурье. Для этого найдите рекурсивно дискретное преобразование Фурье двух массивов  $A = (0,0,0,0,1,0,3,2)$  и  $B = (0,0,0,0,3,3,0,2)$ , затем вычислите ДПФ массива  $C$  и восстановите коэффициенты многочлена-произведения, используя обратное преобразование.

**Решение.**  $reversed(A) = (a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7) = (2, 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0) \rightarrow (2, 0, 0, 0); (3, 1, 0, 0) \rightarrow (2, 0), (0, 0), (3, 0), (1, 0) = (a_0, a_4), (a_2, a_6), (a_1, a_5), (a_3, a_7)$

На каждом шаге мы делим массив на 2 части, помещая в один все элементы, стоящие на нечётных местах, а в другой — все, стоящие на чётных.

Умножим каждый из получившихся массивов (рассматриваем их как столбцы) на матрицу  $M_2$ .

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Получим:

$$M_2 \cdot (a_0, a_4)^T = (2, 2)$$

$$M_2 \cdot (a_2, a_6)^T = (0, 0)$$

$$M_2 \cdot (a_1, a_5)^T = (3, 3)$$

$$M_2 \cdot (a_3, a_7)^T = (1, 1)$$

По рекурсии:

$$M_4 \cdot (a_0, a_2, a_4, a_6)^T = \begin{pmatrix} M_2 \cdot (a_0, a_4)^T \\ M_2 \cdot (a_2, a_6)^T \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} D \cdot M_2 \cdot (a_2, a_6)^T \\ -D \cdot M_2 \cdot (a_2, a_6)^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$M_4 \cdot (a_1, a_3, a_5, a_7)^T = \begin{pmatrix} M_2 \cdot (a_1, a_5)^T \\ M_2 \cdot (a_3, a_7)^T \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} D \cdot M_2 \cdot (a_3, a_7)^T \\ -D \cdot M_2 \cdot (a_3, a_7)^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ -1 \\ -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 3+i \\ 2 \\ 3-i \end{pmatrix}$$

Итого получаем

$$A = M_8 \cdot \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \\ a_4 \\ a_5 \\ a_6 \\ a_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 2\sqrt{2}i + \sqrt{2} \\ 2i \\ 2\sqrt{2}i - \sqrt{2} \\ -4 \\ -2\sqrt{2}i - \sqrt{2} \\ -2i \\ -2\sqrt{2}i + \sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 2\sqrt{2}i + 2 + \sqrt{2} \\ 2i + 2 \\ 2\sqrt{2}i + 2 - \sqrt{2} \\ -2 \\ -2\sqrt{2}i + 2 - \sqrt{2} \\ -2i + 2 \\ -2\sqrt{2}i + 2 + \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Для многочлена  $B$  аналогично получаем:

$$B = M_8 \cdot \begin{pmatrix} b_0 \\ b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ b_5 \\ b_6 \\ b_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ \left(2 - \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) + \left(3 + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)i \\ -1 - 3i \\ \left(2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) + \left(-3 + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)i \\ 2 \\ \left(2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) + \left(3 - \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)i \\ -1 + 3i \\ \left(2 - \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) + \left(-3 - \frac{3\sqrt{2}}{2}\right)i \end{pmatrix}$$

Умножим поэлементно  $A$  на  $B$ :

$$C = A^T \underset{\text{элемент}}{\cdot} B = \begin{pmatrix} 48 \\ (-5 - 7\sqrt{2}) + (3 + 10\sqrt{2})i \\ 4 - 8i \\ (-5 + 7\sqrt{2}) + (-3 + 10\sqrt{2})i \\ -4 \\ (-5 + 7\sqrt{2}) + (3 - 10\sqrt{2})i \\ 4 + 8i \\ (-5 - 7\sqrt{2}) + (-3 - 10\sqrt{2})i \end{pmatrix}$$

Так как  $M_n^{-1}(w) = M_n(w^{-1})$ , то посчитаем произведение  $M_8^{-1} \cdot C$ , итоге получим

$$\begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \\ c_5 \\ c_6 \\ c_7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 6 \\ 17 \\ 9 \\ 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

**Задача 3.** Даны числа  $x_1, \dots, x_n$ . Доказать, что коэффициенты многочлена  $f(x) = \prod_{i=1}^n (x - x_i)$ , можно найти за  $O(n \log_2^2 n)$  арифметических операций.

**Решение.** На первом уровне проводим  $\frac{n}{2}$  перемножений: перемножаются многочлены  $(x - x_1)$  с  $(x - x_2)$ ;  $(x - x_3)$  с  $(x - x_4)$ ;  $\dots$ . Затем также перемножаем полученные многочлены между собой, пока не останется только один многочлен.

Всего мы получим  $\log_2 n$  уровней, также необходимо заметить, что степень многочленов возрастает вдвое на каждом уровне (а многочлены степени  $k$  перемножаются за  $O(k \log k)$  с помощью преобразования Фурье). Таким образом, итоговая сложность

$$T(n) \leq C \cdot \sum_{i=1}^{\log_2 n} \frac{n}{2} i = C \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{\log_2 n \cdot (\log_2 n + 1)}{2} \Rightarrow T(n) = O(n \log_2^2 n)$$

**Задача 4.** Используя ДПФ, найдите решение системы линейных уравнений  $Cx = b$ , где  $C$  — это циркулянтная матрица, порожденная вектором столбцом  $(1, 2, 4, 8)^T$ , а  $b^T = (16, 8, 4, 2)$ .

**Решение.** Циркулянтная матрица  $C$  есть

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 8 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 8 \\ 8 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица  $C$  имеет размерность  $4 \times 4$ , так что в  $w = i$ . Обозначим  $\lambda_j$  — собственные значения  $C$ , тогда  $\lambda_i = \sum_{k=0}^{n-1} c_{n-k} \cdot (i)^{jk}$  (считаем, что  $c_0 = c_n$ ; формула из задачи 6). Тогда получаем

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= 1 + 8 + 4 + 2 = 15 \\ \lambda_1 &= 1 + 8i - 4 - 2i = -3 + 6i \\ \lambda_2 &= 1 - 8 + 4 - 2 = -5 \\ \lambda_3 &= 1 - 8i - 4 + 2i = -3 - 6i \end{aligned}$$

Таким образом матрицы  $\Lambda$  и  $\Lambda^{-1}$  имеют вид:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 15 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 + 6i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 - 6i \end{pmatrix} \Rightarrow \Lambda^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{-3 + 6i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3 + 6i} \end{pmatrix}$$

В нашей задаче матрица Фурье принимает вид:

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} \Rightarrow F^* = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$$

$$Cx = b \Rightarrow x = C^{-1}b; C = F\Lambda F^{-1} \Rightarrow C^{-1} = F\Lambda^{-1}F^{-1} = \frac{1}{4}F\Lambda^{-1}F^* \Rightarrow x = \frac{1}{4} \cdot F\Lambda^{-1}F^* \cdot b$$

$$x = \frac{1}{4} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & i & -1 & -i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -i & -1 & i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{15} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{-3+6i} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{3+6i} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 16 \\ 8 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.8 \\ 1.6 \\ 0.8 \\ 0.4 \end{pmatrix}$$

**Задача 5.** Обозначим для вектора  $\vec{x}$  циркулянтную матрицу с первым столбцом  $\vec{x}$  за  $\text{circ}(\vec{x})$ . Назовём циклической свёрткой  $\vec{x} * \vec{y}$  двух векторов произведение матрицы на вектор  $\text{circ}(\vec{x})\vec{y}$ . Докажите, что  $FFT(\vec{x} * \vec{y})$  есть произведение векторов  $FFT(\vec{x})$  и  $FFT(\vec{y})$  по Адамару (т. е. поэлементное:  $i$ -ая компонента вектора-произведения есть произведение  $i$ -ых компонент сомножителей).

**Решение.**

$$X = \text{circ}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} x_0 & x_{n-1} & x_{n-2} & \dots & x_1 \\ x_1 & x_0 & x_{n-1} & \dots & x_2 \\ x_2 & x_1 & x_0 & \dots & x_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ x_{n-1} & x_{n-2} & x_{n-3} & \dots & x_0 \end{pmatrix}$$

Обозначим  $A = \text{circ}(\vec{x})\vec{y}$ .

Тогда  $a_j$  можно записать в виде  $a_j = \sum_{m=0}^j x_m y_{j-m} + \sum_{m=j+1}^{n-1} x_m y_{n+j-m}$

Обозначим  $B = FFT(\vec{x} * \vec{y})$ .

Так как  $B = FA$ , запишем  $b_i$  в виде  $b_i = \sum_{k=0}^{n-1} (w^i)^k \left( \sum_{m=0}^k x_m y_{k-m} + \sum_{m=k+1}^{n-1} x_m y_{n+k-m} \right)$

Обозначим  $C = FFT(\vec{x}) \underset{\text{элемент}}{\cdot} FFT(\vec{y}) = (F\vec{x}) \cdot (F\vec{y})$  (умножение поэлементное).

Тогда  $c_i = \sum_{j=0}^{n-1} (w^i)^j x_j \cdot \sum_{k=0}^{n-1} (w^i)^k y_k$

Так как  $(w^i)^n = 1$ , то коэффициент при  $(w^i)^k$  имеет вид  $\sum_{j=0}^k x_j y_{k-j} + \sum_{j=k+1}^{n-1} x_j y_{n+k-j}$

Коэффициенты при  $(w^i)^k$  в выражении  $b_i$  абсолютно такие же, из чего и следует утверждение задачи:  $FFT(\vec{x} * \vec{y}) = FFT(\vec{x}) \underset{\text{элемент}}{\cdot} FFT(\vec{y})$

**Задача 6.** Рассмотрим циркулянтную матрицу порядка  $n + 1$ , первый столбец которой равен

$(c_0, c_1, \dots, c_n)^T$ , т. е. матрицу вида

$$\begin{bmatrix} c_0 & c_n & c_{n-1} & \dots & c_1 \\ c_1 & c_0 & c_n & \dots & c_2 \\ c_2 & c_1 & c_0 & \dots & c_3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_n & c_{n-1} & c_{n-2} & \dots & c_0 \end{bmatrix}$$

Докажите, что все её собственные значения, домноженные на  $\frac{1}{\sqrt{n+1}}$ , могут быть найдены умножением матрицы Фурье  $F_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} (\omega_n^{ij})_{i,j=0}^n$  размеров  $(n+1) \times (n+1)$ , где  $\omega_n = e^{\frac{2\pi i}{n}}$  — корень из единицы, на вектор  $(c_0, c_n, c_{n-1}, \dots, c_1)^T$ . Найдите с помощью алгоритма БПФ собственные значения циркулянтной матрицы, первый столбец которой имеет вид  $(1, 2, 4, 6)^T$ .

**Решение.**  $\Lambda F_n = F_n C^T$ . Посмотрим на первые столбцы обеих получающихся матриц:

- Первый столбец левой матрицы есть  $\frac{1}{\sqrt{n+1}} (\lambda_0, \dots, \lambda_n)^T$
- Первый столбец правой матрицы есть  $F_n (c_0, c_n, c_{n-1}, \dots, c_1)^T$

Таким образом

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{pmatrix} = \sqrt{n+1} \cdot F_n \cdot \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$$

Как в задаче номер 4, считаем собственные значения циркулянтной матрицы:

$$\begin{aligned} \lambda_0 &= 1 + 6 + 4 + 2 = 13 \\ \lambda_1 &= 1 + 2i - 4 - 6i = -3 - 4i \\ \lambda_2 &= 1 - 2 + 4 - 6 = -3 \\ \lambda_3 &= 1 - 2i - 4 + 6i = -3 + 4i \end{aligned}$$

**Задача 7.** Дано множество различных чисел  $A \subseteq \{1, \dots, m\}$ . Рассмотрим множество  $A + A$ , образованное суммами элементов  $A$ . Докажите или опровергните существование процедур построения  $A + A$ , имеющих субквадратичную трудоемкость  $o(m^2)$ .

**Решение.** Заведём массив  $B$  из  $m$  элементов, определённых следующим образом

$$b_i = \begin{cases} 0, & i \notin A \\ 1, & i \in A \end{cases}$$

Определим  $f(x) = \sum_{i=1}^m b_i x^i$ , возведём массив во вторую степень за  $O(m \log m)$  с помощью пре-

образования Фурье, получим  $f^2(x) = \sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m b_k b_l x^{k+l}$

Теперь можно сказать, что  $b_k b_l \neq 0 \Leftrightarrow k, l \in A \Rightarrow k + l \in A + A$ .

Сложность алгоритма есть  $O(m \log m)$ , так как всё, помимо возведения многочлена  $f$  в квадрат, выполняется за не более, чем линейное время. А так как алгоритм имеет сложность  $O(m \log m)$ , то также можно сказать, что он имеет сложность  $o(m^2)$