

Práctica 3

Métodos Numéricos y Computación

I. Interpolación polinómica a trozos - Splines (Tema 2)

Python nos permite hacer interpolación mediante splines. La librería `scipy` contiene la función `CubicSpline` con la cual podemos calcular los diferentes tipos de splines, evaluarlos, y obtener los coeficientes de los diferentes polinomios cúbicos.

Ejercicio 1 *Dados los puntos:*

x_k	1	2	3	4
y_k	0.5	4	2	0.7

- Construye el spline cúbico natural ($S''(1) = S''(4) = 0$).
- Construye el spline cúbico de frontera con $S'(1) = 0.3$ y $S'(4) = -0.3$.

Ejercicio 2 *El número de personas afectadas por el virus contagioso que produce la gripe en una determinada población viene dado por la siguiente función, donde t indica el tiempo en días:*

$$f(t) = \frac{100}{2 + 999e^{-2.1t}}.$$

- Aproxima esta función en $[0, 7]$ por polinomios de interpolación de grados 4, 6 y 8, tomando nodos equiespaciados.
- Calcula ahora los polinomios de interpolación tomando nodos de Chebyshev, también de grado 4, 6 y 8.
- Calcula el spline cúbico natural en seis nodos equiespaciados del intervalo $[0, 7]$.
- Calcula el spline cúbico de frontera en seis nodos equiespaciados del intervalo $[0, 7]$.
- Representa la función, los polinomios interpoladores y los splines anteriores junto a los nodos.

II. Aproximación discreta (Tema 3)

Un caso particular del problema de aproximación por mínimos cuadrados es la aproximación discreta. Frecuentemente se recopilan observaciones a las cuales queremos asignar un modelo matemático. Supongamos que disponemos de $n + 1$ puntos en el plano, $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, y consideramos el producto escalar en el espacio de las funciones definidas sobre x_0, x_1, \dots, x_n :

$$(f, g) = \sum_{i=0}^n f(x_i)g(x_i).$$

Nuestro objetivo es obtener el polinomio de grado m , $1 \leq m \leq n$, para el cual la distancia a los puntos sea mínima. Más concretamente, si llamamos:

$$P_m(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m,$$

y $\{\phi_0, \phi_1, \phi_m\} = \{1, x, \dots, x^m\}$ es la base canónica de los polinomios de grado menor o igual que m , e $y_i = f(x_i)$ para $i = 0, 1, \dots, n$, los coeficientes a_0, a_1, \dots, a_m son las soluciones del siguiente sistema de $m + 1$ ecuaciones con $m + 1$ incógnitas (llamado sistema de ecuaciones normales):

$$\left. \begin{array}{rcl} a_0(\phi_0, \phi_0) + a_1(\phi_1, \phi_0) + \cdots + a_m(\phi_m, \phi_0) & = & (f, \phi_0) \\ a_0(\phi_0, \phi_1) + a_1(\phi_1, \phi_1) + \cdots + a_m(\phi_m, \phi_1) & = & (f, \phi_1) \\ & \vdots & \\ a_0(\phi_0, \phi_m) + a_1(\phi_1, \phi_m) + \cdots + a_m(\phi_m, \phi_m) & = & (f, \phi_m) \end{array} \right\}$$

Dados $n + 1$ puntos del plano, uno de los polinomios aproximantes más utilizados es el de primer grado. Este polinomio es conocido como el modelo (o recta) de regresión lineal $P_1(x) = a_0 + a_1x$. En este caso, el problema queda reducido a encontrar los parámetros a_0 y a_1 de la recta que mejor se ajusta al conjunto de observaciones. Esta recta tiene importantes aplicaciones, por ejemplo, en el ámbito de la estadística.

Ejercicio 3 Crea una función *modelo_discreto_general* que, dados $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ y $1 \leq m \leq n$, devuelva el polinomio aproximante de grado m .

Ejercicio 4 Consideremos los siguientes datos:

x	0	0.1	0.2	0.3	0.4
y	0.000	0.078	0.138	0.192	0.244

- Obtén los polinomios aproximantes de grado 1, 2, 3 y 4.
- Comprueba que el polinomio de grado 4 coincide con el polinomio interpolador.
- Representa en un mismo gráfico los cuatro polinomios junto con los cinco puntos del plano.

Ejercicio 5 Un vehículo se mueve supuestamente a velocidad constante. A continuación se muestran los tiempos de llegada a diferentes posiciones separadas 900 metros:

Posición (x)	0	900	1800	2700
Tiempo (y)	17.6	40.4	67.7	90.1

- Obtén el polinomio aproximante de grado 1 (modelo de regresión lineal) y el polinomio aproximante de grado 2.
- Representa el modelo de regresión lineal junto a los datos.
- ¿Se mueve el automóvil a velocidad constante?
- Obtén el máximo de los valores absolutos de la diferencia entre la función y el polinomio de grado 1, y entre la función y el polinomio de grado 2, para los valores de x conocidos, para indicar los errores máximos.
- Estima el tiempo en que se alcanzará una posición de 1200 metros usando aquel polinomio que presente el menor error atendiendo a las conclusiones del apartado anterior.