Isoler une variable – complément

Nom : .....

Dans $V = \pi r^2 h$, h est **multiplié** par πr^2 : pour isoler h, on **divise** les deux membres par πr^2 (avec $r \neq 0$). On ne soustrait jamais pour défaire une multiplication.

1 (TD, ex. 20) Exprimer la variable demandée et préciser les conditions.

$U = RI$, isoler R :

$d = vt$, isoler t :

$V = \pi r^2 h$, isoler h :

$S = \pi r^2$ $(r \geqslant 0)$, isoler r :

2 (TD, ex. 26) Le volume d'un cône est $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$. Exprimer h en fonction de V, r et π.

3 Vérifier les résultats de 1 pour h et de 2 en les remplaçant dans la formule de départ (exemple : $\pi r^2 \times \dfrac{V}{\pi r^2}$ redonne bien V).

..... couper ici .....

Isoler une variable – complément

Nom : .....

Dans $V = \pi r^2 h$, h est **multiplié** par πr^2 : pour isoler h, on **divise** les deux membres par πr^2 (avec $r \neq 0$). On ne soustrait jamais pour défaire une multiplication.

1 (TD, ex. 20) Exprimer la variable demandée et préciser les conditions.

$U = RI$, isoler R :

$d = vt$, isoler t :

$V = \pi r^2 h$, isoler h :

$S = \pi r^2$ $(r \geqslant 0)$, isoler r :

2 (TD, ex. 26) Le volume d'un cône est $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$. Exprimer h en fonction de V, r et π.

3 Vérifier les résultats de 1 pour h et de 2 en les remplaçant dans la formule de départ (exemple : $\pi r^2 \times \dfrac{V}{\pi r^2}$ redonne bien V).

2nde – N04 – Remédiation MT2 – © Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0