

TD N02 — Nombres réels, intervalles et valeur absolue

Seconde générale et technologique — Semaine 2

Objectif. Relier trois registres : nombre placé sur une droite, inégalité et intervalle. Utiliser la valeur absolue comme une distance et produire des encadrements décimaux fiables.

Conseils. Pour chaque intervalle, contrôler les crochets. Pour chaque valeur absolue, penser d'abord « distance » avant de calculer. Les exercices marqués *** sont des approfondissements.

A — Réactivation et automatismes

① ★ [REP, CAL]

On donne les nombres

$$-6 ; -3,25 ; 0 ; \frac{12}{4} ; \frac{5}{7} ; 1,8 ; \sqrt{16} ; \sqrt{3} ; \pi.$$


Compléter avec l'ensemble le plus petit parmi $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$.

Nombre	-6	-3,25	0	$\frac{12}{4}$	$\frac{5}{7}$	1,8	$\sqrt{16}$	$\sqrt{3}$
Ens. le plus petit								

② ★ [REP]


Compléter le diagramme d'inclusion avec $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{D}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, puis placer dans la bonne zone :

$$-2, \quad 0,125, \quad \frac{1}{3}, \quad \sqrt{2}, \quad 9.$$



③ ★ [REP, CAL]

Placer sur la droite les nombres $-3,5, -\frac{1}{2}, \frac{7}{4}, 3$ et $\sqrt{4}$. Puis les ranger dans l'ordre croissant.



④ ★ [CAL]

Comparer sans calculatrice en justifiant brièvement.

$$\begin{aligned} \frac{3}{4} \dots 0,8, \quad -2,7 \dots -\frac{8}{3}, \\ \frac{11}{6} \dots 1,84, \quad \sqrt{9} \dots \frac{10}{3}. \end{aligned}$$

⑤ ★ [CAL]

Calculer.


$$A = |-7|, \quad B = |4 - 11|, \quad C = |-3 - 5|,$$

$$D = |2,4 - 6|, \quad E = \left| \frac{1}{2} - \frac{5}{4} \right|, \quad F = |\pi - 4|.$$

Pour F , donner seulement une écriture sans valeur approchée.

⑥ ★ [REP]

Pour chaque point placé, lire son abscisse, puis calculer les distances AB, BC et AD .



⑦ ★ [REP]

Écrire sous forme d'inégalité.

1. x est strictement supérieur à -4 .


2. x est compris entre -2 inclus et 5 exclu.

3. x est inférieur ou égal à $1,5$.

4. La distance entre x et 3 est au plus 2 .

⑧ ★ [REP]

Lire l'intervalle représenté, puis écrire l'inégalité correspondante.



⑨ ★ [CAL, REP]

Compléter avec un encadrement décimal.

Nombre	au dixième près	au centième près
$\sqrt{2} \approx 1,414213$		
$\pi \approx 3,141592$		
$\frac{17}{7} \approx 2,428571$		

B — Applications : intervalles, distances et encadrements

⑩ ★ [REP]

Passer de l'inégalité à l'intervalle.

$$\begin{aligned} a) \quad -1 \leq x \leq 4 \quad & b) \quad -3 < x \leq 2 \\ c) \quad x < 5 \quad & d) \quad x \geq -2,5 \\ e) \quad 0 < x < \frac{7}{2} \quad & f) \quad x \leq \sqrt{5} \end{aligned}$$

⑪ ★ [REP]

Passer de l'intervalle à l'inégalité.


$$[-4; 2], \quad]-1; 6[, \quad [0; +\infty[, \quad]-\infty; 3,5], \quad]2; \sqrt{7}].$$

⑫ ★ [REP]

Sur les quatre droites, représenter :


$$I = [-2; 3], \quad J =]-4; 1],$$

$$K = [0; +\infty[, \quad L =]-\infty; -1].$$



⑬ ★ [REP, RAI]

Pour chaque représentation, écrire l'intervalle puis une inégalité.



⑭ ★ [REP, CAL]

On pose $I = [-3; 4]$, $J =]1; 7]$ et $K =]-\infty; 2[$. Déterminer, si possible à l'aide d'une droite graduée : $I \cap J$, $I \cup J$, $I \cap K$ et $J \cap K$.

15 ★ [REP, CAL]

Pour chaque case du tableau, répondre par « oui » en cas d'appartenance à l'intervalle donné, par « non » dans le cas contraire (ou à l'aide des symboles $\in$ ou $\notin$).

	-2	0	2,5	5
$[-2; 5[$				
$] - \infty; 0]$				
$]1; +\infty[$				
$] - 2; 2,5]$				

16 ★ [CAL, REP]

Résoudre en donnant un intervalle, puis une représentation sur une droite.

$$|x - 3| \leq 2, \quad |x + 1| \leq 4, \quad |x - 0,5| \leq 1,5.$$


17 ★ [REP, RAI]

Écrire chaque intervalle sous la forme $|x - c| \leq r$.

$$[-2; 6], \quad [1; 9], \quad [-4; -1], \quad \left[\frac{1}{2}; \frac{7}{2}\right].$$

18 ★ [MOD, REP]

Une antenne est placée au point d'abscisse 2 sur une route rectiligne. Elle couvre les positions situées à une distance au plus 3,5 km.



1. Écrire la condition avec une valeur absolue.
2. Donner l'intervalle des positions couvertes.

19 ★ [CAL]


Donner un encadrement décimal au centième près.

$$\sqrt{5} \approx 2,236067, \quad \sqrt{10} \approx 3,162277, \quad \frac{43}{13} \approx 3,307692.$$

Puis indiquer l'amplitude de chaque encadrement.

20 ★ [MOD, REP]

Un thermomètre indique que la température T est comprise entre $-1,5^\circ\text{C}$ inclus et 4°C exclu.



1. Écrire cette information avec une inégalité.
2. Écrire cette information avec un intervalle.
3. Représenter cette information sur le thermomètre.

21 ★★ [REP, COM]

Compléter le tableau-bilan, puis ajouter une représentation rapide sur une droite graduée.

Phrase	Inégalité	Intervalle
x est entre -1 et 4 , bornes incluses	$ x - 6 \leq 2$	
x est strictement inférieur à 3	$-5 < x \leq 0$	


C — Choisir, raisonner, approfondir

22 ★★ [RAI, REP]

On pose $A =] - 5; 2]$, $B = [-1; 6[$ et $C =]3; +\infty[$. Déterminer $A \cap B$, $A \cup B$, $B \cap C$ et $(A \cup B) \cap C$. Une représentation commune sur la droite est attendue.

23 ★★ [CH, REP]

Un nombre x vérifie simultanément deux contraintes :



$$x \in [-4; 5[\quad \text{et} \quad |x - 1| \leq 3.$$

1. Traduire la condition $|x - 1| \leq 3$ avec une phrase de distance.
2. Écrire cette condition sous forme d'intervalle.
3. Représenter les deux contraintes sur les deux premières droites.
4. Colorier sur la troisième droite l'ensemble des nombres possibles et l'écrire sous forme d'intervalle.

On cherche l'intersection des deux contraintes, pas leur réunion.

24 ★★ [RAI, CAL]

Décider si chaque nombre est décimal. Justifier.

$$\frac{7}{20}, \quad \frac{5}{12}, \quad \frac{13}{8}, \quad \frac{21}{14}, \quad \frac{1}{40}.$$

Indication : chercher une écriture avec une puissance de 10 au dénominateur lorsque c'est possible.

25 ★★★ [RAI, COM]

Démonstration guidée : pourquoi $\frac{1}{3}$ n'est pas un nombre décimal ?

1. Supposons que $\frac{1}{3}$ soit décimal. Alors il existe un entier n tel que $10^n \times \frac{1}{3}$ soit un entier. Écrire ce nombre sous forme de quotient.
2. Expliquer pourquoi 10^n n'est pas divisible par 3.
3. Conclure.

26 ★★★ [RAI, COM]

Démonstration guidée : irrationalité de $\sqrt{2}$. On suppose qu'il existe deux entiers p et $q \neq 0$, sans diviseur commun, tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.

1. Montrer que $p^2 = 2q^2$.
2. Expliquer pourquoi p est pair, puis écrire $p = 2k$.
3. En déduire que q est pair.
4. Pourquoi cela contredit-il le choix de p et q ?

27 ** [CAL, REP]

On veut encadrer $\sqrt{50}$ sans calculatrice, en utilisant uniquement des carrés.

1. Trouver deux entiers consécutifs n et $n + 1$ tels que $n < \sqrt{50} < n + 1$.
2. Calculer $7,0^2$, $7,1^2$ et $7,2^2$.
3. Placer $\sqrt{50}$ entre deux graduations au dixième.
4. Écrire l'encadrement obtenu.

Aucune valeur décimale de $\sqrt{50}$ n'est attendue.

28 ** [RAI, REP]

Représenter puis écrire l'ensemble des solutions sous forme d'intervalle ou de réunion d'intervalles.

$$|x - 2| < 3, \quad |x + 4| \leq 2, \quad |x - 1| > 4.$$

Pour la dernière question, expliquer pourquoi on obtient deux morceaux de droite.

29 ** [CH, CAL]

On cherche un encadrement de π par zooms successifs.

$$3 < \pi < 4, \quad 3,1 < \pi < 3,2, \quad 3,14 < \pi < 3,15.$$



Donner l'amplitude de chaque intervalle, expliquer ce que l'on gagne à chaque zoom, puis proposer un encadrement à 10^{-3} près en utilisant $\pi \approx 3,141592$.

30 ** [RAI, COM]

Corriger les écritures incorrectes et expliquer l'erreur.

$$[2; +\infty], \quad x \in] - 3; 1] \iff -3 \leq x \leq 1,$$

$$|x - 5| \leq 2 \iff x - 5 \leq 2, \quad \sqrt{2} = 1,414.$$

31 ** [MOD, CAL]

Un jeu vidéo déclenche une alarme si la position x du joueur vérifie

$$|x + 2| \leq 1,5.$$

1. Réécrire $|x + 2|$ sous la forme d'une distance à un nombre.
2. Identifier la position centrale.
3. Identifier le rayon de la zone d'alarme.
4. Représenter la zone et donner l'intervalle correspondant.

Penser « distance à -2 », pas développement algébrique.

D — Synthèse et problèmes

32 ** [MOD, REP, CAL]

Dans une attraction, il faut mesurer au moins 1,20 m et strictement moins de 1,95 m. Il faut aussi avoir 16 ans ou plus.




1. Écrire l'intervalle des tailles autorisées.
2. Placer 1,19, 1,20, 1,74 et 1,95 sur la droite.
3. Dire quelles tailles conviennent et justifier avec les crochets.
4. Reformuler la règle complète, taille et âge, avec une phrase précise.

La borne 1,20 est incluse ; la borne 1,95 ne l'est pas.

33 ** [MOD, RAI, REP]

Un robot se déplace sur un rail gradué. Sa position x doit vérifier deux contraintes :

$$x \in [-6; 5] \quad \text{et} \quad |x + 1| \leq 4.$$




1. Interpréter la première contrainte comme une zone du rail.
2. Interpréter la deuxième contrainte comme une distance à -1 .
3. Représenter les deux contraintes sur les deux premières droites.
4. Donner l'ensemble des positions possibles sur la troisième droite.

On conserve seulement les positions qui respectent les deux contraintes à la fois.

34 *** [CH, RAI, COM]

Chasse au nombre. On cherche un réel x vérifiant les quatre indices :

- $x \in [-3; 7[$;
- la distance entre x et 2 est au plus 4 ;
- $x \notin \mathbb{Z}$;
- au centième près, x est compris entre 5,41 et 5,42.




1. Traduire l'indice de distance par un intervalle.
2. Vérifier que le zoom proposé est compatible avec les deux premiers indices.
3. Proposer un nombre non entier compris entre 5,41 et 5,42.
4. Justifier séparément chacun des quatre indices.

Une seule valeur correcte suffit, à condition que les quatre contrôles soient écrits.

35 ★★★ [CH, MOD, REP]

Sur une carte linéaire, trois villes ont pour abscisses $A(-4)$, $B(1)$ et $C(6)$. Un relais doit vérifier trois contraintes :



1. être à moins de 5 km de B ;
2. être à au moins 3 km de A ;
3. être situé entre A et C , extrémités comprises.

1. Traduire « à moins de 5 km de B » avec une valeur absolue.
2. Traduire « à au moins 3 km de A » avec une valeur absolue.
3. Écrire la contrainte « entre A et C » sous forme d'intervalle.
4. Représenter les trois contraintes, puis donner l'ensemble des positions possibles.

Le relais doit respecter les trois contraintes simultanément.


36 ★★ [RAI, CAL, COM]

On sait que $1,732 < \sqrt{3} < 1,733$.

1. Donner un encadrement de $\sqrt{3} + 2$ au millième près.
2. Donner un encadrement de $5 - \sqrt{3}$ au millième près.
3. Peut-on affirmer que $\sqrt{3} \in [1,73; 1,74[$? que $\sqrt{3} = 1,732$? Justifier.

37 ★★★ [CH, RAI, REP]

Sur une route graduée, $A(-2)$ et $B(4)$ sont deux bornes. On cherche les positions x plus proches de A que de B , ou à égale distance.



1. Calculer le milieu des abscisses de A et B .
2. Tester une position à gauche du milieu, puis une position à droite.
3. Représenter sur la droite les positions plus proches de A , ou à égale distance.
4. Écrire l'ensemble obtenu sous forme d'intervalle.

Aucune résolution avec équation de valeur absolue n'est attendue.