Corrigé détaillé – TD4

Probabilités 1

Variables aléatoires discrètes

Année universitaire 2026–2027

D'après un document de Chloé Friguet, Cédric Frambourg et Benjamin Dufée.


Chaque exercice commence par une analyse du choix de méthode et une représentation de la situation. Les calculs détaillés sont accompagnés de tableaux ou de graphes ; les hypothèses de modélisation sont explicitées.

Exercice 1

Énoncé. La loi de X est donnée par $X \in \{-2; 3; 4; 9\}$, avec les probabilités 0,20, 0,20, 0,10 et p. Déterminer p, tracer la loi et sa fonction de répartition, puis calculer les probabilités de $X \leq 3$, $X < 3$, $X \leq 5$, $X < 5$, $X > 3$, $3 < X < 5$ et $3 \leq X < 5$.

Analyse : comment choisir la méthode ?

On connaît les valeurs possibles et presque toutes leurs masses : la somme des probabilités donne la masse manquante. Un diagramme en bâtons décrit la loi, tandis qu'une fonction en escalier cumule ces masses. Pour les inégalités, on sélectionne les valeurs du support plutôt que de raisonner comme si X prenait toutes les valeurs d'un intervalle.




Résolution.

1) Normalisation et loi


$p = 1 - (0{,}20 + 0{,}20 + 0{,}10) = \boxed{0{,}50}$.

x_i	-2	3	4	9
$\mathbb{P}(X = x_i)$	0,20	0,20	0,10	0,50



2) Fonction de répartition

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < -2, \\ 0{,}20 & -2 \leq x < 3, \\ 0{,}40 & 3 \leq x < 4, \\ 0{,}50 & 4 \leq x < 9, \\ 1 & x \geq 9. \end{cases}$$



Point plein : valeur incluse ; point creux : extrémité exclue. Le saut en x_i vaut $\mathbb{P}(X = x_i)$.

3) Lire les évènements sur le support

Évènement	Valeurs retenues	Probabilité
$X \leq 3$	$-2; 3$	0,40
$X < 3$	-2	0,20
$X \leq 5$	$-2; 3; 4$	0,50
$X < 5$	$-2; 3; 4$	0,50
$X > 3$	$4; 9$	0,60
$3 < X < 5$	4	0,10
$3 \leq X < 5$	$3; 4$	0,30

Point de vigilance


$\mathbb{P}(X < 3) \neq \mathbb{P}(X \leq 3)$, car $\mathbb{P}(X = 3) = 0{,}20$. En revanche, $\mathbb{P}(X < 5) = \mathbb{P}(X \leq 5)$ puisque 5 ne porte aucune masse.

Exercice 2

Énoncé. Un dé prend les valeurs $1, \dots, 6$ avec $\mathbb{P}(X = k) = Ck$. Déterminer le support et C, donner la loi et l'espérance de X, puis la loi et l'espérance de $Y = 1/X$. Comparer $\mathbb{E}(Y)$ à $1/\mathbb{E}(X)$.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Les faces ne sont pas équiprobables : leur poids est proportionnel à leur numéro. On normalise ces poids, puis on calcule une moyenne pondérée. La transformation 1/X est injective sur le support : chaque probabilité est transportée vers la valeur inverse. L'espérance commute avec les transformations affines, mais pas en général avec l'inversion.




Résolution.

1–2) Support et normalisation

$X \in \{1;2;3;4;5;6\}$ et $1 = C(1+2+3+4+5+6) = 21C$, donc $\boxed{C = 1/21}$.

3) Loi et espérance de X

k	1	2	3	4	5	6
$\mathbb{P}(X=k)$	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21



$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=1}^{6} k\frac{k}{21} = \frac{1+4+9+16+25+36}{21} = \boxed{\frac{13}{3}}.$$

4) Variable transformée

y	1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6
$\mathbb{P}(Y=y)$	1/21	2/21	3/21	4/21	5/21	6/21

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{k=1}^{6} \frac{1}{k}\frac{k}{21} = \frac{6}{21} = \boxed{\frac{2}{7}}.$$

Or $1/\mathbb{E}(X) = 3/13$. Comme $2/7 \neq 3/13$, on a bien $\boxed{\mathbb{E}(1/X) \neq 1/\mathbb{E}(X)}$.

Méthode à retenir


Pour toute transformation h sur un support fini, $\mathbb{E}(h(X)) = \sum_k h(k)\mathbb{P}(X = k)$. Si plusieurs valeurs ont la même image, additionner leurs masses pour construire la loi transformée.

Exercice 3

Énoncé. Un archer atteint toujours une cible de façon uniforme en surface. Les zones jaune, rouge, bleue, noire et blanche occupent respectivement 4 %, 12 %, 20 %, 28 %, 36 % et valent 10, 8, 6, 4, 2 points. Donner la loi du score X et son espérance. Avec la nouvelle règle, les scores noir et blanc sont perdus : le jeu est-il favorable ?

Analyse : comment choisir la méthode ?

L'uniformité porte sur la surface, pas sur les cinq couleurs : les probabilités sont les proportions d'aire. Le tableau doit donc associer chaque score à son aire. La nouvelle règle change les valeurs du gain, pas les probabilités des zones. Pour décider si le jeu est favorable au sens du gain moyen, on calcule l'espérance signée.



Rayons proportionnels à $1, 2, 3, 4, 5$: les aires des cinq zones sont proportionnelles à $1, 3, 5, 7, 9$.

Résolution.

Zone	Jaune	Rouge	Bleue	Noire	Blanche
Probabilité	0,04	0,12	0,20	0,28	0,36
Score X	10	8	6	4	2
Nouveau gain G	10	8	6	-4	-2

1) Loi et espérance du score


Le tableau décrit la loi de X ; ses probabilités ont pour somme 1.

$$\mathbb{E}(X) = 10 \times 0{,}04 + 8 \times 0{,}12 + 6 \times 0{,}20 + 4 \times 0{,}28 + 2 \times 0{,}36 = \boxed{4{,}4 \text{ points}}.$$

2) Gain avec pertes

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(G) &= 10 \times 0{,}04 + 8 \times 0{,}12 + 6 \times 0{,}20 - 4 \times 0{,}28 - 2 \times 0{,}36 \\ &= 0{,}40 + 0{,}96 + 1{,}20 - 1{,}12 - 0{,}72 = \boxed{0{,}72 \text{ point}}.\end{aligned}$$

L'espérance est positive : le jeu est favorable au joueur en gain moyen, sans mise supplémentaire. Cela ne garantit pas un gain à chaque tir.



Point de vigilance


La probabilité de gagner est seulement $0{,}04+0{,}12+0{,}20 = 0{,}36$. Une espérance positive ne signifie pas que gagner est plus probable que perdre.

Exercice 4

Énoncé. Quatre candidats passent successivement un test indépendant, de probabilité de réussite 0,20. Le premier qui réussit est engagé. On pose $X = k$ si le candidat k est engagé, et $X = 5$ si personne n'est engagé. Déterminer la loi de X, la probabilité que le poste soit pourvu et $\mathbb{E}(X)$.

Analyse : comment choisir la méthode ?

On attend le premier succès, mais seuls quatre candidats existent : la loi géométrique non tronquée ne s'applique pas telle quelle. Pour engager le candidat k, il faut k-1 échecs puis une réussite. Le cas X=5 rassemble quatre échecs ; il ne désigne pas un cinquième test. Un tableau de parcours terminaux organise les cinq issues.



Résolution.

X	Parcours (É = échec, R = réussite)	Probabilité
1	R	0,2
2	ÉR	$0{,}8 \times 0{,}2 = 0{,}16$
3	ÉÉR	$0{,}8^2 \times 0{,}2 = 0{,}128$
4	ÉÉÉR	$0{,}8^3 \times 0{,}2 = 0{,}1024$
5	ÉÉÉÉ	$0{,}8^4 = 0{,}4096$

1) Loi

Pour $k \in \{1;2;3;4\}$, $\mathbb{P}(X = k) = 0{,}8^{k-1} \times 0{,}2$, et $\mathbb{P}(X = 5) = 0{,}8^4$. Vérification : la somme vaut 1.

2) Poste pourvu

L'évènement contraire est « aucun des quatre candidats ne réussit » :

$$\mathbb{P}(\text{poste pourvu}) = 1 - 0{,}8^4 = \boxed{0{,}5904}.$$

3) Espérance

$$\mathbb{E}(X) = 1 \times 0{,}2 + 2 \times 0{,}16 + 3 \times 0{,}128 + 4 \times 0{,}1024 + 5 \times 0{,}4096 = \boxed{3{,}3616}.$$

Point de vigilance


Cette espérance est celle du code X, pas du nombre de tests effectivement passés. Celui-ci vaut 4 quand $X = 5$; son espérance serait $1 + 0{,}8 + 0{,}8^2 + 0{,}8^3 = 2{,}952$.

Exercice 5

Énoncé. La variable X prend $-2, -1, 0, 1, 3$ avec les probabilités 0,10, 0,20, 0,40, 0,05, p_5. Calculer p_5, $\mathbb{E}(X)$ et $\mathrm{Var}(X)$.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Après normalisation, un tableau de calcul des deux premiers moments évite de développer les carrés des écarts. La formule Var(X)=E(X^2)-E(X)^2 est adaptée au support fini. Les masses restent positives même lorsque certaines valeurs de X sont négatives.



Résolution.

$$p_5 = 1 - (0{,}10 + 0{,}20 + 0{,}40 + 0{,}05) = \boxed{0{,}25}.$$

x_i	p_i	$x_i p_i$	$x_i^2 p_i$
-2	0,10	$-0{,}20$	0,40
-1	0,20	$-0{,}20$	0,20
0	0,40	0	0
1	0,05	0,05	0,05
3	0,25	0,75	2,25
Somme	1	0,40	2,90

$$\boxed{\mathbb{E}(X) = 0{,}40}, \qquad \boxed{\mathrm{Var}(X) = 2{,}90 - 0{,}40^2 = 2{,}74}.$$

Méthode à retenir


La variance est exprimée dans le carré de l'unité de X. Une valeur négative signalerait une erreur de calcul.

Exercice 6

Énoncé. $X \in \{1;2;3;4\}$ et $\mathbb{P}(X=k) = k^2/C$. Déterminer C, l'espérance et l'écart-type de X.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Les k^2 sont des poids à normaliser. La constante C est donc leur somme, et non leur moyenne. Les moments se déduisent ensuite des sommes de k^3 et de k^4 ; l'écart-type est la racine de la variance, pas le second moment.




Résolution.

$$1 = \frac{1+4+9+16}{C} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{C = 30}.$$

k	1	2	3	4
$\mathbb{P}(X=k)$	1/30	4/30	9/30	16/30
k^3	1	8	27	64
k^4	1	16	81	256

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1+8+27+64}{30} = \boxed{\frac{10}{3}}, \qquad \mathbb{E}(X^2) = \frac{1+16+81+256}{30} = \frac{59}{5}.$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{59}{5} - \frac{100}{9} = \frac{31}{45}, \qquad \boxed{\sigma(X) = \sqrt{\frac{31}{45}} \approx 0{,}8300}.$$




Exercice 7

Énoncé. Z prend les valeurs 0, 1 et 2 avec des probabilités strictement positives. On sait que $\mathbb{E}(Z) = 1$ et $\mathrm{Var}(Z) = 1/2$. Déterminer sa loi.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Cette fois, les masses sont les inconnues. La normalisation et les deux moments donnent trois équations linéaires. On transforme la variance en second moment avant de résoudre : cela évite un système quadratique. La symétrie de la solution sera une vérification, pas une hypothèse de départ.



Résolution.


Posons $p_i = \mathbb{P}(Z = i)$. Puisque $\mathbb{E}(Z^2) = \mathrm{Var}(Z) + \mathbb{E}(Z)^2 = 3/2$,

$$\begin{cases} p_0 + p_1 + p_2 = 1, \\ p_1 + 2p_2 = 1, \\ p_1 + 4p_2 = 3/2. \end{cases}$$

Soustraire les deux dernières lignes donne $2p_2 = 1/2$, donc $p_2 = 1/4$. Ensuite $p_1 = 1 - 2p_2 = 1/2$, et $p_0 = 1 - p_1 - p_2 = 1/4$.

z	0	1	2
$\mathbb{P}(Z = z)$	1/4	1/2	1/4

Les trois masses sont strictement positives et leur somme vaut 1. On retrouve $\mathbb{E}(Z) = 1$ et $\mathrm{Var}(Z) = 1/2$.




Exercice 8

Énoncé. Une roulette a 37 cases équiprobables : 18 rouges, 18 noires et le 0 vert. Une mise de $a > 0$ euros est perdue dans tous les cas ; le versement est $2a$ si la couleur choisie sort, $36a$ si le numéro choisi (de 1 à 36) sort, et 0 sinon. Donner les lois, espérances et variances des gains nets C (couleur) et N (numéro). Comparer les mises.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Il faut distinguer le versement et le gain net : on soustrait la mise dans chaque issue. Les deux stratégies ont deux gains possibles, avec des probabilités de succès différentes. L'espérance compare les gains moyens ; la variance compare leur dispersion. Une même espérance ne suffit donc pas à désigner une stratégie universellement préférable.



Résolution.

Pari	Gain net si succès	Probabilité	Gain net sinon	Probabilité
Couleur	a	$18/37$	$-a$	$19/37$
Numéro	$35a$	$1/37$	$-a$	$36/37$

1) Couleur

$$\mathbb{E}(C) = a\frac{18}{37} - a\frac{19}{37} = \boxed{-\frac{a}{37}}.$$

Comme $C^2 = a^2$ dans les deux cas,

$$\mathrm{Var}(C) = a^2 - \frac{a^2}{37^2} = \boxed{\frac{1368}{1369}a^2}.$$

2) Numéro

$$\mathbb{E}(N) = 35a\frac{1}{37} - a\frac{36}{37} = \boxed{-\frac{a}{37}}.$$

$$\mathbb{E}(N^2) = \frac{1225+36}{37}a^2 = \frac{1261}{37}a^2.$$

$$\mathrm{Var}(N) = \frac{1261}{37}a^2 - \frac{a^2}{1369} = \boxed{\frac{46656}{1369}a^2}.$$

On peut aussi écrire les gains sous la forme $C = 2aI - a$ et $N = 36aJ - a$, où I et J sont des indicatrices de succès ; $\mathrm{Var}(I) = p(1-p)$ retrouve ces résultats.

3) Comparaison

La perte moyenne est identique : $a/37$, soit environ 2,70 % de la mise. Le pari couleur a une variance beaucoup plus faible : il convient davantage si l'on cherche une moindre dispersion. Le pari numéro donne un gain supérieur mais très rare. Aucun des deux n'est favorable en espérance.

Point de vigilance


Pour un numéro gagnant, le versement est $36a$, mais le gain net est $35a$. L'énoncé ne suppose pas que le joueur récupère sa mise en plus du versement.

Exercice 9

Énoncé. Les génotypes 1 (AA), 2 (AB), 3 (BB) ont les proportions 0,75, 0,20, 0,05. Chaque parent transmet un de ses deux allèles au hasard ; les parents sont choisis indépendamment dans la population. Notons P, M leurs génotypes et E celui de l'enfant. Calculer $\mathbb{P}(E = 1 \mid P = i, M = j)$ puis $\mathbb{P}(E = 1)$. Avec $\mathbb{P}(E = 2) = 0{,}255$ et $\mathbb{P}(E = 3) = 0{,}0225$, refaire le calcul pour la génération suivante EE et commenter.

Analyse : comment choisir la méthode ?

Un enfant est AA si chacun des parents transmet A. On calcule d'abord la probabilité de transmission selon le génotype, puis on multiplie les deux transmissions conditionnellement aux parents. La somme pondérée sur les couples parentaux donne la loi de l'enfant. Le même mécanisme s'applique à la génération suivante ; il ne faut pas confondre fréquence d'un allèle et fréquence d'un génotype.



Résolution.

1) Probabilités conditionnelles

Posons $q_1 = 1$, $q_2 = 1/2$, $q_3 = 0$. Alors $\mathbb{P}(E = 1 \mid P = i, M = j) = q_i q_j$.

$P \backslash M$	1 : AA	2 : AB	3 : BB
1 : AA	1	1/2	0
2 : AB	1/2	1/4	0
3 : BB	0	0	0

2) Première génération

L'indépendance des génotypes parentaux donne

$$\mathbb{P}(E = 1) = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} q_i q_j \mathbb{P}(P = i)\mathbb{P}(M = j).$$

Les deux parents ont la même distribution ; le double produit se factorise :

$$\mathbb{P}(E = 1) = \left(0{,}75 + \frac{1}{2} \times 0{,}20\right)^2 = 0{,}85^2 = \boxed{0{,}7225}.$$

Autrement dit, la fréquence de A dans les transmissions est 0,85 et celle de B est 0,15 : les fréquences des enfants sont $0{,}85^2$, $2 \times 0{,}85 \times 0{,}15$ et $0{,}15^2$.

3) Génération suivante

En conservant le choix indépendant des parents et le même mécanisme :

$$\mathbb{P}(EE = 1) = \left(0{,}7225 + \frac{1}{2} \times 0{,}255\right)^2 = 0{,}85^2 = \boxed{0{,}7225}.$$

Génotype	Population initiale	Génération E	Génération EE
AA	0,75	0,7225	0,7225
AB	0,20	0,255	0,255
BB	0,05	0,0225	0,0225

Méthode à retenir

Les fréquences génotypiques se stabilisent après une génération dans ce modèle de reproduction aléatoire, sans sélection ni mutation. La fréquence de l'allèle A reste 0,85.