# Bài 5. DÃY SỐ

# A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

## 1. Định nghĩa dãy số

- $\odot$  Mỗi hàm u xác định trên tập các số nguyên dương  $\mathbb{N}^*$  được gọi là một dãy vô hạn (gọi tắt là dãy số), kí hiệu u=u(n).
- $\bigcirc$  Ta thường viết  $u_n$  thay cho u(n) và kí hiệu dãy số u=u(n) bởi  $(u_n)$ , do đó dãy số  $(u_n)$  được viết dưới dạng khai triển  $u_1,u_2,u_3,\ldots,u_n,\ldots$  Số  $u_1$  gọi là số hạng đầu,  $u_n$  gọi là số hạng thứ n và gọi là số hạng tổng quát của dãy số.
- $\bigcirc$  Nếu  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = c$  thì  $(u_n)$  được gọi là dãy số không đổi.
- **⊘** Mỗi hàm u xác định trên tập  $M = \{1; 2; 3; ...; m\}$ ,  $\forall m \in \mathbb{N}^*$  được gọi là một dãy số hữu han.
- $\bigcirc$  Dạng khai triển của dãy hữu hạn là  $u_1, u_2, u_3, \ldots, u_m$ . Số  $u_1$  gọi là số hạng đầu, số  $u_m$  gọi là số hạng cuối.

# 2. Các cách cho một dãy số

Một dãy số có thể cho bằng:

- ❷ Liệt kê các số hạng (chỉ dùng cho các dãy hữu hạn và có ít số hạng);
- ❷ Công thức của số hạng tổng quát;
- Phương pháp mô tả;
- O Phương pháp truy hồi.

## 3. Dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số bị chặn

- $\odot$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là dãy số tăng nếu ta có  $u_{n+1} > u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- $\odot$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là dãy số giảm nếu ta có  $u_{n+1} < u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- $\odot$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại số M sao cho  $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- $\odot$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại số m sao cho  $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- $\bigcirc$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số m, M sao cho  $m \le u_n \le M, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

# B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

#### Dạng 1. Số hạng tổng quát, biểu diễn dãy số

Để tìm số hạng tổng quát của một dãy bất kỳ khi biết một vài số hạng đầu của dãy số ta làm như sau

- Phân tích các số hạng sau theo các số hạng đã biết theo một quy luật nào đó.
- ❷ Dự đoán số hạng tổng quát
- $\bigcirc$  Kiểm tra bằng cách thay lần lượt các giá trị  $n \in \mathbb{N}^*$  vào công thức tổng quát (Chứng minh bằng phương pháp quy nạp).

Để biểu diễn một dãy số khi biết công thức tổng quát ta lần lượt thay  $n \in \mathbb{N}^*$  vào công thức tổng quát để tìm các số hạng thứ nhất, thứ hai, . . .



ĐIỂM:

"It's not how much time you have, it's how you use it."

OII		NOTE	
WU.	10x		

 •

♥ VNPmath - 0962940819 ♥	
QUICK NOTE	

## 1. Ví du mẫu

**VÍ DU 1 (NB).** Xác định số hạng đầu và số hạng tổng quát của dãy số  $(u_n)$  các số tự nhiên

**VÍ DU 2 (NB).** Xác định số hạng đầu và số hạng tổng quát của dãy số  $(v_n)$  các số nguyên dương chia hết cho 5:5,10,15,20,...

### 2. Bài tấp tư luân

BÀI 1 (NB). Xét dãy số hữu hạn gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 20, sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Liệt kê tất cả các số hạng của dãy số này, tìm số hạng đầu và số hạng cuối của dãy.

BÀI 2 (TH). Xét dãy số gồm tất cả các số tự nhiên chia cho 5 dư 1. Xác định số hạng tổng quát của dãy số.

BÁI 3 (NB). Viết năm số hạng đầu của dãy số gồm các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần.

## 3. Câu hỏi trắc nghiêm

**CÂU 1.** Cho dãy số có các số hạng đầu là 5, 10, 15, 20, 25, ... Số hạng tổng quát của dãy số nàv là

$$\mathbf{B}u_n=5n.$$

$$\bigcirc u_n = 5 + n.$$

$$\mathbf{C}u_n = 5 + n.$$
  $\mathbf{D}u_n = 5n + 1.$ 

**CÂU 2.** Cho dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{an^2}{n+1}$ , a là hằng số.  $u_{n+1}$  là số hạng nào trong các số hạng sau

$$\mathbf{A} u_{n+1} = \frac{a(n+1)^2}{n+2}.$$

$$\mathbf{C} u_{n+1} = \frac{an^2 + 1}{n+1}.$$

$$\mathbf{B} u_{n+1} = \frac{a(n+1)^2}{n+1}.$$

$$\mathbf{D} u_{n+1} = \frac{an^2}{n+2}.$$

$$\mathbf{C}u_{n+1} = \frac{an^2 + 1}{n+1}.$$

$$\mathbf{D}u_{n+1} = \frac{an^2}{n+2}$$

CÂU 3. Cho dãy số có các số hạng đầu là 8, 15, 22, 29, 36, ... Số hạng tổng quát của dãy số này là

- $(\mathbf{A})u_n = 7n + 7.$
- $\mathbf{B}$  $u_n = 7n.$
- $(\mathbf{C})u_n = 7n + 1.$
- $(\mathbf{D})u_n$  không viết được dưới dạng công thức.

**CÂU 4.** Cho dãy số có các số hạng đầu là  $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$  Số hạng tổng quát của dãy số này là

$$\mathbf{A}u_n = \frac{n+1}{n}$$

$$\mathbf{B}u_n = \frac{n}{n+1}.$$

$$\mathbf{C}u_n = \frac{n-1}{n}$$

**CÂU 5.** Cho dãy số  $(u_n)$  với  $u_1 = 1, u_{n+1} = u_n - 1$ . Số hạng tổng quát  $u_n$  của dãy số là số hạng nào dưới đây?

$$\mathbf{A} u_n = 2 - n.$$

 $(\mathbf{B})u_n$  không xác định.

$$\mathbf{c} u_n = 1 - n.$$

 $\mathbf{D}u_n = -n$ , với mọi n

### Dang 2. Tìm số hang cu thể của dãy số

Để tìm số hạng cụ thể của dãy số ta làm như sau

- ❷ Với trường hợp dãy số đã cho biết công thức tổng quát của dãy số thì ta chỉ cần thay giá trị tương ứng của số hạng đó vào công thức tổng quát.
- ❷ Với trường hợp dãy số cho bởi công thức truy hồi hoặc dưới dang thì ta phải tìm lần lượt từ những số hạng đầu tiên cho đến số đứng trước số cần tìm trong dãy.

# 1. Ví dụ mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = (-1)^n \cdot \frac{2^n}{n}$ . Tìm số hạng  $u_3$ . **A**  $u_3 = -\frac{8}{3}$ . **B**  $u_3 = 2$ . **C**  $u_3 = -2$ . **D**  $u_3 = \frac{8}{3}$ .

$$\mathbf{A} u_3 = -\frac{8}{3}$$

$$\mathbf{C}u_3 = -2.$$

**VÍ DỤ 2 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 3}$ . Tìm số hạng  $u_5$ .

(A)  $u_5 = \frac{1}{4}$ .
(B)  $u_5 = \frac{7}{4}$ .
(C)  $u_5 = \frac{17}{12}$ .
(D)  $u_5 = \frac{71}{39}$ .

**B** 
$$u_5 = \frac{7}{4}$$

$$\mathbf{C}u_5 = \frac{17}{12}$$

$$\mathbf{D}u_5 = \frac{71}{39}.$$

**VÍ DU 3 (NB).** Cho dãy số  $u_n$  bao gồm các số nguyên tố. Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.

**VÍ DỤ 4 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$ . Tìm số hạng thứ 5 của dãy

VÍ DU 5 (TH). Cho dãy số xác định bằng hệ thức truy hồi

$$u_1 = 1, u_n = 3u_{n-1} + 2$$
 với  $n \ge 2$ 

Viết ba số hạng đầu của dãy số này.

**VÍ DỤ 6 (VD).** Cho dãy số  $(u_n)$ :  $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$ . Số 20 là số hạng thứ mấy trong dãy?

### 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1 (NB).** Cho dãy số  $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}+1}$ . Tìm số hạng  $u_4$ .

**BÁI 2 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$  có số hạng tổng quát:  $u_n = 2n + \sqrt{n^2 + 4}$ . Tìm số hạng thứ 6 của dãy số.

**BÀI 3 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi:  $\begin{cases} u_1 = -1; u_2 = 3 \\ u_{n+1} = 5u_n - 6u_{n-1} \forall n \geq 2 \end{cases}$ . Tìm số hạng thứ 7 của dãy.

**BÁI 4 (NB).** Viết năm số hạng đầu của dãy số Fibonacci  $(F_n)$  cho bởi hệ thức truy hồi

$$\begin{cases} F_1 = 1, F_2 = 1 \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \ (n \ge 3). \end{cases}$$

BÁI 5 (NB). Người ta nuôi cấy 5 con vi khuẩn E-coli trong môi trường nhân tạo. Cứ 30 phút thì vi khuẩn E-coli sẽ nhân đôi 1 lần. Tính số lương vi khuẩn thu được sau 1,2,3 lần nhân đôi.

**BÀI 6 (TH).** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $u_n = \frac{n^2 + 3n + 7}{n + 1}$ 

- a) Viết năm số hang đầu của dãy.
- b) Dãy số có bao nhiều số hạng nhận giá trị nguyên.

**BÀI 7 (VD).** Cho dãy số  $(x_n)$  thỏa mãn điều kiện  $x_1 = 1, x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n(n+1)}, n = 1$  $1, 2, 3, \dots$  Số hạng  $x_{2023}$  bằng

**BÀI 8 (VDC).** Cho dãy số  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_1 = 99 \\ u_{n+1} = u_n - 2n - 1, n \ge 1 \end{cases}$ . Hỏi số -861 là số hạng thứ mấy?

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{n}{3^n - 1}$ . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là 

$$\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}.$$

**B** 
$$\frac{1}{2}$$
;  $\frac{2}{3}$ ;  $\frac{3}{4}$ .

$$\bigcirc \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{3}{26}$$

$$\mathbf{D}\frac{1}{2};\frac{1}{4};\frac{1}{8}.$$

**CÂU 2.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = (-1)^n \cdot 2n$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

$$\mathbf{B} u_2 = 4.$$

$$u_4 = -8.$$

$$\mathbf{D}u_1 = -2$$

$$\mathbf{A}u_4 = \frac{2}{2}.$$

$$\mathbf{B}u_4 = 1.$$

$$u_4 = \frac{14}{27}$$

$$\mathbf{D}u_4 = \frac{5}{9}.$$

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•






•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	





**CÂU 4.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_1=-1\\ u_{n+1}=u_n+3 \end{cases}$  với  $n\geq 0$ . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là lần lượt là những số nào dưới đây

(A)-1; 2; 5.

**(C)**1; 4; 7.

**CÂU 5.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{2n+5}{5n-4}$ . Số  $\frac{7}{12}$  là số hạng thứ mấy của dãy số?

**CÂU 6.** Cho dãy  $(u_n)$  xác định bởi  $\begin{cases} u_1=3\\ u_{n+1}=\frac{u_n}{2}+2 \end{cases}$ . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

**CÂU 7.** Cho dãy số  $(u_n)$ , với  $u_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2n+3}$ . Tìm số hạng  $u_{n+1}$ .

 $\mathbf{A} u_{n+1} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2(n-1)+3}.$   $\mathbf{B} u_{n+1} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2(n+1)+3}.$   $\mathbf{C} u_{n+1} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+5}.$   $\mathbf{D} u_{n+1} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+3}.$ 

**CÂU 8.** Cho dãy số  $(a_n)$ , được xác định  $\begin{cases} a_1 = 3 \\ a_{n+1} = \frac{1}{2}a_n, & n \geq 1 \end{cases}$ . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

 **(a)**  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = \frac{93}{16}$ .

 **(a)**  $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = \frac{93}{16}$ .

 **(a)**  $a_{n+1} = \frac{3}{2n}$ .

 **(b)**  $a_{n+1} + a_n = \frac{9}{2^n}$ .

**CÂU 9.** Cho dãy số  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_1=1\\ u_2=4\\ u_{n+2}=3u_{n+1}-2u_n \end{cases}$  với mọi  $n\geq 1$ . Giá trị  $u_{101}-u_{100}$ 

**B** $3 \cdot 2^{101}$ .

 $\bigcirc$  3 · 2<sup>100</sup>.

**CÂU 10.** Cho dãy số  $(u_n)$  thoả mãn  $u_1 = \sqrt{2}$  và  $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$  với mọi  $n \ge 1$ . Tìm

 $\mathbf{C}u_{2023} = \sqrt{2}\cos\frac{\pi}{2^{2023}}$ 

## 🖶 Dạng 3. Xét tính tăng giảm của dãy số

a) Phương pháp 1. Xét dấu của hiệu số  $u_{n+1} - u_n$ .

(a) Nếu  $u_{n+1} - u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$  thì  $(u_n)$  là dãy số tăng.

(b) Nếu  $u_{n+1} - u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$  thì  $(u_n)$  là dãy số giảm.

b) Phương pháp 2. Nếu  $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$  thì ta có thể so sánh thương  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  với 1.

(a) Nếu  $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$  thì  $(u_n)$  là dãy số tăng.

(b) Nếu  $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$  thì  $(u_n)$  là dãy số giảm.

Nếu  $u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$  thì ta có thể so sánh thương  $\frac{u_{n+1}}{u}$  với 1.

(a) Nếu  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  < 1 thì  $(u_n)$  là dãy số tăng.

(b) Nếu  $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$  thì  $(u_n)$  là dãy số giảm.

c) Phương pháp 3. Nếu dãy số  $(u_n)$  cho bởi hệ thức truy hồi thì thường dùng phương pháp quy nạp để chứng minh  $u_{n+1} > u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$  (hoặc  $u_{n+1} < u_n \forall n \in \mathbb{N}^*$ ).

# 1. Ví du mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Xét sự tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = (-1)^n$ .

**VÍ DỤ 2 (NB).** Xét tính tăng giảm của dãy số sau  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$ 

**VÍ DỤ 3 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+2}$ .

**VÍ DỤ 4 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{n}{3^n}$ .

**VÍ DỤ 5 (VD).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1=2\\ u_{n+1}=\frac{3u_n+1}{u_n+1}, n\in\mathbb{N}^*. \end{cases}$ 

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1 (NB).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{\sqrt{2}}{2n}$ 

**BÀI 2 (NB).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 

**BÀI 3 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = n + \cos^2 n$ .

**BÀI 4 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n}$ 

**BÀI 5 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n}$ .

**BÀI 6 (VD).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  cho bởi

$$(u_n): \begin{cases} u_1 = 1; u_2 = 2\\ u_{n+1} = \sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n-1}} \forall n \ge 2 \end{cases}$$

**BÀI 7 (VD).** Cho dãy số  $(u_n)$  biết  $u_n = \frac{b \cdot 2n^2 + 1}{n^2 + 3}$  và  $b \in \mathbb{R}$ . Hãy xác định b để

a)  $(u_n)$  là dãy số giảm.

b)  $(u_n)$  là dãy số tăng.

**BÀI 8 (VDC).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \sin n + \cos n$ .

### CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

CÂU 1. Cho các dãy số sau. Dãy số nào là dãy số tăng

(A) 1; 1; 1; 1; 1; 1; . . . .

**B**  $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots$ 

 $\bigcirc$ 1;  $-\frac{1}{2}$ ;  $\frac{1}{4}$ ;  $-\frac{1}{8}$ ;  $\frac{1}{16}$ ; ....

**D**1; 3; 5; 7; 9; . . . .

**CÂU 3.** Trong các dãy  $(u_n)$  sau đây dãy nào là dãy số giảm ?

**(A)**  $u_n = (-1)^n$ . **(B)**  $u_n = 2^n$ . **(C)**  $u_n = 3n + 1$ . **(D)**  $u_n = \frac{1}{2n}$ 

**CÂU 4.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là dãy số

 $\mathbf{A} u_n = \frac{1}{n}.$   $\mathbf{B} u_n = \frac{1}{2^n}.$   $\mathbf{C} u_n = \frac{n+5}{3n+1}.$   $\mathbf{D} u_n = \frac{2n-1}{n+1}.$ 

**CÂU 5.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là dãy số giảm?

 $\mathbf{A} u_n = n^2$ .

**B**  $u_n = \frac{3n-1}{n+1}$ . **C**  $u_n = \sqrt{n+2}$ . **D**  $u_n = \frac{1}{2^n}$ .

**CÂU 6.** Trong các dãy số  $(u_n)$  sau, hãy chọn dãy số tăng.  $\mathbf{A} u_n = (-1)^{2n} (5^n + 1), n \in \mathbb{N}^*.$   $\mathbf{B} u_n = \frac{n}{n^2 + \frac{1}{1}}, n \in \mathbb{N}^*.$ 

 $\mathbf{C}$  $u_n = (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{n}, n \in \mathbb{N}^*.$ 

 $\mathbf{D}u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}+n}, n \in \mathbb{N}^*.$ 

#### **QUICK NOTE**

$\sim$	 C	/	ч .	$\sim$	-
			м		

**CÂU 7.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là dãy số giảm?

$$\mathbf{B} u_n = (-1)^n \cdot (2^n + 1).$$

$$(\mathbf{C})u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$$
.

$$\mathbf{D}u_n = \sin n.$$

**CÂU 8.** Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$igapha$$
 Dãy số  $u_n = \frac{1}{n} - 2$  là dãy tăng.

$$lacksquare$$
 Dãy số  $u_n = 2n + \cos \frac{1}{n}$  là dãy tăng.

$$\bigcirc$$
 Dãu số  $u_n = \frac{n-1}{n+1}$  là dãy giảm.

$$\mathbf{D}$$
 Dãy số  $u_n = (-1)^n (2^n + 1)$  là dãy giảm.

CÂU 9. Mệnh đề nào sau đây sai?

$$\mathbf{A}$$
 Dãy số  $u_n = \frac{1-n}{\sqrt{n}}$  là dãy giảm.

$$lacksquare$$
 Dãy số  $u_n = n + \sin^2 n$  là dãy tăng.

$$\bigcirc$$
 Dãy số  $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  là dãy giảm.

$$\bigcirc$$
 Dãy số  $u_n = 2n^2 - 5$  là dãy tăng.

**CÂU 10.** Cho dãy 
$$(u_n)$$
: 
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{n}{2(n+1)} u_n + \frac{3(n+2)}{2(n+1)}, n \in \mathbb{N}^*. \text{ Nhận xét nào sau đây} \end{cases}$$

đúng

$$lack A$$
 Dãy số  $(u_n)$  là dãy số tăng.

$$(\mathbf{B})$$
Dãy số  $(u_n)$  là dãy số giảm.

$$\bigcirc$$
 Dãy số  $(u_n)$  là dãy số không tăng, không giảm.

### Dạng 4. Xét tính bị chặn của dãy số

 $\odot$  Để chứng minh dãy số  $(u_n)$  bị chặn trên bởi M, ta chứng minh  $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

 $\odot$  Để chứng minh dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới bởi m, ta chứng minh  $u_n \geq m$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ .

❷ Để chứng minh dãy số bị chặn ta chứng minh nó bị chặn trên và bị chặn dưới.

— Nếu dãy số 
$$(u_n)$$
 tăng thì bị chặn dưới bởi  $u_1$ .

— Nếu dãy số 
$$(u_n)$$
 giảm thì bị chặn trên bởi  $u_1$ .

## 1. Ví dụ mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Chứng minh rằng dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{3n}{n^2 + 9}$  bị chặn trên bởi  $\frac{1}{2}$ .

**VÍ DỤ 2 (NB).** Chứng minh rằng dãy số  $(u_n)$  xác đinh bởi  $u_n = \frac{8n+3}{3n+5}$  là một dãy số bị chặn

**VÍ DỤ 3 (TH).** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{3n+1}{n+3}$ .

**VÍ DỤ 4 (VD).** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi  $u_1 = 1$  và  $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$ ,  $\forall n \geq 1$ . Chứng minh rằng dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi số  $\frac{3}{2}$  và bị chặn dưới bởi số 1.

**VÍ DU 5 (VD).** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \sin n + \cos n$ .

## 2. Bài tập tự luận

BÀI 1 (TH). Xét tính bị chặn của các dãy số sau

a) 
$$u_n = \frac{1}{2n^2 - 1}$$
.

b) 
$$u_n = 3 \cdot \cos \frac{nx}{3}$$
.

c) 
$$u_n = 2n^3 + 1$$
.

d) 
$$u_n = \frac{n^2 + 2n}{n^2 + n + 1}$$
.

e) 
$$u_n = n + \frac{1}{n}$$
.

**BÀI 2 (VD).** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  với:

a) 
$$u_n = \frac{4}{n} - 5$$
.

b) 
$$u_n = \frac{n+4}{n+2}$$
.

c) 
$$u_n = \frac{5}{n^2 + 1} + \frac{n+2}{n+1} + \frac{1}{n+2}$$

**BÀI 3 (VDC).** Xét tính bị chặn của dãy số  $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ,  $n \in N^*$ .

**BÀI 4 (VD).** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi  $u_1 = 0$  và  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 4, \forall n \ge 1.$ 

- a) Chứng minh dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi số 8.
- b) Chứng minh dãy  $(u_n)$  tăng, từ đó suy ra dãy  $(u_n)$  bị chặn.

**BÅI 5 (VD).** Trong các dãy số  $(u_n)$  sau, dãy số nào bị chặn trên, bị chặn dưới và bị chặn?

a) 
$$u_n = n^2 + 5$$
.

b) 
$$u_n = \frac{3n+1}{2n+5}$$
.

c) 
$$u_n = (-1)^n \cos \frac{\pi}{2n}$$
.

d) 
$$u_n = \frac{n^2 + 2n}{n^2 + n + 1}$$
.

d) 
$$u_n = \frac{n^2 + 2n}{n^2 + n + 1}$$
. e)  $u_n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + 2n} + n}$ .

# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi  $u_1=3$  và  $u_{n+1}=\frac{u_n+1}{2}$ ,  $\forall n\geq 1$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) Dãy số bị chặn.

(B) Dãy số bị chặn trên.

(C) Dãy số bị chặn dưới.

(**D**)Dãy số không bị chặn.

**CÂU 2.** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi  $u_1 = \sqrt{2}$  và  $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ ,  $\forall n \geq 1$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) Dãy số bị chặn trên.

(B) Dãy số bi chặn dưới.

(C) Dãy số bị chặn.

(**D**)Dãy số không bị chăn.

**CÂU 3.** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \ldots + \frac{1}{n\cdot (n+1)}$ 

- (A) Không bị chặn.
- (B) Bị chặn trên.
- C Bị chặn dưới.

**CÂU 4.** Cho dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 5} + \ldots + \frac{1}{n \cdot (n+3)}$ . Dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới và chặn trên lần lượt bởi các số m và M nào dưới đây?

$$\mathbf{A}m = 0, M = 1.$$

**B**
$$m = 1, M = \frac{1}{2}.$$

$$\mathbf{C}m = 1, M = \frac{10}{19}.$$

**B**
$$m = 1, M = \frac{1}{2}.$$
 **C** $m = 1, M = \frac{10}{19}.$  **D** $m = 0, M = \frac{11}{18}.$ 

**CÂU 5.** Cho dãy số  $(u_n)$  biết  $u_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 2n}$ . Dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới và chặn trên lần lượt bởi các số  $u_n$ 

$$\mathbf{A} \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\mathbf{C}$$
  $\frac{1}{\sqrt{5}}$ .

$$\bigcirc \frac{1}{\sqrt{7}}.$$

**CÂU 6.** Cho dãy số  $(u_n)$ , với  $u_n = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2}$ ,  $\forall n = 2; 3; 4; \ldots$  Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) Dãy số bị chặn.

(B) Dãy số bị chặn trên.

(C) Dãy số bị chặn dưới.

(D) Dãy số không bị chặn.

**CÂU 7.** Cho dãy số  $(u_n)$  và đặt  $u_n = \sum_{k=1}^n a_k$  với  $a_k = \frac{1}{4k^2 - 1}$ . Mệnh đề nào sau đây là

$$\bigcirc 0 < u_n < 1.$$

**B** 
$$0 \le u_n \le \frac{1}{2}$$
. **C**  $0 < u_n < \frac{1}{2}$ . **D**  $0 \le u_n \le 1$ .

$$\bigcirc 0 \le u_n \le 1$$

**CÂU 8.** Cho dãy số  $(u_n)$  và đặt  $u_n = \sum_{k=1}^n a_k$  với  $a_k = \frac{1}{k(k+4)}$ . Dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới

$$\mathbf{A}m = 0, M = \frac{25}{48}.$$

$$\mathbf{B}m = 0, M = \frac{25}{12}$$

$$m = 1, M = \frac{1}{4}$$

$$\bigcirc m = 1, M = \frac{1}{2}$$

### **QUICK NOTE**

٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
٠	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	

٠.	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
٠.	•	•	٠	•	•	•		•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
						٠		٠	٠												٠	٠	٠	٠	٠								

	 •														•	•	

٠																	

	IICK	NI/	STE
SU.	HC K	- INC	-

**CÂU 9.** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  và đặt  $u_n = \sum_{k=1}^n a_k$  với  $a_k = \frac{1}{k(k+1)}$ .

A Bị chặn.

**B**) Bị chặn dưới.

**c**)Bị chặn trên.

(D)Không bị chặn..

**CÂU 10.** Cho dãy số  $(u_n)$ , xác định bởi  $\begin{cases} u_1=6\\ u_{n+1}=\sqrt{6+u_n},\ \forall n\in\mathbb{N}^* \end{cases}$ . Mệnh đề nào sau đây

là đúng?

$$\bigcirc A \sqrt{6} < u_n < 2\sqrt{3}$$
.

 $\mathbf{B})\sqrt{6} \le u_n \le 2\sqrt{3}.$ 


$$(\mathbf{c})\sqrt{6} < u_n \le 2\sqrt{3}$$
.

 $(\mathbf{D})\sqrt{6} > u_n < 2\sqrt{3}$ .

### Dạng 5. Toán thực tế về dãy số

# 1. Ví dụ mẫu

**VÍ DỤ 1.** Trên lưới ô vuông, mỗi ô cạnh 1 đơn vị, người ta vẽ 8 hình vuông và tô màu khác nhau như hình vẽ. Tìm dãy số biểu diễn độ dài cạnh của 8 hình vuông đó từ nhỏ đến lớn. Có nhận xét gì về dãy số trên?



**VÍ DỤ 2.** Chị Mai gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép như sau. Lần đầu chị gửi 100 triệu đồng. Sau đó, cứ hết 1 tháng chị lại gửi thêm vào ngân hàng 6 triệu đồng. Biết lãi suất của ngân hàng là 0.5% một tháng. Gọi  $P_n$  (triệu đồng) là số tiền chị có trong ngân hàng sau n tháng.

- a) Tính số tiền chi có trong ngân hàng sau 1 tháng.
- b) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 3 tháng.
- c) Dự đoán công thức của  $P_n$  tính theo n.

**VÍ DỤ 3.** Anh Thanh vừa được tuyển dụng vào một công ty công nghệ, được cam kết lương năm đầu sẽ là 200 triệu đồng và lương mỗi năm tiếp theo sẽ được tăng thêm 25 triệu đồng. Gọi  $s_n$  (triệu đồng) là lương vào năm thứ n mà anh Thanh làm việc cho công ty đó. Khi đó ta có

$$s_1 = 200, \, s_n = s_{n-1} + 25 \, \text{v\'oi} \, n \ge 2.$$

- a) Tính lương của anh Thanh vào năm thứ 5 làm việc cho công ty.
- b) Chứng minh  $(s_n)$  là dãy số tăng. Giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả này.

**VÍ DỤ 4.** Ông An gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất 6% một năm theo hình thức tính lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của ông An thu được sau n tháng được cho bởi công thứC

$$A_n = 100 \left( 1 + \frac{0.06}{12} \right)^n.$$

- a) Tìm số tiền ông An nhân được sau tháng thứ nhất, sau tháng thứ hai.
- b) Tìm số tiền ông An nhận được sau 1 năm.

**VÍ DỤ 5.** Chị Hương vay trả góp một khoản tiền 100 triệu đồng và đồng ý trả dần 2 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất 0.8% số tiền còn lại của mỗi tháng. Gọi  $A_n$ ,  $(n \in \mathbb{N})$  là số tiền còn nợ (triệu đồng) của chị Hương sau n tháng.

- a) Tìm lần lượt  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ ,  $A_5$ ,  $A_6$  để tính số tiền còn nợ của chị Hương sau 6 tháng.
- b) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy số  $(A_n)$ .

# Bài 6. CẤP SỐ CỘNG

# A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

### 1. Định nghĩa

Dãy số là cấp số cộng nếu mỗi một số hạng (kể từ số hạng thứ hai) đều bằng tổng của số hang đứng ngay trước nó với một số không đổi d.

Dãy số  $(u_n)$  là cấp số cộng  $\Leftrightarrow u_{n+1} = u_n + d, \forall n \in \mathbb{N}^*.$ 

d là số không đổi, gọi là  $c\hat{o}ng$  sai của cấp số cộng.

## 2. Tính chất

Nếu  $(u_n)$  là cấp số cộng thì kể từ số hạng thứ hai (trừ số hạng cuối nếu là cấp số cộng hữu hạn) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề nó trong dãy. Tức là

$$u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}, (\forall k \ge 2, k \in \mathbb{N}^*).$$

## 3. Số hạng tổng quát

Nếu cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1$  và công sai d thì số hạng tổng quát  $u_n$  được xác định bởi công thức

$$u_n = u_1 + (n-1)d \text{ v\'oi } n \ge 2.$$

# 4. Tổng n số hạng đầu tiên

Cho cấp số cộng  $(u_n)$ . Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng kí hiệu là  $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$ .

Khi đó  $S_n$  được tính theo công thức

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n}{2} [2u_1 + (n-1)d].$$

# B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

### ightharpoonup Dạng 1. Nhận diện cấp số cộng, công sai d

Dựa theo định nghĩa của cấp số cộng, để nhận diện  $(u_n)$  là cấp số cộng  $\Leftrightarrow u_{n+1} = u_n + d$ . Khi đó công sai  $d = u_{n+1} - u_n$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ .

## 1. Ví dụ mẫu

VÍ DỤ 1 (NB). Dãy số hữu hạn nào là một cấp số cộng? Vì sao?

- a) -2, 1, 4, 7, 10, 13, 16.
- b) 1, -2, -4, -6, -8.

VÍ DU 2 (TH). Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

- a) Dãy số  $(a_n)$  với  $a_n = 4n 3$ ;
- b) Dãy số  $(c_n)$  với  $c_n = 2018^n$ .

**VÍ DỤ 3 (NB).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có công thức số hạng tổng quát  $u_n = 3n + 1$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ . Tìm số hạng đầu  $u_1$  và công sai d?

**VÍ DỤ 4 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$ ,  $u_2 = 9$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng bao nhiêu?

**VÍ DỤ 5 (VD).** Tính số hạng đầu  $u_1$  và công sai d của một cấp số cộng biết  $u_4 = 10$  và  $u_7 = 19$ .

IICK	NO	
ш		13

### 2. Bài tập tự luận

BÀI 1 (NB). Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

- a)  $1, -3, -7, -11, -15, \ldots$ ;
- b)  $1, -2, -4, -6, -8, \dots$
- c)  $\frac{1}{2}$ , 0,  $-\frac{1}{2}$ , -1,  $-\frac{3}{2}$ , ...

BÁI 2 (NB). Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó.

- a) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = 19n 5$ ;
- b) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = n^2 + n + 1$ .

**BÁI 3 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1=3, u_2=9$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng bao nhiêu?

**BÀI 4 (TH).** Tìm số hạng đầu tiên, công sai của cấp số cộng sau  $\begin{cases} u_5 = 19 \\ u_9 = 35. \end{cases}$ 

**BÀI 5 (VD).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_2+u_4-u_6=-7\\ u_8+u_7=2u_4 \end{cases}$ . Xác định số hạng đầu  $u_1$  và công sai d cấp số cộng.

**BÀI 6 (VD).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$ . Xác định số hạng đầu  $u_1$  và công sai d cấp số cộng.

**BÀI 7 (VDC).** Tính số hạng đầu  $u_1$  và công sai d của một cấp số cộng biết  $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 27 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_2^2 = 275 \end{cases}$ 

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

- (A)1; -3; -7; -11; -15; ....
- **(B)** 1; -3; -6; -9; -12; ....
- $(\mathbf{C})1; -2; -4; -6; -8; \dots$
- $(\mathbf{D})1; -3; -5; -7; -9; \dots$

**CÂU 2.** Dãy số nào sau đây **không** phải là cấp số cộng?  $(A) - \frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; 0; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1; \frac{4}{3}.$ 

- **B**)  $15\sqrt{2}$ ;  $12\sqrt{2}$ ;  $9\sqrt{2}$ ;  $6\sqrt{2}$ .

 $\bigcirc$   $\frac{4}{5}$ ; 1;  $\frac{7}{5}$ ;  $\frac{9}{5}$ ;  $\frac{11}{5}$ .

**CÂU 3.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_2 = 6$ . Công sai của cấp số cộng đã cho là

**CÂU 4.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = -3$  và  $u_6 = 27$ . Công sai d của cấp số cộng đã cho

- $\mathbf{A}$  d=7.
- **B**) d = 5. **C**) d = 8.
- $(\mathbf{D})d = 6.$

**CÂU 5.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_{17}=33$  và  $u_{33}=65$ . Công sai của cấp số cộng đã cho

**CÂU 6.** Cho cấp số cộng có  $u_1 = -3$  và d = 4. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng

- $(\mathbf{A})u_5 = 15.$
- **B**)  $u_4 = 8$ .
- $(\mathbf{c})u_3 = 5.$
- $(\mathbf{D})u_2 = 2.$

**CÂU 7.** Cho cấp số cộng có  $u_1 = 11$  và công sai d = 4. Hãy tính  $u_{99}$ .

- **(C)**402.

**CÂU 8.** Một cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_{13}=8$  và d=-3. Tìm số hạng thứ ba của cấp số cộng  $(u_n).$ 

- (**A**) 50.
- **(B)**28.
- $(\mathbf{C})38.$

**CÂU 9.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1=2$  và công sai d=4. Hãy tính giá trị  $u_{2019}$  bằng

(A) 8074.

**B**)4074.

**(C)**8078.

(**D**)4078.

**CÂU 10.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng tổng quát là  $u_n = 3n - 2$ . Tìm công sai d của cấp số cộng.

(A) d = 3.

**(B)** d = 2.

 $(\mathbf{D})d = -3.$ 

### 🖶 Dạng 2. Số hạng tổng quát của cấp số cộng

Để xác định số hạng tổng quát của một cấp số cộng, ta sử dụng công thức

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$
 hoặc  $u_n = u_{n-1} + d$  với  $n \ge 2$ .

Tức là ta cần xác định số hạng đầu  $u_1$  và công sai d.

# 1. Ví du mâu

**VÍ DỤ 1 (TH).** Xác định số hạng tổng quát của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_7 = 8 \\ d = 2. \end{cases}$ 

**VÍ DỤ 2 (TH).** Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_1 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_1 + u_6 = 17. \end{cases}$ 

**VÍ DỤ 3 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1=-9\\ u_{n-1}=u_n-5 \end{cases}$ . Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng  $(u_n)$ .

**VÍ DỤ 4 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_{20}=-52$  và  $u_{51}=-145$ . Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó.

**VÍ DỤ 5 (VD).** Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết

a) 
$$\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5. \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_1 + u_6 = 7. \end{cases}$$

**VÍ DU 6 (VD).** Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết

a) 
$$\begin{cases} -u_3 + u_7 = 8 \\ u_2 u_7 = 75. \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} u_5 = 4u_3 \\ u_2u_6 = -11. \end{cases}$$

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1 (TH).** Xác định công thức tổng quát của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_{11} = 5 \\ d = -6. \end{cases}$ 

**BÀI 2 (TH).** Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_2 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26. \end{cases}$ 

BÀI 3 (TH). Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết

a) 
$$\begin{cases} u_7 = 27 \\ u_{15} = 59. \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5. \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5. \end{cases}$$
 c) 
$$\begin{cases} u_2 + u_4 - u_6 = -7 \\ u_8 - u_7 = 2u_4. \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} u_3 - u_7 = -8 \\ u_2 \cdot u_7 = 75. \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} u_3 - u_7 = -8 \\ u_2 \cdot u_7 = 75. \end{cases}$$
 e) 
$$\begin{cases} u_6 + u_7 = 60 \\ u_4^2 + u_{12}^2 = 1170. \end{cases}$$

# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1$  và công sai d. Công thức tìm số hạng tổng quát  $u_n$  là

$$\mathbf{A} u_n = u_1 + (n-1)d.$$

$$\mathbf{B})u_n = u_1 + nd.$$

$$\mathbf{C}u_n = u_1 + (n+1)d.$$

$\sim$ 11	NO	,,,,
		-

**CÂU 2.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -3$  và  $d = \frac{1}{2}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

$$\mathbf{B} u_n = -3 + \frac{1}{2}n - 1.$$

$$\mathbf{c}$$
 $u_n = -3 + \frac{2}{2}(n-1).$ 

$$\mathbf{B} u_n = -3 + \frac{1}{2}n - 1.$$

$$\mathbf{D} u_n = -3 + \frac{1}{4}(n - 1).$$

**CÂU 3.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  xác định bởi  $u_n = 2n + 1$ . Xác định số hạng đầu  $u_1$  và công sai d của cấp số cộng.

$$\mathbf{A} u_1 = 3, d = 1.$$

**B**) 
$$u_1 = 1, d = 1.$$

$$\mathbf{C}$$
 $u_1 = 3, d = 2.$ 

$$\mathbf{D}u_1 = 1, d = 2.$$

**CÂU 4.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_4 = -12$ ,  $u_{14} = 18$ . Tìm số hạng đầu  $u_1$  và công sai dcủa cấp số cộng  $(u_n)$ .

$$\mathbf{A}$$
 $u_1 = -20, d = -3.$ 

$$\mathbf{B}$$
 $u_1 = -22, d = 3$ .

$$\mathbf{C}$$
 $u_1 = -21, d = 3.$ 

$$(\mathbf{D})u_1 = -21, d = -3.$$

**CÂU 5.** Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 + u_9 = 12 \\ u_4 - 3u_2 = 1. \end{cases}$ 

$$\mathbf{A} u_1 = \frac{1}{2}; d = \frac{13}{8}.$$

$$\mathbf{A} u_1 = \frac{1}{2}; d = \frac{13}{8}.$$

$$\mathbf{C} u_1 = -\frac{1}{2}; d = \frac{13}{8}.$$

$$\mathbf{D}u_1 = -1; d = 2.$$

**CÂU 6.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_4 = -12$  và  $u_{14} = 18$ . Khi đó, số hạng đầu tiên  $u_1$  và công sai d của cấp số cộng  $(u_n)$  lần lượt là

$$\mathbf{A} u_1 = -20, d = -3.$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_1 = -22, d = 3.$ 

$$\mathbf{C}$$
 $u_1 = -21, d = 3.$ 

$$\mathbf{D}u_1 = -21, d = -3.$$

**CÂU 7.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có các số hạng đầu lần lượt là 5; 9; 13; 17;  $\cdots$ . Tìm số hạng tổng quát  $u_n$  của cấp số cộng.

$$\mathbf{\hat{A}}u_n = 5n + 1.$$

$$\mathbf{B})u_n = 5n - 1$$

$$\mathbf{C}u_n = 4n + 1$$

**B**) 
$$u_n = 5n - 1$$
. **C**)  $u_n = 4n + 1$ . **D**)  $u_n = 4n - 1$ .

**CÂU 8.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_3 = 15$  và d = -2. Tìm  $u_n$   $\mathbf{A} u_n = -2n + 21$ .  $\mathbf{B} u_n = -\frac{3}{2}n + 12$ .  $\mathbf{C} u_n = -3n - 17$ .  $\mathbf{D} u_n = \frac{3}{2}n^2 - 4$ .

$$\mathbf{B} u_n = -\frac{3}{2}n + 12$$

$$\mathbf{C}u_n = -3n - 17$$

$$\mathbf{D}u_n = \frac{3}{2}n^2 - 4.$$

CÂU 9. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào không phải là cấp số cộng?

$$\mathbf{C}u_n = -2n - 21.$$

**CÂU 10.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_4 = -12$  và  $u_{14} = 18$ . Tìm số hạng đầu tiên  $u_1$  và công sai d của cấp số cộng đã cho.

$$\mathbf{A} u_1 = -21; d = 3.$$

$$\mathbf{B}$$
) $u_1 = -20$ ;  $d = -3$ .

$$\mathbf{C}u_1 = -22; d = 3.$$

$$\mathbf{D}u_1 = -21; d = -3.$$

**CÂU 11.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thoả mãn  $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_3 + u_4 = 17 \end{cases}$ . Số hạng đầu tiên và công

sai của cấp số cộng đó lần lượt là

$$(\mathbf{B})$$
 -3 và 4.

$$\bigcirc$$
 4 và  $-3$ .

$$(\mathbf{D})$$
 -4 và -3.

**CÂU 12.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có công sai d < 0,  $u_{31} + u_{34} = 11$  và  $(u_{31})^2 + (u_{34})^2 = 101$ . Số hạng tổng quát của  $(u_n)$  là

$$u_n = 92 - 3n$$
.

$$(\mathbf{C})u_n = 95 - 3n.$$

$$(\mathbf{D})u_n = 103 - 3n.$$

#### Dạng 3. Tìm số hạng cụ thể trong cấp số cộng

Tìm số hạng thứ k  $(k \in \mathbb{N}^*)$  bằng công thức

$$u_k = u_1 + (k-1)d.$$

## 1. Ví du mâu

**VÍ DU 1 (NB).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết

$$\begin{cases} u_1 = -15 \\ d = 18. \end{cases}$$

a) Tim  $u_5$ ,  $u_{10}$ ,  $u_{15}$ ,  $u_{20}$ ,  $u_{25}$ .

b) Số 1209 là số hạng thứ bao nhiêu?

VÍ DU 2 (TH). Tìm sáu số trong khoảng (7;35) để được một cấp số cộng gồm tám số hạng với  $u_1 = 7$ ,  $u_8 = 35$ .

VÍ DU 3 (TH). Một cấp số cộng có năm số hạng mà tổng số hạng đầu và số hạng thứ ba bằng 28, tổng của số hạng thứ ba và số hạng cuối bằng 40. Hãy tìm cấp số cộng đó.

VÍ DỤ 4 (TH). Xác định 4 góc của một tứ giác lồi, biết rằng 4 góc hợp thành cấp số cộng và góc lớn nhất bằng 5 lần góc nhỏ nhất.

**VÍ DỤ 5 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_5 = -43 \\ u_{21} = -171. \end{cases}$ 

- a) Tìm d và  $u_1$ .
- b) Tim  $u_{29}$ .
- c) -16187 là số hạng thứ bao nhiều của cấp số cộng trên?
- d) -35 có thuộc cấp số cộng trên hay không?

### 2. Bài tấp tư luân

BÀI 1 (TH). Giữa các số 10 và 64 hãy đặt thêm 17 số nữa để được một cấp số cộng.

**BÀI 2 (TH).** Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng bằng 2 và tổng các bình phương của ba số đó bằng  $\frac{14}{9}$ . Xác định ba số đó và tính công sai của cấp số cộng.

**BÀI 3 (TH).** Một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai d dương và số hạng thứ tư bằng 11. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó, biết hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 6.

**BÀI 4 (VD).** Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết rằng:

- a) Tổng của chúng bằng 10 và tổng bình phương bằng 70.
- b) Tổng của chúng bằng 22 và tổng bình phương bằng 66.
- c) Tổng của chúng bằng 36 và tổng bình phương bằng 504.
- d) Chúng có tổng bằng 20 và tích của chúng bằng 384.
- e) Tổng của chúng bằng 20, tổng nghịch đảo của chúng bằng  $\frac{25}{24}$  và các số này là những số nguyên.
- f) Nó là số đo của một tứ giác lồi và góc lớn nhất gấp 5 lần góc nhỏ nhất.

### 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = -5$  và công sai d = 3. Tính  $u_{15}$ .

$$\mathbf{A}$$
  $u_{15} = 27.$ 

$$u_{15} = 37.$$

$$\mathbf{C}u_{15} = 47$$

**CÂU 2.** Cho cấp số cộng có các số hạng ban đầu là 1; 5; 9; 13;  $\cdots$ . Số hạng thứ 6 của cấp số cộng này là bao nhiêu?

۲.	Α	1	9	1	
Ų		ノ	4	Τ	٠

**(B)**19.

 $(\mathbf{C})22.$ 

 $(\mathbf{D})20.$ 

**CÂU 3.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có các số hạng lần lượt là -4; 1; 6; x. Tìm giá trị của x.

$$\triangle x = 7$$
.

**(B)** x = 10.

 $(\mathbf{c})x = 11.$ 

**CÂU 4.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -5$  và d = 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$\mathbf{A}$$
 $u_{15} = 34.$ 

$(\mathbf{C})$	$u_{13}$	=	3
· •	413	_	Ο.

1. 
$$\mathbf{D}u_{10} = 35.$$

**CÂU 5.** Cho cấp số cộng có số hạng đầu là  $u_1=-\frac{1}{2}$ , công sai  $d=\frac{1}{2}$ . Trong mỗi bộ gồm 

$$\mathbf{A} - \frac{1}{2}$$
; 0; 1;  $\frac{1}{2}$ ; 1.

$$-\frac{1}{2}$$
; 0;  $\frac{1}{2}$ ; 0;  $\frac{1}{2}$ 

$$\bigcirc \frac{1}{2}$$
; 1; 2;  $\frac{5}{2}$ ;  $\frac{7}{2}$ .

$$\mathbf{D}$$
1;  $\frac{3}{2}$ ; 2;  $\frac{5}{2}$ ; 3.

$\sim$ 11	$1 \sim V$	MO.	
ยบ	ICK	NO.	ш

**CÂU 6.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_7 = \frac{19}{5}$  và công sai  $d = \frac{2}{5}$ . Tính  $u_{10}$ . **A**  $\frac{2}{5}$ . **B**  $\frac{19}{5}$ .

$$\bigcirc \frac{2}{5}$$

$$\bigcirc \frac{19}{5}$$
.

**CÂU 7.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1=-1$  và công sai d=-3. Số hạng thứ 20của cấp số cộng này là

$$\mathbf{A}u_{20} = -58.$$

$$\mathbf{B}u_{20} = 60.$$

$$\mathbf{c}u_{20} = -72.$$

$$\mathbf{D}$$
 $u_{20} = -61.$ 

**CÂU 8.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -5$  và d = 3. Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp số công?

**CÂU 9.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_2=2001$  và  $u_5=1995$ . Khi đó  $u_1001$  bằng

$$\mathbf{A}$$
  $u_{1001} = 4005.$ 

$$u_{1001} = 4003.$$

$$\mathbf{C}$$
 $u_{1001} = 3.$ 

$$\mathbf{D}u_{1001} = 1.$$

**CÂU 10.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_1 + u_3 = 7 \\ u_2 + u_4 = 12 \end{cases}$ . Tính  $u_{21}$ .

$$(A)u_{21}=1.$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_{21} = 51.$ 

$$\mathbf{c}$$
 $u_{21} = 31.$ 

$$\mathbf{D}u_{21} = 21$$

CÂU 11. Một cấp số cộng có 7 số hạng. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 30, tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ sáu bằng 35. Tìm số hạng thứ bảy của cấp số công đã cho.

$$(A)u_7 = 25.$$

$$\mathbf{B}$$
) $u_7 = 30$ .

$$\mathbf{C}u_7 = 35.$$

$$\bigcirc u_7 = 40.$$

**CÂU 12.** Cho dãy số  $(u_n)$  có xác định bởi  $\begin{cases} u_1 = -2, \\ u_{n+1} = \frac{u_n}{1 - u_n} \end{cases}$  (với  $n \in \mathbb{N}^*$ ) và dãy số  $(v_n)$ 

$$\bigcirc -\frac{2023}{3}$$
.

$$\mathbf{B} - \frac{4046}{3}$$
.

$$\bigcirc$$
  $-\frac{4043}{2}$ 

$$(\mathbf{D})$$
  $-2023.$ 

### Dang 4. Các bài toán thực tế

Các bài toán thực tế về cấp số cộng có thể được giải bằng cách sử dụng công thức của cấp số cộng. Công thức của cấp số cộng là:  $u_n = u_1 + (n-1)d$ . Trong đó:

- $\bigcirc u_n$  là số hạng thứ n của cấp số cộng.
- $\Theta$   $u_1$  là số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
- $\odot$  d là công sai của cấp số cộng.
- ❷ Một số công thức thường gặp:

$$\mathbf{\Theta} \ u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2} = u_1 + (n-1)d.$$

## 1. Ví du mẫu

VÍ DU 1 (NB). Một người có một khoản tiền gửi ngân hàng với lãi suất 10% năm. Nếu sau 5 năm người đó nhận được tổng số tiền là 550 triệu đồng thì số tiền gửi ban đầu của người đó là bao nhiêu?

VÍ DU 2. Bạn An muốn mua một món quà tặng mẹ nhân ngày mùng 8/3. Bạn quyết định tiết kiệm từ ngày 1/2/2017 đến hết ngày 6/3/2017. Ngày đầu An có  $5\,000$  đồng, kể từ ngày thứ hai số tiền An tiết kiệm được ngày sau cao hơn ngày trước mỗi ngày 1 000 đồng. Tính số tiền An tiết kiệm được để mua quà tăng mẹ.

VÍ DU 3 (TH). Một hội đồng quản trị quyết định tặng lương cho nhân viên hàng năm theo tỷ lê cố đinh. Ví du, lương của một nhân viên được tăng thêm 5% so với năm trước. Hỏi nếu lương của một nhân viên là 10 triệu đồng/năm vào năm nay, thì lương của nhân viên đó sẽ là bao nhiêu vào năm thứ 5?

VÍ DU 4 (TH). Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiết theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết

kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì anh ấy có đủ tiền để mua cây guitar đó?

**VÍ DỤ 5.** Hàng tháng ông An gửi vào ngân hàng một số tiền như nhau là 5 000 000 đồng (vào ngày đầu mỗi tháng) với lãi suất 0,5% một tháng, biết tiền lãi của tháng trước được nhập vào tiền gốc của tháng sau. Hỏi sau 36 tháng ông An nhận được số tiền vốn và lãi là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị).

**VÍ DỤ 6 (VDT).** Một xưởng có đăng tuyển công nhân với đãi ngộ về lương như sau: Trong quý đầu tiên thì xưởng trả là 6 triệu đồng/quý và kể từ quý thứ 2 sẽ tăng lên 0,5 triệu cho 1 quý. Hỏi với đãi ngộ trên thì sau 5 năm làm việc tại xưởng, tổng số lương của công nhân đó là bao nhiêu?

### 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1 (NB).** Sinh nhật bạn của An vào ngày 01 tháng năm. An muốn mua một món quà sinh nhật cho bạn nên quyết định bỏ ống heo 100 đồng vào ngày 01 tháng 01 năm 2016, sau đó cứ liên tục ngày sau hơn ngày trước 100 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của bạn, An đã tích lũy được bao nhiêu tiền? (thời gian bỏ ống heo tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 04 năm 2016).

**BÀI 2 (TH).** Người ta trồng 3 003 cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây... cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây. Số hàng cây được trồng là bao nhiêu?

**BÀI 3 (TH).** Một công ty định mức sản phẩm hàng tháng theo cấp số cộng. Ví dụ, sản lượng hàng tháng của một công ty được tăng thêm 10 sản phẩm so với tháng trước. Nếu công ty sản xuất được 100 sản phẩm trong tháng này, hỏi công ty sẽ sản xuất được bao nhiêu sản phẩm trong tháng thứ 12?

# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1 (TH).** Một công ty đang cần tuyển dụng thêm nhân viên. Công ty quyết định tăng số lượng nhân viên hàng tháng theo cấp số cộng. Nếu công ty đã có 20 nhân viên và quyết định tăng thêm 2 nhân viên hàng tháng, hỏi sau bao nhiều tháng công ty sẽ có 50 nhân viên?

(A) 19 tháng.

(B) 16 tháng.

© 36 tháng.

(D)26 tháng.

**CÂU 2 (VD).** Một người đang tăng cường luyện tập thể thao hàng ngày. Anh ta quyết định tăng mức độ luyện tập theo cấp số cộng hàng tuần. Nếu anh ta bắt đầu với mức luyện tập 30 phút mỗi ngày và tăng thêm 5 phút mỗi ngày, hỏi anh ta sẽ luyện tập được bao lâu để đạt được mức luyện tập 60 phút mỗi ngày?

(**A**) 16 ngày.

(**B**)6 ngày.

(**C**)9 ngày.

D7 ngày.

**CÂU 3 (VD).** Nếu một công ty công nghệ mới thành lập có số lượng người dùng ban đầu là 10 000 và mỗi tháng tăng thêm cố định 5 000 lượng người dùng, thì sau bao lâu có số lượng người dùng là 1 triệu.

(A) 198 tháng.

(**B**) 197 tháng.

(C) 18 tháng.

(D)98 tháng.

**CÂU 4 (VDC).** Một nhà đầu tư đang đầu tư vào một quỹ đầu tư với mức lợi nhuận cố định hàng năm. Nếu nhà đầu tư đầu tư vào quỹ đầu tư với số tiền ban đầu là 20 triệu đồng và mức lợi nhuận hàng năm là 10%, hỏi số tiền nhà đầu tư sẽ nhận được sau 7 năm?

(A) 34 triệu đồng.

(B) 14 triệu đồng.

(C)30 triệu đồng.

(D)39 triệu đồng.

**CÂU 5 (VDC).** Một công ty sản xuất bánh kẹo tăng sản lượng sản phẩm của mình lên mỗi tháng. Nếu sản lượng ban đầu là 1000 sản phẩm, một sản phẩm lợi nhuận 1 USD và tăng thêm 200 sản phẩm mỗi tháng, thì sau bao nhiêu tháng lợi nhuận công ty 1 triệu đô.

(A) 8 000 tháng.

(**B**) 7 000 tháng.

(**c**) 9 000 tháng.

(**D**)5 000 tháng.

**CÂU 6 (VDC).** Một công ty tăng lương cho nhân viên hàng năm bằng cách thêm một số tiền cố định vào lương của họ. Ví dụ: Nếu lương ban đầu của một nhân viên là 10 triệu đồng và công ty tăng lương 2 triệu đồng mỗi năm, thì lương của nhân viên sẽ là bao nhiêu nếu làm cho công ty 19 năm?

(A) 16 triệu đồng.

**B**)26 triệu đồng.

© 28 triệu đồng.

(D)46 triệu đồng.

**CÂU 7 (VDC).** Tài sản thường bị khấu hao khiến chúng có tuổi thọ hữu ích giới hạn. Ví dụ, nếu một công ty mua một chiếc xe tải với giá 35 000 đô la và nó bị khấu hao với tốc độ không đổi là 700 đô la mỗi tháng, thì sau bao lâu giá trị của nó còn 5 000 đô la.

 $\mathbf{A}$  x = 23 tháng.

 $\mathbf{B}$  x = 43 tháng.

 $(\mathbf{C})x = 41$  tháng.

 $(\mathbf{D})x = 40$  tháng.

QUICK NOTE	CÂU 8 (VDC). Các khấu hao nhanh chói
	máy tính Macbook v
	mỗi tháng, thì giá tr $\mathbf{A}$ $x = 12$ tháng.
	<b>CÂU 9 (VDC).</b> Ban ngày trước 0,5m <sup>2</sup> . B
	hồ?
	<b>CÂU 10 (VDC).</b> Ni
	chỗ hàng ghế, sau dã
	cuối cùng có 10 ghế.  A 21 dãy và 630 d
	© 11 dãy và 630 d
	CÂU 11 (VDC). Ng trồng 1 cây, hàng thu
	cho đến khi hết số cấ
	A 81 hàng.
	<b>CÂU 12 (VDC).</b> Ng
	sau $x$ giờ, bèo sẽ sin
	thêm $0.5 \text{ m}^2$ và tốc $6$
	<b>A</b> 666 gio.
	A. TÓM TẮT
	1. Định nghĩa
	Cấp số nhân là một
	số hạng đều bằng tíc
	$S \hat{o} q$ được gọi là công
	2. Số hạng tổn
	Nếu cấp số nhân ( $u_n$
	$\frac{1}{2}$ dược xác định bởi cô
	O T^2
	3. Tổng của <i>n</i> s
	Giả sử $(u_n)$ là cấp số
	❷ Công bội của c
	Số hạng đầu tiê
	$\odot a, b, c$ là ba số l

thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, hoặc máy ảnh thường bị ng do sự phát triển của công nghệ mới. Ví dụ, nếu một người mua một ới giá 2000 đô la và nó bị khấu hao với tốc độ không đổi là 100 đô la ị của Macbook còn lại 1000 đô la sau bao nhiêu tháng?

- $(\mathbf{B})x = 43$  tháng.
- $(\mathbf{C})x = 11$  tháng.
- $(\mathbf{D})x = 10$  tháng.

đầu có 1m<sup>2</sup> bèo sinh sôi trên mặt hồ biết tốc độ sinh sôi ngày sau hơn iết diện tích mặt hồ nước là 120m² hỏi sau bao lâu bèo phủ đầy mặt

- $(\mathbf{B})x = 143 \text{ tháng.}$   $(\mathbf{C})x = 238 \text{ tháng.}$   $(\mathbf{D})x = 130 \text{ tháng.}$

nà hát lớn Dạ Cỗ Vĩ Lan ở An Cư có hàng ghế đầu kí hiệu dãy A là 50 ly B là 48 chỗ và như thế hàng sau ít hơn hàng trước 2 ghế, biết hàng Tính tổng số dãy ghế và tổng số chỗ ngồi?

chỗ.

**B**)20 dãy và 630 chỗ.

chỗ.

(**D**)21 dãy và 930 chỗ.

gười ta trồng cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất ứ hai trồng 3 cây, hàng thứ ba trồng 5 cây,... cứ tiếp tục trồng như thế ty là 6561. Số hàng cây được trồng là bao nhiêu?

- (**B**)16 hàng.
- (**c**)100 hàng.
- (**D**)89 hàng.

gười ta thả một  $1 \text{ m}^2$  lá bèo vào một hồ nước. Kinh nghiệm cho thấy h sôi kín cả mặt hồ 500 m². Biết rằng sau mỗi giờ, lượng lá bèo tăng độ tăng không đổi tìm x?

- (**B**)777 giờ.
- (C)999 giờ.
- (**D**)700 giờ.

# Bài 7. CẤP SỐ NHÂN

# LÝ THUYẾT

dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi h một số đứng ngay trước nó với một số q không đổi, nghĩa là:

$$u_n = u_{n-1} \cdot q \text{ v\'oi } \forall n \in \mathbf{N}, n \geq 2$$

g bội của cấp số nhân

# g quát của cấp số nhân

) có số hạng đầu là  $u_1$  và công bội q thì số hạng tổng quát  $u_n$  của nó ing thức:

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}, n > 2$$

# ố hạng đầu tiên của cấp số nhân

ô nhân có công bội  $q \neq 1$ . Đặt  $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ , khi đó

$$S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

- $S_n = n \cdot u_1$ .
- cấp số nhân:  $q = \sqrt[n-1]{\frac{u_n}{u_1}}$ .
- ên của cấp số nhân:  $u_1 = \frac{u_n}{q^{n-1}}$ .
- hạng liên tiếp cấp số nhân thì  $a \cdot c = b^2$ .

# B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

#### ightharpoonup Dạng 1. Nhận diện cấp số nhân, công bội q

Để nhận diện (chứng minh) mỗi dãy số là cấp số nhân, ta làm như sau: Chứng minh  $u_{n+1}=u_nq,\,\forall n\in\mathbb{N}^*$  và q là một số không đổi.

Nếu  $u_n \neq 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  thì ta lập tỉ số  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = k$ .

- $\odot$  Nếu k là hằng số thì  $(u_n)$  là cấp số nhân với công bội q=k.
- $\odot$  Nếu k phụ thuộc vào n thì  $(u_n)$  không phải là cấp số nhân.

Để chứng minh dãy  $(u_n)$  không phải là một cấp số nhân. Khi đó, ta chỉ cần chỉ ra ba số hạng liên tiếp không tạo thành một cấp số nhân, chẳng hạn  $\frac{u_3}{u_2} \neq \frac{u_2}{u_1}$ .

Để chứng minh ba số a, b, c theo thứ tự đó lập được một cấp số nhân, thì ta chứng minh  $ac = b^2$  hoặc  $|b| = \sqrt{ac}$ .

# 1. Ví dụ mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Dãy số 1; 1; 1; 1; ... có phải là một cấp số nhân hay không?

**VÍ DỤ 2 (TH).** Dãy số  $u_n = 3^n$  có phải là một cấp số nhân không? Nếu có, hãy tìm công bội của cấp số nhân đó.

**VÍ DỤ 3 (TH).** Dãy số  $\begin{cases} u_1=3\\ u_{n+1}=\frac{9}{u_n} \end{cases}$  có phải là một cấp số nhân không? Nếu có, hãy tìm

công bội của cấp số nhân đó.

**VÍ DỤ 4 (TH).** Cho  $(u_n)$  là cấp số nhân có công bội  $q \neq 0, u_1 \neq 0$ . Chứng minh rằng dãy số  $(v_n)$  với  $v_n = u_n u_{2n}$  cũng là một cấp số nhân.

**VÍ DỤ 5 (VDT).** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $\begin{cases} u_1=2\\ u_{n+1}=4u_n+9 \end{cases}, \forall n\in\mathbb{N}^*. \text{ Chứng}$ 

minh rằng dãy số  $(v_n)$  xác định bởi  $v_n = u_n + 3, \forall n \in \mathbb{N}^*$  là một cấp số nhân. Hãy xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.

### 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1 (NB).** Dãy số 25; 5; 1;  $\frac{1}{5}$ ; ... có phải là một cấp số nhân không? Nếu có hãy tìm công bội của cấp số nhân đó.

**BÀI 2 (NB).** Dãy số 1; n;  $n^2$ ;  $n^3$ ;  $n^4$ ; ... (với n > 1) có phải là một cấp số nhân không? Nếu có hãy tìm công bội của cấp số nhân đó.

**BÀI 3 (TH).** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $\begin{cases} u_1=2\\u_{n+1}=u_n^2 \end{cases}$ . Hỏi dãy số  $(u_n)$  có là một cấp số nhân hay không?

**BÀI 4 (TH).** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_1 = 2$  và  $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n$ . Chứng minh  $(u_n)$  là một cấp số nhân và tìm số hang  $u_3$ .

**BÀI 5 (TH).** Cho  $(u_n)$  là cấp số nhân có công bội  $q \neq 0, u_1 \neq 0$ . Chứng minh rằng dãy số  $(v_n)$  với  $v_n = \frac{u_n u_{2n+1}}{4}$  cũng là một cấp số nhân.

**BÀI 6 (VD).** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $\begin{cases} u_1=3\\ u_{n+1}=2u_n-2 \end{cases}, \forall n\in\mathbb{N}^*.$  Chứng minh

rằng dãy số  $(v_n)$  xác định bởi  $v_n = 2u_n - 4, \forall n \in \mathbb{N}^*$  là một cấp số nhân. Hãy xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

- $\bigcirc$  128; -64; 32; -16; 8; ....
- $\mathbb{B}\sqrt{2}$ ; 2; 4;  $4\sqrt{2}$ ; ...

**©**5; 6; 7; 8; . . . .

**D** 15; 5; 1;  $\frac{1}{5}$ ; ...

CÂU 2. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

QUICK NOTE	<b>A</b> 1
	Ca
	CÂU 3
	<b>A</b>
	<b>C</b> (
	CÂU 4
	của cấj
	(C)-
	CÂU 5
	(A) 1
	CÂU 6
	và công
	$\mathbf{A}u$
	CÂU 7
	nhân?
	(A)
	CÂU 8
	nhân?
	A
	CÂU 9
	(A)I
	BI
	(C)
	D
	CÂU 1
	tổng q
	Khi đớ
	<b>A</b> -
	Dựa
	Giải Nếu
	xác
	1. V
	VÍ DỤ
	cấp số
	VÍ DỤ

<b>A</b> 1;	-1;	1;	-1;	
		_	_	

$$\mathbf{c}$$
  $a; a^3; a^5; a^7; \dots (a \neq 0).$ 

Dãy số 1; 2; 4; 8; 16; 32; ... là một cấp số nhân với

ông bội là 1 và số hạng đầu tiên là 2. (B) Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1.

òng bôi là 2 và số hạng đầu tiên là 2. (D) Công bội là 1 và số hạng đầu tiên là 1.

Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = -2$  và công bội q = -5. Viết bốn số hạng đầu tiên số nhân.

$$\bigcirc$$
 -2; 10; 50; -250.

 $\bigcirc$  -2; 10; -50; 250.

$$(\mathbf{c})$$
 -2; -10; -50; -250.

 $\bigcirc$  -2: 10: 50: 250.

Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 3 và 12. Số hạng tiếp theo của cấp số

**(C)**36.

Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng tổng quát là  $u_n = \frac{3}{2} \cdot 5^n$ . Khi đó số hạng đầu  $u_1$  $\begin{array}{ll} \text{bội } q \text{ là} \\ = \frac{3}{2}, q = \frac{1}{5}. \\ \hline & \textbf{B} u_1 = \frac{3}{2}, q = 5. \\ \hline & \textbf{C} u_1 = \frac{15}{2}, q = \frac{1}{5}. \\ \hline & \textbf{D} u_1 = \frac{15}{2}, q = 5. \\ \hline \end{array}$ 

$$\mathbf{A} u_1 = \frac{3}{2}, q = \frac{1}{5}$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_1 = \frac{3}{2}, q = 8$ 

$$\mathbf{c}$$
 $u_1 = \frac{15}{2}, q = \frac{1}{5}.$ 

$$\mathbf{D}$$
 $u_1 = \frac{15}{2}, q = 5$ 

Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là một cấp số

$$\mathbf{A}u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$$

$$\mathbf{B})u_n = \frac{n}{3^n}.$$

$$=\frac{1}{3^{n-2}}$$
.  $\mathbf{B} u_n = \frac{n}{3^n}$ .  $\mathbf{C} u_n = (n+2) \cdot 3^n$ .  $\mathbf{D} u_n = n^2$ .

Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là một cấp số

**B** 
$$u_n = 7 - 3^n$$
. **C**  $u_n = \frac{7}{3n}$ . **D**  $u_n = 7 \cdot 3^n$ .

$$\bigcirc u_n = \frac{7}{3n}$$

$$\mathbf{D}u_n = 7 \cdot 3^n.$$

Mệnh đề nào sau đây sai?

ãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

ãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

ột cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.

ột cấp số nhân có công bội q > 1 là một dãy tăng.

**).** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $u_1=2, u_n=2u_{n-1}+3n-1$ . Công thức số hạng át của dãy số đã cho là biểu thức có dạng  $a2^n + bn + c$ , với  $a, b, c \in \mathbb{Z}, n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ . sổng a + b + c có giá trị bằng

$$\bigcirc$$
  $-4$ .

$$\bigcirc$$
  $-3$ 

### Dạng 2. Số hạng tổng quát của cấp số nhân

rào giả thuyết, ta lập một hệ phương trình chứa công bội q và số hạng đầu  $u_n$ . iệ phương trình này tìm được  $u_1$  và q.

ấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1$  và công bội q thì số hạng tổng quát  $u_n$  được nh bởi công thức

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$$
 với  $n \ge 2$ .

## du mẫu

**I (NB).** Tìm số hạng tổng quát của dãy số  $2; 4; 8; 16; 32; \ldots$ , biết dãy  $(u_n)$  là một

**2 (TH).** Tìm số hạng đầu, công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\int u_1 + u_5 = 51$  $u_1 + u_6 = 102.$ 

VÍ DU 3 (TH). Tìm số hạng đầu, công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\int u_1 + u_6 = 30$  $u_1 + u_7 = 120.$ 

**VÍ DỤ 4 (TH).** Tìm số hạng đầu, công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $u_6 = 160.$ 

VÍ DU 5 (VDT). Tìm số hang đầu, công bôi và số hang tổng quát của cấp số nhân có công bội  $q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ , biết  $\begin{cases} u_2 + u_4 = 10 \\ u_1 + u_3 + u_5 = -21. \end{cases}$ 

## 2. Bài tấp tư luân

**BÀI 1 (NB).** Tìm số hạng thứ 100 của cấp số nhân  $8; -4; 2; -1; \dots$ 

**BÅI 2 (NB).** Tìm số hạng tổng quát của dãy số  $3; 12; 48; 192; \ldots$ , biết dãy  $(u_n)$  là một cấp số nhân.

**BÀI 3 (TH).** Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\begin{cases} u_1 + u_3 = 51 \\ u_2 + u_4 = 153. \end{cases}$ 

BÀI 4 (TH). Tìm số hạng đầu, công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\int u_3 = 15$  $u_6 = 120.$ 

**BÀI 5 (TH).** Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\begin{cases} u_4 = 35 \\ u_6 = 560 \end{cases}$ 

BÁI 6 (VD). Trong một lọ nuôi cấy vi khuẩn, ban đầu có 5 000 con vi khuẩn và số lượng vi khuẩn tăng lên thêm 8% mỗi giờ. Hỏi sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?

# 3. Câu hỏi trặc nghiệm

**CÂU 1.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu là  $u_1 \neq 0$  và công bội  $q \neq 0$ . Số hạng tổng quát của cấp số nhân bằng

$$\mathbf{B})u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$$

$$\mathbf{C}u_n = u_1 \cdot q^n.$$

**CÂU 2.** Cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_n = \frac{3}{5} \cdot 2^n$ . Số hạng đầu tiên và công bội q là  $\mathbf{A} u_1 = \frac{6}{5}, q = 3$ .  $\mathbf{B} u_1 = \frac{6}{5}, q = -2$ .  $\mathbf{C} u_1 = \frac{6}{5}, q = 2$ .  $\mathbf{D} u_1 = \frac{6}{5}, q = 5$ .

$$\mathbf{A}u_1 = \frac{6}{5}, q = 3.$$

**B** 
$$u_1 = \frac{6}{5}, q = -2$$

$$u_1 = \frac{6}{5}, q = 2$$

$$\mathbf{D}u_1 = \frac{6}{5}, q = 5.$$

**CÂU 3.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -3$  và công bội  $q = \frac{2}{3}$ . Chọn mệnh đề đúng? 

$$\mathbf{A} u_5 = -\frac{27}{16}.$$

$$\mathbf{B}u_5 = -\frac{16}{27}.$$

$$\mathbf{c}$$
 $u_5 = \frac{16}{27}$ .

$$\mathbf{D}u_5 = \frac{27}{16}.$$

**CÂU 4.** Dãy số có số hạng tổng quát  $u_n = \frac{1}{\sqrt{3}}^{2n}$  là một cấp số nhân có công bội q bằng

$$\mathbf{A} \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\bigcirc$$
  $\sqrt{3}$ .

$$\frac{1}{9}$$
.

$$\bigcirc \frac{1}{3}.$$

**CÂU 5.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 1, u_2 = -2$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$\mathbf{B} u_{2024} = 2^{2023}.$$

**CÂU 6.** Cho cấp số nhân có  $\begin{cases} u_4-u_2=54\\ u_5-u_3=108 \end{cases}$ . Số hạng đầu tiên  $u_1$  và công bội q của cấp

số nhân là

**B** 
$$u_1 = 9 \text{ và } q = -2.$$

$$\mathbf{c}$$
  $u_1 = -9 \text{ và } q = 2.$ 

$$\mathbf{D}u_1 = -9 \text{ và } q = -2$$

**A** 
$$u_1 = 2; q = 5$$
 hoặc  $u_1 = 25; q = \frac{1}{5}$ .

**B**
$$u_1 = 5; q = 1$$
 hoặc  $u_1 = 25; q = \frac{1}{5}$ .

$$\mathbf{c}$$
  $u_1 = 25; q = 5 \text{ hoặc } u_1 = 1; q = \frac{9}{5}.$ 

$$\mathbf{D}$$
 $u_1 = 1; q = 5 \text{ hoặc } u_1 = 25; q = \frac{1}{\epsilon}$ 

**CÂU 8.** Số hạng đầu tiên và công bội của cấp số nhân thỏa mãn  $\begin{cases} u_5 + u_2 = 36 \\ u_6 - u_4 = 48 \end{cases} \text{ (với } q > 0\text{)}$ 

$$\mathbf{A} u_1 = 4, q = 4.$$
  $\mathbf{B} u_1 = 2, q = 4.$   $\mathbf{C} u_1 = 2, q = 2.$   $\mathbf{D} u_1 = 4, q = 2.$ 

$$u_1 = 2, q = 2$$

$$(\mathbf{D})u_1 = 4, q = 2.$$

**CÂU 9.** Cho cấp số nhân  $u_2 = \frac{1}{4}, u_5 = 16$ . Công bội và số hạng đầu tiên của cấp số nhân

$\frown$	ш	$\sim$ I	/	XЦ.	$\frown$	76
ရ	UJI	C.		м	$\cup$	IΕ

$\bigcirc q =$	$\frac{1}{1}$	$=\frac{1}{-}$ .
	_	7
$\bigcirc q$ =	$=4;u_1$	$=\frac{1}{16}$

**CÂU 10.** Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của để tháp (có diện tích là 12 288 m²). Diện tích mặt trên cùng (của tầng thứ 11) có giá trị nào sau đây?

- $\mathbf{A}$  6 m<sup>2</sup>.
- $(\mathbf{B})8 \text{ m}^2$
- $\bigcirc$  10 m<sup>2</sup>.
- $(\mathbf{D})$ 12 m<sup>2</sup>.

### Dạng 3. Tìm số hạng cụ thể của CSN

Ta chuyển các số hạng của CSN về số hạng đầu  $u_1$  và công bội q. Sử dụng công thức  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ .

Chia hai phương trình vế theo vế ta thu được phương trình theo q.

Giải tìm q và  $u_1$ . Từ đó tìm được số hạng cần tìm thỏa yebt.

# 1. Ví dụ mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Cho  $u_n$  là CSN thỏa  $u_1 = 2$ ;  $u_4 = 16$ . Tìm số hạng thứ 5 của CSN.

**VÍ DỤ 2 (TH).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $\begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases}$ . Tính số hạng đầu  $u_1$  và công bội q của cấp Số nhân.

**VÍ DỤ 3 (TH).** Cho cấp số nhân có  $u_1 = -3$ ,  $q = \frac{2}{3}$ . Số  $\frac{-96}{243}$  là số hạng thứ mấy của cấp số nhân?

**VÍ DỤ 4 (TH).** Cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng tổng quát là  $u_n = \frac{3}{5} \cdot 2^{n-1}, n \in \mathbb{N}^*$ . Số hạng đầu tiên và công bội của cấp số nhân đó là

**VÍ DỤ 5 (VD).** Người ta thiết kế một cái tháp gồm 10 tầng theo cách: Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích bề mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt của tầng 1 bằng nửa diện tích bề mặt để tháp. Biết diện tích bề mặt để tháp là 12 288 m<sup>2</sup>, tính diện tích bề mặt trên cùng của tháp.

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1 (TH).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_4 - u_2 = 25 \\ u_3 - u_1 = 50. \end{cases}$ 

- a) Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân  $(u_n)$ .
- b) Tìm số hang thứ 8 của cấp số nhân  $(u_n)$ .

**BÀI 2 (TH).** Tìm số hạng thứ 10 của cấp số nhân  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_4 - u_2 = 72 \\ u_5 - u_3 = 144. \end{cases}$ 

**BÀI 3 (TH).** Cho một cấp số nhân có 5 số hạng biết 2 số hạng đầu là số dương, tích số hạng đầu và số hạng thứ 3 là 1, tích số hạng thứ 3 và số hạng cuối là  $\frac{1}{16}$ . Tìm cấp số nhân này.

**BÀI 4 (TH).** Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_2 + u_5 - u_4 = 10 \\ u_3 + u_6 - u_5 = 20. \end{cases}$ 

**BÀI 5 (TH).** Tìm 5 số lập thành một cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{4}$  số thứ nhất và tổng 2 số đầu là  $\frac{5}{4}$ .

BÀI 6 (TH). Tìm 3 số lập thành một cấp số nhân có tổng là 63 và tích là 1728.

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_{20} = 8u_{17}$ . Công bội của cấp số nhân là

$$\bigcirc q = 2.$$

$$\mathbf{B}$$
  $q = -2$ .

$$\mathbf{C}$$
) $q=4$ .

**CÂU 2.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có 10 số hạng với công bội  $q \neq 0$  và  $u_1 \neq 0$ . Đẳng thức nào sau đây là đúng?

$$(\mathbf{A})u_7 = u_4 \cdot q^6.$$

$$\mathbf{B} u_7 = u_4 \cdot q^3$$

**(B)** 
$$u_7 = u_4 \cdot q^3$$
. **(C)**  $u_7 = u_4 \cdot q^4$ . **(D)**  $u_7 = u_4 \cdot q^5$ .

**CÂU 3.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1=2$  và công bội q=3. Giá trị  $u_{2019}$ 

$$\mathbf{A}$$
 3 · 2<sup>2019</sup>.

**B**)
$$2 \cdot 3^{2019}$$
.

$$(\mathbf{C})3 \cdot 2^{2018}.$$

$$\bigcirc 2 \cdot 3^{2018}$$
.

**CÂU 4.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với công bội q < 0 và  $u_2 = 4$ ,  $u_4 = 9$ . Tìm  $u_1$ .

$$\mathbf{A} u_1 = 6.$$

**B** 
$$u_1 = -\frac{8}{3}$$
. **C**  $u_1 = -6$ . **D**  $u_1 = \frac{8}{3}$ .

$$\mathbf{C}u_1 = -6$$

$$\mathbf{D}u_1 = \frac{8}{3}.$$

**CÂU 5.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_2 = -6, u_3 = 3$ . Công bội q của cấp số nhân đã cho

$$\bigcirc$$
2.

**B** 
$$\frac{1}{2}$$
.

$$\mathbf{c} - \frac{1}{2}$$
.

$$\bigcirc$$
  $-2$ .

**CÂU 6.** Cho cấp số nhân có  $u_1 = -3$ ,  $q = \frac{2}{3}$ . Tính  $u_5$ ?

$$\mathbf{A} u_5 = \frac{27}{16}.$$

$$\mathbf{A} u_5 = \frac{27}{16}.$$
  $\mathbf{B} u_5 = \frac{-16}{27}.$   $\mathbf{C} u_5 = \frac{-27}{16}.$   $\mathbf{D} u_5 = \frac{16}{27}.$ 

$$\mathbf{c}$$
 $u_5 = \frac{-27}{16}$ .

$$\mathbf{D}u_5 = \frac{16}{27}.$$

**CÂU 7.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_2 = \frac{1}{4}$ ;  $u_5 = -16$ . Tìm q và số hạng đầu tiên của cấp số

$$\mathbf{B} q = -\frac{1}{2}, u_1 = -\frac{1}{2}.$$

$$\mathbf{D} q = -4, u_1 = -\frac{1}{16}.$$

$$\mathbf{c}$$
  $q = -4, u_1 = \frac{1}{16}.$ 

**CÂU 8.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$ , biết:  $u_n = 81, u_{n+1} = 9$ . Lựa chọn đáp án đúng.

$$\bigcirc q = 9.$$

$$\bigcirc q = -9.$$

**CÂU 9.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1=2$  và công bội q=3. Số hạng  $u_2$  bằng

 $(\mathbf{C})12.$ 

**CÂU 10.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_3 = 8$ . Số hạng thứ hai của cấp số nhân đã cho bằng

$$\mathbf{A}u_2 = 4.$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_2 = 6.$ 

$$\mathbf{C}u_2 = \pm 4.$$

$$\mathbf{D}u_2 = -4.$$

**CÂU 11.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1=-1; q=\frac{-1}{10}$ . Số  $\frac{1}{10^{103}}$  là số hạng thứ bao nhiêu?

(A) số hạng thứ 103. (B) số hạng thứ 105. (C) số hạng thứ 104. (D) Đáp án khác.

**CÂU 12.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có các số hạng lần lượt là  $3, 9, 27, 81, \dots$  Khi đó  $u_n$  bằng  $(B)3^{n-1}$ .  $(\mathbf{C})3^{n+1}$ .  $(\mathbf{A})3 + 3^n$ .

**CÂU 13.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 3$  và  $15u_1 - 4u_2 + u_3$  đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm số hạng thứ 13 của cấp số nhân đã cho.

 $(\mathbf{A})u_{13} = 12288.$ 

**(B)**  $u_{13} = 3072$ .

 $\mathbf{C}$ ) $u_{13} = 24567$ .

 $\mathbf{D}$ ) $u_{13} = 49152$ .

**CÂU 14.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  biết  $u_1 + u_5 = 51$  và  $u_2 + u_6 = 102$ . Hỏi số 12288 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân  $(u_n)$ ?

(A) Số hạng thứ 13. (B) Số hạng thứ 10. (C) Số hạng thứ 11. (D) Số hạng thứ 12.

CÂU 15. Một tứ giác lồi có số đo các góc lập thành một cấp số nhân. Biết rằng số đo của góc nhỏ nhất bằng  $\frac{1}{0}$  số đo của góc nhỏ thứ ba. Hãy tính số đo của các góc trong tứ giác đó.

(A)5°, 15°, 45°, 225°.

**(B)**9°, 27°, 81°, 243°.

(C)7°, 21°, 63°, 269°.

(D)8°. 32°. 72°. 248°.

#### Dạng 4. Tìm điều kiện để một dãy số lập thành CSN

Dãy số a, b, c lập thành CSN khi  $b^2 = a \cdot c$ .

Dãy số a, b, c, d lập thành CSN khi  $\begin{cases} b^2 = a \cdot c \\ c^2 = b \cdot d. \end{cases}$ 

$\sim$ 1	$\mathbf{u}$	v .	-	
Ыι	JIC	KN		ш

1. Ví du mẫu

**VÍ DU 1 (NB).** Cho dãy 3, x, 12, y. Tìm x, y để dãy là CSN.

**VÌ DỤ 2 (TH).** Cho dãy x-1, 2x, 4x+3. Tìm x để dãy là CSN.

**VÍ DỤ 3 (VD).** Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng, đồng thời, các số  $x + \frac{3}{3}$ , y - 1, 2x - 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm x và y.

**VÍ DU 4 (VD).** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân  $x^3 - 7x^2 + 2(m^2 + 6m)x - 8 = 0$ .

**VÍ DỤ 5 (VD).** Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số x-1, y+2, x-3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính  $x^2+y^2$ .

2. Bài tấp tư luân

**BÀI 1 (TH).** Xác định x dương để 2x-3; x; 2x+3 lập thành cấp số nhân.

**BÁI 2 (TH).** Cho cấp số nhân x, 12, y, 192. Tìm x và y.

**BÀI 3 (TH).** Tìm x để dãy số 1,  $x^2$ ,  $6-x^2$  lập thành cấp số nhân.

**BÀI 4 (TH).** Viết 6 số xen giữa hai số -2 và 256 để được một cấp số nhân có 8 số hạng. Tìm cấp số nhân này.

BAI 5 (VD). Bốn góc của một tứ giác lồi lập thành một cấp số nhân, góc lớn nhất gấp 8 lần góc nhỏ nhất. Tìm 4 góc đó.

**BÀI 6 (VD).** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân  $x^3 - 7mx^2 + 2(m^2 + 6m)x - 64 = 0$ .

3. Câu hỏi trắc nghiệm

CẦU 1. Bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và góc lớn nhất gấp 27 lần góc nhỏ nhất. Tổng của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng

**(B)**102°.

**CÂU 2.** Xác định x để 3 số 2x-1; x; 2x+1 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

 $\mathbf{A} x = \pm \sqrt{3}.$ 

 $\mathbf{B}x = \pm \frac{1}{2}.$ 

 $\mathbf{C}$   $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ .

 $(\mathbf{D})$ Không có giá trị nào của x.

**CẦU 3.** Cho 4 số nguyên dương, trong đó 3 số đầu lập thành cấp số cộng, 3 số cuối lập thành cấp số nhân. Biết tổng số đầu và cuối là 37, tổng 2 số hạng giữa là 36. Hỏi số lớn nhất thuộc khoảng nào sau đây?

(A)(26;29).

**(B)**(24; 26).

**(C)**(30; 33).

 $(\mathbf{D})(22;25).$ 

**CÂU 4.** Ba số x, y, z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q khác 1 đồng thời các số x, 2y, 3z theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai khác 0. Tìm giá trị của q.

 $\mathbf{A} q = -\frac{1}{3}$ .

 $\bigcirc q = \frac{1}{0}$ .

 $\bigcirc q = -3.$ 

 $\mathbf{D}q = \frac{1}{2}$ 

**CÂU 5.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

 $\mathbf{A} u_n = \frac{1}{3^n} - 1.$   $\mathbf{B} u_n = n + \frac{1}{3}.$   $\mathbf{C} u_n = n^2 - \frac{1}{3}.$   $\mathbf{D} u_n = \frac{1}{3^{n-2}}.$ 

CÂU 6. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là sai?

(A) Dãy số  $(a_n)$ , với  $a_1 = 3$  và  $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 6}$ ,  $\forall n \ge 1$ , vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.

 $\textcircled{\textbf{B}}$  Dãy số  $(d_n)$ , với  $d_1=-3$  và  $d_{n+1}=2d_n^2-15,\, \forall n\geq 1,$  vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.

(C) Dãy số  $(b_n)$ , với  $b_1 = 1$  và  $b_{n+1}(2b_n^2 + 1) = 3$ ,  $\forall n \geq 1$ , vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.

 $(\mathbf{D})$  Dãy số  $(c_n)$ , với  $c_1 = 2$  và  $c_{n+1} = 3c_n^2 - 10$ ,  $\forall n \geq 1$ , vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.

**CÂU 7.** Biết rằng tồn tại hai giá trị  $m_1$  và  $m_2$  để phương trình

$$2x^3 + 2(m^2 + 2m - 1)x^2 - 7(m^2 + 2m - 2)x - 54 = 0$$

có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị của biểu thức  $P=m_1^3+$ 

$$(A)P = 56.$$

$$\mathbf{B}$$
 $P=8$ .

$$(\mathbf{C})P = -8.$$

$$(\mathbf{D})P = -56.$$

**CÂU 8.** Cho bốn số a, b, c, d biết rằng a, b, c theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q>1; còn b,c,d theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng. Tìm q, biết rằng a+d=14và b + c = 12.

$$\mathbf{A} q = \frac{20 + \sqrt{73}}{24}$$

**B** 
$$q = \frac{19 + \sqrt{73}}{24}$$

$$\mathbf{c}$$
  $q = \frac{21 + \sqrt{73}}{24}$ 

**A** 
$$q = \frac{20 + \sqrt{73}}{24}$$
. **B**  $q = \frac{19 + \sqrt{73}}{24}$ . **C**  $q = \frac{21 + \sqrt{73}}{24}$ . **D**  $q = \frac{18 + \sqrt{73}}{24}$ .

**CÂU 9.** Cho dãy số tăng  $a, b, c \ (c \in \mathbb{Z})$  theo thứ tư lập thành cấp số nhân; đồng thời a, b+8, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng và a, b+8, c+64 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức P = a - b + 2c.

$$\bigcirc P = 32.$$

**B**
$$P = \frac{92}{9}$$
.

$$(c)P = 64.$$

$$\bigcirc P = \frac{184}{9}.$$

**CÂU 10.** Cho 3 số a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết cũng theo thứ tự đó chúng lần lượt là số thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng công sai là d,  $(d \neq 0)$ . Tính  $\frac{a}{d}$ 

$$\frac{4}{3}$$
.

$$\bigcirc \frac{4}{9}$$
.

**CÂU 11.** Cho dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân với  $u_n \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$ . Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

$$(A)$$
  $u_1 + 2$ ;  $u_2 + 2$ ;  $u_3 + 2$ ; ....

$$\mathbf{B} 3u_1; 3u_2; 3u_3; \dots$$

$$\overset{\bullet}{\mathbf{C}} \frac{1}{u_1}; \frac{1}{u_2}; \frac{1}{u_3}; \dots$$

$$\bigcirc u_1; u_3; u_5; \ldots$$

**CÂU 12.** Xác định x để 3 số x-2; x+1; 3-x theo thứ tự lập thành một cấp số nhân

$$lackbox{\textbf{B}}$$
 Không có giá trị nào của  $x$ .

$$\mathbf{C}x = -3.$$

$$\mathbf{D}$$
 $x=2.$ 

**CÂU 13.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là một cấp **B**  $u_n = \frac{7}{3n}$ . **C**  $u_n = 7 - 3^n$ . **D**  $u_n = 7 - 3n$ .

$$\mathbf{B}u_n = \frac{7}{3n}.$$

$$\bigcirc u_n = 7 - 3^n$$

$$\bigcirc u_n = 7 - 3n$$

CÂU 14. Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp số cộng với công sai khác 0 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q. Tìm q.

$$\mathbf{C}q = \frac{3}{2}.$$

$$\mathbf{D}q=2.$$

**CÂU 15.** Ba số x, y, z lập thành một cấp số cộng và có tổng bằng 21. Nếu lần lượt thêm các số 2, 3, 9 vào ba số đó (theo thứ tự của cấp số cộng) thì được ba số lập thành một cấp số nhân. Tính  $F = x^2 + y^2 + z^2$ .

$$(A)$$
  $F = 389$  hoặc  $F = 395$ .

**B** 
$$F = 395 \text{ hoăc } F = 179.$$

$$(\mathbf{C})F = 441 \text{ hoặc } F = 357.$$

$$(\mathbf{D})F = 389 \text{ hoăc } F = 179.$$

### Dạng 5. Tính tống của cấp số nhân

Phương pháp

- $\bigcirc$  Xác định số hạng đầu  $u_1$ , công bội q.
- ❷ Áp dụng công thức tính tổng các số hạng của cấp số nhân.

### 1. Ví du mâu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Tính tổng  $10 \text{ số hạng đầu tiên của cấp số nhân } (u_n)$ , biết  $u_1 = -3 \text{ và công}$ bội q=-2.

**VÍ DỤ 2 (TH).** Tính tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân  $(u_n)$ , biết  $u_1 = 3$  và  $u_2 = 6$ .

**VÍ DỤ 3 (TH).** Tính tổng vô hạn  $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + ... + \frac{1}{2^n} + ...$ 

$\sim$ 1	JICE	/	$\triangle$ T	
				_

**VÍ DỤ 4 (VD).** Tính tổng 200 số hạng đầu tiên của dãy số  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_1=1\\ u_{n+1}=3u_n \end{cases}$ 

**VÍ DU 5 (VD).** Một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 3$ , công bội q = 2. Biết  $S_n = 765$ , tìm n.

### 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 3$  và công bội q = 2. Tính tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân.

**BÀI 2.** Một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 1$  và công bội q = 3. Tính  $S_{10}$ .

**BÀI 3.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1=4$  và công bội q=2. Tính  $S_{20}$ .

**BÀI 4.** Tính tổng  $S = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^n} + \dots$ .

**BÀI 5.** Cho cấp số nhân có q = -3,  $S_6 = 730$ . Tính  $u_1$ .

**BAI 6.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1=-5, u_2=10$ . Tính tổng của 15 số hạng đầu của cấp số nhân đó.

**BÀI 7.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1=2, u_2=-2$ . Tính tổng của 9 số hạng đầu của cấp số

**BÀI 8.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_3=8, u_5=32$  và công bội q>0. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

**BÁI 9.** Tính tổng S = 2 + 6 + 18 + ... + 13122.

**BÀI 10.** Tính tổng  $S = 1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 1024$ .

**BÀI 11.** Một cấp số nhân có  $u_1 = 1, q = 3$ , biết  $S_n = 3280$ . Tìm n.

**BÁI 12.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_4 + u_6 = -540, u_3 + u_5 = 180$ . Tính  $S_5$ .

BÀI 13. Bốn số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, trong đó số hạng thứ hai nhỏ hơn số hạng thứ nhất 35, còn số hạng thứ ba lớn hơn số hạng thứ tư 560. Tìm tổng của bốn số hạng trên, biết công bội mang giá trị dương.

**BÀI 14.** Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn bằng  $\frac{1}{4}$ , tổng ba số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó bằng  $\frac{7}{27}$ . Tổng của số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó bằng

BÁI 15. Một du khách vào trường đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20.000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi số tiền lần đặt trước. Người đó thua 10 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 11. Hỏi du khách trên thắng hay thua bao nhiêu tiền?

## Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho cấp số nhân  $u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n$  với công bội  $q \ (q \neq 0, q \neq 1)$ . Đặt

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n.$$

Khẳng định nào sau đây là đúng?

$$\mathbf{\hat{A}} S_n = \frac{u_1 \left(q^n - 1\right)}{q - 1}.$$

$$\mathbf{\hat{C}} S_n = \frac{u_1 \left(q^{n-1} - 1\right)}{q + 1}.$$

$$\mathbf{B} S_n = \frac{u_1 \left(q^n + 1\right)}{q+1}.$$

$$\mathbf{D} S_n = \frac{u_1 \left(q^{n-1} - 1\right)}{q-1}.$$

**CÂU 2.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = 12$  và công sai  $q = \frac{3}{2}$ . Tổng 5 số hạng 

$$\frac{93}{4}$$
.

$$\frac{633}{2}$$

$$\bigcirc \frac{633}{4}$$
.

$$\bigcirc \frac{93}{2}.$$

**CẦU 3.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1=3$ , công bội q=-2. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân  $(u_n)$ .

$$\bigcirc$$
 -1023.

**CÂU 4.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_2 = -2$  và  $u_5 = 54$ . Tính tổng 1000 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

CÂU 5. Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết số hạng đầu bằng 18, số hạng thứ hai bằng 54 và số hạng cuối bằng 39366.

- **(B)** 59040.
- **(C)**177138.

**CÂU 6.** Dãy số  $(u_n)$  xác định bởi  $\begin{cases} u_1=1\\ u_{n+1}=\frac{1}{2}u_n \end{cases}$  với  $n\geq 1$ . Tính tổng  $S=u_1+u_2+\cdots+1$ 

**CÂU 7.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -6$  và q = -2. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho bằng 2046. Tìm n.

- (A)n = 9.
- **(B)**n = 12.
- (c)n = 11.

**CÂU 8.** Tổng 100 số hạng đầu của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = 2n - 1$  là

- $(\mathbf{B})2^{100}-1.$
- **(C)**10000.

**CÂU 9.** Cho dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$ . Tính  $S_{2019} = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + u$ 

**CÂU 10.** Cho  $S = 11 + 101 + 1001 + \cdots + 1000 \dots 01$ . Khẳng định nào sau đây là đúng? (n-1) chữ số 0

- $\mathbf{B}S = 10\left(\frac{10^n 1}{9}\right) n.$
- $\bigcirc S = 10 \left( \frac{10^n 1}{9} \right) + n.$

**CÂU 11.** Gọi  $S=1+11+111+\cdots+\underbrace{111\ldots 1}_{(n\text{ số }1)}$  thì S nhận giá trị nào sau đây?

- $\mathbf{A} S = \frac{1}{9} \left[ 10 \left( \frac{10^n 1}{9} \right) n \right].$
- $\mathbf{B}S = \frac{10^n 1}{21}.$
- $\bigcirc S = 10 \left( \frac{10^n 1}{81} \right) n.$

**CÂU 12.** Cho dãy số  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = 2u_{n-1} + 1, n \geq 2 \end{cases}$ . Tổng  $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{20}$ 

- - $\mathbf{A}$   $2^{21} 20$ .
- $(\mathbf{B})2^{21}-22.$
- $(\mathbf{C})2^{20}.$

**CÂU 13.** Biết rằng  $S = 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \dots + 11 \cdot 3^{10} = a + \frac{21 \cdot 3^b}{4}$ . Tính  $P = a + \frac{b}{4}$ . **(a)** P = 3. **(b)** P = 4. **(c)** P = 1.

## Dạng 6. Kết hợp cấp số cộng và cấp số nhân

Nhắc lại tính chất CSC, CSN

- $\odot$  3 số a, b, c theo thứ tự lập thành CSC thì a + c = 2b.
- $\odot$  3 số a, b, c theo thứ tự lập thành CSN thì  $a.c = b^2$ .

## 1. Ví du mẫu

**VÍ DU 1 (TH).** Ba số x, y, z theo thứ tự đó lập thành một CSN với công bội  $q(q \neq 1)$ , đồng thời các số x, 2y, 3z theo thứ tự đó lập thành một CSC với công sai d. Hãy tìm q?

**VÍ DU 2 (TH).** Biết rằng a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một CSC và a, c, b là ba số hạng liên tiếp của một CSN, đồng thời a + b + c = 30. Tìm a, b, c.

QUICK NOTE	<b>VÍ DỤ 3 (VD).</b> Ba số $x, y, z$ theo thứ tự đó lập thành một CSN. Ba số tự đó lập thành CSN. Đồng thời các số $x, y - 4, z - 9$ theo thứ tự đó l $x, y, z$ .
	<b>VÍ DỤ 4 (VD).</b> Cho $a,b,c$ là ba số hạng liên tiếp của một CSN và $a,b$ liên tiếp của một CSC, đồng thời $a,b-1,c-5$ là ba số hạng liên tiếp $a,b,c$ biết $a,b,c$ là các số nguyên.
	<b>VÍ DỤ 5 (VDC).</b> Cho 4 số nguyên dương, trong đó 3 số đầu lập thành sau thành lập CSN. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối là hạng giữa là 36. Tìm tổng 4 số đó
	2. Bài tập tự luận
	<b>BÀI 1.</b> Biết $x, y, x+4$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng và $x+1, y+1$ lập thành cấp số nhân với $x, y$ là số thực dương. Tính $x+y$ .
	<b>BÀI 2.</b> Cho 3 số $a, b, c$ theo thứ tự tạo thành một cấp số nhân với cố cũng theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ cộng với công sai $d \neq 0$ . Tính $\frac{a}{d}$ .
	<b>BÀI 3.</b> Tìm tích các số dương $a$ và $b$ sao cho $a, a+2b, 2a+b$ lập thành
	$(b+1)^2$ , $ab+5$ , $(a+1)^2$ lập thành một cấp số nhân.
	<b>BÁI 4.</b> $a,b,c$ $(a \neq b \neq c)$ là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng và liên tiếp của một cấp số nhân, đồng thời $a.b.c = 125$ . Tìm $a,b,c$ .
	BÀI 5. Một cấp số cộng và một cấp số nhân đều là các dãy tăng các số
	hai dãy số đều bằng 3, các số hạng thứ hai bằng nhau. Tỉ số giữa các CSN và CSC là $\frac{9}{5}$ . Tìm tích ba số hạng của cấp số cộng thỏa mãn tính
	5. This tien but so hang cut cup to cong thou must think
	<b>BÁI 6.</b> Một CSC và CSN đều có số hạng đầu tiên là bằng 5, số hạng thơn số hạng thứ hai của CSN là 10, còn các số hạng thứ 3 của hai cấ
	Tìm tổng các số hạng của cấp số cộng biết công bội của cấp số nhân ki
	BÀI 7. Ba số khác nhau có tổng bằng 114 có thể coi là ba số hạng liên
	hoặc coi là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ hai mươi lăm của một CSC
	<b>BÀI 8.</b> Ba số khác nhau có tổng là 217 có thể coi là các số hạng liên hoặc là các số hạng thứ 2 thứ 9 và thứ 44 của một CSC. Tìm 3 số đó.
	<b>BAI 9.</b> $a, b, c$ là ba số hạng liên tiếp của một CSN và $a, b + 2, c + 9$ là của một CSC, đồng thời $a, b + 2, c$ là ba số hạng liên tiếp của một CSN
	<b>BÀI 10.</b> Một CSC và CSN có cùng các số hạng thứ $m+1$ , thứ $n+1$
	hạng này là 3 số dương $a,b,c$ . Tính $T=a^{b-c}.b^{c-a}.c^{a-b}$ .
	<b>BÀI 11.</b> Tìm $m$ dương để phương trình $x^3 + (5-m)x^2 + (6-5m)x$
	nghiệm phân biệt lập thành cấp số nhân.
	<b>BÀI 12.</b> Tìm tham số $m$ để phương trình $x^3 - (2m+1)x^2 + 2mx = 0$
	biệt lập thành một cấp số cộng, biết $m < 0$ .
	3. Câu hỏi trắc nghiệm
	<b>CÂU 1.</b> Các số $x+6y$ , $5x+2y$ , $8x+y$ theo thứ tự đó lập thành một cấ
	các số $x - 1$ , $y + 2$ , $x - 3y$ theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. (A) $x^2 + y^2 = 25$ . (B) $x^2 + y^2 = 40$ . (C) $x^2 + y^2 = 100$ . (1)
	<b>CÂU 2.</b> Cho hai số dương $a$ và $b$ không vượt quá 10 sao cho $a - b$ ; 2 thành một cấp số cộng và $a + b$ ; $3a - 2b$ ; $5a$ theo thứ tự lập thành mộ
	giá trị của $S = a + b$ .
	<b>A</b> $S = 8$ . <b>B</b> $S = 20$ . <b>C</b> $S = 7$ .
	CÂU 3. Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp
	khác 0 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội $q$ . Tìm c
	<b>B</b> $q = 2$ . <b>C</b> $q = \frac{3}{2}$ .

x, y-4, z theo thứ ập thành CSC. Tìm

c, c-4 là ba số hạng của một CSN. Tìm

một CSC, 3 số hạng 37, tổng của hai số

1,2y+2 theo thứ tự

ng bội khác 1. Biết tám của một cấp số

một cấp số cộng và

b, c, a là ba số hạng

ố hạng thứ nhất của số hạng thứ ba của chất trên.

thứ hai của CSC lớn p số thì bằng nhau. hông âm.

n tiếp của một CSN, C. Tìm ba số đó.

n tiếp của một CSN

ba số hạng liên tiếp khác. Tìm a.

1, thứ p+1 và 3 số

-6m = 0 (\*) có 3

\*) có 3 nghiệm phân

p số cộng, đồng thời Tính  $x^2 + y^2$ .

$$\mathbf{D}x^2 + y^2 = 10.$$

2; b theo thứ tự tạo t cấp số nhân. Tính

$$\bigcirc S = 5.$$

số cộng với công sai

$$\bigcirc q = -\frac{3}{2}$$

**CÂU 4.** Cho ba số a, b, c theo thứ tự tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết cũng theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng công sai là  $s \neq 0$ . Tính  $\frac{a}{s}$ 

(**A**)3.

**(C**)9.

 $\bigcirc \frac{4}{3}$ 

**CÂU 5.** Xét các số thực dương a, b sao cho -25, 2a, 3b là cấp số cộng và 2, a + 2, b - 3 là cấp số nhân. Khi đó  $a^2 + b^2 - 3ab$  bằng

(**A**) 76.

**(C)**31.

(**D**)59.

**CÂU 6.** Cho ba số x; 5; 2y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và ba số x; 4; 2y theo thứ tự lập thành cấp số nhân thì |x-2y| bằng

(**A**) 10.

(**B**)8.

**(C**)9.

 $(\mathbf{D})6.$ 

**CÂU 7.** Cho dãy số tăng a, b, c ( $c \in \mathbb{Z}$ ) theo thứ tự lập thành cấp số nhân; đồng thời a, b+8, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng và a, b+8, c+64 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức P = a - b + 2c.

 $\bigcirc P = \frac{184}{9}.$ 

**B** P = 64. **C**  $P = \frac{92}{9}$ . **D** P = 32.

**CÂU 8.** Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết tổng ba số hạng đầu bằng  $\frac{148}{9}$ , đồng thời theo thứ tự đó a, b, c lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng. Tính giá trị của biểu thức T=a-b+c-d.

 $\mathbf{A}T = -\frac{101}{27}$ .

 $\mathbf{C}T = -\frac{100}{27}.$   $\mathbf{D}T = \frac{101}{27}.$ 

**CÂU 9.** Cho x và y là các số nguyên thỏa mãn các số x+6y, 5x+2y, 8x+y theo thứ tự lập thành cấp cộng và các số  $x - \frac{5}{3}y$ , y - 1, 2x - 3y theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính tổng S = 2x + 3y.

(A)9.

 $(\mathbf{B})6.$ 

 $(\mathbf{c})_{-6}$ .

(**D**) = 9.

🖶 Dạng 7. Bài toán thực tế

# 1. Ví du mẫu

**VÍ DU 1 (TH).** Dân số trung bình của Việt Nam năm 2020 là 97,6 triệu người, tỉ lệ tăng dân số là 1,14%/năm.

(Nguồn: Niên giám thống kê của Việt Nam năm 2020, NXB Thống kê, 2021)

Giả sử tỉ lệ tăng dân số không đổi qua các năm.

- a) Sau 1 năm, dân số của Việt Nam sẽ là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
- b) Viết công thức tính dân số Việt Nam sau n năm kể từ năm 2020.

VI DU 2 (TH). Bác Linh gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng tiền tiết kiệm với hình thức lãi kép, kì hạn 1 năm với lãi suất 6%/năm. Viết công thức tính số tiền (cả gốc và lãi) mà bác Linh có được sau n năm (giả sử lãi suất không thay đổi qua các năm).


VÍ DU 3 (VD). Một hình vuông có cạnh 1 đơn vị dài được chia thành chín hình vuông nhỏ hơn và hình vuông ở chính giữa được tô màu xanh như hình. Mỗi hình vuông nhỏ hơn lại được chia thành chín hình vuông con, và mỗi hình vuông con ở chính giữa lại được tô màu xanh. Nếu quá trình này được tiếp tục lặp lại năm lần, thì tổng diện tích các hình vuông được tô màu xanh là bao nhiêu?

Ì	Ì		ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ			Ì	Ì	Ì	Ì	Ì	Ì	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	ĺ	

QUICK NOTE	
	<b>VÍ DỤ 4 (TH).</b> Một khay nước có nhiệt độ $23^{\circ}$ được đặt vào ngăn đá của tủ lạnh. Biết sau mỗi giờ, nhiệt độ của nước giảm $20\%$ . Tính nhiệt độ của khay nước đó sau 6 giờ theo đơn vị độ $C$ .
	<b>VÍ DỤ 5 (TH).</b> Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ poloni 210 là 138 ngày, nghĩa là sau 138 ngày, khối lượng của nguyên tố đó chi còn một nửa (theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Poloni-210). Tính khối lượng còn lại của 20 gam poloni 210 sau:
	a) 690 ngày; b) 7314 ngày (khoảng 20 năm).
	<b>VÍ DỤ 6 (TH).</b> Tế bào E.Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Hỏi sau 24 giờ, tế bào ban đầu sẽ phân chia thành bao nhiều tế bào?
	2. Bài tập tự luận
	<b>BÀI 1 (TH).</b> Một quốc gia có dân số năm 2011 là $P$ triệu người. Trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm dân số tăng $a\%$ . Chứng minh rằng dân số các năm từ năm 2011 đến năm 2021 của quốc gia đó tạo thành cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân này.
	<b>BÀI 2 (TH).</b> Vào năm 2020, dân số của một quốc gia là khoảng 97 triệu người và tốc độ tăng trưởng dân số là 0,91%. Nếu tốc độ tăng trưởng dân số này được giữ nguyên hằng năm, hãy ước tính dân số của quốc gia đó vào năm 2030.
	<b>BÀI 3 (TH).</b> Một tỉnh có 2 triệu dân vào năm 2020 với tỉ lệ tăng dân số là 1 %/năm. Gọi $u_n$ là số dân của tỉnh đó sau $n$ năm. Giả sử tỉ lệ tăng dân số là không đổi.
	a) Viết công thức tính số dân của tỉnh đó sau $n$ năm kể từ năm 2020.
	b) Tính số dân của tỉnh đó sau 10 năm kể từ năm 2020.
	<b>BÀI 4 (TH).</b> Giả sử một thành phố có dân số năm 2022 là khoảng 2,1 triệu người và tốc độ gia tăng dân số trung bình mỗi năm là 0,75%.
	a) Dự đoán dân số của thành phố đó vào năm 2032;
	b) Nếu tốc độ gia tăng dân số vẫn giữ nguyên như trên thì uớc tính vào năm nào dân số của thành phố đó sẽ tăng gấp đôi so với năm 2022?
	<b>BÀI 5 (TH).</b> Giả sử anh Tuấn kí hợp đồng lao động trong 10 năm với điều khoản về tiền lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Tuấn là 60 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Tuấn được tăng lên 8%. Tính tổng số tiền lương anh Tuấn lĩnh được trong 10 năm đi làm (đơn vị: triệu đồng, làm tròn đến hàng phần nghìn).
	<b>BÀI 6 (TH).</b> Một công ty xây dựng mua một chiếc máy ủi với giá 3 tỉ đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá trị của chiếc máy ủi này lại giảm 20% so với giá trị của nó trong năm liền trước đó. Tìm giá trị còn lại của chiếc máy ủi đó sau 5 năm sử dụng.
	<b>BÀI 7 (TH).</b> Một gia đình mua một chiếc ô tô giá 800 triệu đồng. Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của ô tô giảm đi 4% (so với năm trước đó).
	a) Viết công thức tính giá trị của ô tô sau 1 năm, 2 năm sử dụng.
	b) Viết công thức tính giá trị của ô tô sau $n$ năm sử dụng.
	c) Sau 10 năm, giá trị của ô tô ước tính còn bao nhiêu triệu đồng?

#### **BÀI 8 (VD).**

Một người nhảy bungee (một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây đai an toàn buộc xung quanh người) từ một cây cầu và căng một sợi dây dài 100 m. Sau mỗi lần rơi xuống, nhờ sự đàn hồi của dây, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75%so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên. Tính tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần kéo lên và lại rơi xuống.



BÀI 9 (TH). Một cái tháp có 11 tầng. Diện tích của mặt sàn tầng 2 bằng nửa diện tích của mặt đáy tháp và diện tích của mặt sàn mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt sàn mỗi tầng ngay bên dưới. Biết mặt đáy tháp có diện tích là  $12288m^2$ . Tính diện tích của mặt sàn tầng trên cùng của tháp theo đơn vị mét vuông.

### BÀI 10 (TH).

Cho hình vuông  $C_1$  có cạnh bằng 4. Người ta chia mỗi cạnh hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông  $C_2$ . Từ hình vuông  $C_2$  lại làm tiếp tục như trên để có hình vuông  $C_3$ . Cứ tiếp tục quá trình như trên, ta nhận được dãy các hình vuông  $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n, \dots$  Gọi  $a_n$  là độ dài cạnh hình vuông  $C_n$ . Chứng minh rằng dãy số  $(a_n)$  là cấp số nhân.



BÁI 11 (TH). Một cây đàn organ có tần số âm thanh các phím liên tiếp tạo thành một cấp số nhân. Cho biết tần số phím La trung là 400 Hz và tần số của phím La cao cao hơn 12 phím là 800 Hz (nguồn: https://vi.wikipedia.org/wikiOrgan). Tìm công bội của cấp số nhân nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

BÁI 12 (VD). Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dung ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là 50 mg, và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày kề trước đó. Tính tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp.

# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

#### CÂU 1.


Cho hình vuông có cạnh là 1. Nối các trung điểm của hình vuông trên ta được một hình vuông có diện tích  $S_1$ , tiếp tục quá trình trên với các hình vuông với diện tích là  $S_2$ ;  $S_3$ ;  $S_n$ ; .... Tính tổng vô hạn  $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n + \dots$ .

(A) 2. (B)  $\frac{1}{2}$ . (C) 1. (D)  $\frac{3}{2}$ .









**CÂU 2.** Cho n là số nguyên dương và n tam giác  $A_1B_1C_1, A_2B_2C_2, \ldots, A_nB_nC_n$ , trong đó các điểm lần  $A_{i+1}, B_{i+1}, C_{i+1}$  lượt nằm trên các cạnh  $B_iC_i, A_iC_i, A_iB_i (i=1,2,\ldots,n-1)$ sao cho  $A_{i+1}C_i=3A_{i+1}B_i, B_{i+1}A_i=3B_{i+1}C_i, C_{i+1}B_i=3C_{i+1}A_i.$  Gọi S là tổng tất cả các diện tích của tam giác  $A_1B_1C_1, A_2B_2C_2, \ldots, A_nB_nC_n$  biết rằng tam giác  $A_1B_1C_1$  có diện tích bằng  $\frac{9}{16}$ . Tìm số nguyên dương sao cho  $S=\frac{16^{29}-7^{29}}{16^{29}}$ .



**(B)** n = 2018.

$\bigcirc n$	=	30.
--------------	---	-----

$$\bigcirc n = 29.$$

CÁU 3. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện của mặt trên tầng ngay bên dưới và diện tích tầng 1 bằng nửa diện tích của để tháp. Biết để tháp có diện tích là 12288 m<sup>2</sup>. Tính diện tích mặt trên cùng.

 $(B)6 \, m^2$ .

 $(\mathbf{C})10\,\mathrm{m}^2$ .

**CÂU 4.** Cho tứ giác ABCD có bốn góc tạo thành cấp số nhân có công bội q=2. Góc có số đo nhỏ nhất trong bốn góc đó là

0.40
24

(**B**)1°.

**(C**)12°.

(**D**)30°.

QUICK NOTE	CÂL
	lần s lần t
	CÂL
	theo
	CÂL
	năm sau
	Sau
	CÂL
	cao
	mà l đến
	A
	CÂL
	hàng
	khôr
	gia o
	CÂL
	A
	CÂL
	A
	CÂL
	A
	CÂL
	A
	CÂL
	(A
	CÂL
	này

🕽 5. Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu tiên đặt 20000 đồng, mỗi sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cược trước. Người đó thua lần 9 liên tiếp và thắng ở thứ 10. Hỏi du khách đó thắng hay thua bao nhiêu tiền?

Thắng 20000 đồng.

(B) Thua 40000 đồng.

Hòa vốn.

(**D**)Thua 20000 đồng.

**J 6.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy BC, đường cao AH và cạnh bên ABthứ tự đó lập thành cấp số nhân công bội q. Giá trị của q là

**B**)
$$q = \sqrt{2} + 1$$
.

$$\mathbf{C} q = \sqrt{2(\sqrt{2}+1)}.$$

🕽 7. Giả sử một người đi làm được lĩnh lương khởi điểm là 2.000.000 đồng/tháng. Cứ 3 người ấy lại được tăng lương một lần với mức tăng bằng 7% của tháng trước đó. Hỏi 36 năm làm việc người ấy lĩnh được tất cả bao nhiêu tiền?

1.287.968.492 đồng.

**B**) 10.721.769.110 đồng.

 $7,068289036 \cdot 10^8$  đồng.

(**D**)429.322.830.5 đồng.

 ${f J}$ 8. Từ độ cao 55,8 (mét) của tháp nghiên Pisa nước Italia người ta thả một quả bóng su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất bóng lại nảy lên độ cao bằng  $\frac{1}{10}$  độ cao bóng đạt trước đó. Tổng độ dài hành trình (mét) của bóng được thả từ lúc ban đầu cho khi nó nằm yên trên mặt đất thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(69; 72).

**(B)** (60; 63).

 $(\mathbf{C})(67;69).$ 

 $(\mathbf{D})(64;66).$ 

🕽 9. Một gia đình lập kế hoạch tiết kiệm như sau: Họ lập một sổ tiết kiệm tại một ngân g và cứ đầu mỗi tháng họ gửi vào sổ tiết kiệm đó 15 triệu đồng. Giả sử lãi suất tiền gửi ng đổi là  $0,6~\%/ ext{tháng}$  và tiền gửi được tính lãi theo hình thức lãi kép. Hỏi sau  $3~ ext{năm}$ đình đó tiết kiệm được số tiền gần nhất với con số nào dười đây?

(a) 543240000 đồng. (b) 589269000 đồng. (c) 669763000 đồng. (d) 604359000 đồng.

# **ÔN TẬP CHƯƠNG 2**

**J 1.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = (-1)^n . 2n$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

$$(A)u_1 = -2.$$

$$\mathbf{a} u_1 = -2.$$
  $\mathbf{B} u_2 = 4.$ 

$$\mathbf{C}u_3 = -6.$$
  $\mathbf{D}u_4 = -8.$ 

$$\mathbf{D}u_4 = -8.$$

**U 2.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = (-1)^n \cdot \frac{2^n}{n}$ . Tìm số hạng  $u_3$ .

$$u_3 = -2$$

**B** 
$$u_3 = 2$$
. **C**  $u_3 = -2$ . **D**  $u_3 = -\frac{8}{3}$ .

**J 3.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{2n+5}{5n-4}$ . Số  $\frac{7}{12}$  là số hạng thứ mấy của dãy số?

**J 4.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = 2^n$ . Tìm số hạng  $u_{n+1}$ .

$$\mathbf{B} u_{n+1} = 2^n + 1$$

$$\mathbf{b} u_{n+1} = 2^n.2.$$
  $\mathbf{b} u_{n+1} = 2^n + 1.$   $\mathbf{c} u_{n+1} = 2(n+1).$   $\mathbf{b} u_{n+1} = 2^n + 2.$ 

$$\mathbf{D}$$
 $u_{n+1} = 2^n + 2.$ 

**J 5.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = 5^{n+1}$ . Tìm số hạng  $u_{n-1}$ .

$$\mathbf{A} u_{n-1} = 5^{n-1}.$$

$$\mathbf{B} u_{n-1} = 5^n.$$

$$\mathbf{b} u_{n-1} = 5^{n-1}.$$
  $\mathbf{b} u_{n-1} = 5^n.$   $\mathbf{c} u_{n-1} = 5.5^{n+1}.$   $\mathbf{b} u_{n-1} = 5.5^{n-1}.$ 

f J6. Cho dãy số có các số hạng đầu là -2;0;2;4;6;... Số hạng tổng quát của dãy số là công thức nào dưới đây?

$$\mathbf{A} u_n = -2n$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_n = n - 2.$ 

**B** 
$$u_n = n - 2$$
. **C**  $u_n = -2(n+1)$ . **D**  $u_n = 2n - 4$ .

$$\mathbf{D})u_n = 2n - 4$$

**CÂU 7.** Cho dãy số  $(u_n)$ , được xác định  $\begin{cases} u_1=\frac{1}{2}\\u_{n+1}=u_n-2 \end{cases}$ . Số hạng tổng quát  $u_n$  của dãy

số là số hạng nào dưới đây?

$$\mathbf{\hat{A}} u_n = \frac{1}{2} + 2(n-1).$$

$$\mathbf{\hat{C}} u_n = \frac{1}{2} - 2n.$$

$$\mathbf{B} u_n = \frac{1}{2} - 2(n-1).$$

$$\mathbf{D} u_n = \frac{1}{2} + 2n.$$

$$\mathbf{c} u_n = \frac{\tilde{1}}{2} - 2n$$

**CÂU 8.** Cho dãy số  $(u_n)$ , được xác định  $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_{n+1} = -2 - \frac{1}{u_n} \end{cases}$ . Số hạng tổng quát  $u_n$  của dãy

số là số hạng nào dưới đây?

$$\mathbf{A} u_n = \frac{-n+1}{n}$$

$$\mathbf{B} u_n = \frac{n+1}{n}$$

$$\mathbf{C}u_n = -\frac{n+1}{n}$$

$$\mathbf{A} u_n = \frac{-n+1}{n}$$
.  $\mathbf{B} u_n = \frac{n+1}{n}$ .  $\mathbf{C} u_n = -\frac{n+1}{n}$ .  $\mathbf{D} u_n = -\frac{n}{n+1}$ .

**CÂU 9.** Cho cấp số cộng có số hạng đầu  $u_1=-\frac{1}{2}$ , công sai  $d=\frac{1}{2}$ . Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số này là.

$$\mathbf{A} - \frac{1}{2}; 0; 1; \frac{\hat{1}}{2}; 1.$$

$$-\frac{1}{2}$$
; 0;  $\frac{1}{2}$ ; 0;  $\frac{1}{2}$ .

$$\frac{1}{2}$$
; 1;  $\frac{3}{2}$ ; 2;  $\frac{5}{2}$ 

CÂU 10. Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số

- (A) 7; 12; 17.
- (**B**)6; 10; 14.
- **(C)**8; 13; 18.
- $(\mathbf{D})6; 12; 18.$

**CÂU 11.** Biết các số  $C_n^1$ ;  $C_n^2$ ;  $C_n^3$  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với n > 3. Tìm

$$(\mathbf{B})n=7.$$

$$(\mathbf{c})n = 9.$$

$$(\mathbf{D})n = 11.$$

**CÂU 12.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có các số hạng đầu lần lượt là  $5; 9; 13; 17; \dots$  Tìm số hạng tổng quát  $u_n$  của cấp số cộng.

$$\mathbf{A} u_n = 5n + 1.$$
  $\mathbf{B} u_n = 5n - 1.$ 

$$(\mathbf{B})u_n = 5n - 1.$$

$$\bigcirc u_n = 4n + 1.$$

$$\bigcirc u_n = 4n - 1.$$

**CÂU 13.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 3$  và  $d = \frac{1}{2}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

$$\mathbf{B} u_n = -3 + \frac{1}{2}n - 1.$$

$$\mathbf{C}$$
 $u_n = -3 + \frac{1}{2}(n-1).$ 

CÂU 14. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

$$\mathbf{A} u_7 = 7 - 3n.$$

**B** 
$$u_7 = 7 - 3^n$$
. **C**  $u_7 = \frac{7}{3n}$ .

**CÂU 15.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -5$  và d = 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$\mathbf{A}u_{15} = 34.$$

$$\mathbf{B}u_{15} = 45.$$

$$u_{13} = 31.$$

$$\mathbf{D}u_{10} = 35.$$

**CÂU 16.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có d = -2 và  $S_8 = 72$ . Tìm số hạng đầu tiên  $u_1$ . **A**  $u_1 = 16$ . **B**  $u_1 = -16$ . **C**  $u_1 = \frac{1}{16}$ . **D**  $u_1 = -\frac{1}{1}$ 

$$\mathbf{A}u_1 = 16$$

$$\mathbf{B}u_1 = -16.$$

$$\mathbf{C}$$
 $u_1 = \frac{1}{16}$ .

$$\mathbf{D}u_1 = -\frac{1}{16}.$$

CÁU 17. Một cấp số cộng có số hạng đầu là 1, công sai là 4, tổng của n số hạng đầu là 561. Khi đó số hạng thứ n của cấp số cộng đó là  $u_n$  có giá trị là bao nhiêu?

$$\bigcirc u_n = 57.$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_n = 61.$ 

$$u_n = 65.$$

$$\bigcirc u_n = 69.$$

**CÂU 18.** Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là  $S_n = \frac{3n^2 - 19n}{4}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ . Tìm số hạng đầu tiên  $u_1$  và công sai d của cấp số cộng đã cho.

$$\mathbf{A} u_1 = 2, d = -\frac{1}{2}.$$

$$\mathbf{B}u_1 = -4, d = \frac{3}{2}.$$

$$\mathbf{C}u_1 = -\frac{3}{2}, d = -2.$$

**CÂU 19.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_2 = 2001$  và  $u_5 = 1995$ . Khi đó  $u_{1001}$  bằng.

$$\mathbf{A}u_{1001} = 4005.$$

$$\mathbf{B}$$
) $u_{1001} = 4003$ .

$$\mathbf{C}u_{1001} = 3.$$

$$\mathbf{D}u_{1001} = 1.$$

**CÂU 20.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  biết  $u_n = -1, u_{n+1} = 8$ . Tính công sai d của cấp số cộng đó.

$$\bigcirc d = 7.$$

$$\bigcirc d = 9.$$

**CÂU 21.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $u_2 + u_{23} = 60$ . Tính tổng  $S_24$  của 24 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.

$$(A)S_{24} = 60.$$

$$(\mathbf{B})S_{24} = 120.$$

$$\mathbf{C}S_{24} = 720.$$

$$\bigcirc S_{24} = 1440.$$

CÂU 22. Một cấp số cộng có 6 số hạng. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 17, tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ tư bằng 14. Tìm công sai d của câp số cộng đã cho.

$$\mathbf{B}$$
) $d = -3$ .

$$cd = 4.$$

	CI	//	м	$\boldsymbol{\frown}$	-
			IXI		
U.			III I	v	

**CÂU 23.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_7 - u_3 = 8 \\ u_2 u_7 = 75 \end{cases}$ . Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho.  $\mathbf{B}$   $d = \frac{1}{2}$ . (c)d = 2. $(\mathbf{D})d = 3.$ CÂU 24. Ba góc của một tam giác vuông tạo thành cấp số cộng. Hai góc nhọn của tam giác có số đo (độ) là  $\triangle 20^{\circ}$  và  $70^{\circ}$ . **B** 45° và 45°. **(c)**20° và 45°. **D**30° và 60°. **CÂU 25.** Một tam giác vuông có chu vi bằng 3 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là  $\frac{1}{2}$ ; 1;  $\frac{3}{2}$ .  $\bigcirc \frac{3}{4}; 1; \frac{5}{4}.$   $\bigcirc \frac{1}{4}; 1; \frac{7}{4}.$ **CÂU 26.** Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế? **(B)**1792.  $(\mathbf{C})2055.$ (**D**)3125. CÂU 27. Người ta trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây,... .Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng (**A**) 73. (**B**)75. (**D**)79. CÂU 28. Một chiếc đồng hồ đánh chuông, kể từ thời điểm 0 (giờ) thì sau mỗi giờ thì số tiếng chuông được đánh đúng bằng số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông? (A) 78. (**B**)156. **(C)**300. CÁU 29. Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn  $\hat{o}$  thứ hai là 5,... và cứ thế tiếp tục đến  $\hat{o}$  thứ n. Biết rằng đặt hết số  $\hat{o}$  trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô vuông? (A) 98. (B) 100. CÂU 30. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ 2 giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50 mét mới có nước. Vậy hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan cái giếng đó? (A) 5.250.000 đồng. (**B**) 10.125.000 đồng. (**C**) 4.00.000 đồng.  $(\mathbf{D})4.245.000$  đồng. CÂU 31. Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 16 và 36. Số hạng tiếp theo là (A) 720. **(B)**81. **(C)**64. **CÂU 32.** Tìm x để các số 2; 8; x; 128 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. **(B)** x = 32.  $(\mathbf{C})x = 64.$ **CÂU 33.** Tìm tất cả giá trị của x để ba số 2x - 11; x; 2x + 1 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.  $\mathbf{A} x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$ **B** $x = \pm \frac{1}{2}$ .  $\mathbf{C})x = \pm \sqrt{3}.$ **CAU 34.** Với giá trị x, y nào dưới đây thì các số hạng lần lượt là -2; x; -18; y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân? **CÂU 35.** Hai số hang đầu của của một cấp số nhân là 2x + 1 và  $4x^2 - 1$ . Số hang thứ ba của cấp số nhân là. **B** 2x + 1. **D**  $8x^3 + 4x^2 - 2x - 1$ . **(A)** 2x - 1. (c)8 $x^3 - 4x^2 - 2x + 1.$ **CÂU 36.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào là một cấp  $\mathbf{A} u_n = \frac{1}{3^{n-2}}. \qquad \mathbf{B} u_n = \frac{1}{3^n} - 1. \qquad \mathbf{C} u_n = n + \frac{1}{3}. \qquad \mathbf{D} u_n = n^2 - \frac{1}{3}.$ 

CÂU 37. Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

$$\mathbf{A} q = 3.$$

$$\mathbf{B}$$
 $q=-3.$ 

$$\mathbf{C}$$
) $q=2$ .

$$\mathbf{D}q = -2.$$

**CÂU 38.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -3$  và  $q = \frac{2}{3}$  Mệnh đề nào sau đây đúng.

(A) 
$$u_5 = -\frac{27}{16}$$
. (B)  $u_5 = -\frac{16}{27}$ . (C)  $u_5 = \frac{16}{27}$ . (D)  $u_5 = \frac{27}{16}$ 

$$\mathbf{B}u_5 = -\frac{16}{27}$$

$$\mathbf{C}u_5 = \frac{16}{27}$$

$$\mathbf{D}u_5 = \frac{27}{16}$$

**CÂU 39.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1=3$  và q=-2. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho.

(**A**) 5.

 $(\mathbf{B})6.$ 

 $(\mathbf{C})7.$ 

(D)Không là số hạng của cấp số đã cho.

CÂU 40. Một cấp số nhân có công bội bằng 3 và số hạng đầu bằng 5. Biết số hạng chính giữa là 32805. Hỏi cấp số nhân đã cho có bao nhiêu số hạng?

**CÂU 41.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -3$  và q = -2. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

$$(A)S_{10} = -511.$$

$$(\mathbf{B})S_{10} = -1025.$$
  $(\mathbf{C})S_{10} = 1025.$ 

$$(\mathbf{C})S_{10} = 1025$$

$$\bigcirc S_{10} = 1023.$$

**CÂU 42.** Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là 1;4;16;64;... Gọi  $S_n$  là tổng của nsố hạng đầu tiên của cấp số nhân đó. Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$\mathbf{B}S_n = \frac{n\left(1 + 4^{n-1}\right)}{2}$$

$$\bigcirc S_n = \frac{4^n - 1}{3}.$$

$$\mathbf{B} S_n = \frac{n\left(1 + 4^{n-1}\right)}{2}.$$

$$\mathbf{D} S_n = \frac{4\left(4^n - 1\right)}{3}.$$

CÂU 43. Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp số cộng với công 

$$\mathbf{A}q=2.$$

$$\mathbf{B}$$
 $q=-2.$ 

$$\mathbf{C}q = -\frac{3}{2}$$

**CÂU 44.** Cho bố số a, b, c, d biết rằng a, b, c theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân công bội q>1, còn b,c,d theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng. Tìm q biết rằng a+d=14

$$\mathbf{c}$$
  $q = \frac{20 + \sqrt{73}}{24}$ 

$$\mathbf{A}S = \frac{10^n - 1}{10^n - 1}$$

**B**
$$S = 10 \cdot \frac{10^n - 1}{21}$$
.

$$\mathbf{C}S = 10 \cdot \frac{10^n - 1}{81} - 1$$

**CÂU 46.** Biết rằng  $S = 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \dots + 11.3^{10} = a + \frac{21 \cdot 3^b}{4}$ . Tính  $P = a + \frac{b}{4}$ .

$$\bigcirc P = 1.$$

$$\mathbf{B}P=2.$$

$$\mathbf{C}$$
 $P=3$ 

$$\mathbf{D}P = 4.$$

**CÂU 47.** Một cấp số nhân có ba số hạng là a, b, c (theo thứ tự đó) trong đó các số hạng 

$$\bigcirc$$
  $\frac{1}{2} = \frac{1}{1}$ .

$$\frac{1}{12} = \frac{1}{12}$$
.

$$\mathbf{C}\frac{1}{c^2} = \frac{1}{ba}.$$

CÂU 48. Bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và góc lớn nhất gấp 27 lần góc nhỏ nhất. Tổng của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng.

**(B)**102°.

(**D**)168°.

CÂU 49. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của để tháp (có diện tích là  $12288m^2$ ). Tính diện tích mặt trên cùng.

(A)  $6m^2$ .

(**B**) $8m^2$ .

 $(\mathbf{C})10m^2$ .

 $(\mathbf{D})12m^2$ .

CÁU 50. Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Hỏi du khác trên thắng hay thua bao nhiêu?

(A) Hoà vốn.

(**B**)Thua 20000 đồng.

(**C**)Thắng 20000 đồng.

(**D**)Thua 40000 đồng.

# LỜI GIẢI CHI TIẾT

# Bài 5. DÃY SỐ

# A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

## 1. Định nghĩa dãy số

- $\odot$  Mỗi hàm u xác định trên tập các số nguyên dương  $\mathbb{N}^*$  được gọi là một dãy vô hạn (gọi tắt là dãy số), kí hiệu u=u(n).
- $\odot$  Ta thường viết  $u_n$  thay cho u(n) và kí hiệu dãy số u=u(n) bởi  $(u_n)$ , do đó dãy số  $(u_n)$  được viết dưới dạng khai triển  $u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n, \ldots$ Số  $u_1$  gọi là số hạng đầu,  $u_n$  gọi là số hạng thứ n và gọi là số hạng tổng quát của dãy số.
- $\odot$  Nếu  $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = c$  thì  $(u_n)$  được gọi là dãy số không đổi.
- $\odot$  Mỗi hàm u xác định trên tập  $M = \{1; 2; 3; ...; m\}, \forall m \in \mathbb{N}^*$  được gọi là một dãy số hữu hạn.
- $\bigcirc$  Dạng khai triển của dãy hữu hạn là  $u_1, u_2, u_3, \ldots, u_m$ . Số  $u_1$  gọi là số hạng đầu, số  $u_m$  gọi là số hạng cuối.

## 2. Các cách cho một dãy số

Một dãy số có thể cho bằng:

- ❷ Liệt kê các số hạng (chỉ dùng cho các dãy hữu hạn và có ít số hạng);
- ❷ Công thức của số hạng tổng quát;
- Phương pháp mô tả;
- Phương pháp truy hồi.

# 3. Dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số bị chặn

- $\odot$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là dãy số tăng nếu ta có  $u_{n+1} > u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- $\odot$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là dãy số giảm nếu ta có  $u_{n+1} < u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- $\odot$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại số M sao cho  $u_n \leq M, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- $\odot$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại số m sao cho  $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- $\bigcirc$  Dãy số  $(u_n)$  được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số m, M sao cho  $m \le u_n \le M, \forall n \in \mathbb{N}^*.$

# B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

#### Dạng 1. Số hạng tống quát, biểu diễn dãy số

Để tìm số hạng tổng quát của một dãy bất kỳ khi biết một vài số hạng đầu của dãy số ta làm như sau

- ❷ Phân tích các số hạng sau theo các số hạng đã biết theo một quy luật nào đó.
- ❷ Dự đoán số hạng tổng quát
- $\odot$  Kiểm tra bằng cách thay lần lượt các giá trị  $n \in \mathbb{N}^*$  vào công thức tổng quát (Chứng minh bằng phương pháp quy nạp).

Để biểu diễn một dãy số khi biết công thức tổng quát ta lần lượt thay  $n \in \mathbb{N}^*$  vào công thức tổng quát để tìm các số hạng thứ nhất, thứ hai, . . .

## 1. Ví du mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Xác định số hạng đầu và số hạng tổng quát của dãy số  $(u_n)$  các số tự nhiên lẻ  $1,3,5,7,\ldots$ Lời giải.

Dãy  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = 1$  và số hạng tổng quát  $u_n = 2n - 1$ .

**VÍ DU 2 (NB).** Xác định số hạng đầu và số hạng tổng quát của dãy số  $(v_n)$  các số nguyên dương chia hết cho 5:  $5, 10, 15, 20, \ldots$ 

#### Lời giải.

Dãy  $(v_n)$  có số hạng đầu  $v_1 = 5$  và số hạng tổng quát  $v_n = 5n$ .

### 2. Bài tấp tư luân

BÀI 1 (NB). Xét dãy số hữu hạn gồm các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 20, sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Liệt kê tất cả các số hạng của dãy số này, tìm số hạng đầu và số hạng cuối của dãy.

#### Lời giái.

Các số hạng của dãy là 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19.

Số hạng đầu của dãy là  $u_1 = 1$ .

Số hang cuối của dãy là  $u_{11} = 19$ .

BAI 2 (TH). Xét dãy số gồm tất cả các số tự nhiên chia cho 5 dư 1. Xác định số hạng tổng quát của dãy số. Dèi giải.

Các số tự nhiên chia cho 5 dư 1 gồm các số sau: 6, 11, 16, 21, ...

Số hạng tổng quát  $u_n = 5n + 1$ .

BÀI 3 (NB). Viết năm số hạng đầu của dãy số gồm các số nguyên tố theo thứ tự tăng dần. Lời giải.

Năm số hạng đầu của dãy số trên là 2, 3, 5, 7, 11.

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho dãy số có các số hạng đầu là 5, 10, 15, 20, 25, ... Số hạng tổng quát của dãy số này là

$$\mathbf{A} u_n = 5(n-1).$$

$$\mathbf{C}u_n = 5 + n.$$

$$\mathbf{D}u_n = 5n + 1.$$

🗩 Lời giải.

Ta có  $5 = 5 \cdot 1, 10 = 5 \cdot 2, 15 = 5 \cdot 3, 20 = 5 \cdot 4, 25 = 5 \cdot 5, \dots$ 

Vậy dãy trên có số hạng tổng quát là  $u_n = 5n$ .

Chọn đáp án (B).....

**CÂU 2.** Cho dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{an^2}{n+1}$ , a là hằng số.  $u_{n+1}$  là số hạng nào trong các số hạng sau

$$\mathbf{C}u_{n+1} = \frac{an^2 + 1}{n+1}.$$

$$\bigcirc u_{n+1} = \frac{an^2}{n+2}$$

Ta có 
$$u_{n+1} = \frac{a(n+1)^2}{n+1+1} = \frac{a(n+1)^2}{n+2}.$$

CÂU 3. Cho dãy số có các số hạng đầu là 8, 15, 22, 29, 36, ... Số hạng tổng quát của dãy số này là

$$\mathbf{A} u_n = 7n + 7.$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_n = 7n.$ 

$$\mathbf{C})u_n = 7n + 1.$$

$$(\mathbf{D})u_n$$
 không viết được dưới dạng công thức .

Dòi giải.

Ta có  $8 = 7 \cdot 1 + 1, 15 = 7 \cdot 2 + 1, 22 = 7 \cdot 3 + 1, 29 = 7 \cdot 4 + 1, 36 = 7 \cdot 5 + 1, \dots$ 

Vậy dãy trên có số hạng tổng quát là  $u_n = 7n + 1$ .

Chọn đáp án (C)..... 

**CÂU 4.** Cho dãy số có các số hạng đầu là  $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \dots$  Số hạng tổng quát của dãy số này là

$$\mathbf{A} u_n = \frac{n+1}{n}.$$

$$\mathbf{C}u_n = \frac{n-1}{n}.$$

**B** 
$$u_n = \frac{n}{n+1}$$
. **C**  $u_n = \frac{n-1}{n}$ . **D**  $u_n = \frac{n^2 - n}{n+1}$ .

Ta có  $0 = \frac{0}{0+1}, \frac{1}{2} = \frac{1}{1+1}, \frac{2}{3} = \frac{2}{2+1}, \frac{3}{4} = \frac{3}{3+1}, \frac{4}{5} = \frac{4}{4+1}, \dots$ 

Vậy dãy trên có số hạng tổng quát là  $u_n = \frac{n}{n+1}$ 

Chọn đáp án (B).....

**CÂU 5.** Cho dãy số  $(u_n)$  với  $u_1 = 1, u_{n+1} = u_n - 1$ . Số hạng tổng quát  $u_n$  của dãy số là số hạng nào dưới đây?

$$\mathbf{A} u_n = 2 - n.$$

$$(\mathbf{B})u_n$$
 không xác định.

$$(\mathbf{c})u_n = 1 - n.$$

$$\mathbf{D}$$
 $u_n = -n$ , với mọi  $n$ .

🗩 Lời giải.

Ta có  $u_1 = 1, u_2 = 0, u_3 = -1, u_4 = -2, \dots$ 

Dễ dàng dự đoán được số hạng tổng quát là  $u_n = 2 - n$ .

Chon đáp án  $\bigcirc$ 

### Dạng 2. Tìm số hạng cụ thể của dãy số

Để tìm số hạng cụ thể của dãy số ta làm như sau

- Với trường hợp dãy số đã cho biết công thức tổng quát của dãy số thì ta chỉ cần thay giá trị tương ứng của số hạng đó vào công thức tổng quát.
- ❷ Với trường hợp dãy số cho bởi công thức truy hồi hoặc dưới dạng thì ta phải tìm lần lượt từ những số hạng đầu tiên cho đến số đứng trước số cần tìm trong dãy.

# 1. Ví du mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = (-1)^n \cdot \frac{2^n}{n}$ . Tìm số hạng  $u_3$ .

$$\mathbf{A} u_3 = -\frac{8}{3}.$$

$$\bigcirc u_3 = -2$$

🗩 Lời giải.

Ta có

$$u_3 = (-1)^3 \cdot \frac{2^3}{3} = -\frac{8}{3}.$$

**VÍ DỤ 2 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{2n^2 - 1}{n^2 + 3}$ . Tìm số hạng  $u_5$ .

$$\mathbf{B}u_5 = \frac{7}{4}.$$

$$\mathbf{c}$$
 $u_5 = \frac{17}{12}$ .

$$\mathbf{D}$$
 $u_5 = \frac{71}{39}$ .

D Lời giải.

Ta có 
$$u_5 = \frac{2 \cdot 5^2 - 1}{5^2 + 3} = \frac{49}{28} = \frac{7}{4}.$$

Chọn đáp án B

**VÍ DỤ 3 (NB).** Cho dãy số  $u_n$  bao gồm các số nguyên tố. Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.

### 🗩 Lời giải.

Ta có  $u_1 = 2, u_2 = 3, u_3 = 5, u_4 = 7, u_5 = 11.$ 

Vậy số hạng thứ 5 của dãy số là 11.

**VÍ DỤ 4 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$ . Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.

**A** 11.

**B**15

**C**16.

**D**12.

### Dùi giải.

Ta có  $u_2 = u_1 + 1 = 6$ ,  $u_3 = u_2 + 2 = 8$ ,  $u_4 = u_3 + 3 = 11$ ,  $u_5 = u_4 + 4 = 15$ .

**VÍ DỤ 5 (TH).** Cho dãy số xác định bằng hệ thức truy hồi

$$u_1 = 1, u_n = 3u_{n-1} + 2 \text{ v\'oi } n \ge 2$$

Viết ba số hạng đầu của dãy số này.

#### Lời giải.

Ta có:  $u_1 = 1, u_2 = 3u_1 + 2 = 3 \cdot 1 + 2 = 5, u_3 = 3u_2 + 2 = 3 \cdot 5 + 2 = 17.$ 

**VÍ DỤ 6 (VD).** Cho dãy số  $(u_n)$ :  $\begin{cases} u_1 = 5 \\ u_{n+1} = u_n + n \end{cases}$ . Số 20 là số hạng thứ mấy trong dãy?

#### Dèi giải.

Ta có  $u_1 = 5$ ,  $u_2 = 6$ ,  $u_3 = 8$ ,  $u_4 = 11$ ,  $u_5 = 16$ ,  $u_6 = 20$ .

Vậy số 20 là số hạng thứ 6.

## 2. Bài tấp tư luân

**BÀI 1 (NB).** Cho dãy số  $u_n = \frac{1}{\sqrt{n}+1}$ . Tìm số hạng  $u_4$ .

#### 🗩 Lời giải.

Ta có  $u_4 = \frac{1}{\sqrt{4}} + 1 = \frac{1}{3}$ .

**BÀI 2 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$  có số hạng tổng quát:  $u_n = 2n + \sqrt{n^2 + 4}$ . Tìm số hạng thứ 6 của dãy số. 🗩 Lời giải.

Ta có  $u_6 = 12 + 2\sqrt{10}$ .

**BÀI 3 (NB).** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi:  $\begin{cases} u_1 = -1; u_2 = 3 \\ u_{n+1} = 5u_n - 6u_{n-1} \forall n > 2 \end{cases}$ . Tìm số hạng thứ 7 của dãy. Dòi aiải.

Ta có

$$u_3 = 5u_2 - 6u_1 = 21$$
;  $u_4 = 5u_3 - 6u_2 = 87$ ;  $u_5 = 309$ ;  $u_6 = 1023$ ;  $u_7 = 3261$ 

Vậy số hạng thứ 7 của dãy là 3261.

**BÁI 4 (NB).** Viết năm số hang đầu của dãy số Fibonacci  $(F_n)$  cho bởi hệ thức truy hồi

$$\begin{cases} F_1 = 1, F_2 = 1 \\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \ (n \ge 3). \end{cases}$$

#### 🗩 Lời giải.

Ta có  $F_3 = 2$ ,  $F_4 = 3$ ,  $F_5 = 5$ .

BÁI 5 (NB). Người ta nuôi cấy 5 con vi khuẩn E-coli trong môi trường nhân tạo. Cứ 30 phút thì vi khuẩn E-coli sẽ nhân đôi 1 lần. Tính số lượng vi khuẩn thu được sau 1, 2, 3 lần nhân đôi. Lời giải.

Đặt  $u_1 = 5$ , gọi số vi khuẩn sau n lần phân chia là  $u_{n+1}$ , khi đó ta có dãy số  $(u_n)$  thỏa mãn

$$u_1 = 5, \ u_{n+1} = 2u_n$$

Ta có  $u_2 = 10, u_3 = 20, u_4 = 40.$ 

**BÀI 6 (TH).** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $u_n = \frac{n^2 + 3n + 7}{n+1}$ 

- a) Viết năm số hạng đầu của dãy.
- b) Dãy số có bao nhiều số hạng nhận giá trị nguyên.

#### Lời giải.

- a) Ta có năm số hạng đầu của dãy  $u_1 = \frac{1^2 + 3.1 + 7}{1 + 1} = \frac{11}{2}$ ;  $u_2 = \frac{17}{3}$ ;  $u_3 = \frac{25}{4}$ ;  $u_4 = 7$ ;  $u_5 = \frac{47}{6}$ .
- b) Ta có:  $u_n = n + 2 + \frac{5}{n+1}$ , do đó  $u_n$  nguyên khi và chỉ khi  $\frac{5}{n+1}$  nguyên hay n+1 là ước của 5. Điều đó xảy ra khi  $n+1=5 \Leftrightarrow n=4$ . Vậy dãy số có duy nhất một số hạng nguyên là  $u_4=7$ .

**BÀI 7 (VD).** Cho dãy số  $(x_n)$  thỏa mãn điều kiện  $x_1 = 1, x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n(n+1)}, n = 1, 2, 3, \dots$  Số hạng  $x_{2023}$  bằng Lời giải.

Ta có

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \Leftrightarrow \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) = \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$
$$\Leftrightarrow x_n - x_1 = 1 - \frac{1}{n}$$
$$\Leftrightarrow x_n = \frac{2n-1}{n}.$$

**BÀI 8 (VDC).** Cho dãy số  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_1 = 99 \\ u_{n+1} = u_n - 2n - 1, n \ge 1 \end{cases}$ . Hỏi số -861 là số hạng thứ mấy? Dòi giải.

Ta có

$$u_{n} = u_{n-1} - 2n + 1$$

$$u_{n-1} = u_{n-2} - 2n + 3$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$u_{3} = u_{2} - 2n + 2n - 5$$

$$u_{2} = u_{1} - 2n + 2n - 3$$

Suy ra

$$u_n = u_1 - 2n \cdot (n-1) + 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-5) + (2n-3)$$
  
$$u_n = 99 - 2n^2 + 2n + \frac{n-1}{2} \cdot [2 \cdot 1 + (n-2) \cdot 2] = 100 - n^2$$

Giả sử  $u_n = -861 \Rightarrow n^2 = 961 \Rightarrow n = 31$  (vì  $n \in \mathbb{N}$ ). Vậy số -861 là số hạng thứ 31.

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{n}{3^n - 1}$ . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là những số nào dưới đây? **A**  $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{16}$ . **B**  $\frac{1}{2}; \frac{2}{3}; \frac{3}{4}$ . **C**  $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{3}{26}$ . **D**  $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}$ .

$$\bigcirc$$
  $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{3}{26}$ 

$$\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}$$

Ta có 
$$u_1 = \frac{1}{2}$$
;  $u_2 = \frac{2}{3^2 - 1} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ ;  $u_3 = \frac{3}{3^3 - 1} = \frac{3}{26}$ .

Chon đáp án (C).....

**CÂU 2.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = (-1)^n \cdot 2n$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

$$\mathbf{A}u_3 = -6.$$

$$\mathbf{B}u_2=4.$$

$$\mathbf{C}u_4 = -8.$$

$$(\mathbf{D})u_1 = -2.$$

🗩 Lời giải.

$$u_1 = -2 \cdot 1 = -2; \ u_2 = (-1)^2 \cdot 2 \cdot 2 = 4, \ u_3 = (-1)^3 \cdot 2 \cdot 3 = -6; \ u_4 = (-1)^4 \cdot 2 \cdot 4 = 8.$$

**Nhận xét:** Dễ thấy  $u_n > 0$  khi n chẵn và ngược lại nên đáp án  $u_4 = -8$  sai.

$$\mathbf{c}$$
 $u_4 = \frac{14}{27}$ .

$$\text{Ta có } u_2 = \frac{1}{3}(u_1+1) = \frac{1}{3}(2+1) = 1; \ u_3 = \frac{1}{3}(u_2+1) = \frac{2}{3}; \ u_4 = \frac{1}{3}(u_3+1) = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}+1\right) = \frac{5}{9}.$$

**CÂU 4.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_1 = -1 \\ u_{n+1} = u_n + 3 \end{cases}$  với  $n \geq 0$ . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là lần lượt là những số nào

dưới đây?

$$A - 1; 2; 5.$$

$$\bigcirc$$
 -1; 3; 7.

Dèi giải.

Ta có 
$$u_1 = -1$$
;  $u_2 = u_1 + 3 = 2$ ;  $u_3 = u_2 + 3 = 5$ .

Nhận xét. (i) Dùng chức năng "lặp" của MTCT để tính:

Nhập vào màn hình: X = X + 3

Bấm CALC và cho X = -1 (ứng với  $u_1 = -1$ )

Để tính  $u_n$  cần bấm "=" ra kết quả liên tiếp n-1 lần. Ví dụ để tính  $u_2$  ta bấm "=" ra kết quả lần đầu tiên, bấm "=" ra kết quả thứ hai chính là  $u_3, \ldots$ 

(ii) Vì  $u_1 = -1$  nên loại các đáp án  $u_1 = 1$ ,  $u_1 = 4$ .

Còn lại các đáp án có  $u_1 = -1$ ; để biết đáp án nào ta chỉ cần kiểm tra  $u_2$  (vì  $u_2$  ở hai đáp án là khác nhau):  $u_2 = u_1 + 3 = 2$ . Chọn đáp án (A).....

**CÂU 5.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{2n+5}{5n-4}$ . Số  $\frac{7}{12}$  là số hạng thứ mấy của dãy số?

(A) 9.

Ta có

 $(\mathbf{D})8.$ 

Dòi giải.

$$u_n = \frac{2n+5}{5n-4} = \frac{7}{12} \Leftrightarrow 24n+60 = 35n-28 \Leftrightarrow 11n = 88 \Leftrightarrow n = 8.$$

Chọn đáp án (D)...

**CÂU 6.** Cho dãy  $(u_n)$  xác định bởi  $\begin{cases} u_1=3\\ u_{n+1}=\frac{u_n}{2}+2 \end{cases}$ . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

$$\mathbf{A} u_2 = \frac{5}{2}.$$
 $\mathbf{P}$  Lời giải.

**B**
$$u_4 = \frac{31}{8}$$

$$\mathbf{C}u_3 = \frac{15}{4}.$$

Ta có 
$$\begin{cases} u_2 = \frac{u_1}{2} + 2 = \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}; \ u_3 = \frac{u_2}{2} + 2 = \frac{7}{4} + 2 = \frac{15}{4}. \\ u_4 = \frac{u_3}{2} + 2 = \frac{15}{8} + 2 = \frac{31}{8}; \ u_5 = \frac{u_4}{2} + 2 = \frac{31}{16} + 2 = \frac{63}{16}. \end{cases}$$

**CÂU 7.** Cho dãy số  $(u_n)$ , với  $u_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2n+3}$ . Tìm số hạng  $u_{n+1}$ .

$$\mathbf{B} u_{n+1} = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2(n+1)+3} .$$
 
$$\mathbf{D} u_{n+1} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+3} .$$

$$\mathbf{C}u_{n+1} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+5}.$$

$$u_n = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^{2n+3} \Rightarrow u_{n+1} = \left(\frac{(n+1)-1}{(n+1)+1}\right)^{2(n+1)+3} = \left(\frac{n}{n+2}\right)^{2n+5}.$$

**CÂU 8.** Cho dãy số  $(a_n)$ , được xác định  $\begin{cases} a_1=3\\ a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n,\ n\geq 1 \end{cases}$ . Mệnh đề nào sau đây **sai**?

Ta có  $a_1 = 3$ ;  $a_2 = \frac{u_1}{2}$ ;  $a_3 = \frac{u_2}{2} = \frac{u_1}{2^2}$ ;  $a_4 = \frac{u_3}{2} = \frac{u_1}{2^3}$ ,...  $\Rightarrow u_n = \frac{u_1}{2^{n-1}} = \frac{3}{2^{n-1}}$  nên suy ra đáp án  $a_n = \frac{3}{2^n}$  sai.

Xét đáp án

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 3\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4}\right) = 3 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{93}{16} \Rightarrow \text{dúng}.$$

Xét đáp án  $a_{10} = \frac{3}{2^9} = \frac{3}{512} \Rightarrow$  đúng. Xét đáp án  $a_{n+1} + a_n = \frac{3}{2^n} + \frac{3}{2^{n-1}} = \frac{3+3\cdot 2}{2^n} = \frac{9}{2^n} \Rightarrow$  đúng.

Chọn đáp án (C).....

# **CÂU 9.** Cho dãy số $(u_n)$ biết $\begin{cases} u_1=1\\ u_2=4\\ u_{n+2}=3u_{n+1}-2u_n \end{cases}$ với mọi $n\geq 1$ . Giá trị $u_{101}-u_{100}$ là

 $\mathbf{A} \cdot 3 \cdot 2^{102}$ .

 $(\mathbf{D})3 \cdot 2^{99}$ .

🗩 Lời giải.

Theo bài ta có

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$$

$$\Leftrightarrow u_{n+2} = u_{n+1} + 2(u_{n+1} - u_n)$$

$$\Leftrightarrow u_{n+2} - u_{n+1} = 2(u_{n+1} - u_n).$$

Với n = 99 ta có

$$u_{101} - u_{100} = 2(u_{100} - u_{99})$$

$$= 2 \cdot 2(u_{99} - u_{98})$$

$$= \dots$$

$$= 2^{99} \cdot (u_2 - u_1) = 3 \cdot 2^{99}.$$

Chọn đáp án (D).....

#### Dèi giải.

Ta chứng minh bằng phương pháp quy nạp số hạng tổng quát của dãy là  $u_n = 2\cos\frac{\pi}{2n+1}$ .

Dễ thấy, với n=1 ta có  $u_1=\sqrt{2}$  (đúng).

Giả sử mệnh đề đúng với  $n=k, \forall k \in \mathbb{N}^*$  nghĩa là  $u_k=2\cos\frac{\pi}{2^{k+1}}$  ta phải chứng minh mệnh đề đúng với n=k+1 nghĩa là  $u_{k+1} = 2\cos\frac{\pi}{2^{k+2}}.$ 

Thật vậy, 
$$u_{k+1} = \sqrt{2 + u_k} = \sqrt{2 + 2\cos\frac{\pi}{2^{k+1}}} = \sqrt{4\cos^2\frac{\pi}{2^{k+2}}} = 2\cos\frac{\pi}{2^{k+2}}.$$

Áp dụng công thức tổng quát trên ta có  $u_{2023} = \sqrt{2}\cos\frac{n}{2^{2024}}$ 

Chon đáp án (B).....

## Dang 3. Xét tính tăng giảm của dãy số

- a) Phương pháp 1. Xét dấu của hiệu số  $u_{n+1} u_n$ .
  - (a) Nếu  $u_{n+1} u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$  thì  $(u_n)$  là dãy số tăng.
  - (b) Nếu  $u_{n+1} u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$  thì  $(u_n)$  là dãy số giảm.
- b) Phương pháp 2. Nếu  $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$  thì ta có thể so sánh thương  $\frac{u_{n+1}}{u_n}$  với 1.
  - (a) Nếu  $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$  thì  $(u_n)$  là dãy số tăng.
  - (b) Nếu  $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$  thì  $(u_n)$  là dãy số giảm.

Nếu  $u_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$  thì ta có thể so sánh thương  $\frac{u_{n+1}}{u}$  với 1.

- (a) Nếu  $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$  thì  $(u_n)$  là dãy số tăng.
- (b) Nếu  $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$  thì  $(u_n)$  là dãy số giảm.
- c) Phương pháp 3. Nếu dãy số  $(u_n)$  cho bởi hệ thức truy hồi thì thường dùng phương pháp quy nạp để chứng minh  $u_{n+1} > u_n, \forall n \in \mathbb{N}^* \text{ (hoặc } u_{n+1} < u_n \forall n \in \mathbb{N}^*\text{)}.$

## 1. Ví du mẫu

**VÍ DU 1 (NB).** Xét sự tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = (-1)^n$ .

## Dèi giải.

Ta có:

$$u_1=(-1)^1=-1, \ u_2=(-1)^2=1, \ u_3=(-1)^3=-1.$$
 Vậy  $(u_n)$  là dãy không tăng không giảm.

**VÍ DỤ 2 (NB).** Xét tính tăng giảm của dãy số sau  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{2n+1}{n+1}$ .

Lời giải.

Ta có: 
$$u_n = \frac{2n+1}{n+1} = 2 - \frac{1}{n+1}$$
. 
$$u_{n+1} - u_n = \left(2 - \frac{1}{n+1+1}\right) - \left(2 - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vậy dãy số  $(u_n)$  là dãy số tăng

**VÍ DU 3 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+2}$ . Dòi giải.

Ta có 
$$u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n+2} = \frac{-2}{\sqrt{n} + \sqrt{n+2}}$$

Xét hiệu

$$u_{n+1} - u_n = \frac{-2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+3}} - \frac{-2}{\sqrt{n} + \sqrt{n+2}}$$
$$= \frac{2}{\sqrt{n} + \sqrt{n+2}} - \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+3}} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vây  $(u_n)$  là dãy số tăng.

**VÍ DỤ 4 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{n}{3^n}$ .

#### Lời giải.

Ta có 
$$u_n = \frac{n}{3^n} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Xét thương 
$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{3^{n+1}} : \frac{n}{3^n} = \frac{n+1}{3 \cdot n} < 1, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vậy  $(u_n)$  là dãy số giảm.

**VÍ DỤ 5 (VD).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1=2\\ u_{n+1}=\frac{3u_n+1}{u_n+1}, n\in\mathbb{N}^*. \end{cases}$ 

#### 🗩 Lời giải.

Giả sử 
$$u_{n+1} > u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$
 (\*)

Ta chứng minh (\*) bằng phương pháp quy nạp.

Với 
$$n=1, u_2=\frac{3.2+1}{2+1}=\frac{6}{3}=\frac{7}{3}>u_1=2.$$

 $\odot$  Giả sử (\*) đúng khi  $n=k,k\in\mathbb{N}^*$ , tức là  $u_{k+1}>u_k$ .

Ta sẽ chứng minh (\*) đúng với n = k + 1, tức là  $u_{k+2} > u_{k+1}$ .

Thật vậy

$$u_{k+2} - u_{k+1} = \left(3 - \frac{2}{u_{k+1} + 1}\right) - \left(3 - \frac{2}{u_k + 1}\right) = \frac{2}{u_k + 1} - \frac{2}{u_{k+1} + 1}.$$

Theo giả thiết quy nap ta có:

$$u_{k+1} > u_k \Rightarrow u_{k+1} + 1 > u_k + 1 \Rightarrow \frac{2}{u_k + 1} > \frac{2}{u_{k+1} + 1}.$$

Vậy 
$$u_{k+2} - u_{k+1} > 0$$
.

Do đó, (\*) đúng với mọi số nguyên dương n.

Vậy  $(u_n)$  là dãy số tăng.

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1 (NB).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{\sqrt{2}}{3^n}$ .

#### Dòi giải.

Ta có  $u_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

Xét thương

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\sqrt{2}}{3^{n+1}} : \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3^2}} = \frac{3^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} < 1.$$

Vậy  $(u_n)$  là dãy số giảm.

**BÀI 2 (NB).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{n(n+1)}$ .

#### 🗩 Lời giải.

Ta có 
$$u_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$
. Xét hiệu:

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) - \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right)$$
$$= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$$

Vậy  $(u_n)$  là dãy số tăng.

**BÀI 3 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = n + \cos^2 n$ .  $\bigcirc$  Lời giải.

Xét hiệu

$$u_{n+1} - u_n = (n+1+\cos^2(n+1)) - (n+\cos^2 n)$$
  
= 1 + \cos^2(n+1) - \cos^2 n  
= \cos^2(n+1) + \sin^2 n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^\*.

Vậy  $(u_n)$  là dãy số tăng.

**BÀI 4 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n}$ .

Lời giải.

Xét hiệu

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \dots + \frac{1}{2(n+1)}\right) - \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}\right)$$

$$= \frac{1}{n+2} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2}$$

$$= \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+1} < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

**BÀI 5 (TH).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n}$ Lời giải.

Xét hiệu

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \left(\frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \ldots + \frac{1}{2(n+1)}\right) - \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n}\right) \\ &= \frac{1}{n+2} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} \\ &= \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+1} < 0, \forall n \in \mathbb{N}^* \end{aligned}$$

Vậy  $(u_n)$  là dãy số giảm.

**BÀI 6 (VD).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  cho bởi

$$(u_n): \begin{cases} u_1 = 1; u_2 = 2\\ u_{n+1} = \sqrt{u_n} + \sqrt{u_{n-1}} \forall n \ge 2 \end{cases}$$

#### Lời giải.

Ta chứng minh dãy  $(u_n)$  là dãy tăng bằng phương pháp quy nạp.

Dễ thấy  $u_1 < u_2 < u_3$ .

Giả sử  $u_{k-1} < u_k \ \forall k \ge 2$ , ta chứng minh  $u_{k+1} > u_k$ .

Thật vậy ta có  $u_{k+1} = \sqrt{u_k} + \sqrt{u_{k-1}} > \sqrt{u_{k-1}} + \sqrt{u_{n-2}} = u_k$ .

Vậy  $(u_n)$  là dãy tăng.

**BÀI 7 (VD).** Cho dãy số 
$$(u_n)$$
 biết  $u_n = \frac{b \cdot 2n^2 + 1}{n^2 + 3}$  và  $b \in \mathbb{R}$ . Hãy xác định  $b$  để

a)  $(u_n)$  là dãy số giảm.

b)  $(u_n)$  là dãy số tăng.

#### Lời giải.

Ta có

$$u_n = 2b + \frac{1 - 6b}{n^2 + 3}$$

Xét hiệu

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1 - 6b}{(n+1)^2 + 3} - \frac{1 - 6b}{n^2 + 3} = (1 - 6b) \cdot \left(\frac{1}{(n+1)^2 + 3} - \frac{1}{n^2 + 3}\right) = A_n.$$

a) Để  $(u_n)$  là dãy sỗ giảm thì  $A_n < 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

$$A_n < 0 \Leftrightarrow 1 - 6b > 0 \Leftrightarrow b < \frac{1}{6}$$

b) Để  $(u_n)$  là dãy số tăng thì  $A_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

$$A_n > 0 \Leftrightarrow 1 - 6b < 0 \Leftrightarrow b > \frac{1}{6}.$$

**BÀI 8 (VDC).** Xét tính tăng giảm của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \sin n + \cos n$ . Lời giải.

Ta có:  $u_n = \sin n + \cos n = \sqrt{2} \sin \left( n + \frac{\pi}{4} \right)$ . Xét hiệu

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2} \sin\left(n + 1 + \frac{\pi}{4}\right) - \sqrt{2} \sin\left(n + \frac{\pi}{4}\right)$$
$$= 2\sqrt{2} \cdot \cos\left(2n + \frac{1}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \cdot \sin\frac{1}{2} = A_n.$$

Với  $n = 1, A_1 > 0$ . Với  $n = 100, A_{100} < 100$ . Vậy  $(u_n)$  là dãy không tăng, không giảm.

## CÂU HỎI TRẮC NGHIÊM

**CÂU 1.** Cho các dãy số sau. Dãy số nào là dãy số tăng? **(A)**  $1; 1; 1; 1; 1; 1; \dots$  **(B)**  $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots$ 

**B** 
$$1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots$$

$$\bigcirc$$
 1;  $-\frac{1}{2}$ ;  $\frac{1}{4}$ ;  $-\frac{1}{8}$ ;  $\frac{1}{16}$ ; ....

Dòi aiải.

Xét đáp án 1; 1; 1; 1; 1; 1; ... đây là dãy hằng nên không tăng không giảm. Xét đáp án 1; 
$$-\frac{1}{2}$$
;  $\frac{1}{4}$ ;  $-\frac{1}{8}$ ;  $\frac{1}{16}$ ; ...  $\Rightarrow u_1 > u_2 < u_3 \Rightarrow$  loại.

Xét đáp án 1; 3; 5; 7; 9; ... 
$$\Rightarrow u_n < u_{n+1}, \ n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \text{chọn}$$

Xét đáp án 1; 3; 5; 7; 9; ... 
$$\Rightarrow u_n < u_{n+1}, \ n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow \text{chọn.}$$
  
Xét đáp án 1;  $\frac{1}{2}$ ;  $\frac{1}{4}$ ;  $\frac{1}{8}$ ;  $\frac{1}{16}$ ; ...  $\Rightarrow u_1 > u_2 > u_3 ... > u_n > ... \Rightarrow \text{loại.}$ 

Chọn đáp án (D)...

**CÂU 2.** Với giá trị nào của 
$$a$$
 thì dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{an-1}{n+2}, \forall n \geq 1$  là dãy số tăng?

$$\bigcirc$$
  $a < -2$ .

$$a > -\frac{1}{2}$$
.

$$\bigcirc a < -\frac{1}{2}$$
.

🗩 Lời giải.

$$\text{Ta có } u_n = a - \frac{1+2a}{n+2}.$$

$$u_{n+1} - u_n = (1+2a)\left(\frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right).$$

Suy ra dãy số đã cho tăng khi  $a > -\frac{1}{2}$ 

Chon đáp án (C).....

**CÂU 3.** Trong các dãy  $(u_n)$  sau đây dãy nào là dãy số giảm ?

$$\bigcirc u_n = 3n + 1.$$

$$\mathbf{D}u_n = \frac{1}{3^n}.$$

🗩 Lời giải.

Xét dãy số  $(u_n)$  có  $u_n = \frac{1}{3^n}$ , ta thấy  $u_n > 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  và  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{1}{3^{n+1}}}{\frac{1}{2^n}} = \frac{1}{3} < 1$  nên dãy số  $(u_n)$  này là dãy số giảm.

$$\mathbf{B})u_n = \frac{1}{2^n}.$$

$$\mathbf{C}u_n = \frac{n+5}{3n+1}.$$

$$\mathbf{D}u_n = \frac{2n-1}{n+1} \ .$$

🗩 Lời giải.

Vì  $2^n$ ; n là các dãy dương và tăng nên  $\frac{1}{2^n}$ ;  $\frac{1}{n}$  là các dãy giảm, do đó loại các đáp án  $u_n = \frac{1}{2^n}$  và  $u_n = \frac{1}{n}$ 

Xét đáp án 
$$u_n = \frac{n+5}{3n+1} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{3}{2} \\ u_2 = \frac{7}{6} \end{cases} \Rightarrow u_1 > u_2 \Rightarrow \text{loai.}$$

Xét đáp án 
$$u_n = \frac{2n-1}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = 3\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) > 0 \Rightarrow \text{nhận}.$$

Chọn đáp án (D). **CÂU 5.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là dãy số giảm?

$$\mathbf{B}u_n = \frac{3n-1}{n+1}.$$

$$\mathbf{C}u_n = \sqrt{n+2}.$$

Dòi giải.

Vì  $2^n$  là dãy dương và tăng nên  $\frac{1}{2^n}$  là dãy giảm.

Xét 
$$u_n = \frac{3n-1}{n+1} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ u_2 = \frac{5}{3} \end{cases} \Rightarrow u_1 < u_2$$
, loại.

Hoặc 
$$u_{n+1} - u_n = \frac{3n+2}{n+2} - \frac{3n-1}{n+1} = \frac{4}{(n+1)(n+2)} > 0$$
 nên  $(u_n)$  là dãy tăng.

Xét 
$$u_n = n^2 \Rightarrow u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1 > 0$$
, loại.

$$X \text{ ft } u_n = n^2 \Rightarrow u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 - n^2 = 2n+1 > 0, \text{ loai.}$$

$$X \text{ ft } u_n = \sqrt{n+2} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = \sqrt{n+3} - \sqrt{n+2} = \frac{1}{\sqrt{n+3} + \sqrt{n+2}} > 0, \text{ loai.}$$

Chon đáp án (D).....

#### **CÂU 6.** Trong các dãy số $(u_n)$ sau, hãy chọn dãy số tăng.

$$\mathbf{A}$$
  $u_n = (-1)^{2n} (5^n + 1), n \in \mathbb{N}^*.$ 

$$\mathbf{C}u_n = (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{n}, \ n \in \mathbb{N}^*.$$

$$\mathbf{B} u_n = \frac{n}{n^2 + 1}, n \in \mathbb{N}^*.$$

$$\mathbf{D} u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1} + n}, n \in \mathbb{N}^*.$$

#### Dòi giải.

Xét dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = (-1)^{2n}(5^n + 1)$ , ta có

$$u_{n+1} - u_n = (-1)^{2n+2} (5^{n+1} + 1) - (-1)^{2n} (5^n + 1) = 5^{n+1} + 1 - 5^n - 1 = 4 \cdot 5^n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vây dãy trên là dãy số tăng.

Xét các dãy số còn lại

$$\bullet$$
 Với  $u_n = (-1)^{n+1} \sin \frac{\pi}{n}$  ta có  $u_1 = 0$ ,  $u_2 = -1$  hay  $u_1 > u_2$ . Vậy dãy số này không là dãy số tăng.

$$\bullet$$
 Với  $u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}+n}$  ta có  $u_1 = \sqrt{2}-1$ ,  $u_2 = 2-\sqrt{3}$  hay  $u_1 > u_2$ . Vậy dãy số này không là dãy số tăng.

$$\bullet$$
 Với  $u_n = \frac{n}{n^2 + 1}$  ta có  $u_1 = \frac{1}{2}$ ,  $u_2 = \frac{2}{5}$  hay  $u_1 > u_2$ . Vậy dãy số này không là dãy số tăng.

Chon đáp án (A)...

## **CÂU 7.** Trong các dãy số $(u_n)$ cho bởi số hạng tổng quát $u_n$ sau, dãy số nào là dãy số giảm?

$$\mathbf{A} u_n = \frac{n^2 + 1}{n}$$

**B** 
$$u_n = (-1)^n \cdot (2^n + 1)$$
. **C**  $u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$ . **D**  $u_n = \sin n$ .

$$\mathbf{C}u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}.$$

$$\mathbf{D}u_n = \sin n.$$

Xét  $u_n = \sin n \Rightarrow u_{n+1} - u_n = 2\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)\sin\frac{1}{2}$  có thể dương hoặc âm phụ thuộc n nên đáp án sai. Hoặc dễ thấy  $\sin n$  có dấu thay đổi trên  $\mathbb{N}^*$ nên dãy  $\sin n$  không tăng, không giảm.

Xét 
$$u_n = \frac{n^2 + 1}{n} = n + \frac{1}{n} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = 1 + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = \frac{n^2 + n - 1}{n(n+1)} > 0$$
 nên dãy đã cho tăng nên đáp án sai.

Xét 
$$u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1} = \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}$$
, dãy  $\sqrt{n} + \sqrt{n-1} > 0$  là dãy tăng nên suy ra  $u_n$  giảm.

Xét  $u_n = (-1)^n (2^n + 1)$  là dãy thay dấu nên không tăng không giảm, nên đáp án đúng.

Cách trắc nghiệm

Xét 
$$u_n = \sin n$$
 có dấu thay đổi trên  $\mathbb{N}^*$  nên dãy này không tăng không giảm.   
Xét  $u_n = \frac{n^2+1}{n}$ , ta có 
$$\begin{cases} n=1 \to u_1=2 \\ n=2 \to u_2=\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow u_1 < u_2 \Rightarrow u_n = \frac{n^2+1}{n} \text{ không giảm.}$$

Xét 
$$u_n = \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$$
, ta có 
$$\begin{cases} n = 1 \to u_1 = 1 \\ n = 2 \to u_2 = \sqrt{2} - 1 \end{cases} \Rightarrow u_1 > u_2 \text{ nên dự đoán dãy này giảm.}$$
 Xét  $u_n = (-1)^n (2^n + 1)$  là dãy thay dấu nên không tăng không giảm.

Cách CASIO.

Các dãy  $\sin n$ ;  $(-1)^n(2^n+1)$  có dấu thay đổi trên  $\mathbb{N}^*$  nên các dãy này không tăng không giảm nên loại các đáp án này.

Xét hai đáp án còn lại, ta chỉ cần kiểm tra một đáp án bằng chức năng TABLE.

Chẳng hạn kiểm tra đáp án  $u_n = \frac{n^2 + 1}{n}$ , ta vào chức năng TABLE nhập  $F(X) = \frac{X^2 + 1}{X}$  với thiết lập Start = 1, End =

Nếu thấy cột F(X) các giá trị tăng thì loại  $u_n = \frac{n^2 + 1}{n}$  nếu ngược lại nếu thấy cột F(X) các giá trị giảm dần thị chọn  $u_n = \frac{n^2 + 1}{n}.$ 

CÂU 8. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- igapha Dãy số  $u_n = \frac{1}{n} 2$  là dãy tăng.
- $\mathbf{C}$  Dấu số  $u_n = \frac{n}{n+1}$  là dãy giảm.

- **B** Dãy số  $u_n = 2n + \cos \frac{1}{n}$  là dãy tăng.
- $\bigcirc$ Dãy số  $u_n = (-1)^n (2^n + 1)$  là dãy giảm.

Xét đáp án 
$$u_n = \frac{1}{n} - 2 \Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} < 0 \Rightarrow loại.$$

Xét đáp án  $u_n = (-1)^n (2^n + 1)$  là dãy có dấu thay đổi nên không giảm nên loại.

Xét đáp án 
$$u_n = \frac{n-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = 2\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) > 0 \Rightarrow \text{loại}.$$

Xét đáp án 
$$u_n = \frac{n-1}{n+1} = 1 - \frac{2}{n+1} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = 2\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}\right) > 0 \Rightarrow \text{loại.}$$
  
Xét đáp án  $u_n = 2n + \cos\frac{1}{n} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = \left(2 - \cos\frac{1}{n+1}\right) + \cos\frac{1}{n+2} > 0 \text{ chọn.}$ 

Chọn đáp án (B).....

- **CÂU 9.** Mệnh đề nào sau đây **sai**? **A** Dãy số  $u_n = \frac{1-n}{\sqrt{n}}$  là dãy giảm.
  - $\bigcirc$  Dãy số  $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$  là dãy giảm.

- **B** Dãy số  $u_n = n + \sin^2 n$  là dãy tăng.
- $(\mathbf{D})$ Dãy số  $u_n = 2n^2 5$  là dãy tăng.

Dòi giải.

$$u_n = \frac{1 - n}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{n} \Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}} + \sqrt{n} - \sqrt{n+1} < 0 \text{ nên dãy } (u_n) \text{ là dãy giảm nên đúng.}$$

Xét đáp án  $u_n=2n^2-5$  là dãy tăng vì  $n^2$  là dãy tăng nên đúng. Hoặc  $u_{n+1}-u_n=2(2n+1)>0$  nên  $(u_n)$  là dãy tăng.

Hoạc 
$$u_{n+1} - u_n = 2(2n+1) > 0$$
 nên  $(u_n)$  là day tạng.  
Xét đáp án  $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n > 0 \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+2}{n+1} \cdot \left(\frac{n+2}{n}\right)^n > 1 \Rightarrow (u_n)$  là dãy tặng nên sai.  
Xét đáp án  $u_n = n + \sin^2 n \Rightarrow u_{n+1} - u_n = (1 - \sin^2(n+1)) + \sin^2 n > 0.$ 

Chọn đáp án (C).....

**CÂU 10.** Cho dãy  $(u_n)$ :  $\begin{cases} u_1=1\\ u_{n+1}=\frac{n}{2(n+1)}u_n+\frac{3(n+2)}{2(n+1)} \end{cases}, n\in\mathbb{N}^*. \text{ Nhận xét nào sau đây đúng}$ 

 $(\mathbf{A})$ Dãy số  $(u_n)$  là dãy số tăng.

- (**B**) Dãy số  $(u_n)$  là dãy số giảm.
- (**C**) Dãy số  $(u_n)$  là dãy số không tăng, không giảm.
- (D) Tất cả các đáp án còn lại đều sai.

Dèi giải.

Ta chứng minh quy nạp  $u_n < 3, \forall n \in N^*$ .

Giả sử mđ đúng với n = k khi đó có:

$$u_{k+1} = \frac{k}{2(k+1)}u_k + \frac{3(k+2)}{2(k+1)} < \frac{3k}{2(k+2)} + \frac{3(k+2)}{2(k+1)} = 3.$$

Vậy mệnh đề đúng với n = k + 1. Từ đó ta có

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(3 - u_n)(n+2)}{n+1} > 0.$$

Vậy dãy  $(u_n)$  tăng

Chon đáp án (A)...

## Dang 4. Xét tính bi chăn của dãy số

- $\odot$  Để chứng minh dãy số  $(u_n)$  bị chặn trên bởi M, ta chứng minh  $u_n \leq M$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- $\odot$  Để chứng minh dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới bởi m, ta chứng minh  $u_n \geq m, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .
- Để chứng minh dãy số bị chặn ta chứng minh nó bị chặn trên và bị chặn dưới.
  - Nếu dãy số  $(u_n)$  tăng thì bị chặn dưới bởi  $u_1$ .
  - Nếu dãy số  $(u_n)$  giảm thì bị chặn trên bởi  $u_1$ .

1. Ví dụ mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Chứng minh rằng dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{3n}{n^2+9}$  bị chặn trên bởi  $\frac{1}{2}$ 

#### 🗩 Lời giải.

Với mọi  $n \ge 1$ , ta có  $\frac{3n}{n^2+9} \le \frac{1}{2} \Leftrightarrow n^2+9 \le 6n \Leftrightarrow (n-3)^2 \le 0$  (đúng).

Vậy dãy số đã cho bị chặn trên bởi  $\frac{1}{2}$ .

**VÍ DỤ 2 (NB).** Chứng minh rằng dãy số  $(u_n)$  xác đinh bởi  $u_n = \frac{8n+3}{3n+5}$  là một dãy số bị chặn.

#### 🗩 Lời giải.

Ta có  $u_n > 0$ ,  $\forall n \ge 1$ . Suy ra dãy số bị chặn dưới. Mặt khác  $u_n = \frac{8n+3}{3n+5} < \frac{8n+3}{3n} = \frac{8}{3} + \frac{1}{n} < \frac{8}{3} + 1 = \frac{11}{3}$ . Do đó dãy số bị chặn trên bởi  $\frac{11}{3}$ .

Vậy dãy số đã cho bi chăn.

**VÍ DỤ 3 (TH).** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{3n+1}{n+3}$ 

Với 
$$n \in \mathbb{N}^*$$
 ta có  $u_n = \frac{3n+1}{n+3} > 0.$ 

Nên dãy 
$$(u_n)$$
 bị chặn dưới bởi 0.  
Mặt khác  $u_n = \frac{3n+1}{n+3} = \frac{3n+9-8}{n+3} = 3 - \frac{8}{n+3} < 3, \forall n \in \mathbb{N}^*.$ 
Nên dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi 3

Nên dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi 3

Vậy dãy số  $(u_n)$  bị chặn.

**VÍ DỤ 4 (VD).** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi  $u_1 = 1$  và  $u_{n+1} = \frac{u_n + 2}{u_n + 1}$ ,  $\forall n \geq 1$ . Chứng minh rằng dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi số  $\frac{3}{2}$  và bị chặn dưới bởi số 1.

## 🗩 Lời giải.

Ta chứng minh  $1 \le u_n \le \frac{3}{2}, \forall n \ge 1$  bằng phương pháp quy nạp.

$$\bullet$$
 Với  $n=1$  ta có  $1 \le u_1 \le \frac{3}{2}$ .

$$igotimes$$
 Giả sử  $1 \le u_n \le \frac{3}{2}$  với mọi  $n = k \ge 1$ , tức là  $1 \le u_k \le \frac{3}{2}$ . Ta cần chứng minh  $1 \le u_{k+1} \le \frac{3}{2}$ .

Thật vậy 
$$u_{k+1} = 1 + \frac{1}{u_k + 1}$$
.

Vì 
$$u_k + 1 > 0$$
 nên  $u_{k+1} = 1 + \frac{1}{u_k + 1} > 1$ .

Vì 
$$u_k + 1 \ge 2$$
 nên  $u_{k+1} = 1 + \frac{1}{u_k + 1} \le 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ .

Vậy  $1 \le u_n \le \frac{3}{2}$ ,  $\forall n \ge 1$  hay dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi số  $\frac{3}{2}$  và bị chặn dưới bởi số 1.

**VÍ DỤ 5 (VD).** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \sin n + \cos n$ .

## 🗩 Lời giải.

Ta có 
$$\sin n + \cos n$$

$$= \sqrt{2} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \sin n + \frac{1}{\sqrt{2}} \cos n \right)$$
$$= \sqrt{2} \left( \sin n \cdot \cos \frac{\pi}{4} + \cos n \cdot \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

$$=\sqrt{2}\sin\left(n+\frac{\pi}{4}\right).$$

$$Vi -1 \le \sqrt{2} \sin\left(n + \frac{\pi}{4}\right) \le 1$$

$$\Rightarrow -\sqrt{2} \le \sqrt{2} \sin\left(n + \frac{\pi}{4}\right) \le \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow -\sqrt{2} \le \sin n + \cos n \le \sqrt{2}, \ \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\Rightarrow -\sqrt{2} \le u_n \le \sqrt{2}, \ \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vậy dãy số  $(u_n)$  là dãy số bị chặn.

## 2. Bài tấp tư luân

BÀI 1 (TH). Xét tính bị chặn của các dãy số sau

a) 
$$u_n = \frac{1}{2n^2 - 1}$$
.

b) 
$$u_n = 3 \cdot \cos \frac{nx}{3}$$

c) 
$$u_n = 2n^3 + 1$$
.

d) 
$$u_n = \frac{n^2 + 2n}{n^2 + n + 1}$$
.

e) 
$$u_n = n + \frac{1}{n}$$
.

#### 🗩 Lời giải.

a) 
$$u_n = \frac{1}{2n^2 - 1}$$
.  
Ta có  $2n^2 - 1 \ge 1 \Rightarrow u_n = \frac{1}{2n^2 - 1} \le 1, \forall n \ge 1$ .

Vậy dãy số bị chặn trên bởi 1

b) 
$$u_n = 3 \cdot \cos \frac{nx}{3}$$
 có  $-1 \le \cos \frac{nx}{3} \le 1 \Rightarrow -3 \le 3 \cdot \cos \frac{nx}{3} \le 3$ .  
Vây dãy số bi chặn dưới bởi  $-3$  và chặn trên bởi  $3$ .

c) 
$$u_n = 2n^3 + 1$$
 có  $2n^3 + 1 \ge 3$ ,  $\forall n \ge 1$ .  
Vậy dãy số bị chặn dưới bởi 3.

d) 
$$u_n = \frac{n^2 + 2n}{n^2 + n + 1}$$
 có  $u_n = \frac{n^2 + 2n}{n^2 + n + 1} = 1 + \frac{n - 1}{n^2 + n + 1} \ge 1, \forall n \ge 1.$  Vây dãy số bị chặn dưới bởi 1.

e) 
$$u_n=n+\frac{1}{n}$$
 có  $u_n=n+\frac{1}{n}\geq 2\sqrt{n\cdot\frac{1}{n}}=2,\,\forall n>0.$  Vậy dãy số bị chặn bởi 2.

**BÁI 2 (VD).** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  với:

a) 
$$u_n = \frac{4}{n} - 5$$
.

b) 
$$u_n = \frac{n+4}{n+2}$$
.

c) 
$$u_n = \frac{5}{n^2 + 1} + \frac{n+2}{n+1} + \cos n$$
.

## P Lời giải.

a) 
$$u_n=\frac{4}{n}-5$$
. Ta có  $u_n=\frac{4}{n}-5\leq \frac{4}{1}-5=-1,\, \forall n\in\mathbb{N}^*$  suy ra dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi  $-1$ . Mặt khác  $u_n=\frac{4}{n}-5\geq -5\,\, \forall n\in\mathbb{N}^*$  suy ra dãy  $(u_n)$  bị chặn dưới bởi  $-5$ . Vậy dãy  $(u_n)$  bị chặn.

b) 
$$u_n=\frac{n+4}{n+2}$$
. Ta có  $u_n=\frac{n+4}{n+2}=1+\frac{2}{n+2}>1,\,\forall n\in\mathbb{N}^*$  suy ra dãy  $(u_n)$  bị chặn dưới bởi 1. Mặt khác  $u_n=\frac{n+4}{n+2}=1+\frac{2}{n+2}\leq 1+\frac{2}{1+2}=\frac{3}{5},\,\forall n\in\mathbb{N}^*$  suy ra dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi  $\frac{3}{5}$ . Vậy dãy  $(u_n)$  bị chặn.

c) 
$$u_n = \frac{5}{n^2+1} + \frac{n+2}{n+1} + \cos n.$$
 Ta có 
$$u_n = \frac{5}{n^2+1} + \frac{n+2}{n+1} + \cos n = \frac{5}{n^2+1} + 1 + \frac{1}{n+1} + \cos n < 5, \, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$
 Suy ra dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi 5.   
 Mặt khác 
$$u_n = \frac{5}{n^2+1} + \frac{n+2}{n+1} + \cos n = \frac{5}{n^2+1} + 1 + \frac{1}{n+1} + \cos n > 0, \, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$
 Suy ra dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi 0.   
 Vậy dãy  $(u_n)$  bị chặn.

**BÀI 3 (VDC).** Xét tính bị chặn của dãy số  $u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ ,  $n \in N^*$ .

Ta có 
$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > 0, \forall n \in \mathbb{N}^*$$
 nên  $(u_n)$  bị chặn dưới (1).

Lai có 
$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \left(\frac{1}{n}\right)^k$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \left[ \frac{n!}{k! \cdot (n-k)! \cdot n^k} \right]$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \left[ \frac{1}{k!} \cdot \frac{(n-k+1)}{n} \cdot \frac{(n-k+2)}{n} \dots \frac{(n-k+k)}{n} \right] \le \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}, n \in \mathbb{N}^*$$

$$\text{Mà } \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \le 1 + 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \\
 = 2 + \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\
 = 3 - \frac{1}{n} < 3, \, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Suy ra  $u_n < 3$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  nên dãy số  $(u_n)$  bị chặn trên (2).

Từ (1) và (2) suy ra dãy số  $(u_n)$  bị chặn.

**BÀI 4 (VD).** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi  $u_1 = 0$  và  $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 4, \forall n \ge 1.$ 

- a) Chứng minh dãy  $(u_n)$  bị chặn trên bởi số 8.
- b) Chứng minh dãy  $(u_n)$  tăng, từ đó suy ra dãy  $(u_n)$  bị chặn.

#### Dòi giải.

- a) Ta chứng minh  $u_n \leq 8$  với mọi  $n \geq 1$ .
  - **⊘** Khi n = 1, ta có  $u_1 = 0 < 8$ .
  - $\begin{aligned} & \boldsymbol{\Theta} \text{ Giả sử } u_n \leq 8 \text{ với } n=k \geq 1, \text{ tức là } u_k \leq 8. \\ & \text{ Ta cần chứng minh } u_{k+1} \leq 8. \\ & \text{ Thật vậy, } u_{k+1} = \frac{1}{2}u_k + 4 \leq \frac{1}{2} \cdot 8 + 4 \leq 8. \end{aligned}$

Vậy  $u_n \leq 8$  với mọi  $n \geq 1$ , hay  $(u_n)$  bị chặn trên bởi 8.

b) Với mọi  $n \ge 1$ , ta có  $u_{n+1} - u_n = 4 - \frac{1}{2}u_n$ . Mà  $u_n \le 8$  nên  $u_{n+1} - u_n \ge 0$ . Suy ra  $u_n$  là dãy số tăng. Do đó  $(u_n)$  bị chặn dưới bởi  $u_1 = 0$ . Kết hợp với câu a, ta được dãy số  $(u_n)$  bị chặn.

**BÁI 5 (VD).** Trong các dãy số  $(u_n)$  sau, dãy số nào bị chặn trên, bị chặn dưới và bị chặn?

a) 
$$u_n = n^2 + 5$$
.

b) 
$$u_n = \frac{3n+1}{2n+5}$$
.

c) 
$$u_n = (-1)^n \cos \frac{\pi}{2n}$$
.

d) 
$$u_n = \frac{n^2 + 2n}{n^2 + n + 1}$$
.

e) 
$$u_n = \frac{n}{\sqrt{n^2 + 2n} + n}$$
.

#### Lời giải.

- a) Dãy số bị chặn dưới bởi 6, không bị chặn trên.
- b) Đãy  $(u_n)$  bị chặn dưới bởi 0. Vì  $u_n < \frac{3n+1}{2n} = \frac{3}{2} + \frac{1}{2n} < \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$  nên dãy số bị chặn trên bởi  $\frac{5}{2}$ . Vậy dãy số bị chặn.
- c) Ta có  $|u_n| \le 1$  nên dãy số bị chặn trên bởi 1, bị chặn dưới bởi -1.
- d) Dãy số bị chặn dưới bởi 0. Vì  $u_n < \frac{n^2 + 2n}{n^2} = 1 + \frac{2}{n} \le 3$  nên dãy số bị chặn trên. Vậy dãy số bị chặn.
- e) Ta có  $0 < u_n \le 1$  vậy dãy số bị chặn.

## 3. Câu hỏi trắc nghiêm

**CÂU 1.** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi  $u_1 = 3$  và  $u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}$ ,  $\forall n \geq 1$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- (A) Dãy số bị chặn.
- (B) Dãy số bị chặn trên.
- **(C)** Dãy số bị chặn dưới.
- Dãy số không bị chặn.

#### 🗩 Lời giải.

Ta chứng minh  $u_n > 1, \forall n \geq 1$  bằng phương pháp quy nạp.

Suy ra dãy số bị chặn dưới bởi 1.

Ta có  $u_{n+1} - u_n = \frac{1 - u_n}{2} < 0, \forall n \ge 1.$ 

Do đó dãy số này là dãy số giảm nên nó bị chặn trên bởi  $u_1 = 3$ .

Vậy dãy số đã cho là dãy số bị chặn.

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 2.** Cho dãy số  $(u_n)$  xác định bởi  $u_1 = \sqrt{2}$  và  $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ ,  $\forall n \ge 1$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- (A) Dãy số bị chặn trên.
- (B) Dãy số bị chặn dưới. (C) Dãy số bị chặn.
- (**D**)Dãy số không bị chặn.

#### Dòi giải.

Vì  $u_n \ge 0$ ,  $\forall n \ge 1$  nên dãy số bị chặn dưới bởi 0.

Ta chứng minh  $u_n \geq 2, \forall n \geq 1$ . Suy ra dãy số bị chặn trên bởi 2.

Vậy dãy số đã cho là dãy số bị chặn.

Chọn đáp án (C).....

**CÂU 3.** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \ldots + \frac{1}{n \cdot (n+1)}$ .

- (A) Không bị chặn.
- (B) Bị chặn trên.
- (C) Bị chặn dưới.
- (D)Bị chặn.

🗩 Lời giải.

Ta có  $u_n = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \ldots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$ 

Do đó  $0 \le u_n \le 1, \forall n \ge 1.$ 

Vậy dãy số đã cho bị chặn.

Chọn đáp án (D).....

**CÂU 4.** Cho dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 5} + \ldots + \frac{1}{n \cdot (n+3)}$ . Dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới và chặn trên lần lượt bởi các số m và M nào dưới đây?

- (A)m = 0, M = 1.
- **B**  $m = 1, M = \frac{1}{2}.$  **C**  $m = 1, M = \frac{10}{10}.$  **D**  $m = 0, M = \frac{11}{18}.$

#### Dèi giải.

Rõ ràng  $u_n > 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  nên  $(u_n)$  bị chặn dưới. Mặt khác  $\frac{1}{k(k+3)} = \frac{1}{3} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+3} \right)$ .

Suy ra  $u_n = \frac{1}{3} \left[ \left( 1 - \frac{1}{4} \right) + \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{5} \right) + \left( \frac{1}{3} - \frac{1}{6} \right) + \left( \frac{1}{4} - \frac{1}{7} \right) + \right]$ 

$$\dots + \left(\frac{1}{n-3} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n-2} - \frac{1}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+2}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+3}\right)\right]$$
$$= \frac{1}{3}\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) < \frac{11}{18}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Do đó  $(u_n)$  bị chặn trên.

Vậy  $m = 0, M = \frac{11}{18}$ 

Chon đáp án D.....

**CÂU 5.** Cho dãy số  $(u_n)$  biết  $u_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \dots (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 2n}$ . Dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới và chặn trên lần lượt bởi các số m và M.

Tính giá trị biểu thức m + M?

- $\bigcirc \mathbf{B} \frac{1}{\sqrt{3}}$ .

 $\frac{1}{\sqrt{5}}$ .

 $\bigcirc \frac{1}{\sqrt{7}}$ .

🗗 Lời giải.

 $\begin{aligned} & \text{X\'et } \frac{2k-1}{2k} < \frac{2k-1}{\sqrt{4k^2-1}} = \frac{\sqrt{(2k-1)^2}}{\sqrt{(2k-1)(2k+1)}} = \frac{\sqrt{2k-1}}{\sqrt{2k+1}}, \, \forall k \geq 1. \\ & \Rightarrow u_n < \frac{\sqrt{1}}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} \cdot \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{7}} \cdot \ldots \cdot \frac{\sqrt{2n-1}}{\sqrt{2n+1}} = \frac{1}{\sqrt{2n+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{3}}, \, \forall n \in \mathbb{N}^*. \end{aligned}$ 

$$\Rightarrow 0 < u_n < \frac{1}{\sqrt{3}}, \forall n \in \mathbb{N}^*.$$

Vây 
$$m + M = 0 + \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Chọn đáp án (B)...

**CÂU 6.** Cho dãy số  $(u_n)$ , với  $u_n = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2}$ ,  $\forall n = 2; 3; 4; \ldots$  Khẳng định nào sau đây là đúng?

P Lời giải.

Ta có  $u_n>0 \Rightarrow (u_n)$  bị chặn dưới bởi 0. Mặt khác  $\frac{1}{k^2}<\frac{1}{(k-1)k}=\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k},\,(k\in\mathbb{N}^*,\,k\geq 2)$  nên suy ra

$$u_n < \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)}$$

$$= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} < 1.$$

Nên dãy  $(u_n)$  bị chặn trên, do đó dãy  $(u_n)$  bị chặn.

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 7.** Cho dãy số  $(u_n)$  và đặt  $u_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$  với  $a_k = \frac{1}{4k^2 - 1}$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng?

$$\bigcirc 0 < u_n < 1.$$

$$\bigcirc 0 < u_n < \frac{1}{2}.$$

$$\bigcirc 0 \le u_n \le 1.$$

🗩 Lời giải.

$$\mathbf{O}$$
 Ta có  $a_k = \frac{1}{4k^2 - 1} = \frac{1}{(2k+1)(2k-1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(2k+1) - (2k-1)}{(2k+1)(2k-1)} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right).$ 

 $\odot$  Mặt khác  $u_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k$ . Do đó

$$u_n = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \dots + \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2n+1}\right)$$
$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{n}{2n+1}.$$

 $\Theta$  Với mọi  $n \in \mathbb{N}^*$  thì  $u_n > 0$  nên dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới.

Ta lai có 
$$u_n = \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) < \frac{1}{2}.$$

Vậy dãy số bị chặn.

Chọn đáp án  $\bigcirc$  ......

**CÂU 8.** Cho dãy số  $(u_n)$  và đặt  $u_n = \sum_{k=1}^n a_k$  với  $a_k = \frac{1}{k(k+4)}$ . Dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới và chặn trên lần lượt bởi các số

**B** 
$$m = 0, M = \frac{25}{12}.$$
 **C**  $m = 1, M = \frac{1}{4}.$ 

$$m = 1, M = \frac{1}{4}.$$

$$\mathbf{D}m = 1, M = \frac{1}{2}.$$

Dèi giải.

Ta có 
$$a_k = \frac{1}{k(k+4)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{k(k+4)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{k+4-k}{k(k+4)} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+4}\right).$$

Mặt khác  $u_n = \sum a_k$ . Do đó

$$u_n = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{5}\right) + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) + \dots + \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+4}\right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4}\right)$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{25}{12} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4}\right).$$

Với mọi 
$$n \in \mathbb{N}^*$$
 thì  $u_n > 0$  nên dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới. Ta lại có  $u_n = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{25}{12} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} - \frac{1}{n+4}\right) < \frac{1}{4} \cdot \frac{25}{12} = \frac{25}{48}$ . Vậy  $m = 0, \ M = \frac{25}{48}$ .

Chon đáp án (A).....

**CÂU 9.** Xét tính bị chặn của dãy số  $(u_n)$  và đặt  $u_n = \sum_{k=1}^n a_k$  với  $a_k = \frac{1}{k(k+1)}$ .

(A) Bi chăn.

B) Bị chặn dưới.

(**D**)Không bị chặn...

D Lời giải.

Ta có 
$$a_k = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$
. Do đó

$$u_n = \sum_{k=1}^n a_k = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}.$$

Với mọi  $n \in \mathbb{N}^*$  thì  $u_n > 0$  nên dãy số  $(u_n)$  bị chặn dưới. Ta lại có  $u_n = 1 - \frac{n}{n+1} < 1, \forall n \in \mathbb{N}^*$  nên dãy số  $(u_n)$  bị chặn trên.

Vậy dãy số bị chặn.

Chọn đáp án (A).....

🗩 Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 = 6 \\ u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 6 \\ u_{n+1} \ge 0 \end{cases} \Rightarrow u_n \ge 0 \Rightarrow \begin{cases} u_1 = 6 \\ u_{n+1} = \sqrt{6 + u_n} \ge \sqrt{6} \end{cases} \Rightarrow u_n \ge \sqrt{6}.$$
Ta chứng minh quy nạp 
$$\begin{cases} u_n \le 2\sqrt{3} \\ u_1 \le 2\sqrt{3} \\ u_k \le 2\sqrt{3}. \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_{k+1} = \sqrt{6 + u_{k+1}} \le \sqrt{6 + 2\sqrt{3}} < \sqrt{6 + 6} = 2\sqrt{3}.$$
Vây  $\sqrt{6} < u_n < 2\sqrt{3}.$ 


 $V_{ay} \sqrt{6} \le u_n \le 2\sqrt{3}.$ 

Chọn đáp án (B).

## 🖶 Dạng 5. Toán thực tế về dãy số

## 1. Ví du mẫu

VÍ DU 1. Trên lưới ô vuông, mỗi ô cạnh 1 đơn vị, người ta vẽ 8 hình vuông và tô màu khác nhau như hình vẽ. Tìm dãy số biểu diễn độ dài cạnh của 8 hình vuông đó từ nhỏ đến lớn. Có nhận xét gì về dãy số trên?



Lời giải.

$$oldsymbol{\Theta} u_1 = 1.$$

$$u_3 = 2.$$

$$oldsymbol{0} u_6 = 8.$$

$$oldsymbol{0} u_8 = 21.$$

Ta có dãy số 
$$(u_n)$$
: 
$$\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_2 = 1 \\ u_n = u_{n-1} - u_{n-2} \end{cases}$$

**VÍ DỤ 2.** Chị Mai gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng theo thể thức lãi kép như sau. Lần đầu chị gửi 100 triệu đồng. Sau đó, cứ hết 1 tháng chị lại gửi thêm vào ngân hàng 6 triệu đồng. Biết lãi suất của ngân hàng là 0.5% một tháng. Gọi  $P_n$  (triệu đồng) là số tiền chị có trong ngân hàng sau n tháng.

- a) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 1 tháng.
- b) Tính số tiền chị có trong ngân hàng sau 3 tháng.
- c) Dự đoán công thức của  $P_n$  tính theo n.

#### 🗩 Lời giải.

- a) Số tiền chị có trong ngân hàng sau 1 tháng là  $P_1 = +100 + 100 \cdot 0.5\% + 6 = 100.5 + 6$  (triệu đồng).
- b) Số tiền chị có trong ngân hàng sau 2 tháng là

$$P_2 = 100.5 + 6 + (100.5 + 6) \cdot 0.5\% + 6$$

$$= (100.5 + 6)(1 + 0.5\%) + 6$$

$$= 100.5(1 + 0.5\%) + 6 \cdot (1 + 0.5\%) + 6 \text{ (triệu đồng)}.$$

Số tiền chị có trong ngân hàng sau 3 tháng là

$$P_3 = (100,5+6)(1+0,5\%) + 6 + [(100,5+6)(1+0,5\%) + 6] \cdot 0,5\% + 6$$
$$= 100,5 \cdot (1+0,5\%)^2 + 6(1+0,5\%)^2 + 6 \cdot (1+0,5\%) + 6(\text{triệu đồng}).$$

c) Số tiền chi có trong ngân hàng sau 4 tháng là

$$P_4 = (100.5 + 6)(1 + 0.5\%)^2 + 6 \cdot (1 + 0.5\%) + 6 + [(100.5 + 6)(1 + 0.5\%)^2 + 6 \cdot (1 + 0.5\%) + 6] \cdot 0.5\% + 6$$

$$= 100.5 \cdot (1 + 0.5\%)^3 + 6 \cdot (1 + 0.5\%)^3 + 6 \cdot (1 + 0.5\%)^2 + 6 \cdot (1 + 0.5\%) + 6 \text{ (triêu đồng)}.$$

Số tiền chị có trong ngân hàng sau n tháng là

$$P_n = 100.5 \cdot (1 + 0.5\%)^{n-1} + 6 \cdot (1 + 0.5\%)^{n-1} + 6 \cdot (1 + 0.5\%)^{n-2} + 6 \cdot (1 + 0.5\%)^{n-3} + \dots + 6 \cdot (1 + 0.5\%)^{n-1} + 6 \cdot (1$$

với mọi  $n \in \mathbb{N}^*$ .

**VÌ DỤ 3.** Anh Thanh vừa được tuyển dụng vào một công ty công nghệ, được cam kết lương năm đầu sẽ là 200 triệu đồng và lương mỗi năm tiếp theo sẽ được tăng thêm 25 triệu đồng. Gọi  $s_n$  (triệu đồng) là lương vào năm thứ n mà anh Thanh làm việc cho công ty đó. Khi đó ta có

$$s_1 = 200, \, s_n = s_{n-1} + 25 \, \text{v\'en} \, n \ge 2.$$

- a) Tính lương của anh Thanh vào năm thứ 5 làm việc cho công ty.
- b) Chứng minh  $(s_n)$  là dãy số tăng. Giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả này.

#### D Lời giải.

a) Ta có

$$s_2 = s_1 + 25 = 200 + 25 = 225$$
  
 $s_3 = s_2 + 25 = 225 + 25 = 250$   
 $s_4 = s_3 + 25 = 250 + 25 = 275$   
 $s_5 = s_4 + 25 = 275 + 25 = 300$ 

Vây lương của anh Thanh vào năm thứ 5 làm việc cho công ty là 300 triệu đồng.

b) Ta có  $s_n = s_{n-1} + 25 \Leftrightarrow s_n - s_{n-1} = 25 > 0$  với mọi  $n \ge 2, n \in \mathbb{N}^*$ .

Tức là  $s_n > s_{n-1}$  với mọi  $n \ge 2, n \in \mathbb{N}^*$ .

Vậy  $(s_n)$  là dãy số tăng.

Diều này có nghĩa là mức lương hàng năm của anh Thanh tăng dần theo thời gian làm việc.

**VÍ DỤ 4.** Ông An gửi tiết kiệm 100 triệu đồng kì hạn 1 tháng với lãi suất 6% một năm theo hình thức tính lãi kép. Số tiền (triệu đồng) của ông An thu được sau n tháng được cho bởi công thứC

$$A_n = 100 \left( 1 + \frac{0.06}{12} \right)^n.$$

- a) Tìm số tiền ông An nhận được sau tháng thứ nhất, sau tháng thứ hai.
- b) Tìm số tiền ông An nhận được sau 1 năm.

#### Dòi giải.

a) Số tiền ông An nhận được sau tháng thứ nhất là

$$A_1 = 100 \left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^1 = 100.5$$
(triệu đồng).

Số tiền ông An nhận được sau tháng thứ hai là

$$A_2 = 100 \left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^2 = 101,0025 \, ({\rm triệu} \ {\it đồng}).$$

b) Số tiền ông An nhận được sau 1 năm (12 tháng) là

$$A_{12} = 100 \left(1 + \frac{0.06}{12}\right)^{12} \approx 106,17 \, ({\rm triệu} \ {\rm đồng}).$$

**VÍ DỤ 5.** Chị Hương vay trả góp một khoản tiền 100 triệu đồng và đồng ý trả dần 2 triệu đồng mỗi tháng với lãi suất 0.8% số tiền còn lại của mỗi tháng. Gọi  $A_n$ ,  $(n \in \mathbb{N})$  là số tiền còn nợ (triệu đồng) của chị Hương sau n tháng.

- a) Tìm lần lượt  $A_0$ ,  $A_1$ ,  $A_2$ ,  $A_3$ ,  $A_4$ ,  $A_5$ ,  $A_6$  để tính số tiền còn nợ của chị Hương sau 6 tháng.
- b) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy số  $(A_n)$ .

#### Dèi giải.

- a) Ta có  $A_0 = 100$  (triệu đồng).
  - Tiền lãi chị Hương phải trả sau 1 tháng là 100 · 0,8% = 0,8 (triệu đồng).
     Do đó, số tiền gốc chị Hương trả được sau 1 tháng là 2 − 0,8 = 1,2 (triệu đồng).
     Khi đó, số tiền còn nợ của chị Hương sau 1 tháng là A₁ = 100 − 1,2 = 98,8 (triệu đồng).
  - Tiền lãi chị Hương phải trả sau 2 tháng là  $98.8 \cdot 0.8\% = 0.7904$  (triệu đồng).
     Do đó, số tiền gốc chị Hương trả được sau 2 tháng là 2 0.7904 = 1,2096 (triệu đồng).
     Khi đó, số tiền còn nợ của chị Hương sau 2 tháng là  $A_2 = 98.8 1,2096 = 97,5904$  (triệu đồng).
  - $\bigcirc$  Tiền lãi chị Hương phải trả sau 3 tháng là  $97,5904 \cdot 0.8\% = 0,7807232$  (triệu đồng). Do đó, số tiền gốc chị Hương trả được sau 3 tháng là 2 0,7807232 = 1,2192768 (triệu đồng). Khi đó, số tiền còn nợ của chị Hương sau 3 tháng là  $A_3 = 97,5904 1,2192768 = 96,3711232$  (triệu đồng).
  - **⊘** Tiền lãi chị Hương phải trả sau 4 tháng là  $96,3711232 \cdot 0.8\% \approx 0,77097$  (triệu đồng). Do đó, số tiền gốc chị Hương trả được sau 4 tháng là 2 0,77097 = 1,22903 (triệu đồng). Khi đó, số tiền còn nợ của chị Hương sau 4 tháng là  $A_4 = 96,3711232 1,22903 = 95,1420932$  (triệu đồng).
  - $\odot$  Tiền lãi chị Hương phải trả sau 5 tháng là  $95,1420932 \cdot 0,8\% \approx 0,76114$  (triệu đồng). Do đó, số tiền gốc chị Hương trả được sau 5 tháng là 2-0,76114=1,23886 (triệu đồng). Khi đó, số tiền còn nợ của chị Hương sau 5 tháng là  $A_5=95,1420932-1,23886=93,9032332$  (triệu đồng).
  - $\bigcirc$  Tiền lãi chị Hương phải trả sau 6 tháng là  $93,9032332 \cdot 0,8\% \approx 0,75123$  (triệu đồng). Do đó, số tiền gốc chị Hương trả được sau 6 tháng là 2-0,75123=1,24877 (triệu đồng). Khi đó, số tiền còn nợ của chị Hương sau 6 tháng là  $A_6=93,9032332-1,24877=92,6544632$  (triệu đồng).
- b) Dự đoán hệ thức truy hồi đối với dãy số  $(A_n)$  là

$$A_0 = 100, A_n = A_{n-1} - (2 - A_{n-1} \cdot 0.8\%) = 1.008A_{n-1} - 2$$

# Bài 6. CẤP SỐ CỘNG

# A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

## 1. Đinh nghĩa

Dãy số là cấp số cộng nếu mỗi một số hạng (kể từ số hạng thứ hai) đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi d.

Dãy số  $(u_n)$  là cấp số cộng  $\Leftrightarrow u_{n+1} = u_n + d, \forall n \in \mathbb{N}^*.$ 

d là số không đổi, gọi là **công sai** của cấp số cộng.

## 2. Tính chât

Nếu  $(u_n)$  là cấp số công thì kể từ số hang thứ hai (trừ số hang cuối nếu là cấp số công hữu han) đều là trung bình công của hai số hạng đứng kề nó trong dãy. Tức là

$$u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}, (\forall k \ge 2, k \in \mathbb{N}^*).$$

## 3. Số hang tổng quát

Nếu cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1$  và công sai d thì số hạng tổng quát  $u_n$  được xác định bởi công thức

$$u_n = u_1 + (n-1)d \text{ với } n \ge 2.$$

# 4. Tổng n số hang đầu tiên

Cho cấp số cộng  $(u_n)$ . Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng kí hiệu là  $S_n = u_1 + u_2 + \ldots + u_n$ .

Khi đó  $S_n$  được tính theo công thức

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{n}{2} [2u_1 + (n-1)d].$$

# B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GĂP

#### Dạng 1. Nhận diện cấp số cộng, công sai d

Dựa theo định nghĩa của cấp số cộng, để nhận diện  $(u_n)$  là cấp số cộng  $\Leftrightarrow u_{n+1} = u_n + d$ . Khi đó công sai  $d = u_{n+1} - u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*.$ 

## 1. Ví du mẫu

VÍ DU 1 (NB). Dãy số hữu hạn nào là một cấp số cộng? Vì sao?

a) 
$$-2$$
, 1, 4, 7, 10, 13, 16.

b) 
$$1, -2, -4, -6, -8$$
.

#### De Loi giải.

- a) Ta thấy  $u_2 = u_1 + 3$  do 1 = (-2) + 3. Vì  $u_k = u_{k-1} + d$ ,  $\forall k \ge 2$  ( 1 = (-2) + 3; 4 = 1 + 3; 7 = 4 + 3; 10 = 7 + 3; 13 = 10 + 3; 16 = 13 + 3) nên dãy số đã cho là cấp số cộng.
- b) Ta thấy  $u_2=u_1+(-3)$  do -2=1+(-3). Vì  $u_3\neq u_2+(-3)$  bởi  $(-4\neq -2+(-3))$  nên dãy số đã cho không là cấp số cộng.

VI DU 2 (TH). Trong các dãy số dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

a) Dãy số 
$$(a_n)$$
 với  $a_n = 4n - 3$ ;

b) Dãy số 
$$(c_n)$$
 với  $c_n = 2018^n$ .

#### D Lời giải.

- a) Ta có  $a_{n+1} = 4(n+1) 3 = 4n+1$  nên  $a_{n+1} a_n = (4n+1) (4n-3) = 4, \forall n \ge 1...$
- b) Ta có  $c_{n+1} = 2018^{n+1}$  nên  $c_{n+1} c_n = 2018^{n+1} 2018^n = 2017 \cdot 2018^n$  (phụ thuộc vào giá trị của n). Suy ra  $(c_n)$  không phải là một cấp số cộng.

**VÍ DỤ 3 (NB).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có công thức số hạng tổng quát  $u_n = 3n + 1, n \in \mathbb{N}^*$ . Tìm số hạng đầu  $u_1$  và công sai d?

#### Lời giải.

Từ công thức số hạng tổng quát, ta có  $u_1 = 4$ ,  $u_2 = 7$  suy ra  $d = u_2 - u_1 = 3$ .

**VÍ DỤ 4 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$ ,  $u_2 = 9$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng bao nhiêu?  $\bigcirc$  **Lời giải.** 

Cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng tổng quát là  $u_n = u_1 + (n-1)d$  với  $n \ge 2$ .

Suy ra  $u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow 9 = 3 + d \Leftrightarrow d = 6$ .

Vậy công sai của cấp số cộng đã cho là 6.

**VÍ DỤ 5 (VD).** Tính số hạng đầu  $u_1$  và công sai d của một cấp số cộng biết  $u_4 = 10$  và  $u_7 = 19$ .  $\bigcirc$  Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_4 = 10 \\ u_7 = 19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 10 \\ u_1 + 6d = 19 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = 3. \end{cases}$$

## 2. Bài tập tự luận

BÀI 1 (NB). Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

- a)  $1, -3, -7, -11, -15, \ldots;$
- b)  $1, -2, -4, -6, -8, \dots$
- c)  $\frac{1}{2}$ , 0,  $-\frac{1}{2}$ , -1,  $-\frac{3}{2}$ , ...

#### 🗩 Lời giải.

Ta lần lượt đi kiểm tra:  $u_2 - u_1 = u_3 - u_2 = u_4 - u_3 = \dots$ ?

Xét từng dãy số thì ta thấy 1) và 3) là cấp số cộng.

BÀI 2 (NB). Trong các dãy số sau, dãy nào là cấp số cộng. Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng đó.

a) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = 19n - 5$ ;

b) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = n^2 + n + 1$ .

#### 🗩 Lời giải.

- a) Dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = 19n 5$ . Ta có  $u_{n+1} - u_n = 19(n+1) - 5 - (19n - 5) = 19$ . Vậy  $(u_n)$  là một cấp số cộng với số hạng đầu là  $u_1 = 19 \cdot 1 - 5 = 14$  và công sai d = 19.
- b) Đãy số  $(u_n)$  với  $u_n = n^2 + n + 1$ . Ta có  $u_{n+1} - u_n = (n+1)^2 + (n+1) + 1 - (n^2 + n + 1) = 2n + 2$  phụ thuộc vào n. Vậy  $(u_n)$  không là một cấp số cộng.

**BÀI 3 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = 3$ ,  $u_2 = 9$ . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng bao nhiêu?  $\bigcirc$  **Lời giải.** 

Cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng tổng quát là  $u_n = u_1 + (n-1) d$  với  $n \ge 2$  (số hạng đầu  $u_1$  và công sai d) Suy ra  $u_2 = u_1 + d \Leftrightarrow 9 = 3 + d \Leftrightarrow d = 6$ .

Vậy công sai của cấp số cộng đã cho là 6.

**BÀI 4 (TH).** Tìm số hạng đầu tiên, công sai của cấp số cộng sau  $\begin{cases} u_5 = 19 \\ u_9 = 35. \end{cases}$ 

## 🗩 Lời giải.

Áp dụng công thức  $u_n = u_1 + (n-1)d$  ta có  $\begin{cases} u_5 = 19 \\ u_9 = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 4d = 19 \\ u_1 + 8d = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4. \end{cases}$ 

Vậy số hạng đầu tiên  $u_1 = 3$ , công sai d = 4.

**BÀI 5 (VD).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_2 + u_4 - u_6 = -7 \\ u_8 + u_7 = 2u_4 \end{cases}$ . Xác định số hạng đầu  $u_1$  và công sai d cấp số cộng.

#### P Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_2 + u_4 - u_6 = -7 \\ u_8 + u_7 = 2u_4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d + (u_1 + 3d) - (u_1 + 5d) = -7 \\ u_1 + 7d - (u_1 + 6d) = 2(u_1 + 3d) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - d = -7 \\ 2u_1 + 5d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -5 \\ d = 2. \end{cases}$$

**BÀI 6 (VD).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases}$ . Xác định số hạng đầu  $u_1$  và công sai d cấp số cộng.

#### 🗩 Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d - (u_1 + 2d) + u_1 + 4d = 10 \\ u_1 + 3d + u_1 + 5d = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 10 \\ u_1 + 4d = 13 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = 3. \end{cases}$$

**BÀI 7 (VDC).** Tính số hạng đầu  $u_1$  và công sai d của một cấp số cộng biết

#### 🗩 Lời giải.

 $\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 27 \\ u_1^2 + u_2^2 + u_3^2 = 275 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_2 - d + u_2 + u_2 + d = 27 \\ (u_2 - d)^2 + u_2^2 + (u_2 + d)^2 = 275 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_2 = 9 \\ 3u_2^2 + 2d^2 = 275. \end{cases}$ 

Thay  $u_2 = 9$  vào  $3u_2^2 + 2d^2 = 275$  ta được d = 4 hay

Vậy  $u_1 = 5$ , d = 4 hoặc  $u_1 = 13$ , d = -4.

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số công?

(A)1; -3; -7; -11; -15; .... (B)1; -3; -6; -9; -12; .... (C)1; -2; -4; -6; -8; .... (D)1; -3; -5; -7; -9; ....

#### Dòi giải.

Ta lần lượt tính khoảng cách d các phần tử, ta thấy dãy số đáp án A có d = -4.

**CÂU 2.** Dãy số nào sau đây **không** phải là cấp số cộng?

$$\mathbf{A} - \frac{2}{3}; -\frac{1}{3}; 0; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1; \frac{4}{3}.$$

**B**)  $15\sqrt{2}$ :  $12\sqrt{2}$ :  $9\sqrt{2}$ :  $6\sqrt{2}$ .

$$\bigcirc$$
  $\frac{4}{5}$ ; 1;  $\frac{7}{5}$ ;  $\frac{9}{5}$ ;  $\frac{11}{5}$ .

Ta lần lượt tính khoảng cách d các phần tử, ta thấy dãy số trừ đáp án C có khoảng cách các phần tử không bằng nhau. Chọn đáp án  $\binom{\mathbb{C}}{}$ .

**CÂU 3.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1=2$  và  $u_2=6$ . Công sai của cấp số cộng đã cho là

(**A**)4.

🗭 Lời giải.

Ta có  $u_2 = 6 \Leftrightarrow 6 = u_1 + d \Leftrightarrow d = 4$ .

Chon đáp án (A).....

**CÂU 4.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_1 = -3$  và  $u_6 = 27$ . Công sai d của cấp số cộng đã cho là

$$\mathbf{B}$$
 $d=5$ .

$$\mathbf{C}d = 8$$

$$\mathbf{D}d = 6.$$

Dòi giải.

Ta có  $u_6 = 27 \Leftrightarrow 27 = u_1 + 5d \Leftrightarrow d = 6$ .

Chọn đáp án (D).

**CÂU 5.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $u_{17}=33$  và  $u_{33}=65$ . Công sai của cấp số cộng đã cho là

(**A**)1.

$$(\mathbf{c})$$
-2.



🗩 Lời giải.

Goi  $u_1$ , d lần lượt là số hang đầu và công sai của cấp số công  $(u_n)$ .

Khi đó, ta có  $u_{17} = u_1 + 16d$ ,  $u_{33} = u_1 + 32d$ 

Suy ra  $u_{33} - u_{17} = 65 - 33 \Leftrightarrow 16d = 32 \Leftrightarrow d = 2$ 

Vậy công sai bằng 2.

Chọn đáp án (D).....

**CÂU 6.** Cho cấp số cộng có  $u_1 = -3$  và d = 4. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

 $(\mathbf{A})u_5 = 15.$ 

**(B)** 
$$u_4 = 8$$
.

$$(\mathbf{C})u_3 = 5.$$

$$(\mathbf{D})u_2 = 2$$

Lời giải.

Ta có  $u_3 = u_1 + 2d = -3 + 2 \cdot 4 = 5$ .

Chọn đáp án (C).....

**CÂU 7.** Cho cấp số cộng có  $u_1 = 11$  và công sai d = 4. Hãy tính  $u_{99}$ .

(A) 401.

(**D**)404.

Dòi giải.

Ta có  $u_{99} = u_1 + 98d = 11 + 98 \cdot 4 = 403$ .

Chọn đáp án (B).....

**CÂU 8.** Một cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_{13} = 8$  và d = -3. Tìm số hạng thứ ba của cấp số cộng  $(u_n)$ .

(A) 50.

(B)28.

(**D**)44.

Lời giải.

Ta có  $u_{13} = u_1 + 12d \Leftrightarrow 8 = u_1 + 12 \cdot (-3) \Rightarrow u_1 = 44 \Rightarrow u_3 = u_1 + 2d = 44 - 6 = 38.$ 

Chọn đáp án  $\binom{\mathbb{C}}{}$ .

**CÂU 9.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1=2$  và công sai d=4. Hãy tính giá trị  $u_{2019}$  bằng

(A) 8074.

**(B)**4074.

**(C)**8078.

#### 🗩 Lời giải.

Ta có  $u_{2019} = u_1 + 2018d = 2 + 2018 \cdot 4 = 8074.$ 

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 10.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng tổng quát là  $u_n = 3n - 2$ . Tìm công sai d của cấp số cộng.

$$\mathbf{A}d=3.$$

$$\mathbf{B}$$
 $d=2.$ 

$$cd = -2.$$

$$\mathbf{D}d = -3.$$

#### 🗩 Lời giải.

Ta có  $u_{n+1} - u_n = 3(n+1) - 2 - 3n + 2 = 3$ . Suy ra công sai d = 3.

## Dạng 2. Số hạng tổng quát của cấp số cộng

Để xác định số hạng tổng quát của một cấp số cộng, ta sử dụng công thức

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$
 hoặc  $u_n = u_{n-1} + d$  với  $n \ge 2$ .

Tức là ta cần xác định số hạng đầu  $u_1$  và công sai d.

## 1. Ví du mâu

**VÍ DỤ 1 (TH).** Xác định số hạng tổng quát của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_7 = 8 \\ d = 2 \end{cases}$ 

#### Lời giải.

Ta có

$$\begin{cases} u_7 = 8 \\ d = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 6d = 8 \\ d = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -4 \\ d = 2. \end{cases}$$

Vậy công thức tổng quát của cấp số cộng

$$u_n = -4 + (n-1)2 \Leftrightarrow u_n = 2n - 6 \text{ v\'oi } n \ge 2.$$

**VÍ DỤ 2 (TH).** Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_1 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_1 + u_6 = 17. \end{cases}$ 

#### Dèi giải.

Ta có

$$\begin{cases} u_1 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_1 + u_6 = 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 + 4d - (u_1 + 2d) = 10 \\ u_1 + u_1 + 5d = 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 2d = 10 \\ 2u_1 + 5d = 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 16 \\ d = -3. \end{cases}$$

Vậy  $u_1 = 16, d = -3.$ 

**VÍ DỤ 3 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_1 = -9 \\ u_{n-1} = u_n - 5 \end{cases}$ . Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng  $(u_n)$ .

Từ công thức  $u_{n-1} = u_n - 5 \Leftrightarrow u_n = u_{n-1} + 5$ , suy ra d = 5.

Vậy công thức tổng quát của cấp số cộng  $(u_n)$  là  $u_n = -9 + 5(n-1) = 5n - 14$ .

**VI DỤ 4 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_{20} = -52$  và  $u_{51} = -145$ . Hãy tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng đó. 🗩 Lời giải.

Ta có

$$\begin{cases} u_{20} = -52 \\ u_{51} = -145 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 19d = -52 \\ u_1 + 50d = -145 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 5 \\ d = -3. \end{cases}$$

Vậy số hạng tổng quát cần tìm là  $u_n = u_1 + (n-1)d = 5 + (n-1) \cdot (-3) = -3n + 8$ 

**VÍ DỤ 5 (VD).** Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết

a) 
$$\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5. \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_1 + u_6 = 7. \end{cases}$$

#### 🗩 Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 8d = 5(u_1 + d) \\ u_1 + 12d = 2(u_1 + 5d) + 5 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} -4u_1 + 3d = 0 \\ -u_1 + 2d = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4. \end{cases}$$

Vây  $u_1 = 3, d = 4.$ 

b) Ta có

$$\begin{cases} u_1 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_1 + u_6 = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - (u_1 + 2d) + (u_1 + 4d) = 10 \\ u_1 + (u_1 + 5d) = 7 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 2d = 10 \\ 2u_1 + 5d = 7 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 36 \\ d = -13. \end{cases}$$

Vây  $u_1 = 36$ , d = -13.

**VÌ DỤ 6 (VD).** Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết

a) 
$$\begin{cases} -u_3 + u_7 = 8 \\ u_2 u_7 = 75. \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} u_5 = 4u_3 \\ u_2u_6 = -11. \end{cases}$$

#### D Lời giải.

a) Ta có

$$\begin{cases} -u_3 + u_7 = 8 \\ u_2 u_7 = 75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -(u_1 + 2d) + (u_1 + 6d) = 8 \\ (u_1 + d)(u_1 + 6d) = 75 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4d = 8 \\ u_1^2 + 7u_1d + 6d^2 = 75 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} d = 2 \\ u_1^2 + 14u_1 - 51 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} u_1 = -17 \\ d = 2 \end{cases}$$

Vậy 
$$\begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 2 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} u_1 = -17 \\ d = 2. \end{cases}$$

b) Ta có

$$\begin{cases} u_5 = 4u_3 \\ u_2u_6 = -11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 4d = 4(u_1 + 2d) \\ (u_1 + d)(u_1 + 5d) = -11 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3u_1 + 4d = 0 \\ u_1^2 + 6du_1 + 5d^2 = -11 \end{cases} \tag{1}$$

Từ (1) suy ra  $3u_1 = -4d$ . Thay vào (2) ta được

$$9u_1^2 + 54du_1 + 45d^2 = -99 \Leftrightarrow 16d^2 - 72d^2 + 45d^2 = -99$$
  
 $\Leftrightarrow -11d^2 = -99 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} d = 3 \\ d = -3. \end{bmatrix}$ 

Với 
$$d=3$$
, ta có  $u_1=-4$ .  
Với  $d=-3$ , ta có  $u_1=4$ .  
Vậy 
$$\begin{cases} u_1=-4\\ d=3 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} u_1=4\\ d=-3. \end{cases}$$

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1 (TH).** Xác định công thức tổng quát của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_{11} = 5 \\ d = -6. \end{cases}$ 

Ta có

$$\begin{cases} u_{11} = 5 \\ d = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 10d = 5 \\ d = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 65 \\ d = -6. \end{cases}$$

Vậy công thức tổng quát của cấp số cộng:

$$u_n = 65 + (n-1) \cdot (-6) \Leftrightarrow u_n = -6n + 71 \text{ v\'oi } n \ge 2.$$

**BÀI 2 (TH).** Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng  $(u_n)$ , biết  $\begin{cases} u_2 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26. \end{cases}$   $\bigcirc$  Lời giải.

Ta có

$$\begin{cases} u_2 + u_5 - u_3 = 10 \\ u_4 + u_6 = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d + u_1 + 4d - (u_1 + 2d) = 10 \\ u_1 + 3d + u_1 + 5d = 26 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 10 \\ 2u_1 + 8d = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = 3. \end{cases}$$

Vậy  $u_1 = 1, d = 3.$ 

BÀI 3 (TH). Tìm số hạng đầu và công sai của cấp số cộng, biết

a) 
$$\begin{cases} u_7 = 27 \\ u_{15} = 59. \end{cases}$$

b) 
$$\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5. \end{cases}$$

c) 
$$\begin{cases} u_2 + u_4 - u_6 = -7 \\ u_8 - u_7 = 2u_4. \end{cases}$$

d) 
$$\begin{cases} u_3 - u_7 = -8 \\ u_2 \cdot u_7 = 75. \end{cases}$$

e) 
$$\begin{cases} u_6 + u_7 = 60 \\ u_4^2 + u_{12}^2 = 1170. \end{cases}$$

#### P Lời giải.

a) Ta có 
$$\begin{cases} u_7 = 27 \\ u_{15} = 59 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 6d = 27 \\ u_1 + 14d = 59 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4. \end{cases}$$

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là  $u_1 = 3$ , công sai là d = 4

b) Ta có 
$$\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 8d = 5u_1 + 5d \\ u_1 + 12d = 2u_1 + 10d + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4u_1 - 3d = 0 \\ -u_1 + 2d = 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4. \end{cases}$$
 Vây số hang đầu của cấp số công là  $u_1 = 3$ , công sai là  $d = 4$ .

c) Ta có 
$$\begin{cases} u_2 + u_4 - u_6 = -7 \\ u_8 - u_7 = 2u_4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d + u_1 + 3d - u_1 - 5d = -7 \\ u_1 + 7d - u_1 - 6d = 2u_1 + 6d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - d = -7 \\ 2u_1 + 5d = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -5 \\ d = 2. \end{cases}$$
 Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là  $u_1 = -5$ , công sai là  $d = 2$ .

d) Ta có 
$$\begin{cases} u_3 - u_7 = -8 \\ u_2 \cdot u_7 = 75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 2d - u_1 - 6d = -8 \\ (u_1 + d)(u_1 + 6d) = 75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 2 \\ u_1^2 + 14u_1 - 51 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 2 \\ u_1 = 3 \\ u_1 = -17. \end{cases}$$

Vậy số hạng đầu của cấp số cộng là  $u_1 = 3$ , công sai là d = 2 hoặc  $u_1 = -17$ , d = 2.

e) Ta có 
$$\begin{cases} u_6 + u_7 = 60 \\ u_4^2 + u_{12}^2 = 1170 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_6 + d = 60 \\ (u_6 - 2d)^2 + (u_6 + 6d)^2 = 1170. \end{cases}$$
(1)
Tir (1) suy ra  $d = 60 - 2u_6$ , they vào (2) ta có

$$(5u_6-120)^2+(360-11u_6)^2=1170 \Leftrightarrow 146u_6^2-9120u_6+142830=0 \text{ (vô nghiệm)}.$$

Vậy không tồn tại cấp số cộng thỏa yêu cầu bài toán.

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1$  và công sai d. Công thức tìm số hạng tổng quát  $u_n$  là

$$\mathbf{A} u_n = u_1 + (n-1)d.$$

$$\mathbf{B}u_n = u_1 + nd.$$

$$\mathbf{C}u_n = u_1 + (n+1)d.$$

🗩 Lời giải.

Ta có  $u_n = u_1 + (n-1)d$ .

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 2.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -3$  và  $d = \frac{1}{2}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) 
$$u_n = -3 + \frac{1}{2}(n+1)$$
. (B)  $u_n = -3 + \frac{1}{2}n - 1$ . (C)  $u_n = -3 + \frac{1}{2}(n-1)$ . (D)  $u_n = -3 + \frac{1}{4}(n-1)$ .

$$\mathbf{B} u_n = -3 + \frac{1}{2}n - 1.$$

$$\mathbf{C}u_n = -3 + \frac{1}{2}(n-1).$$

Dòi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 = -3 \\ d = \frac{1}{2} \end{cases} \xrightarrow{CTTQ} u_n = u_1 + (n-1)d = -3 + \frac{1}{2}(n-1).$$

**CAU 3.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  xác định bởi  $u_n = 2n + 1$ . Xác định số hạng đầu  $u_1$  và công sai d của cấp số cộng.

$$(A)u_1 = 3, d = 1.$$

**B**)
$$u_1 = 1, d = 1.$$

$$\mathbf{C}$$
 $u_1 = 3, d = 2.$ 

$$\mathbf{D}$$
 $u_1 = 1, d = 2.$ 

🗩 Lời giải.

Ta có  $u_1 = 2 \cdot 1 + 1 = 3$  và  $u_2 = 2 \cdot 2 + 1 = 5$ , nên  $d = u_2 - u_1 = 2$ .

**CÂU 4.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_4 = -12$ ,  $u_{14} = 18$ . Tìm số hạng đầu  $u_1$  và công sai d của cấp số cộng  $(u_n)$ .

$$\mathbf{A}$$
 $u_1 = -20, d = -3.$ 

$$\mathbf{B}$$
) $u_1 = -22, d = 3$ .

$$\mathbf{c}$$
 $u_1 = -21, d = 3.$ 

$$\mathbf{D}$$
 $u_1 = -21, d = -3.$ 

🗩 Lời giải.

 $\mathrm{Ta}\ \mathrm{c}\acute{\mathrm{o}}$ 

$$\begin{cases} u_4 = u_1 + (4-1)d \\ u_{14} = u_1 + (14-1)d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -12 = u_1 + 3d \\ 18 = u_1 + 13d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -12 \\ d = 3. \end{cases}$$

$$\mathbf{A} u_1 = \frac{1}{2}; d = \frac{13}{8}$$

$$\mathbf{C}u_1 = -\frac{1}{2}; \ d = \frac{13}{8}.$$

$$\mathbf{D}u_1 = -1; d = 2.$$

Ta có: 
$$\begin{cases} u_1 + u_9 = 12 \\ u_4 - 3u_2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + (u_1 + 8d) = 12 \\ (u_1 + 3d) - 3(u_1 + d) = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 8d = 12 \\ -2u_1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = \frac{13}{8} \\ u_1 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

**CÂU 6.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_4 = -12$  và  $u_{14} = 18$ . Khi đó, số hạng đầu tiên  $u_1$  và công sai d của cấp số cộng  $(u_n)$  lần

$$\mathbf{A} u_1 = -20, d = -3.$$
  $\mathbf{B} u_1 = -22, d = 3.$ 

$$\mathbf{B}$$
) $u_1 = -22, d = 3.$ 

$$\mathbf{C}u_1 = -21, d = 3.$$

$$\mathbf{D}u_1 = -21, d = -3.$$

Dòi giải.

Ta có: 
$$\begin{cases} u_4 = -12 \\ u_{14} = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = -12 \\ u_1 + 13d = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -21 \\ d = 3. \end{cases}$$

**CÂU 7.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có các số hạng đầu lần lượt là 5; 9; 13; 17;  $\cdots$ . Tìm số hạng tổng quát  $u_n$  của cấp số cộng. **B**  $u_n = 5n - 1$ .

 $(\mathbf{A})u_n = 5n + 1.$ 

$$\mathbf{C}u_n = 4n + 1.$$

Dòi giải.

Các số 5; 9; 13; 17; · · · theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng  $(u_n)$  nên

$$\begin{cases} u_1 = 5 \\ d = u_2 - u_1 = 4 \end{cases} \xrightarrow{CTTQ} u_n = u_1 + (n-1)d = 5 + 4(n-1) = 4n + 1.$$

Chon đáp án (C)...

**CÂU 8.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_3 = 15$  và d = -2. Tìm  $u_n$ 

**B** 
$$u_n = -\frac{3}{2}n + 12.$$
 **C**  $u_n = -3n - 17.$ 

$$\mathbf{C}u_n = -3n - 17$$

🗩 Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} 15 = u_3 = u_1 + 2d \\ d = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 19 \\ d = -2 \end{cases} \Rightarrow u_n = u_1 + (n-1)d = -2n + 21.$$

Chọn đáp án (A)....

**CÂU 9.** Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào **không** phải là cấp số cộng?

**B**
$$u_n = -2n + 19.$$

$$\mathbf{C}u_n = -2n - 21.$$

$$\mathbf{D}u_n = -2^n + 15.$$

Dòi giải.

Dãy số  $u_n = -2^n + 15$  không có dạng an + b nên có không phải là cấp số cộng.

Chọn đáp án (D).....

**CÂU 10.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_4 = -12$  và  $u_{14} = 18$ . Tìm số hạng đầu tiên  $u_1$  và công sai d của cấp số cộng đã cho.

$$\mathbf{A} u_1 = -21; d = 3.$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_1 = -20; d = -3.$ 

$$\mathbf{C}u_1 = -22; d = 3.$$

$$\mathbf{D}u_1 = -21; d = -3.$$

Dòi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_4 = -12 \\ u_{14} = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = -12 \\ u_1 + 13d = 18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -21 \\ d = 3. \end{cases}$$

**CÂU 11.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thoả mãn  $\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_3 + u_4 = 17 \end{cases}$ . Số hạng đầu tiên và công sai của cấp số cộng đó lần lượt

$$\bigcirc$$
 3 và 4.

$$\bigcirc$$
 4 và  $-3$ .

$$\bigcirc$$
 -4 và -3.

Dòi giải.

$$\begin{cases} u_2 - u_3 + u_5 = 10 \\ u_3 + u_4 = 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (u_1 + d) - (u_1 + 2d) + (u_1 + 4d) = 10 \\ (u_1 + 2d) + (u_1 + 3d) = 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 10 \\ 2u_1 + 5d = 17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = 3. \end{cases}$$
Chọn đáp án  $(A)$ ...

**CÂU 12.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có công sai d < 0,  $u_{31} + u_{34} = 11$  và  $(u_{31})^2 + (u_{34})^2 = 101$ . Số hạng tổng quát của  $(u_n)$ 

là  $(\mathbf{A})u_n = 86 - 3n.$ 

**B**)
$$u_n = 92 - 3n$$
.

$$\mathbf{C}u_n = 95 - 3n.$$

$$\mathbf{D}$$
 $u_n = 103 - 3n.$ 

🗩 Lời giải.

Gọi cấp số cộng  $(u_n)$  có công sai d.

$$(u_{31})^2 + (u_{34})^2 = 101 \Leftrightarrow (u_{31} + u_{34})^2 - 2u_{31}.u_{34} = 101 \Rightarrow u_{31}.u_{34} = 10.$$
Do đó, ta có 
$$\begin{cases} u_{31} + u_{34} = 11 \\ u_{31}.u_{34} = 10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_{31} = 10 \\ u_{34} = 1 \end{cases} \text{(vì } d < 0)$$

 $u_{31} + u_{34} = 11 \Rightarrow 2u_{31} + 3d = 11 \Rightarrow d = -3 \text{ và } u_1 = 100.$ 

Do đó:  $u_n = 103 - 3n$ .

Chọn đáp án (D)...

## Dang 3. Tìm số hang cu thể trong cấp số công

Tìm số hạng thứ k  $(k \in \mathbb{N}^*)$  bằng công thức

$$u_k = u_1 + (k-1)d.$$

## 1. Ví du mẫu

**VÍ DU 1 (NB).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$ , biết

$$\begin{cases} u_1 = -15 \\ d = 18. \end{cases}$$

- a) Tim  $u_5$ ,  $u_{10}$ ,  $u_{15}$ ,  $u_{20}$ ,  $u_{25}$ .
- b) Số 1209 là số hạng thứ bao nhiêu?

#### Lời giải.

a) Ap dụng công thức  $u_n = u_1 + (n-1)d$  ta có

$$u_5 = u_1 + 4d = -15 + 4.18 = 57.$$

$$u_{10} = u_1 + 9d = -15 + 9.18 = 147.$$

$$u_{15} = u_1 + 14d = -15 + 14.18 = 237.$$
  
 $u_{20} = u_1 + 19d = -15 + 19.18 = 327.$ 

$$u_{20} = u_1 + 19d = -15 + 19.18 = 327.$$
  
 $u_{25} = u_1 + 24d = -15 + 24.18 = 417.$ 

b) Gọi  $u_k$  là số hạng của số 1209. Ta có

$$u_k = 1209 = u_1 + (k-1)d = -15 + 18(k-1) = 18k - 33 \Leftrightarrow k = 69.$$

Vậy 1209 là số hạng thứ 69.

**VÍ DỤ 2 (TH).** Tìm sáu số trong khoảng (7;35) để được một cấp số cộng gồm tám số hạng với  $u_1 = 7$ ,  $u_8 = 35$ . Dèi giải.

Ta có

$$\begin{cases} u_1 = 7 \\ u_8 = -35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 7 \\ u_1 + 7d = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 7 \\ d = 4. \end{cases}$$

Vây sáu số đặt giữa các số 7 và 35 để được một cấp số công là

VÍ DU 3 (TH). Một cấp số cộng có năm số hạng mà tổng số hạng đầu và số hạng thứ ba bằng 28, tổng của số hạng thứ ba và số hạng cuối bằng 40. Hãy tìm cấp số cộng đó.

#### Lời giải.

Ta có

$$\begin{cases} u_1 + u_3 = 28 \\ u_3 + u_5 = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + (u_1 + 2d) = 28 \\ (u_1 + 2d) + (u_1 + 4d) = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 2d = 28 \\ 2u_1 + 6d = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 11 \\ d = 3. \end{cases}$$

Vây cấp số công cần tìm là

VÍ DU 4 (TH). Xác định 4 góc của một tứ giác lồi, biết rằng 4 góc hợp thành cấp số cộng và góc lớn nhất bằng 5 lần góc nhỏ nhất.

#### 🗩 Lời giải.

Gọi số đo bốn góc cần tìm là  $u_1, u_2, u_3, u_4$ . Ta có

$$\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 + u_4 = 360 \\ u_5 = 5u_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4u_1 + 6d = 360 \\ 4d = 4u_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 36 \\ d = 36. \end{cases}$$

Vậy số đo bốn góc cần tìm là

$$36^{\circ}$$
;  $72^{\circ}$ ;  $108^{\circ}$ ;  $144^{\circ}$ 

**VÍ DỤ 5 (TH).** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  với  $\begin{cases} u_5 = -43 \\ u_{21} = -171. \end{cases}$ 

- a) Tìm d và  $u_1$ .
- b) Tim  $u_{29}$ .
- c) -16187 là số hạng thứ bao nhiều của cấp số cộng trên?
- d) -35 có thuộc cấp số cộng trên hay không?

#### Dòi giải.

a) Ta có

$$\begin{cases} u_5 = -43 \\ u_{21} = -171 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 4d = -43 \\ u_1 + 20d = -171 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -11 \\ d = -8. \end{cases}$$

- b) Ta có  $u_{29} = u_1 + 28d = -11 + 28 \cdot (-8) = -235$
- c) Giả sử  $u_k = -16187$ , với  $k \in \mathbb{N}^*$ . Ta có

$$u_1 + (k-1)d = -16187 \Leftrightarrow -11 + (k-1) \cdot (-8) = -16187 \Leftrightarrow k = 2023.$$

Vậy -16187 là số hạng thứ 2023 của cấp số cộng.

d) Giả sử  $u_m = -35$ , với  $m \in \mathbb{N}^*$ . Ta có

$$u_1 + (m-1)d = -35 \Leftrightarrow -11 + (m-1) \cdot (-8) = -35 \Leftrightarrow m = 4.$$
 (thoả mãn)

 $V_{ay} - 35$  thuộc cấp số cộng đã cho.

## 2. Bài tấp tư luân

BÀI 1 (TH). Giữa các số 10 và 64 hãy đặt thêm 17 số nữa để được một cấp số cộng.

Ta có

$$\begin{cases} u_1 = 10 \\ u_{19} = 64 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 10 \\ u_1 + 18d = 64 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 10 \\ d = 3. \end{cases}$$

Vậy 17 số đặt thêm giữa các số 10 và 64 để được một cấp số cộng là

13; 16; 19; 22; 25; 28; 31; 34; 37; 40; 43; 46; 49; 52; 55; 58; 61.

**BÀI 2 (TH).** Tổng ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng bằng 2 và tổng các bình phương của ba số đó bằng  $\frac{14}{\alpha}$ . Xác định ba số đó và tính công sai của cấp số cộng.

Lời giải.

Ta có hệ

$$\begin{cases} u_k + u_{k+1} + u_{k+2} = 2 \\ u_k^2 + u_{k+1}^2 + u_{k+2}^2 = \frac{14}{9} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_k + u_k + d + u_k + 2d = 2 \\ u_k^2 + (u_k + d)^2 + (u_k + 2d)^2 = \frac{14}{9} \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3u_k + 3d = 2 \\ 3u_k^2 + 6u_k d + 5d^2 = \frac{14}{9} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_k = 1 \\ d = -\frac{1}{3} \end{cases} \text{hoặc } \begin{cases} u_k = \frac{1}{3} \\ d = \frac{1}{3}. \end{cases}$$

Vậy ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng thỏa yêu cầu bài toán: 
$$1; \frac{2}{3}; \frac{1}{3} \text{ ứng với } d = -\frac{1}{3} \text{ hoặc } \frac{1}{3}; \frac{2}{3}; 1 \text{ ứng với } d = \frac{1}{3}.$$

**BÀI 3 (TH).** Một cấp số cộng có 7 số hạng với công sai d dương và số hạng thứ tư bằng 11. Hãy tìm các số hạng còn lại của cấp số cộng đó, biết hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 6.

Lời giái.

Gọi số hạng đầu của cấp số cộng là  $u_1$ , công sai d. Vì số hạng thứ tư của cấp số cộng bằng 11 nên ta có  $u_4 = 11$ .

Do d dương nên  $u_5 > u_3$ .

Vì hiệu của số hạng thứ ba và số hạng thứ năm bằng 6 nên ta có  $u_5 - u_3 = 6$ .

Ta có

$$\begin{cases} u_4 = 11 \\ u_5 - u_3 = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3d = 11 \\ (u_1 + 4d) - (u_1 + 2d) = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 3 \cdot 3 = 11 \\ d = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ d = 3. \end{cases}$$

Vậy các số hạng còn lại của cấp số cộng là  $u_1 = 2$ ;  $u_2 = 5$ ;  $u_4 = 11$ ;  $u_6 = 17$ ;  $u_7 = 20$ .

BÀI 4 (VD). Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng, biết rằng:

- a) Tổng của chúng bằng 10 và tổng bình phương bằng 70.
- b) Tổng của chúng bằng 22 và tổng bình phương bằng 66.
- c) Tổng của chúng bằng 36 và tổng bình phương bằng 504.
- d) Chúng có tổng bằng 20 và tích của chúng bằng 384.
- e) Tổng của chúng bằng 20, tổng nghịch đảo của chúng bằng  $\frac{25}{24}$  và các số này là những số nguyên.
- f) Nó là số đo của một tứ giác lồi và góc lớn nhất gấp 5 lần góc nhỏ nhất.

#### Lời giải.

a) Gọi bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là x - 3d; x - d; x + d, x + 3d trong đó 2d là công sai. Theo đề bài ta có

$$\begin{cases} (x-3d) + (x-d) + (x+d) + (x+3d) = 10 \\ (x-3d)^2 + (x-d)^2 + (x+d)^2 + (x+3d)^2 = 70 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 10 \\ 4x^2 + 20d^2 = 70 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ 4 \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2 + 20d^2 = 70 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ d^2 = \frac{9}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{5}{2} \\ d = \pm \frac{3}{2}. \end{cases}$$

Vậy bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là -2; 1; 4; 7.

b) Gọi bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là x-3d; x-d; x+d; x+3d trong đó 2d là công sai. Theo đề bài ta có

$$\begin{cases} (x-3d) + (x-d) + (x+d) + (x+3d) = 22 \\ (x-3d)^2 + (x-d)^2 + (x+d)^2 + (x+3d)^2 = 66 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 22 \\ 4x^2 + 20d^2 = 66 \end{cases}$$
 
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{2} \\ 4 \cdot \left(\frac{11}{2}\right)^2 + 20d^2 = 66 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{11}{2} \\ d^2 = \frac{-11}{4} \text{ (loại)}. \end{cases}$$

Vậy không tồn tại bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng thỏa mãn yêu cầu đề bài.

c) Gọi bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là x-3d; x-d; x+d; x+3d trong đó 2d là công sai. Theo đề bài ta có

$$\begin{cases} (x-3d) + (x-d) + (x+d) + (x+3d) = 36 \\ (x-3d)^2 + (x-d)^2 + (x+d)^2 + (x+3d)^2 = 504 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 36 \\ 4x^2 + 20d^2 = 504 \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 9 \\ 4 \cdot 9^2 + 20d^2 = 504 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9 \\ d^2 = 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 9 \\ d = \pm 3. \end{cases}$$

Vây bốn số hang liên tiếp của cấp số công là 0; 6; 12; 18.

d) Gọi bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là x-3d; x-d; x+d; x+3d trong đó 2d là công sai. Theo đề bài ta có

$$\begin{cases} (x-3d) + (x-d) + (x+d) + (x+3d) = 20 \\ (x-3d)(x-d)(x+d)(x+3d) = 384 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ (x^2-d^2)(x^2-9d^2) = 384 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ (25-d^2)(25-9d^2) = 384 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ 9d^4 - 250d^2 + 241 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ d^2 = 1 \\ d^2 = \frac{241}{9} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=5 \\ d = \pm 1 \\ d = \pm \frac{\sqrt{241}}{3} \end{cases}$$

Vậy bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là 2; 4; 6; 8 hoặc  $5-\sqrt{241}$ ;  $\frac{15-\sqrt{241}}{3}$ ;  $\frac{15+\sqrt{241}}{3}$ ;  $5+\sqrt{241}$ .

e) Gọi bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng là x-3d; x-d; x+d; x+3d trong đó 2d là công sai trong đó  $2d \in \mathbb{Z}$ . Theo đề bài ta có

$$\begin{cases} (x-3d) + (x-d) + (x+d) + (x+3d) = 20 \\ \frac{1}{x-3d} + \frac{1}{x-d} + \frac{1}{x+d} + \frac{1}{x+3d} = \frac{25}{24} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 20 \\ \frac{1}{5-3d} + \frac{1}{5-d} + \frac{1}{5+d} + \frac{1}{5+3d} = \frac{25}{24} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ \frac{10}{25-9d^2} + \frac{10}{25-d^2} = \frac{25}{24} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ 9d^4 - 250d^2 + 241 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ d^2 = 1 \\ d^2 = \frac{241}{9} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 5 \\ d = \pm 1 \text{ (thổa mẫn)} \\ d = \pm \frac{\sqrt{241}}{3} \text{ (loại vì } 2d \in \mathbb{Z}). \end{cases}$$

Vậy bốn số hạng nguyên liên tiếp của cấp số cộng là 2; 4; 6; 8.

f) Gọi bốn số hạng liên tiếp của cấp số cộng xếp theo thứ tự tăng dần là x-3d; x-d; x+d; x+3d trong đó 2d>0 là công sai.

Theo đề bài ta có

$$\begin{cases} (x - 3d) + (x - d) + (x + d) + (x + 3d) = 360^{\circ} \\ x + 3d = 5(x - 3d) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 360^{\circ} \\ 4x = 18d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 90^{\circ} \\ 4 \cdot 90^{\circ} = 18d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 90^{\circ} \\ d = 20^{\circ}. \end{cases}$$

Vậy bốn góc của tứ giác lồi lần lượt là 30°; 70°; 110°; 150°.

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = -5$  và công sai d = 3. Tính  $u_{15}$ .

$$\mathbf{A}$$
 $u_{15} = 27.$ 

$$\mathbf{B}$$
 $u_{15} = 37.$ 

$$\mathbf{C}u_{15} = 47.$$

$$(\mathbf{D})u_{15} = 57.$$

🗩 Lời giải.

 $u_{15} = u_1 + 14d = -5 + 14 \times 3 = 37.$ 

Chọn đáp án (B).....

CẦU 2. Cho cấp số cộng có các số hạng ban đầu là 1; 5; 9; 13; · · · . Số hạng thứ 6 của cấp số cộng này là bao nhiêu? (**B**)19.  $(\mathbf{C})22.$ 

(**A**)21. 🗩 Lời giải.

Ta có  $u_1 = 1$ , d = 5 - 1 = 4 nên  $u_6 = 1 + 5d = 1 + 20 = 21$ .

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 3.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có các số hạng lần lượt là -4; 1; 6; x. Tìm giá trị của x.

**B**)
$$x = 10$$
.

$$(c)x = 11.$$

$$\mathbf{D}x = 12.$$

 $(\mathbf{D})20.$ 

🗩 Lời giải.

Dễ thấy  $u_1 = -4$ , d = 5 nên  $u_4 = -4 + 3 \cdot 5 = 11$ .

Chọn đáp án (C).....

**CÂU 4.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -5$  và d = 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$\mathbf{A} u_{15} = 34.$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_{15} = 45.$ 

$$\mathbf{C}$$
 $u_{13} = 31.$ 

$$(\mathbf{D})u_{10} = 35.$$

Dài giải.

$$\begin{cases} u_1 = -5 \\ d = 3 \end{cases} \Rightarrow u_n = 3n - 8 \Rightarrow \begin{cases} u_{15} = 37 \\ u_{13} = 31 \\ u_{10} = 22. \end{cases}$$

**CÂU 5.** Cho cấp số cộng có số hạng đầu là  $u_1 = -\frac{1}{2}$ , công sai  $d = \frac{1}{2}$ . Trong mỗi bộ gồm năm số hạng dưới đây, bộ năm số 

$$\mathbf{A} - \frac{1}{2}$$
; 0; 1;  $\frac{1}{2}$ ; 1

$$\mathbf{B} - \frac{1}{2}$$
; 0;  $\frac{1}{2}$ ; 0;  $\frac{1}{2}$ 

$$\bigcirc$$
  $\frac{1}{2}$ ; 1; 2;  $\frac{5}{2}$ ;  $\frac{7}{2}$ .

**D**1; 
$$\frac{3}{2}$$
; 2;  $\frac{5}{2}$ ; 3.

Ta có  $u_1 = -\frac{1}{2}$ ;  $u_2 = 0$ ;  $u_3 = \frac{1}{2}$ ,  $u_4 = 1$ ;  $u_5 = \frac{3}{2}$ ;  $u_6 = 2$ ;  $u_7 = \frac{5}{2}$ ;  $u_8 = 3$ .

**CÂU 6.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_7 = \frac{19}{5}$  và công sai  $d = \frac{2}{5}$ . Tính  $u_{10}$ .

$$\mathbf{A} \frac{2}{5}.$$

**B** 
$$\frac{19}{5}$$
.

$$\bigcirc \frac{27}{5}$$

🗭 Lời giải.

Ta có:  $u_7 = u_1 + 6d \Rightarrow u_1 = u_7 - 6d = \frac{19}{5} - 6 \cdot \frac{2}{5} = \frac{7}{5}$ .

Suy ra  $u_{10} = u_1 + 9d = \frac{7}{5} + 9 \cdot \frac{2}{5} = 5.$ 

**CÂU 7.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = -1$  và công sai d = -3. Số hạng thứ 20 của cấp số cộng này là

 $(\mathbf{A})u_{20} = -58.$ 

$$\mathbf{B}u_{20} = 60.$$

$$\mathbf{C}u_{20} = -72.$$

$$\mathbf{D}u_{20} = -61.$$

Lời giải.

Số hạng thứ 20 là:  $u_{20} = u_1 + 19d = -1 + 19 \cdot (-3) = -58$ .

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 8.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -5$  và d = 3. Số 100 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?

(A) Thứ 15.

Dòi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 = -5 \\ d = 3 \end{cases}$$
. Vì  $u_n = 100 \Rightarrow 100 = u_n = u_1 + (n-1)d = 3n - 8 \Leftrightarrow n = 36.$ 

**CÂU 9.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_2=2001$  và  $u_5=1995$ . Khi đó  $u_1001$  bằng

 $(\mathbf{A})u_{1001} = 4005.$ 

$$\mathbf{c}$$
 $u_{1001} = 3.$ 

$$\mathbf{D}u_{1001} = 1.$$

🗩 Lời giải.

$$\begin{cases} 2001 = u_2 = u_1 + d \\ 1995 = u_5 = u_1 + 4d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2003 \\ d = -2 \end{cases} \Rightarrow u_{1001} = u_1 + 1000d = 3.$$

**CÂU 10.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_1 + u_3 = 7 \\ u_2 + u_4 = 12 \end{cases}$ . Tính  $u_{21}$ .

$$\mathbf{A} u_{21} = 1.$$

$$u_{21} = 51$$

$$\mathbf{c}$$
 $u_{21} = 31.$ 

$$u_{21} = 21.$$

■ Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 + u_3 = 7 \\ u_2 + u_4 = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 + 2d = 7 \\ u_1 + d + u_1 + 3d = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 2d = 7 \\ 2u_1 + 4d = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 1 \\ d = \frac{5}{2}. \end{cases}$$

Suy ra 
$$u_{21} = u_1 + 20d = 1 + 20 \cdot \frac{5}{2} = 1 + 50 = 51.$$

Chọn đáp án (B).....

**CÂU 11.** Một cấp số cộng có 7 số hạng. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 30, tổng của số hạng thứ ba và số hạng thứ sáu bằng 35. Tìm số hạng thứ bảy của cấp số cộng đã cho.

$$u_7 = 25.$$

**B**)
$$u_7 = 30$$
.

$$u_7 = 35.$$

$$(\mathbf{D})u_7 = 40.$$

🗭 Lời giải.

Theo dề ta có: 
$$\begin{cases} u_1 + u_7 = 30 \\ u_3 + u_6 = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + (u_1 + 6d) = 30 \\ (u_1 + 2d) + (u_1 + 5d) = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 6d = 30 \\ 2u_1 + 7d = 35 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ d = 5. \end{cases}$$

Chọn đáp án B.....

Số hạng thứ 2023 của dãy  $(v_n)$  là

$$\mathbf{A} - \frac{2023}{3}$$
.

**B** 
$$-\frac{4046}{3}$$

$$\bigcirc$$
  $-\frac{4043}{2}$ .

$$\bigcirc$$
 -2023.

Ta có 
$$v_{n+1} - v_n = \frac{u_{n+1} + 1}{u_{n+1}} - \frac{u_n + 1}{u_n} = \frac{\frac{u_n}{1 - u_n} + 1}{\frac{u_n}{1 - u_n}} - \frac{u_n + 1}{u_n} = \frac{1}{u_n} - \frac{u_n + 1}{u_n} = -1$$
. Vậy  $(v_n)$  là một CSC có công sai  $d = -1$ 

d = -1.

Mặt khác, ta có  $v_1 = \frac{u_1+1}{u_1} = \frac{1}{2}$ , do đó số hạng tổng quát  $v_n = \frac{1}{2} + (n-1)(-1) = -n + \frac{3}{2}$ . Do đó  $v_{2023} = -2023 + \frac{3}{2} = -\frac{4043}{2}$ .

Chon đáp án (C)....

## Dang 4. Các bài toán thực tế

Các bài toán thực tế về cấp số cộng có thể được giải bằng cách sử dụng công thức của cấp số cộng. Công thức của cấp số cộng là:  $u_n = u_1 + (n-1)d$ . Trong đó:

- $\bigcirc$   $u_n$  là số hạng thứ n của cấp số cộng.
- $\bigcirc$   $u_1$  là số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
- ❷ Môt số công thức thường gặp:

$$\mathbf{\Theta} \ u_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{2} = u_1 + (n-1)d.$$

$$\Theta S_n = \frac{(u_1 + u_n) \cdot n}{2} = \frac{2u_1 + (n-1)d}{2} \cdot n.$$

# 1. Ví du mẫu

VÍ DU 1 (NB). Một người có một khoản tiền gửi ngân hàng với lãi suất 10% năm. Nếu sau 5 năm người đó nhận được tổng số tiền là 550 triệu đồng thì số tiền gửi ban đầu của người đó là bao nhiêu?

Lời giải.

Gọi x là số tiền gửi ban đầu của người đó (x > 0).

Sau 5 năm, số tiền nhận được bằng số tiền gốc cộng với lãi suất:

$$x + 0.1x \times 5 = 1.5x.$$

Theo đề bài, tổng số tiền nhận được sau 5 năm là 550 triệu đồng, do đó ta có phương trình:

$$1.5x = 550.$$

Giải phương trình ta có:

$$x = \frac{550}{1.5} \approx 366,67.$$

Vậy số tiền gửi ban đầu của người đó là 366,67 triệu đồng.

**VÍ DỤ 2.** Bạn An muốn mua một món quà tặng mẹ nhân ngày mùng 8/3. Bạn quyết định tiết kiệm từ ngày 1/2/2017 đến hết ngày 6/3/2017. Ngày đầu An có 5 000 đồng, kể từ ngày thứ hai số tiền An tiết kiệm được ngày sau cao hơn ngày trước mỗi ngày 1 000 đồng. Tính số tiền An tiết kiệm được để mua quà tặng mẹ.

#### D Lời giải.

Tính số ngày mà An tiết kiệm được từ ngày 1/2/2017 đến hết ngày 6/3/2017:

Số ngày từ ngày 1/2/2017 đến hết ngày 28/2/2017 là 28 ngày.

Số ngày từ ngày 1/3/2017 đến hết ngày 6/3/2017 là 6 ngày.

Vậy An tiết kiệm được 28 + 6 = 34 ngày.

Gọi x là số tiền An tiết kiệm được vào ngày đầu tiên, do ngày sau An tiết kiệm được nhiều hơn ngày trước mỗi ngày  $1\,000$  đồng, nên số tiền An tiết kiệm được vào ngày thứ n là  $x+1\,000(n-1)$ .

Vậy An tiết kiệm được tổng số tiền là:

$$S = x + (x + 1000) + (x + 2000) + \dots + (x + 33 \times 1000).$$

Ta có công thức của tổng số hạng cấp số cộng:

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} = \frac{2u_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$$

Áp dung công thức này, ta có:

$$S = \frac{2u_1 + (n-1)d}{2} \cdot n$$
$$= \frac{2 \cdot 5000 + 33 \cdot 1000}{2} \cdot 34.$$
$$= 731,000$$

Vậy số tiền An tiết kiệm được để mua quà tặng mẹ là 731 000 đồng.

**VÍ DỤ 3 (TH).** Một hội đồng quản trị quyết định tăng lương cho nhân viên hàng năm theo tỷ lệ cố định. Ví dụ, lương của một nhân viên được tăng thêm 5% so với năm trước. Hỏi nếu lương của một nhân viên là 10 triệu đồng/năm vào năm nay, thì lương của nhân viên đó sẽ là bao nhiêu vào năm thứ 5?

#### Lời giải.

Theo giả thiết, lương của nhân viên được tăng thêm 5% so với năm trước đó.

- $\odot$  Vậy lương của nhân viên vào năm thứ 2 sẽ là  $10 \cdot (1+0.05) = 10.5$  triệu đồng/năm.
- $\odot$  Tương tự, lương của nhân viên vào năm thứ 3 sẽ là  $10.5 \cdot (1+0.05) = 11.025$  triệu đồng/năm.
- $\Theta$  Lương của nhân viên vào năm thứ 4 sẽ là  $11,025 \cdot (1+0,05) = 11,57625$  triệu đồng/năm.
- $\Theta$  Cuối cùng, lương của nhân viên vào năm thứ 5 sẽ là  $11,57625 \cdot (1+0,05) = 12,1550625$  triệu đồng/năm.

Vậy lương của nhân viên đó vào năm thứ 5 sẽ là 12,1550625 triệu đồng/năm.

Chú ý: Lương của nhân viên đó vào năm thứ 5 sẽ là  $u_5 = u_1 + 4d = 10 + 4 \cdot 10 \cdot 0.05 = 12$  triệu đồng chỉ đúng trong trường hợp lương của một nhân viên được tăng thêm 5% so với năm đầu tiên.

**VÌ DỤ 4 (TH).** Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiết theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì anh ấy có đủ tiền để mua cây guitar đó?

#### Dèi giải.

Gọi n là số tuần anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình.

Số tiền anh ta tiết kiệm được sau n tuần đó là S=42+8n.

Theo bài ra  $S=42+8n\geq 400 \Leftrightarrow n\geq 44,75\Rightarrow n=45.$ 

Vậy kể cả tuần đầu thì tuần thứ 46 anh ta có đủ tiền để mua cây guitar đó.

**VÍ DỤ 5.** Hàng tháng ông An gửi vào ngân hàng một số tiền như nhau là 5 000 000 đồng (vào ngày đầu mỗi tháng) với lãi suất 0,5% một tháng, biết tiền lãi của tháng trước được nhập vào tiền gốc của tháng sau. Hỏi sau 36 tháng ông An nhận được số tiền vốn và lãi là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vi).

#### 🗭 Lời giải.

Gọi a là số tiền ông An gửi vào hàng tháng, r là lãi suất trên một tháng và  $P_n$  là số tiền vốn và lãi ông An nhận được sau n tháng.

- $\odot$  Sau một tháng, ông An có số tiền là  $P_1 = a + ar = a(1+r)$ .
- $\odot$  Đầu tháng thứ hai, ông An có số tiền là  $P_1 + a = a(1+r) + a$ .
- $\odot$  Sau hai tháng, ông An có số tiền là  $P_2 = a(1+r) + a + [a(1+r) + a] r = a [(1+r)^2 + (1+r)].$
- ❷ Cuối tháng thứ 36, ông An có số tiền là

$$P_{36} = a \left[ (1+r)^{36} + (1+r)^{35} + \dots + (1+r) \right]$$

$$= a(1+r) \frac{(1+r)^{36} - 1}{r}$$

$$= 5000000 \cdot (1+0,005) \cdot \frac{(1+0,005)^{36} - 1}{0,005}$$

$$\approx 197663927 \quad \text{(đồng)}.$$

**VÍ DỤ 6 (VDT).** Một xưởng có đăng tuyển công nhân với đãi ngộ về lương như sau: Trong quý đầu tiên thì xưởng trả là 6 triệu đồng/quý và kể từ quý thứ 2 sẽ tăng lên 0,5 triệu cho 1 quý. Hỏi với đãi ngộ trên thì sau 5 năm làm việc tại xưởng, tổng số lương của công nhân đó là bao nhiêu?

#### D Lời giải.

Gọi  $u_n$  (triệu đồng) là số lương của công nhân trong quý thứ n.

Theo đề:

Quý đầu:  $u_1 = 6$  triệu.

Các quý tiếp theo:  $u_{n+1} = u_n + 0, 5$  với  $\forall n \geq 1$ .

Mức lương của công nhân mỗi quý là 1 số hạng của dãy số  $u_n$ . Mặt khác, lương của quý sau hơn lương quý trước là 0,5 triệu nên dãy số  $u_n$  là một cấp số cộng với công sai d=0,5.

Ta biết 1 năm sẽ có 4 quý nên 5 năm sẽ có  $5 \cdot 4 = 20$  quý. Theo yêu cầu của đề bài ta cần tính tổng của 20 số hạng đầu tiên của cấp số cộng  $(u_n)$ .

Lương tháng quý 20 của công nhân:  $u_{20} = 6 + (20 - 1) \cdot 0.5 = 15.5$  triệu đồng.

Tổng số lương của công nhân nhận được sau 5 năm làm việc tại xưởng:  $S_{12} = 20 \cdot (6 + 15, 5)2 = 215$  (triệu đồng).

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1 (NB).** Sinh nhật bạn của An vào ngày 01 tháng năm. An muốn mua một món quà sinh nhật cho bạn nên quyết định bỏ ống heo 100 đồng vào ngày 01 tháng 01 năm 2016, sau đó cứ liên tục ngày sau hơn ngày trước 100 đồng. Hỏi đến ngày sinh nhật của bạn, An đã tích lũy được bao nhiêu tiền? (thời gian bỏ ống heo tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 04 năm 2016).

#### Dèi giải.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 30 tháng 4 năm 2016 có tổng cộng 31 + 29 + 31 + 30 = 121 ngày.

Goi S là số tiền An tích lũy được vào ngày sinh nhất của ban.

Do An bỏ được 100 đồng vào ngày đầu tiên nên số tiền An tích lũy được vào ngày thứ n là

$$S = 100 + 100(n - 1).$$

Vậy tổng số tiền An tích lũy được là:

$$S = 100 + 200 + \dots + 12100 = \frac{121(100 + 12100)}{2} = 738100.$$

Vậy An đã tích lũy được 738 100 đồng vào ngày sinh nhật của bạn.

**BÀI 2 (TH).** Người ta trồng 3 003 cây theo dạng một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây... cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây. Số hàng cây được trồng là bao nhiêu? **Dòi giải.** 

Tổng số cây trồng được là  $1+2+3+\cdots+n$ , nghĩa là tổng của n số tự nhiên đầu tiên. Ta cần tìm số n để tổng này bằng 3003.

Ta có công thức tổng của n số tự nhiên đầu tiên là:

$$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$
.

Giải phương trình:

$$\frac{n(n+1)}{2} = 3003.$$

Ta có:

$$n(n+1) = 6006 \Rightarrow n = 77.$$

Vậy số hàng cây được trồng là 77.

**BÀI 3 (TH).** Một công ty định mức sản phẩm hàng tháng theo cấp số cộng. Ví dụ, sản lượng hàng tháng của một công ty được tăng thêm 10 sản phẩm so với tháng trước. Nếu công ty sản xuất được 100 sản phẩm trong tháng này, hỏi công ty sẽ sản xuất được bao nhiều sản phẩm trong tháng thứ 12?

#### Lời giải.

Công thức cấp số cộng được sử dụng để tính sản lượng hàng tháng của công ty. Nếu công ty sản xuất được 100 sản phẩm trong tháng này và sản lượng hàng tháng được tăng thêm 10 sản phẩm so với tháng trước, ta có thể sử dụng công thức sau để tính sản lượng hàng tháng của công ty trong tháng thứ 12:

$$a_n = a_1 + (n-1)d.$$

Trong đó  $a_1$  là sản lượng hàng tháng ban đầu, d là công sai và n là số tháng.

Với bài toán này, ta có:  $a_1 = 100, d = 10, n = 12.$ 

Sản lượng hàng tháng của công ty trong tháng thứ 12 là:

$$a_{12} = a_1 + (n-1)d = 100 + (12-1) \times 10 = 210.$$

Vậy công ty sẽ sản xuất được 210 sản phẩm trong tháng thứ 12.

## 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1 (TH).** Một công ty đang cần tuyển dụng thêm nhân viên. Công ty quyết định tăng số lượng nhân viên hàng tháng theo cấp số cộng. Nếu công ty đã có 20 nhân viên và quyết định tăng thêm 2 nhân viên hàng tháng, hỏi sau bao nhiêu tháng công ty sẽ có 50 nhân viên?

(A) 19 tháng.

**B** 16 tháng.

© 36 tháng.

(D)26 tháng.

#### 🗩 Lời giải.

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng công thức cấp số cộng:

$$a_n = a_1 + (n-1) \times d.$$

Trong đó  $a_1$  là số lượng nhân viên ban đầu, d là số lượng nhân viên tăng hàng tháng và n là số tháng. Ta cần tìm số tháng n để công ty có được 50 nhân viên. Thay các giá trị vào công thức cấp số cộng ta có:

$$50 = 20 + (n-1) \times 2.$$

Suy ra:

$$n = \frac{50 - 20}{2} + 1 = 16.$$

Vậy sau 16 tháng kể từ khi công ty quyết định tăng số lượng nhân viên hàng tháng theo cấp số cộng, công ty sẽ có được 50 nhân viên.

Chọn đáp án (B)......

**CÂU 2 (VD).** Một người đang tăng cường luyện tập thể thao hàng ngày. Anh ta quyết định tăng mức độ luyện tập theo cấp số cộng hàng tuần. Nếu anh ta bắt đầu với mức luyện tập 30 phút mỗi ngày và tăng thêm 5 phút mỗi ngày, hỏi anh ta sẽ luyện tập được bao lâu để đạt được mức luyện tập 60 phút mỗi ngày?

(A) 16 ngày.

**B**)6 ngày.

**(C**)9 ngày.

D7 ngày.

#### Lời giải.

Gọi n là số ngày liên tiếp mà người đó tăng mức độ luyện tập. Theo đó, mức độ luyện tập của người đó sau n ngày là:

$$30 + 5n$$
 (phút).

Vì để đạt được mức luyện tập 60 phút mỗi ngày nên:

$$30 + 5n = 60.$$

Từ đó suy ra:

$$n = \frac{60 - 30}{5} = 6.$$

Vậy người đó cần luyện tập liên tiếp trong 6 ngày để đạt được mức luyện tập 60 phút mỗi ngày. Chọn đáp án  $\fbox{B}$ .

<b>CÂU 3 (VD).</b>	Nếu một công ty	công nghệ mới tl	hành lập có số lượ	ợng người dùng l	ban đầu là 1	10000 và mỗi	tháng tăng thêm
cố định 5 000 l	lượng người dùng,	thì sau bao lâu d	có số lượng người	dùng là 1 triệu.			

(A) 198 tháng.

 $(\mathbf{B})$ 197 tháng.

(**C**)18 tháng.

(**D**)98 tháng.

#### Lời giải.

Ta cần tính số tháng n theo công thức sau:

$$10\,000 + 5\,000n = 1\,000\,000.$$

$$\Rightarrow n = \frac{1000000 - 10000}{5000} = 198.$$

Vậy sau khoảng 198 tháng (khoảng 16 năm và 6 tháng), công ty sẽ đạt được 1 triệu người dùng.

Chọn đáp án (A).....

CÂU 4 (VDC). Một nhà đầu tư đang đầu tư vào một quỹ đầu tư với mức lợi nhuận cố định hàng năm. Nếu nhà đầu tư đầu tư vào quỹ đầu tư với số tiền ban đầu là 20 triệu đồng và mức lợi nhuận hàng năm là 10%, hỏi số tiền nhà đầu tư sẽ nhận được sau 7 năm?

(A) 34 triệu đồng.

(B) 14 triệu đồng.

(C)30 triệu đồng.

(D)39 triệu đồng.

#### Dòi giải.

Với số tiền ban đầu là 20 triệu đồng và mức lợi nhuận hàng năm là 10%, ta có thể tính được số tiền nhà đầu tư sẽ nhận được sau 1 năm, sau đó sử dụng cấp số cộng để tính số tiền nhà đầu tư sẽ nhận được sau 7 năm.

Số tiền nhà đầu tư sẽ nhận được sau 1 năm là:

 $20 \text{ triệu đồng} \times 10\% = 2 \text{ triệu đồng}$ 

Số tiền nhà đầu tư sẽ nhận được sau 7 năm là:

2triệu đồng × 7 năm + 20 triệu đồng = 34 triệu đồng

Vây sau 7 năm, nhà đầu tư sẽ nhân được tổng công 34 triệu đồng.

Chọn đáp án (A)......

CÂU 5 (VDC). Một công ty sản xuất bánh keo tăng sản lượng sản phẩm của mình lên mỗi tháng. Nếu sản lượng ban đầu là 1000 sản phẩm, một sản phẩm lợi nhuận 1 USD và tăng thêm 200 sản phẩm mỗi tháng, thì sau bao nhiêu tháng lợi nhuận công ty 1 triệu đô.

(**A**) 8 000 tháng.

(**B**) 7 000 tháng.

(**c**)9 000 tháng.

(**D**)5 000 tháng.

#### Lời giải.

Để tính thời gian công ty đạt được lợi nhuận 1 triệu đô, chúng ta cần biết lợi nhuận của công ty đạt được bao nhiêu sau mỗi tháng.

Giả sử sản lương ban đầu là 1000 sản phẩm một sản phẩm lợi nhuân 1 USD và tăng thêm 200 sản phẩm mỗi tháng. Ta có thể tính được lợi nhuận của công ty sau mỗi tháng như sau:

 $\odot$  Tháng 1: 1000 × 1 = 1000 USD.

 $\odot$  Tháng 2:  $(1000 + 200) \times 1 = 1200$  USD.

 $\bigcirc$  Tháng 3:  $(1000 + 2 \times 200) \times 1 = 1400 \text{ USD}$ .

 $\bigcirc$  Tháng 4:  $(1000 + 3 \times 200) \times 1 = 1600 \text{ USD}.$ 

**⊘** Tháng  $n: (1000 + (n-1) \times 200) \times 1 = (n-1) \times 200 + 1000$  USD.

Để tính thời gian để công ty đạt được lợi nhuận 1 triệu đô, ta giải phương trình sau:

 $(n-1) \times 200 + 1000 = 10^6$ 

 $\Rightarrow (n-1) \times 200 = (10^6 - 1000)$ 

 $\Rightarrow n - 1 = \frac{10^6 - 1000}{200}$ 

 $\Rightarrow n = \frac{10^6 - 1000}{200} + 1$ 

 $\Rightarrow n = 5001$ 

Vậy sau 5 000 tháng, công ty sẽ đạt được lợi nhuận 1 triệu đô.

Chon đáp án  $\overline{(D)}$ ......

CAU 6 (VDC). Một công ty tăng lương cho nhân viên hàng năm bằng cách thêm một số tiền cố định vào lương của họ. Ví dụ: Nếu lương ban đầu của một nhân viên là 10 triệu đồng và công ty tăng lương 2 triệu đồng mỗi năm, thì lương của nhân viên sẽ là bao nhiêu nếu làm cho công ty 19 năm?

(A) 16 triệu đồng.

(B) 26 triệu đồng.

© 28 triệu đồng.

D)46 triệu đồng.

#### Dòi giải.

Do tăng lương cho nhân viên hàng năm bằng cách thêm một số tiền cố định nên ta có thể sử dụng công thức tính số hạng thứ n của cấp số cộng  $a_n = a_1 + (n-1)d$ .

Ó bài toán này, ta có:

 $a_1 = 10$  (triệu đồng) là lương ban đầu của nhân viên.

d=2 (triệu đồng) là công sai của cấp số cộng.

n = 19 là số thứ tự của số hạng.

Ta thay các giá tri này vào công thức trên để tính lương của nhân viên sau 19 năm:

 $a_{19} = 10 + (19 - 1)2 \Rightarrow a_{19} = 46$  (triệu đồng).

Vậy lương của nhân viên sau 19 năm làm việc cho công ty là 46 triệu đồng.

Chon đáp án (D).....

CÂU 7 (VDC). Tài sản thường bị khấu hao khiến chúng có tuổi thọ hữu ích giới hạn. Ví dụ, nếu một công ty mua một chiếc xe tải với giá 35 000 đô la và nó bị khấu hao với tốc độ không đổi là 700 đô la mỗi tháng, thì sau bao lâu giá trị của nó còn 5000 đô la.

$$\mathbf{A}$$
  $x = 23$  tháng.

$$\mathbf{B}$$
) $x = 43$  tháng.

$$\mathbf{C}x = 41 \text{ tháng.}$$

$$\mathbf{D}x = 40$$
 tháng.

#### 🗩 Lời giải.

Cách 1: Thời gian để giá trị của chiếc xe tải trên được khấu hao xuống còn 5.000 đô la có thể được tính bằng cách sử dụng công thức sau:

Giá trị khởi đầu của chiếc xe tải là 35 000 Giá trị cuối cùng của chiếc xe tải là 5 000 Tốc độ khấu hao tương ứng 700/tháng Để tìm ra thời gian cần thiết để giá trị của chiếc xe tải giảm xuống còn 5.000, ta cần tìm số tháng được khấu hao.

Giả sử số tháng cần khấu hao là x tháng.

Giá trị của chiếc xe tải sau x tháng khấu hao được tính bằng:

 $35\,000 - 700x = 5\,000.$ 

Giải phương trình trên ta có:  $x \approx 43$  tháng

Vì vậy, sau 43 tháng, giá trị của chiếc xe tải sẽ giảm xuống còn 5000. Ngoài ra ta có thể giải theo cấp số cộng như sau: Cách 2: Ta có thể sử dụng cộng thức tính số hạng thứ n của cấp số cộng  $a_n = a_1 + (n-1)d$ 

- $\Theta$   $u_1 = 35\,000$  (đô la) là giá tri ban đầu của xe tải.
- $\bigcirc$  d = -700 (đô la) là công sai của cấp số cộng (âm vì giá trị xe tải giảm).
- $\Theta$   $a_n = 5\,000$  (đô la) là giá tri cuối cùng của xe tải.

Ta thay các giá tri này vào công thức trên để tính số tháng mà xe tải bi khấu hao đến 5000 đô la:

$$5\,000 = 35\,000 + (n-1)(-700) \Rightarrow n = 43.857.$$

Vậy sau khoảng 43,857 tháng, tức là khoảng 3 năm và 7 tháng, giá trị của xe tải sẽ còn khoảng 5 000 đô la.

CÂU 8 (VDC). Các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, hoặc máy ảnh thường bị khấu hao nhanh chóng do sự phát triển của công nghệ mới. Ví dụ, nếu một người mua một máy tính Macbook với giá 2000 đô la và nó bị khấu hao với tốc độ không đổi là 100 đô la mỗi tháng, thì giá trị của Macbook còn lại 1000 đô la sau bao nhiêu tháng?

Chọn đáp án (B)......

$$\mathbf{A}$$
  $x = 12$  tháng.

$$\mathbf{B}$$
  $x = 43$  tháng.

$$\mathbf{C}$$
  $x = 11$  tháng.

$$\mathbf{D}x = 10$$
 tháng.

#### P Lời giải.

Để giải bài toán này, ta có thể sử dụng công thức tính số hạng thứ n của cấp số cộng  $a_n = a + (n-1)d$ .

O bài toán này, ta có:

 $a=2\,000$  (đô la) là giá trị ban đầu của máy tính Macbook.

d = -100 (đô la) là công sai của cấp số cộng (âm vì giá trị máy tính giảm).

 $a_n = 1\,000$  (đô la) là giá trị cuối cùng của máy tính Macbook.

Ta thay các giá trị này vào công thức trên để tính số tháng mà máy tính bị khấu hao đến 1000 đô la:

$$1000 = 2000 + (n-1)(-100) \Rightarrow n = 11.$$

Vậy sau 11 tháng, giá trị của máy tính Macbook sẽ còn 1000 đô la.

Chọn đáp án  $\overline{(C)}$ .......

**CÂU 9 (VDC).** Ban đầu có 1m<sup>2</sup> bèo sinh sôi trên mặt hồ biết tốc độ sinh sôi ngày sau hơn ngày trước 0,5m<sup>2</sup>. Biết diện tích mặt hồ nước là 120m² hỏi sau bao lâu bèo phủ đầy mặt hồ?

$$\mathbf{A}$$
  $x = 120$  tháng.

$$(\mathbf{B})x = 143$$
 tháng.

$$\mathbf{C}x = 238 \text{ tháng.}$$

$$(\mathbf{D})x = 130 \text{ tháng.}$$

#### 🗩 Lời giải.

Giả sử sau x ngày, diện tích của bèo phủ đầy mặt hồ là  $Sm^2$ .

Theo đề bài, ta biết được rằng:

- $\bigcirc$  Tốc độ sinh sôi của bèo là  $0.5 \text{m}^2/\text{ngày}$ .
- $\odot$  Ban đầu, diện tích của bèo là 1 m<sup>2</sup>.
- $\odot$  Diện tích mặt hồ là  $120\text{m}^2$ .

Vậy ta có phương trình sau đây: S = 1 + 0.5x.

Điều kiện để bèo phủ đầy mặt hồ là S = 120.

 $1 + 0.5x = 120 \text{ hay } 0.5x = 119 \Rightarrow x = 238 \text{ ngày.}$ 

Vậy sau 238 ngày, bèo sẽ phủ đầy mặt hồ.

Chọn đáp án (C).....

CÂU 10 (VDC). Nhà hát lớn Dạ Cỗ Vĩ Lan ở An Cư có hàng ghế đầu kí hiệu dãy A là 50 chỗ hàng ghế, sau dãy B là 48 chỗ và như thế hàng sau ít hơn hàng trước 2 ghế, biết hàng cuối cùng có 10 ghế. Tính tổng số dãy ghế và tổng số chỗ ngồi?

(A) 21 dãy và 630 chỗ.

#### 🗩 Lời giải.

Gọi n là số dãy ghế. Theo đề bài, ta có:

$$\begin{cases} S = 50 + 48 + \dots + 10 = \frac{50 + 10}{2}n \\ S = \frac{2.50 + (n - 1) \cdot (-2)}{2}n \end{cases}$$

Từ phương trình đầu tiên, ta có:

$$S = 50 + 48 + \dots + 10 = \frac{50 + 10}{2}n = 30n.$$

Từ phương trình thứ hai, ta có:

$$S = \frac{2 \cdot 50 + (n-1) \cdot (-2)}{2} n = (50 - n + 1)n = (51 - n)n.$$

Do đó, ta có:

$$30n = (51 - n)n \Rightarrow n = 21.$$

Vậy n = 21 dãy ghế và  $30 \cdot 21 = 630$  ghế.

Chon đáp án (A).....

CÂU 11 (VDC). Người ta trồng cây theo dang một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 3 cây, hàng thứ ba trồng 5 cây,... cứ tiếp tục trồng như thế cho đến khi hết số cây là 6561. Số hàng cây được trồng là bao nhiêu?

(**A**)81 hàng.

**B**)16 hàng.

**c**)100 hàng.

(**D**)89 hàng.

#### Lời giải.

Để giải bài toán này, ta cần tìm số hàng cây được trồng cho đến khi tổng số cây là 2023.

- ❷ Hàng thứ nhất trồng 1 cây.
- $\bigcirc$  Hàng thứ hai trồng 3 cây (1 cây +2 cây).
- $\Theta$  Hàng thứ ba trồng 5 cây (1 cây +2 cây +2 cây).
- **②** ...

Vậy ta thấy rằng số cây trồng trong hàng thứ n là  $(n-1) \cdot 2 + 1$ . Số cây được trồng trong n hàng đầu tiên là:

$$1+3+5+...+(2n-1)=n^2$$
.

Để tìm số hàng cây được trồng cho đến khi tổng số cây là 6561, ta giải phương trình sau:  $n^2 = 6561$ . Vậy số hàng cây được trồng là 81 hàng.

**CÂU 12 (VDC).** Người ta thả một  $1 \text{ m}^2$  lá bèo vào một hồ nước. Kinh nghiệm cho thấy sau x giờ, bèo sẽ sinh sôi kín cả mặt hồ  $500 \text{ m}^2$ . Biết rằng sau mỗi giờ, lượng lá bèo tăng thêm  $0.5 \text{ m}^2$  và tốc độ tăng không đổi tìm x?

(A) 888 giờ.

(**B**)777 giờ.

(C)999 giờ.

(**D**)700 giờ.

#### 🕰 Lời giải.

Bài toán này có thể giải bằng cách sử dụng công thức tăng trưởng của bèo. Giả sử lượng lá bèo ban đầu là 1 m<sup>2</sup>, sau mỗi giờ lượng lá bèo tăng thêm  $0.5 \text{ m}^2$ . Sau x giờ, lượng lá bèo đã phủ kín mặt hồ  $500 \text{ m}^2$ . Ta có thể viết phương trình sau:

$$1 + 0.5x = 500.$$

Giải phương trình ta được:

$$x = \frac{500 - 1}{0.5} \approx 999.$$

Vậy sau khoảng 999 giờ (khoảng 41 ngày), lượng lá bèo sẽ phủ kín mặt hồ  $500 \text{ m}^2$ .

Chọn đáp án  $\overline{(C)}$ .....

# Bài 7. CẤP SỐ NHÂN

# A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

# 1. Định nghĩa

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hoặc vô hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích một số đứng ngay trước nó với một số q không đổi, nghĩa là:

$$u_n = u_{n-1} \cdot q \, \text{v\'oi} \, \forall n \in \mathbf{N}, n \geq 2$$

Số q được gọi là công bội của cấp số nhân

# 2. Số hạng tổng quát của cấp số nhân

Nếu cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu là  $u_1$  và công bội q thì số hạng tổng quát  $u_n$  của nó được xác định bởi công thức:

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}, n \ge 2$$

# 3. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân

Giả sử  $(u_n)$  là cấp số nhân có công bội  $q \neq 1$ . Đặt  $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ , khi đó

$$S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q}.$$

- $m{\Theta}$  Công bội của cấp số nhân:  $q = \sqrt[n-1]{\frac{u_n}{u_1}}$ .
- $\Theta$  Số hạng đầu tiên của cấp số nhân:  $u_1 = \frac{u_n}{q^{n-1}}$ .
- $\odot$  a, b, c là ba số hạng liên tiếp cấp số nhân thì  $a \cdot c = b^2$ .

# B. CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

# ightharpoonup Dạng 1. Nhận diện cấp số nhân, công bội q

Để nhận diện (chứng minh) mỗi dãy số là cấp số nhân, ta làm như sau:

Chứng minh  $u_{n+1} = u_n q$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  và q là một số không đổi.

Nếu  $u_n \neq 0$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  thì ta lập tỉ số  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = k$ .

- $\odot$  Nếu k là hằng số thì  $(u_n)$  là cấp số nhân với công bội q = k.
- $\odot$  Nếu k phụ thuộc vào n thì  $(u_n)$  không phải là cấp số nhân.

Để chứng minh dãy  $(u_n)$  không phải là một cấp số nhân. Khi đó, ta chỉ cần chỉ ra ba số hạng liên tiếp không tạo thành một cấp số nhân, chẳng hạn  $\frac{u_3}{u_2} \neq \frac{u_2}{u_1}$ .

Để chứng minh ba số a, b, c theo thứ tự đó lập được một cấp số nhân, thì ta chứng minh  $ac = b^2$  hoặc  $|b| = \sqrt{ac}$ .

# 1. Ví dụ mẫu

VÍ DỤ 1 (NB). Dãy số 1;1;1;1;... có phải là một cấp số nhân hay không?

Dễ thấy  $\frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} = \ldots = 1$  là một số không đổi.

Do đó dãy số  $1; 1; 1; 1; \dots$  là một cấp số nhân.

**VÍ DỤ 2 (TH).** Dãy số  $u_n = 3^n$  có phải là một cấp số nhân không? Nếu có, hãy tìm công bội của cấp số nhân đó.  $\bigcirc$  Lời giải.

Ta có  $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n+1}}{3^n} = \frac{3^n \cdot 3}{3^n} = 3$  là số không đổi nên  $(u_n)$  là cấp số nhân với công bội q = 3.

### 🗩 Lời giải.

Xét dãy số 
$$\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = \frac{9}{u_n} \end{cases} \text{ có } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{9}{u_n} : \frac{9}{u_{n-1}} = \frac{u_{n-1}}{u_n} \Rightarrow u_{n+1} = u_{n-1}, \forall n \geq 2.$$
Do đó ta có 
$$\begin{cases} u_1 = u_3 = u_5 = \dots = u_{2n+1} = \dots \\ u_2 = u_4 = u_6 = \dots = u_{2n} = \dots \end{cases} \tag{1}$$
Theo đề bài ta có  $u_1 = 3 \Rightarrow u_2 = \frac{9}{u_1} = 3 \tag{3}.$ 
Từ (1) (2) và (3) suy ra  $u_1 = u_2 = u_3 = u_4 = u_4 = u_5 = u$ 

Do đó ta có 
$$\begin{cases} u_1 = u_3 = u_5 = \dots = u_{2n+1} = \dots \\ u_2 = u_4 = u_6 = \dots = u_{2n} = \dots \end{cases}$$
 (1)

Từ (1), (2) và (3) suy ra  $u_1 = u_2 = u_3 = u_4 = \dots = u_{2n} = u_{2n+1} = \dots$ 

Do đó  $(u_n)$  là một cấp số nhân với công bội q=1.

**VÍ DU 4 (TH).** Cho  $(u_n)$  là cấp số nhân có công bội  $q \neq 0, u_1 \neq 0$ . Chứng minh rằng dãy số  $(v_n)$  với  $v_n = u_n u_{2n}$  cũng là một cấp số nhân.

### Dèi giải.

Ta có 
$$\frac{v_n}{v_{n-1}} = \frac{u_n u_{2n}}{u_{n-1} u_{2(n-1)}} = \frac{u_1 q^{n-1} \cdot u_1 q^{2n-1}}{u_1 q^{n-2} \cdot u_1 q^{2n-3}} = q^3$$
. Do đó  $(v_n)$  là một cấp số nhân với công bội là  $q^3$ .

**VÍ DỤ 5 (VDT).** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $\begin{cases} u_1=2\\ u_{n+1}=4u_n+9 \end{cases}$ ,  $\forall n\in\mathbb{N}^*$ . Chứng minh rằng dãy số  $(v_n)$  xác định

bởi  $v_n=u_n+3, \forall n\in\mathbb{N}^*$  là một cấp số nhân. Hãy xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.

### 🗩 Lời giải.

Ta có  $v_n = u_n + 3$  (1) và  $v_{n+1} = u_{n+1} + 3$  (2).

Theo đề ta có  $u_{n+1} = 4u_n + 9 \Rightarrow u_{n+1} + 3 = 4(u_n + 3)$  (3). Thay (1) và (2) vào (3) ta được  $v_{n+1} = 4v_n \Rightarrow \frac{v_{n+1}}{v_n} = 4, \forall n \in \mathbb{N}^*$ .

Suy ra  $(v_n)$  là cấp số nhân với công bội q=4 và số hàng đầu  $v_1=u_1+3=2+3=5$ .

# 2. Bài tấp tư luân

**BÀI 1 (NB).** Dãy số 25; 5; 1;  $\frac{1}{5}$ ; ... có phải là một cấp số nhân không? Nếu có hãy tìm công bội của cấp số nhân đó.

Ta có 
$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} = \ldots = \frac{1}{5}$$
 là một số không đổi.

Do đó dãy số 25; 5; 1;  $\frac{1}{5}$ ; ... là một cấp số nhân với công bội  $q = \frac{1}{5}$ .

**BÀI 2 (NB).** Dãy số 1; n;  $n^2$ ;  $n^3$ ;  $n^4$ ; ... (với n > 1) có phải là một cấp số nhân không? Nếu có hãy tìm công bội của cấp số nhân đó.

#### Dèi giải.

Ta có  $\frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} = \ldots = n$  (với n > 1) là một số không đổi. Do đó dãy số 1; n;  $n^2$ ;  $n^3$ ;  $n^4$ ;  $\ldots$  (với n > 1) là một cấp số nhân với công bội q = n.

**BÀI 3 (TH).** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $\begin{cases} u_1=2\\ u_{n+1}=u_n^2 \end{cases}$ . Hỏi dãy số  $(u_n)$  có là một cấp số nhân hay không?

## **♥** Lời aiải.

Ta có 
$$u_2 = u_1^2 = 4$$
,  $u_3 = u_2^2 = 16$ ,  $u_4 = u_3^2 = 256$ .  
Suy ra  $\frac{u_2}{u_1} = 2$ ;  $\frac{u_3}{u_2} = 4$  và  $\frac{u_4}{u_3} = 16$ . Vì  $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_3}{u_2} \neq \frac{u_4}{u_3}$  nên  $(u_n)$  không là một cấp số nhân

**BÀI 4 (TH).** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_1=2$  và  $u_{n+1}=\frac{1}{3}u_n$ . Chứng minh  $(u_n)$  là một cấp số nhân và tìm số hạng  $u_3$ .

Ta có  $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n \Rightarrow \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3}$  là một số không đổi nên  $(u_n)$  là một cấp số nhân với công bội là  $q = \frac{1}{3}$ .

Do đó  $u_3 = u_2 \cdot q = u_1 \cdot q^2 = 2 \cdot \frac{1}{3^2} = \frac{2}{9}$ .

**BÀI 5 (TH).** Cho  $(u_n)$  là cấp số nhân có công bội  $q \neq 0, u_1 \neq 0$ . Chứng minh rằng dãy số  $(v_n)$  với  $v_n = \frac{u_n u_{2n+1}}{4}$  cũng là một cấp số nhân.

#### Lời giải.

$$\text{Ta có } \frac{v_n}{v_{n-1}} = \frac{\frac{u_n u_{2n+1}}{4}}{\underbrace{u_{n-1} u_{2(n-1)+1}}_{4}} = \frac{u_1 q^{n-1} \cdot u_1 q^{2n}}{u_1 q^{n-2} \cdot u_1 q^{2n-2}} = q^3. \text{ Do dó } (v_n) \text{ là một cấp số nhân với công bội là } q^3.$$

**BÀI 6 (VD).** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $\begin{cases} u_1 = 3 \\ u_{n+1} = 2u_n - 2 \end{cases}$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}^*$ . Chứng minh rằng dãy số  $(v_n)$  xác định bởi

 $v_n = 2u_n - 4, \forall n \in \mathbb{N}^*$  là một cấp số nhân. Hãy xác định số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó.

### Dèi giải.

Ta có  $v_n = 2u_n - 4$  (1) và  $v_{n+1} = 2u_{n+1} - 4$  (2).

Theo đề ta có  $u_{n+1} = 2u_n - 2 \Rightarrow 2u_{n+1} - 4 = 2(2u_n - 4)$  (3).

Thay (1) và (2) vào (3) ta được  $v_{n+1} = 2v_n \Rightarrow \frac{v_{n+1}}{v_n} = 2, \forall n \in \mathbb{N}^*.$ 

Suy ra  $(v_n)$  là cấp số nhân với công bội q=2 và số hàng đầu  $v_1=2u_1-4=2\cdot 3-4=2$ .

# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

- (A)  $128; -64; 32; -16; 8; \dots$  (B)  $\sqrt{2}; 2; 4; 4\sqrt{2}; \dots$  (C)  $5; 6; 7; 8; \dots$

- $\bigcirc$  15; 5; 1;  $\frac{1}{5}$ ; ....

# Dòi giải.

Xét phương án 128; -64; 32; -16; 8; ....

Có  $\frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} = \ldots = -\frac{1}{2}$  là một số không đổi nên dãy số 128; -64; 32; -16; 8; ... là một cấp số nhân.

CÂU 2. Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?

- (A)1; -1; 1; -1; ....
- **(B)**  $3; 3^2; 3^3; 3^4; \dots$
- $\mathbf{C}$   $a; a^3; a^5; a^7; \dots (a \neq 0). \quad \mathbf{D} \frac{1}{\pi}; \frac{1}{\pi^2}; \frac{1}{\pi^4}; \frac{1}{\pi^6}; \dots$

🗩 Lời giải.

Xét dãy  $\frac{1}{\pi}$ ;  $\frac{1}{\pi^2}$ ;  $\frac{1}{\pi^4}$ ;  $\frac{1}{\pi^6}$ ; ... có  $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_3}{u_2} \left(\frac{1}{\pi} \neq \frac{1}{\pi^2}\right)$ .

Do đó dãy  $\frac{1}{\pi}$ ;  $\frac{1}{\pi^2}$ ;  $\frac{1}{\pi^4}$ ;  $\frac{1}{\pi^6}$ ; ... không là một cấp số nhân.

**CÂU 3.** Dãy số 1; 2; 4; 8; 16; 32; ... là một cấp số nhân với

- (A) Công bội là 1 và số hạng đầu tiên là 2.
- (B) Công bội là 2 và số hạng đầu tiên là 1.
- (C) Công bội là 2 và số hang đầu tiên là 2.
- (D) Công bội là 1 và số hang đầu tiên là 1.

Lời giái.

Ta có  $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} = \dots = 2.$ 

Vậy dãy số đã cho là một cấp số nhân với công bội là q=2 và số hạng đầu tiên là  $u_1=1$ .

- **CÂU 4.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1=-2$  và công bội q=-5. Viết bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân.
  - (A) -2; 10; 50; -250.
- $(\mathbf{B})$  -2; 10; -50; 250.
- $(\mathbf{C})$  -2; -10; -50; -250.
- $(\mathbf{D})$ -2; 10; 50; 250.

Dòi giải.

Vì  $(u_n)$  là một cấp số nhân nên ta có  $u_{n+1} = u_n q$ .

Do đó  $u_2 = u_1 q = (-2) \cdot (-5) = 10$ ,  $u_3 = u_2 q = 10 \cdot (-5) = -50$ ,  $u_4 = u_3 q = (-50) \cdot (-5) = 250$ .

Vậy bốn số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó là -2; 10; -50; 250.

Chọn đáp án (B).....

CÂU 5. Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 3 và 12. Số hạng tiếp theo của cấp số nhân là

(A) 15. Lời giải.

Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 3 và 12, do đó ta có  $q = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{12}{3} = 4$ .

Vậy số hạng tiếp theo của cấp số nhân đó là  $u_{n+2} = u_{n+1}q = 12 \cdot 4 = 48$ .

Chọn đáp án (D).....

**CÂU 6.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng tổng quát là  $u_n = \frac{3}{2} \cdot 5^n$ . Khi đó số hạng đầu  $u_1$  và công bội q là

- $\mathbf{A} u_1 = \frac{3}{2}, q = \frac{1}{5}.$
- **B**  $u_1 = \frac{3}{2}, q = 5.$  **C**  $u_1 = \frac{15}{2}, q = \frac{1}{5}.$  **D**  $u_1 = \frac{15}{2}, q = 5.$

Ta có  $u_1 = \frac{3}{2} \cdot 5^1 = \frac{15}{2}$  và  $u_2 = \frac{3}{2} \cdot 5^2 = \frac{75}{2}$ . Vì  $(u_n)$  là một cấp số nhân nên  $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{75}{2} : \frac{15}{2} = 5$ .

Chọn đáp án (D).....

**CÂU 7.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

$$\mathbf{A} u_n = \frac{1}{3^{n-2}}.$$

$$\mathbf{C}u_n = (n+2) \cdot 3^n.$$

🗭 Lời giải.

Vậy dãy số  $(u_n)$  có số hạng tổng quát  $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$  là một cấp số nhân.

 $oldsymbol{oldsymbol{ iny{O}}}$  Với  $u_n=rac{n}{3^n},$  ta có  $q=rac{u_{n+1}}{u_n}=rac{n+1}{3^{n+1}}:rac{n}{3^n}=rac{n+1}{3n}$  không phải là một số không đổi. Vậy dãy số  $(u_n)$  có số hạng tổng quát  $u_n = \frac{n}{3^n}$  không là một cấp số nhân.

Vậy dãy số  $(u_n)$  có số hạng tổng quát  $u_n = (n+2) \cdot 3^n$  không là một cấp số nhân.

 Với  $u_n=n^2$ , ta có  $q=\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{(n+1)^2}{n^2}=\left(1+\frac{1}{n}\right)^2$  không là một số không đổi. Vậy dãy số  $(u_n)$  có số hạng tổng quát  $u_n = n^2$  không là một cấp số nhân.

**CÂU 8.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

$$\mathbf{A} u_n = 7 - 3n.$$

$$\mathbf{B})u_n = 7 - 3^n.$$

$$\mathbf{C}u_n = \frac{7}{3n}.$$

$$\mathbf{D}u_n = 7 \cdot 3^n.$$

🗩 Lời giải.

igotimes Với  $u_n=7-3n$ , ta có  $q=\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{7-3(n+1)}{7-3n}=\frac{4-3n}{7-3n}$  không phải là một số không đổi. Vậy dãy số  $(u_n)$  có số hạng tổng quát  $u_n = 7 - 3n$  không là một cấp số nhân.

 $oldsymbol{\Theta}$  Với  $u_n = 7 - 3^n$ , ta có  $q = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{7 - 3^{n+1}}{7 - 3^n} = \frac{7 - 3 \cdot 3^n}{7 - 3^n} = 1 - \frac{2 \cdot 3^n}{7 - 3^n}$  không phải là một số không đổi. Vậy dãy số  $(u_n)$  có số hạng tổng quát  $u_n = 7 - 3^n$  không là một cấp số nhân.

 $igodesigned ext{Với } u_n = rac{7}{3n}, ext{ ta có } q = rac{u_{n+1}}{u_n} = rac{7}{3(n+1)}: rac{7}{3n} = rac{n}{n+1}$  không phải là một số không đổi. Vậy dãy số  $(u_n)$  có số hạng tổng quát  $u_n = rac{7}{3n}$  không là một cấp số nhân.

Chọn đáp án (D).....

CÂU 9. Mệnh đề nào sau đây sai?

(A) Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.

(B) Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.

(C) Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng.

 $(\mathbf{D})$  Một cấp số nhân có công bội q > 1 là một dãy tăng.

🗭 Lời giải.

❷ Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân là mệnh đề đúng. Vì xét dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân. Khi đó  $u_{n+1}=u_n\cdot q$  với  $u_n\neq 0, q=1$  thì  $u_{n+1}=u_n.$ 

② Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng là mệnh đề đúng. Vì  $u_{n+1} = u_n + d$ , với d = 0 thì  $u_{n+1} = u_n$ .

❷ Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy số tăng là mệnh đề đúng. Ta xét dãy  $(u_n)$  là một cấp số cộng có công sai d > 0. Vì  $u_{n+1} = u_n + d \Rightarrow u_{n+1} - u_n = d > 0$ . Do đó dãy  $(u_n)$  là dãy số tăng.

 $\Theta$  Một cấp số nhân có công bội q > 1 là một dãy tăng là mệnh đề sai.

Ta xét dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có công bội q > 1.

Vì  $u_{n+1}=u_nq$  với  $u_n\neq 0, q>1$ . Khi đó  $u_{n+1}-u_n=u_nq-u_n=u_n(q-1)$ .

Nếu  $u_n < 0$  thì  $u_{n+1} - u_n = u_n q - u_n = u_n (q-1) < 0$ .

Do đó dãy  $(u_n)$  là dãy số giảm.

Chon đáp án (D)...

**CÂU 10.** Cho dãy số  $(u_n)$  được xác định bởi  $u_1 = 2, u_n = 2u_{n-1} + 3n - 1$ . Công thức số hạng tổng quát của dãy số đã cho là biểu thức có dạng  $a2^n + bn + c$ , với  $a, b, c \in \mathbb{Z}, n \geq 2, n \in \mathbb{N}$ . Khi đó tổng a + b + c có giá trị bằng

$$\bigcirc$$
  $-4$ .

$$(c)$$
 -3.

$$\bigcirc$$
3

# P Lời giải.

Ta có  $u_n = 2u_{n-1} + 3n - 1 \Leftrightarrow u_n + 3n + 5 = 2[u_{n-1} + 3(n-1) + 5]$  với  $n \ge 2, n \in \mathbb{N}$ .

Đặt  $v_n = u_n + 3n + 5$ , ta có  $v_n = 2v_{n-1}$  với  $n \ge 2, n \in \mathbb{N}$ .

Như vậy  $(v_n)$  là cấp số nhân với công bội q=2 và  $v_1=10$ .

Do đó  $v_n = 10 \cdot 2^{n-1} = 5 \cdot 2^n$ .

Suy ra  $u_n + 3n + 5 = 5 \cdot 2^n$  hay  $u_n = 5 \cdot 2^n - 3n - 5$  với  $n \ge 2, n \in \mathbb{N}$ .

Vây a = 5, b = -3, c = -5, suy ra a + b + c = -3.

Chon đáp án (C)...

# Dang 2. Số hạng tổng quát của cấp số nhân

Dựa vào giả thuyết, ta lập một hệ phương trình chứa công bội q và số hạng đầu  $u_n$ . Giải hệ phương trình này tìm được  $u_1$  và q.

Nếu cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1$  và công bội q thì số hạng tổng quát  $u_n$  được xác định bởi công thức

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$$
 với  $n \ge 2$ .

# 1. Ví dụ mâu

**VÍ DU 1 (NB).** Tìm số hạng tổng quát của dãy số 2;4;8;16;32;..., biết dãy  $(u_n)$  là một cấp số nhân.

Vì dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân nên  $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} = \ldots = 2$  và số hạng đầu  $u_1 = 2$ .

Do đó dãy số 2; 4; 8; 16; 32; ... là một cấp số nhân có số hạng tổng quát là  $u_n = u_1 q^{n-1} = 2 \cdot 2^{n-1}$ .

**VÍ DỤ 2 (TH).** Tìm số hạng đầu, công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102. \end{cases}$ 

# Dèi giải.

Vì 
$$(u_n)$$
 là một cấp số nhân nên  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ .  
Ta có 
$$\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q^4 = 51 \\ u_1 q + u_1 q^5 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 (1 + q^4) = 51 \\ u_1 q (1 + q^4) = 102 \end{cases}$$
(2).

Chia từng vế của (2) cho (1) ta được  $\frac{u_1q(1+q^4)}{u_1(1+q^4)} = \frac{102}{51} \Leftrightarrow q=2.$ 

Suy ra 
$$u_1 = \frac{51}{1+q^4} = \frac{51}{17} = 3$$
,  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 3 \cdot 2^{n-1}$ .

**VÍ DỤ 3 (TH).** Tìm số hạng đầu, công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\begin{cases} u_1 + u_6 = 30 \\ u_2 + u_7 = 120. \end{cases}$ 

# Dèi giải.

Vì 
$$(u_n)$$
 là một cấp số nhân nên  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ .

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 + u_6 = 30 \\ u_2 + u_7 = 120 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q^5 = 30 \\ u_1 q + u_1 q^6 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 (1 + q^5) = 30 \\ u_1 q (1 + q^5) = 120 \end{cases}$$
(2).

Chia từng vế của (2) cho (1) ta được 
$$\frac{u_1 q (1 + q^5)}{u_1 (1 + q^5)} = \frac{120}{30} \Leftrightarrow q = 4.$$
Suy ra  $u_1 = \frac{30}{4} = \frac{30}{4} = \frac{6}{4}$ ,  $u_2 = u_1 \cdot q^{n-1} = \frac{6}{4} \cdot 4^{n-1}$ 

Suy ra 
$$u_1 = \frac{30}{1+q^5} = \frac{30}{1+4^5} = \frac{6}{205}$$
,  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = \frac{6}{205} \cdot 4^{n-1}$ .

Vây  $u_1 = \frac{6}{205}$ , q = 4 và  $u_n = \frac{6}{205} \cdot 4^{n-1}$ .

**VÍ DỤ 4 (TH).** Tìm số hạng đầu, công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\begin{cases} u_3 = 40 \\ u_6 = 160. \end{cases}$ 

# Dèi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_3 = 40 \\ u_6 = 1080 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^2 = 40 \\ u_1 q^5 = 1080 \end{cases}$$
 (2).

Vì  $(u_n)$  là một cấp số nhân nên  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ . Ta có  $\begin{cases} u_3 = 40 \\ u_6 = 1080 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^2 = 40 \\ u_1 q^5 = 1080 \end{cases} \tag{2}.$ Chia từng vế của (2) cho (1) ta được  $\frac{u_1 q^5}{u_1 q^2} = \frac{1080}{40} \Leftrightarrow q^3 = 27 \Leftrightarrow q = 3.$ 

Suy ra 
$$u_1 = \frac{40}{q^2} = \frac{40}{3^2} = \frac{40}{9}$$
,  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = \frac{40}{9} \cdot 3^{n-1} = 40 \cdot 3^{n-3}$ .

Vây 
$$u_1 = \frac{40}{9}, q = 3 \text{ và } u_n = 40 \cdot 3^{n-3}.$$

**VÍ DỤ 5 (VDT).** Tìm số hạng đầu, công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân có công bội  $q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ , biết  $\int u_2 + u_4 = 10$  $u_1 + u_3 + u_5 = -21.$ 

### Lời giải.

Vì 
$$(u_n)$$
 là một cấp số nhân nên  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$  với  $q \in \mathbb{Z}, q \neq 0$ .  
Ta có 
$$\begin{cases} u_2 + u_4 = 10 \\ u_1 + u_3 + u_5 = -21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q + u_1 q^3 = 10 \\ u_1 q + u_1 q^2 + u_1 q^4 = -21 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 (q + q^3) = 10 & (1) \\ u_1 (1 + q^2 + q^4) = -21 & (2). \end{cases}$$

$$\begin{split} \frac{u_1(1+q^2+q^4)}{u_1(q+q^3)} &= \frac{-21}{10} &\Leftrightarrow & 10q^4+21q^3+10q^2+21q+10=0 \\ &\Leftrightarrow & (q+2)(2q+1)(5q^2-2q+5)=0 \\ &\Leftrightarrow & \left[q=-2 \text{ (thỏa mãn)} \right. \\ &\Leftrightarrow & \left[q=-\frac{1}{2} \text{ (loại)}. \right] \end{split}$$

Suy ra 
$$u_1 = \frac{10}{q+q^3} = -1$$
,  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = (-1) \cdot (-2)^{n-1} = -(-2)^{n-1} = -\frac{(-2)^n}{-2} = \frac{(-2)^n}{2}$ .  
Vậy  $u_1 = -1$ ,  $q = -2$  và  $u_n = \frac{(-2)^n}{2}$ .

# 2. Bài tấp tư luân

**BÀI 1 (NB).** Tìm số hạng thứ 100 của cấp số nhân  $8; -4; 2; -1; \dots$ 

# 🗩 Lời giải.

Cấp số nhân này có số hạng đầu  $u_1 = 8$  và công bội  $q = \frac{-4}{8} = -\frac{1}{2}$ .

Do đó số hạng tổng quát  $u_n = 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ .

Vây 
$$u_{100} = 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{100-1} = 8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^{99} = -\frac{1}{2^{96}}.$$

**BÀI 2 (NB).** Tìm số hạng tổng quát của dãy số  $3; 12; 48; 192; \ldots$ , biết dãy  $(u_n)$  là một cấp số nhân.

# 🗭 Lời giải.

Vì dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân nên  $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{12}{3} = 4$  và số hạng đầu  $u_1 = 3$ .

Do đó dãy số  $3;12;48;192;\dots$  là một cấp số nhân có số hạng tổng quát là  $u_n=u_1q^{n-1}=3\cdot 4^{n-1}$ .

**BÀI 3 (TH).** Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\begin{cases} u_1 + u_3 = 51 \\ u_2 + u_4 = 153 \end{cases}$ 

### Dòi giải.

Vì 
$$(u_n)$$
 là một cấp số nhân nên  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ .

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 + u_3 = 51 \\ u_2 + u_4 = 153 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + u_1 q^2 = 51 \\ u_1 q + u_1 q^3 = 153 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 (1 + q^2) = 51 \\ u_1 q (1 + q^2) = 153 \end{cases}$$
(2).

Chia từng vế của (2) cho (1) ta được 
$$\frac{u_1 q (1 + q^2)}{u_1 (1 + q^2)} = \frac{153}{51} \Leftrightarrow q = 3.$$

Suy ra 
$$u_1 = \frac{51}{1+q^2} = \frac{51}{10}$$
,  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = \frac{51}{10} \cdot 3^{n-1}$ .

Vậy số hạng tổng quát  $u_n = \frac{51}{10} \cdot 3^{n-1}$ .

**BÀI 4 (TH).** Tìm số hạng đầu, công bội và số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\begin{cases} u_3 = 15 \\ u_6 = 120. \end{cases}$ 

# Lời giải.

Vì  $(u_n)$  là một cấp số nhân nên  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ 

Ta có 
$$\begin{cases} u_3 = 15 \\ u_6 = 120 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^2 = 15 \\ u_1 q^5 = 120 \end{cases}$$
 (2).

Chia từng vế của (2) cho (1) ta được  $\frac{u_1q^5}{u_1q^2} = \frac{120}{15} \Leftrightarrow q^3 = 8 \Leftrightarrow q = 2.$ 

Suy ra 
$$u_1 = \frac{15}{q^2} = \frac{15}{2^2} = \frac{15}{4}$$
,  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = \frac{15}{4} \cdot 2^{n-1} = 15 \cdot 2^{n-3}$ .

Vậy 
$$u_1 = \frac{15}{4}, q = 2 \text{ và } u_n = 15 \cdot 3^{n-3}.$$

**BÀI 5 (TH).** Tìm số hạng tổng quát của cấp số nhân, biết  $\begin{cases} u_4 = 35 \\ u_8 = 560. \end{cases}$ 

# 🗩 Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_4 = 35 \\ u_8 = 560 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 = 35 \\ u_1 q^7 = 560 \end{cases}$$
 (1)

Ta có  $\begin{cases} u_4 = 35 & \text{def } 10 \text$ 

Với 
$$q = 2$$
. Suy ra  $u_1 = \frac{35}{q^3} = \frac{35}{8}$ ,  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = \frac{35}{8} \cdot 2^{n-1} = 35 \cdot 2^{n-4}$ .

Với 
$$q = -2$$
. Suy ra  $u_1 = \frac{35}{a^3} = -\frac{35}{8}$ ,  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = -\frac{35}{8} \cdot (-2)^{n-1} = 35 \cdot (-2)^{n-4}$ .

Vậy 
$$u_n = 35 \cdot 2^{n-4}$$
 với  $q = 2$  hoặc  $u_n = 35 \cdot (-2)^{n-4}$  với  $q = -2$ .

BÀI 6 (VD). Trong một lọ nuôi cấy vi khuẩn, ban đầu có 5 000 con vi khuẩn và số lượng vi khuẩn tăng lên thêm 8% mỗi giờ. Hỏi sau 5 giờ thì số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?

### 🗩 Lời giái.

Ta có A=5~000 là số lượng vi khuẩn ban đầu, r=8%=0.08 là tỉ lệ gia tăng vi khuẩn sau một giờ.

Vì sau mỗi giờ, số lượng vi khuẩn tăng lên bằng số lượng vi khuẩn trước đó cộng cho số lượng vi khuẩn tăng lên. Nên ta có:

 $\odot$  Tại thời điểm sau 1 giờ:  $T_1 = 5000 + 5000 \cdot 0.08 = 5000 \cdot (1.08)$ .

Do đó ta có thể nhận thấy rằng, số lượng vi khuẩn ở thời gian n giờ là một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 5000.1,08$  và công bôi q = 1.08.

Suy ra số hạng tổng quát  $u_n = 5 000 \cdot (1.08)^n$ .

Vậy số lượng vi khuẩn sau 5 giờ là  $u_5 = 5~000 \cdot (1.08)^5 \approx 7346$  (vi khuẩn).

# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu là  $u_1 \neq 0$  và công bội  $q \neq 0$ . Số hạng tổng quát của cấp số nhân bằng

$$\mathbf{A} u_n = u_1 + (n-1)q.$$
  $\mathbf{B} u_n = u_1 \cdot q^{n-1}.$ 

$$\mathbf{B}u_n = u_1 \cdot q^{n-1}.$$

$$\mathbf{C}u_n = u_1 \cdot q^n.$$

### Lời giải.

Số hạng tổng quát của cấp số nhân là  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ .

**CÂU 2.** Cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_n = \frac{3}{5} \cdot 2^n$ . Số hạng đầu tiên và công bội q là

$$\mathbf{A} u_1 = \frac{6}{5}, q = 3.$$

**(A)** 
$$u_1 = \frac{6}{5}, q = 3.$$
 **(B)**  $u_1 = \frac{6}{5}, q = -2.$  **(C)**  $u_1 = \frac{6}{5}, q = 2.$ 

$$\mathbf{C}u_1 = \frac{6}{5}, q = 2.$$

$$\mathbf{D}u_1 = \frac{6}{5}, q = 5.$$

# Lời giải

Ta có  $u_n = \frac{3}{5} \cdot 2^n = \frac{6}{5} \cdot 2^{n-1}$ , suy ra  $u_1 = \frac{6}{5}$  và q = 2.

Chon đáp án (C).....

**CÂU 3.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -3$  và công bội  $q = \frac{2}{3}$ . Chọn mệnh đề đúng?

$$\mathbf{A} u_5 = -\frac{27}{16}.$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_5 = -\frac{16}{27}$ .

$$\mathbf{c} u_5 = \frac{16}{27}.$$

$$\mathbf{D}u_5 = \frac{27}{16}.$$

Số hạng tổng quát của cấp số nhân là  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 3 \cdot \left(\frac{2}{2}\right)^{n-1}$ 

Vây 
$$u_5 = 3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{5-1} = \frac{16}{27}.$$

**CÂU 4.** Dãy số có số hạng tổng quát  $u_n = \frac{1}{\sqrt{3}}^{2n}$  là một cấp số nhân có công bội q bằng

$$\bigcirc \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

$$\bigcirc$$
  $\sqrt{3}$ 

$$\mathbf{c}_{\frac{1}{9}}$$
.

$$\bigcirc \frac{1}{3}$$
.

🗩 Lời giải.

Ta có 
$$u_n = \frac{1}{\sqrt{3}}^{2n} = \left[ \left( \frac{1}{\sqrt{3}} \right)^2 \right]^n = \left( \frac{1}{3} \right)^n = \frac{1}{3} \cdot \left( \frac{1}{3} \right)^{n-1}.$$

Suy ra công bội của cấp số nhân  $q = \frac{1}{2}$ 

Chọn đáp án (D)....

**CÂU 5.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 1, u_2 = -2$ . Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$\mathbf{B}u_{2024} = 2^{2023}.$$

$$\mathbf{C}u_{2024} = -2^{2024}.$$

$$\mathbf{D}$$
 $u_{2024} = 2^{2024}$ .

Dèi giải.

Số hạng tổng quát của cấp số nhân là  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = (-2)^{n-1}$ 

 $V_{\text{ay}} u_{2024} = (-2)^{2024-1} = (-2)^{2023} = -2^{2023}$ 

Chọn đáp án (A)....

**CÂU 6.** Cho cấp số nhân có  $\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases}$ . Số hạng đầu tiên  $u_1$  và công bội q của cấp số nhân là

**B**)
$$u_1 = 9 \text{ và } q = -2.$$

**B**) 
$$u_1 = 9 \text{ và } q = -2.$$
 **C**)  $u_1 = -9 \text{ và } q = 2.$ 

$$\mathbf{D}$$
 $u_1 = -9 \text{ và } q = -2.$ 

Dòi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_4 - u_2 = 54 \\ u_5 - u_3 = 108 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 - u_1 q = 54 \\ u_1 q^4 - u_1 q^2 = 108 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q(q^2 - 1) - 54 & (1) \\ u_1 q^2 (q^2 - 1) = 108 & (2). \end{cases}$$
Chia từng vế của (2) cho (1) ta được 
$$\frac{u_1 q^2 (q^2 - 1)}{u_1 q(q^2 - 1)} = \frac{108}{54} \Leftrightarrow q = 2.$$

Suy ra  $u_1 = \frac{54}{a^3 - a} = \frac{54}{2^3 - 2} = 9.$ 

Chọn đáp án (A).....

**A** 
$$u_1 = 2; q = 5 \text{ hoặc } u_1 = 25; q = \frac{1}{5}$$

**B** 
$$u_1 = 5; q = 1$$
 hoặc  $u_1 = 25; q = \frac{1}{5}$ .

$$\mathbf{C}$$
 $u_1 = 25; q = 5 \text{ hoặc } u_1 = 1; q = \frac{3}{5}$ 

$$\mathbf{D}u_1 = 1; q = 5 \text{ hoặc } u_1 = 25; q = \frac{\mathbf{J}}{5}.$$

Lời giải.

Vì 
$$(u_n)$$
 là một cấp số nhân nên  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ .  
Ta có 
$$\begin{cases} u_1 + u_2 + u_3 = 31 \\ u_1 + u_3 = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_2 = 5 \\ u_1 + u_3 = 26 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q = 5 \quad (1) \\ u_1 (1 + q^2) = 26 \quad (2). \end{cases}$$

Chia từng vế của (2) cho (1) ta được  $\frac{q^2+1}{q} = \frac{26}{5} \Leftrightarrow 5q^2 - 26q + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} q=5\\ q=1 \end{bmatrix}$ 

Với q = 5. Suy ra  $u_1 = \frac{5}{a} = \frac{5}{5} = 1$ .

Với 
$$q = \frac{1}{5}$$
. Suy ra  $u_1 = \frac{q}{5} = 5 : \frac{1}{5} = 25$ .

Vậy  $u_1 = 1$  với q = 5 hoặc  $u_1 = 25$  với  $q = \frac{1}{\epsilon}$ 

Chọn đáp án (D).....

**CÂU 8.** Số hạng đầu tiên và công bội của cấp số nhân thỏa mãn  $\begin{cases} u_5+u_2=36\\ u_6-u_4=48 \end{cases}$  (với q>0) là

$$\mathbf{A} u_1 = 4, q = 4.$$

**B**) 
$$u_1 = 2, q = 4.$$

$$\mathbf{C}u_1 = 2, q = 2.$$

$$\bigcirc u_1 = 4, q = 2$$

Dòi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_5 + u_2 = 36 \\ u_6 - u_4 = 48 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^4 + u_1 q = 36 \\ u_1 q^5 - u_1 q^3 = 48 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q(q^3 + 1) = 36 & (1) \\ u_1 q(q^4 - q^2) = 48 & (2). \end{cases}$$

Chia từng vế của (2) cho (1) ta được

$$\frac{u_1q(q^4-q^2)}{u_1q(q^3+1)} = \frac{48}{36} \Leftrightarrow \frac{q^4-q^2}{q^3+1} = \frac{4}{3} \Leftrightarrow 3q^4-4q^3-3q^2-4 = 0 \\ \begin{bmatrix} q=2 \\ q=-1. \end{bmatrix}$$

Từ điều kiện q > 0 suy ra công bội của cấp số nhân là q = 2, do đó  $u_1 = \frac{36}{q^4 + q} = 2$ .

 $V_{ay} u_1 = 2 \text{ và } q = 2.$ 

Chọn đáp án (C).....

**CÂU 9.** Cho cấp số nhân  $u_2 = \frac{1}{4}, u_5 = 16$ . Công bội và số hạng đầu tiên của cấp số nhân là

**B** 
$$q = \frac{-1}{2}$$
;  $u_1 = \frac{-1}{2}$ . **C**  $q = 4$ ;  $u_1 = \frac{1}{16}$ .

$$\mathbf{C}$$
  $q = 4; u_1 = \frac{1}{16}.$ 

Ta có  $u_2 = u_1 q = \frac{1}{4}$  (1) và  $u_5 = u_1 q^4 = 16$  (2).

Lấy (2) chia cho (1) vế theo vế ta được  $\frac{u_1q^4}{u_1q} = \frac{16}{\frac{1}{4}} \Leftrightarrow q^3 = 64 \Leftrightarrow q = 4.$ 

Suy ra 
$$u_1 = \frac{1}{4} : q = \frac{1}{4} : 4 = \frac{1}{16}$$
.

Vậy 
$$u_1 = \frac{1}{16}, q = 4.$$

Chọn đáp án (C)...

CÂU 10. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của để tháp (có diện tích là 12 288 m<sup>2</sup>). Diện tích mặt trên cùng (của tầng thứ 11) có giá trị nào sau đây?

$$\bigcirc$$
 A) 6 m<sup>2</sup>

(**B**) $8 \text{ m}^2$ .

 $(\mathbf{C})10 \text{ m}^2.$ 

Dèi giải.

Vì diện tích của mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của để tháp.

Do đó diện tích của mỗi tầng tạo nên dãy số và dãy số đó là một cấp số nhân có công bội  $q = \frac{1}{2}$ .

Vậy số hạng tổng quát của cấp số nhân đó là  $u_n = 12\ 288 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ .

Vì từ để tháp đến tầng thứ 11 của tháp sẽ có 12 mặt nền, do đó diện tích của mặt của tầng thứ 11 là  $u_{12} = 12\ 288 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{12-1} = 6$  $\mathrm{m}^2$ .

Chọn đáp án (A)...

# 🖶 Dạng 3. Tìm số hạng cụ thể của CSN

Ta chuyển các số hang của CSN về số hang đầu  $u_1$  và công bôi q. Sử dung công thức  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1}$ .

Chia hai phương trình vế theo vế ta thu được phương trình theo q.

Giải tìm q và  $u_1$ . Từ đó tìm được số hạng cần tìm thỏa yebt.

# 1. Ví du mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Cho  $u_n$  là CSN thỏa  $u_1=2;\,u_4=16.$  Tìm số hạng thứ 5 của CSN.

Do  $u_n$  là CSN nên ta có  $u_4 = u_1 \cdot q^3 \Rightarrow q^3 = \frac{u_4}{u_1} = 8 \Rightarrow q = 2.$ 

Vậy  $u_5 = u_1 \cdot q^4 = 2 \cdot 2^4 = 32$ .

**VÍ DỤ 2 (TH).** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $\begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases}$ . Tính số hạng đầu  $u_1$  và công bội q của cấp Số nhân.

D Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 (1 + q^2) = -540 \\ u_1 q^2 (1 + q^2) = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ q = -3. \end{cases}$$

Vậy  $\begin{cases} u_1 = 2 \\ a = -3 \end{cases}$  là số hạng cần tìm.

**VÍ DỤ 3 (TH).** Cho cấp số nhân có  $u_1 = -3$ ,  $q = \frac{2}{3}$ . Số  $\frac{-96}{243}$  là số hạng thứ mấy của cấp số nhân?

🗩 Lời giải.

Giả sử số  $\frac{-96}{243}$  là số hạng thứ n của cấp số nhân.

Ta có:  $u_1 \cdot q^{n-1} = \frac{-96}{243} \Leftrightarrow (-3) \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{-96}{243} \Leftrightarrow n = 6.$ 

Vậy số  $\frac{-96}{243}$  là số hạng thứ 6 của cấp số nhân.

**VÍ DỤ 4 (TH).** Cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng tổng quát là  $u_n = \frac{3}{5} \cdot 2^{n-1}, n \in \mathbb{N}^*$ . Số hạng đầu tiên và công bội của cấp số nhân đó là

### D Lời giải.

Ta có 
$$u_1 = \frac{3}{5} \cdot 2^{1-1} = \frac{3}{5}$$
 và  $u_2 = \frac{3}{5} \cdot 2^{2-1} = \frac{6}{5} \Rightarrow q = \frac{u_2}{u_1} = 2$ .  
Vậy  $u_1 = \frac{3}{5}$  và  $q = 2$ .

VÍ DU 5 (VD). Người ta thiết kế một cái tháp gồm 10 tầng theo cách: Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích bề mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích bề mặt của tầng 1 bằng nửa diện tích bề mặt để tháp. Biết diện tích bề mặt để tháp là 12 288 m<sup>2</sup>, tính diện tích bề mặt trên cùng của tháp.

### Lời giải.

Gọi S là diện tích mặt để và  $T_1, T_2, \dots, T_{10}$  là diện tích bề mặt của tầng 1, tầng 2, ..., tầng 10. Khi đó, ta có

$$T_{1} = \frac{1}{2} \cdot S;$$

$$T_{2} = \frac{1}{2} \cdot T_{1} = \frac{1}{2^{2}} \cdot S;$$

$$T_{3} = \frac{1}{2} \cdot T_{2} = \frac{1}{2^{3}} \cdot S;$$

$$\vdots$$

$$T_{10} = \frac{1}{2} \cdot T_{9} = \frac{1}{2^{10}} \cdot S.$$

Vậy diện tích bề mặt trên cùng của tháp là  $T_{10} = \frac{1}{2^{10}} \cdot 12288 = 12 \text{ m}^2$ .

# 2. Bài tấp tư luân

**BÀI 1 (TH).** Cho cấp số nhân 
$$(u_n)$$
 biết  $\begin{cases} u_4 - u_2 = 25 \\ u_3 - u_1 = 50. \end{cases}$ 

- a) Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân  $(u_n)$ .
- b) Tìm số hạng thứ 8 của cấp số nhân  $(u_n)$ .

#### Lời giải.

a) Ta có 
$$\begin{cases} u_4 - u_2 = 25 \\ u_3 - u_1 = 50 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(q^3 - q) = 25 \\ u_1(q^2 - q) = 50 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q = \frac{1}{2} \\ u_1 = -200. \end{cases}$$

b) Ta có 
$$u_8 = u_1 \cdot q^7 = -200 \cdot \frac{1}{2^7} = -\frac{25}{16}$$
.

**BÀI 2 (TH).** Tìm số hạng thứ 10 của cấp số nhân  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_4 - u_2 = 72 \\ u_5 - u_3 = 144. \end{cases}$ 

$$\text{Ta có } \begin{cases} u_4 - u_2 = 72 \\ u_5 - u_3 = 144 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_4 - u_2 = 72 \\ q(u_4 - u_2) = 144 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q = 2 \\ u_1(q^3 - q) = 72 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = 2 \\ u_1 = 12. \end{cases}$$
Khi đó  $u_1 = u_2 + q^9 = 6144$ 

BÀI 3 (TH). Cho một cấp số nhân có 5 số hạng biết 2 số hạng đầu là số dương, tích số hạng đầu và số hạng thứ 3 là 1, tích số hạng thứ 3 và số hạng cuối là  $\frac{1}{16}.$  Tìm cấp số nhân này.

Gọi 5 số hạng cần tìm có dạng  $\frac{x}{q^2}$ ;  $\frac{x}{q}$ ; x; xq;  $xq^2$ .

Theo đề ra ta có  $\begin{cases} \frac{x}{q^2} \cdot x = 1 \\ x \cdot xq^2 = \frac{1}{16} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}$  (do hai số hạng đầu dương nên q > 0).

Vậy 5 số hạng cần tìm là  $2; 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}$ 

**BÀI 4 (TH).** Tìm số hạng đầu và công bội của cấp số nhân  $(u_n)$  biết  $\begin{cases} u_2 + u_5 - u_4 = 10 \\ u_3 + u_6 - u_5 = 20. \end{cases}$ 

Dòi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_2 + u_5 - u_4 = 10 \\ u_3 + u_6 - u_5 = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1(q + q^4 - q^3) = 10 \\ u_1(q^2 + q^5 - q^4) = 20 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = 2 \\ u_1 = 1. \end{cases}$$

**BÀI 5 (TH).** Tìm 5 số lập thành một cấp số nhân có công bội bằng  $\frac{1}{4}$  số thứ nhất và tổng 2 số đầu là  $\frac{5}{4}$ 🗩 Lời giải.

Theo đề, ta có  $\begin{cases} q = \frac{1}{4}u_1 \\ u_1 + u_2 = \frac{5}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = \frac{1}{4}u_1 \\ u_1 + u_1 \cdot q = \frac{5}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = \frac{1}{4}u_1 \\ u_1^2 + 4u_1 - 5 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q = \frac{1}{4} & \text{hoặc } \\ u_1 = 1 \end{cases} \begin{cases} q = -\frac{5}{4} \\ u_1 = -5. \end{cases}$ 

BÀI 6 (TH). Tìm 3 số lập thành một cấp số nhân có tổng là 63 và tích là 1728. Dèi giải.

Gọi ba số cần tìm là  $\frac{x}{a}$ ; x; xq. Theo đề ra, ta có  $x^3 = 1728 \Rightarrow x = 12$ .

Mặt khác  $\frac{x}{q} + x + xq = 63 \Leftrightarrow 12q + 12 + \frac{12}{q} = 63 \Leftrightarrow 12q^2 - 51q + 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} q = 4 \\ q = \frac{1}{2} & \frac{1}{2}$ 

Vậy CSN cần tìm là 3; 12; 48.

# 3. Câu hỏi trắc nghiêm

**CÂU 1.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_{20} = 8u_{17}$ . Công bội của cấp số nhân là

 $(\mathbf{A})q=2.$ 

 $(\mathbf{B})q = -2.$ 

 $(\mathbf{D})q = -4.$ 

🗩 Lời giải.

Ta có  $u_{20} = 8u_{17} \Rightarrow u_1 \cdot q^{19} = 8 \cdot u_1 \cdot q^{16} \Rightarrow q = 2.$ 

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 2.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có 10 số hạng với công bội  $q \neq 0$  và  $u_1 \neq 0$ . Đẳng thức nào sau đây là đúng?

 $(\mathbf{A})u_7 = u_4 \cdot q^6.$ 

 $\mathbf{B})u_7 = u_4 \cdot q^3.$ 

 $(\mathbf{C})u_7 = u_4 \cdot q^4.$ 

P Lời giải.

Ta có  $u_7 = u_1 \cdot q^6 = (u_1 \cdot q^3) \cdot q^3 = u_4 \cdot q^3$ .

Chọn đáp án (B).....

**CÂU 3.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1=2$  và công bội q=3. Giá trị  $u_{2019}$  bằng

 $\mathbf{A}$  3 · 2<sup>2019</sup>.

 $(\mathbf{B})2 \cdot 3^{2019}$ 

 $(\mathbf{C})_3 \cdot 2^{2018}$ .

 $(\mathbf{D})2 \cdot 3^{2018}$ 

🗩 Lời giải.

Áp dụng công thức của số hạng tổng quát  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 2 \cdot 3^{2018}$ .

Chọn đáp án (D).....

**CÂU 4.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với công bội q < 0 và  $u_2 = 4$ ,  $u_4 = 9$ . Tìm  $u_1$ .

 $(A)u_1 = 6.$ 

 $\mathbf{D}u_1 = \frac{8}{2}$ .

P Lời giải.

Vì  $q<0,\ u_2>0$  nên  $u_3<0.$  Do đó  $u_3=-\sqrt{u_2\cdot u_4}=-\sqrt{4\cdot 9}=-6.$  Ta có  $u_2^2=u_1\cdot u_3\Rightarrow u_1=\frac{u_2^2}{u_3}=\frac{4^2}{-6}=-\frac{8}{3}.$ 

**CÂU 5.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_2 = -6, u_3 = 3$ . Công bội q của cấp số nhân đã cho bằng

 $(\mathbf{A})2.$ 

 $(\mathbf{c}) - \frac{1}{2}$ .

(**D**)-2.

🗩 Lời giải.

Công bội của cấp số nhân đã cho là

$$q = \frac{u_3}{u_2} = -\frac{1}{2}.$$

**CÂU 6.** Cho cấp số nhân có  $u_1 = -3$ ,  $q = \frac{2}{3}$ . Tính  $u_5$ ?

$$\mathbf{A} u_5 = \frac{27}{16}.$$

$$\mathbf{B}u_5 = \frac{-36}{27}$$

$$\mathbf{c}$$
 $u_5 = \frac{-27}{16}$ .

$$\mathbf{D}u_5 = \frac{16}{27}.$$

🗩 Lời giải.

Ta có:  $u_5 = u_1 \cdot q^4 = (-3) \left(\frac{2}{3}\right)^4 = -\frac{16}{27}$ 

Chọn đáp án (B).....

**CÂU 7.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_2 = \frac{1}{4}$ ;  $u_5 = -16$ . Tìm q và số hạng đầu tiên của cấp số nhân?

**B** 
$$q = -\frac{1}{2}, u_1 = -\frac{1}{2}.$$
 **C**  $q = -4, u_1 = \frac{1}{16}.$  **D**  $q = -4, u_1 = -\frac{1}{16}.$ 

$$\mathbf{C}$$
  $q = -4, u_1 = \frac{1}{16}.$ 

Ta có 
$$\begin{cases} u_2 = \frac{1}{4} \\ u_5 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q = \frac{1}{4} \\ u_1 \cdot q^4 = -16 \end{cases} \Rightarrow q^3 = -64 \Rightarrow q = -4 \Rightarrow u_1 = \frac{1}{16}.$$

**CÂU 8.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$ , biết:  $u_n = 81, u_{n+1} = 9$ . Lựa chọn đáp án đúng.

$$\mathbf{A} q = -\frac{1}{2}$$
.

$$\mathbf{B}q = \frac{1}{9}.$$

$$\bigcirc q = 9.$$

$$\mathbf{D}q = -9.$$

P Lời giải.

Ta có 
$$q = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{9}{81} = \frac{1}{9}.$$

Chọn đáp án (B)...

**CÂU 9.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và công bội q = 3. Số hạng  $u_2$  bằng

(A) 8.

Lời giải.

Ta có  $u_2 = u_1 \cdot q = 2 \cdot 3 = 6$ .

Chọn đáp án (B).....

**CÂU 10.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  với  $u_1 = 2$  và  $u_3 = 8$ . Số hạng thứ hai của cấp số nhân đã cho bằng

**B**)
$$u_2 = 6$$
.

$$u_2 = \pm 4.$$

$$\mathbf{D}u_2 = -4.$$

🗩 Lời giải.

Ta có 
$$u_1 \cdot u_3 = u_2^2 \Leftrightarrow u_2^2 = 16 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} u_2 = 4 \\ u_2 = -4 \end{bmatrix}$$

Chọn đáp án (C).....

**CÂU 11.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1=-1; q=\frac{-1}{10}$ . Số  $\frac{1}{10^{103}}$  là số hạng thứ bao nhiêu?

$$lack A$$
 số hạng thứ 103.

(D)Đáp án khác.

Dòi giải.

Ta có 
$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} \Leftrightarrow \frac{1}{10^{103}} = -1 \cdot \left(\frac{-1}{10}\right)^{n-1} \Leftrightarrow \left(\frac{-1}{10}\right)^{n-1} = \left(\frac{-1}{10}\right)^{103} \Rightarrow n = 104.$$

**CÂU 12.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có các số hạng lần lượt là  $3, 9, 27, 81, \dots$ Khi đó  $u_n$  bằng

$$(A)$$
 3 + 3<sup>n</sup>.

**B**
$$3^{n-1}$$
.

$$\bigcirc$$
 3<sup>n+1</sup>.

$$\bigcirc$$
  $3^n$ .

Lời giải.

Cấp số nhân đã cho có  $u_1 = 3$  và công bội q = 3 nên  $u_n = u_1 \cdot q^{n-1} = 3 \cdot 3^{n-1} = 3^n$ .

Chon đáp án (D).....

**CÂU 13.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 3$  và  $15u_1 - 4u_2 + u_3$  đạt giá trị nhỏ nhất. Tìm số hạng thứ 13 của cấp số nhân đã cho.

$$\mathbf{A} u_{13} = 12288.$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_{13} = 3072.$ 

$$\mathbf{C}$$
 $u_{13} = 24567.$ 

$$\mathbf{D}$$
 $u_{13} = 49152.$ 

Dòi giải.

Gọi q là công bội của cấp số nhân  $(u_n)$ .

Ta có  $15u_1 - 4u_2 + u_3 = 45 - 12q + 3q^2 = 3(q-2)^2 + 33 \ge 33 \ \forall q \in \mathbb{R}.$ 

Suy ra  $15u_1 - 4u_2 + u_3$  đạt giá trị nhỏ nhất khi q = 2. Khi đó  $u_{13} = u_1 q^{12} = 12288.$ 

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 14.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  biết  $u_1 + u_5 = 51$  và  $u_2 + u_6 = 102$ . Hỏi số 12288 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân  $(u_n)$ ?

- (A) Số hạng thứ 13.
- (B) Số hạng thứ 10.
- (C) Số hạng thứ 11.
- (D)Số hạng thứ 12.

Lời giải.

Gọi q là công bội của cấp số nhân đã cho. Theo đề bài, ta có

Got 
$$q$$
 to congress of main doctors. Theo de ball, to congress  $\begin{cases} u_1 + u_5 = 51 \\ u_2 + u_6 = 102 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \left(1 + q^4\right) = 51 \\ u_1 q \left(1 + q^4\right) = 102 \end{cases} \Rightarrow q = 2 \Rightarrow u_1 = 3 \Rightarrow u_n = 3 \cdot 2^{n-1}.$  Mặt khác  $u_n = 12288 \Leftrightarrow 3 \cdot 2^{n-1} = 12288 \Leftrightarrow 2^{n-1} = 2^{12} \Leftrightarrow n = 13.$ 

**CÂU 15.** Một tứ giác lồi có số đo các góc lập thành một cấp số nhân. Biết rằng số đo của góc nhỏ nhất bằng  $\frac{1}{6}$  số đo của góc nhỏ thứ ba. Hãy tính số đo của các góc trong tứ giác đó.

- $(A)5^{\circ}, 15^{\circ}, 45^{\circ}, 225^{\circ}.$
- (**B**)9°, 27°, 81°, 243°.
- $(\mathbf{C})7^{\circ}, 21^{\circ}, 63^{\circ}, 269^{\circ}.$   $(\mathbf{D})8^{\circ}, 32^{\circ}, 72^{\circ}, 248^{\circ}.$

🗩 Lời giải.

Gọi các góc của tứ giác là a, aq,  $aq^2$ ,  $aq^3$ , trong đó q > 1.

Theo giả thiết, ta có  $a = \frac{1}{9}aq^2$  nên q = 3.

Suy ra các góc của tứ giác là a, 3a, 9a, 27a.

Vì tổng các góc trong tứ giác bằng  $360^{\circ}$  nên ta có  $a + 3a + 9a + 27a = 360^{\circ} \Leftrightarrow a = 9^{\circ}$ .

Vậy số đo các góc trong tứ giác lần lượt là 9°, 27°, 81°, 243°.

Chọn đáp án (B).....

# 🖶 Dang 4. Tìm điều kiên để một dãy số lập thành CSN

Dãy số a, b, c lập thành CSN khi  $b^2 = a \cdot c$ .

Đây số a, b, c lạp thành CSN khi  $\begin{cases} b^2 = a \cdot c \\ c^2 = b \cdot d. \end{cases}$ 

# 1. Ví dụ mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Cho dãy 3, x, 12, y. Tìm x, y để dãy là CSN.

D Lời giải.

Dãy là CSN khi 
$$\begin{cases} x^2 = 3 \cdot 12 \\ 12^2 = x \cdot y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 6 \\ y = 24 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -6 \\ y = -24. \end{cases}$$

**VÌ DỤ 2 (TH).** Cho dãy x-1, 2x, 4x+3. Tìm x để dãy là CSN.

Lời giải.

Dãy là CSN khi  $(2x)^2 = (x-1)(4x+3) \Leftrightarrow x = -3$ .

**VÍ DỤ 3 (VD).** Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng, đồng thời, các số  $x + \frac{5}{2}$ , y - 1, 2x - 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Hãy tìm x và y.

Lời giải.

- $\Theta$  Ba số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y lập thành cấp số cộng nên  $(x + 6y) + (8x + y) = 2(5x + 2y) \Leftrightarrow x = 3y$ .
- $\odot$  Ba số  $x + \frac{5}{3}$ , y 1, 2x 3y lập thành cấp số nhân nên  $\left(x + \frac{5}{3}\right)(2x 3y) = (y 1)^2$ .

Thay x = 3y vào ta được  $8y^2 + 7y - 1 = 0 \Leftrightarrow y = -1$  hoặc  $y = \frac{1}{8}$ 

Với y = -1 thì x = -3; với  $y = \frac{1}{9}$  thì  $x = \frac{3}{9}$ .

**VÍ DU 4 (VD).** Tìm tất cả các giá tri của tham số m để phương trình sau có ba nghiêm phân biệt lập thành một cấp số nhân  $x^3 - 7x^2 + 2(m^2 + 6m)x - 8 = 0.$ 

Dòi giải.

+ Điều kiện cần:

Giả sử phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt  $x_1,x_2,x_3$  lập thành một cấp số nhân.

Theo định lý Vi-ét, ta có  $x_1x_2x_3 = 8$ .

Theo tính chất của cấp số nhân, ta có  $x_1x_3 = x_2^2$ . Suy ra  $x_2^3 = 8 \Leftrightarrow x_2 = 2$ .

Với nghiệm x = 2, ta có  $m^2 + 6m - 7 = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} m = 1 \\ m = -7. \end{bmatrix}$ 

#### + Điều kiện đủ:

Với m=1 hoặc m=-7 thì  $m^2+6m=7$ .

Khi đó phương trình ban đầu trở thành  $x^3 - 7x^2 + 14x - 8 = 0$ .

Giải phương trình này, ta được các nghiệm là 1,2,4. Hiển nhiên ba nghiệm này lập thành một cấp số nhân với công bội q=2. Vậy m=1 và m=-7 là các giá trị cần tìm.

**VÍ DỤ 5 (VD).** Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng; đồng thời các số x - 1, y + 2, x - 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính  $x^2 + y^2$ .

#### Dèi giải.

Theo giả thiết ta có

$$\begin{cases} (x+6y) + (8x+y) = 2(5x+2y) \\ (x-1)(x-3y) = (y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y \\ (3y-1)(3y-3y) = (y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3y \\ 0 = (y+2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -6 \\ y = -2. \end{cases}$$

Vâv  $x^2 + y^2 = 40$ .

# 2. Bài tấp tư luân

**BÀI 1 (TH).** Xác định x dương để 2x-3; x; 2x+3 lập thành cấp số nhân.

### 🗩 Lời giải.

Ba số 2x-3; x; 2x+3 lập thành cấp số nhân khi  $x^2=(2x-3)(2x+3) \Leftrightarrow x=\pm\sqrt{3}$ . Do x>0 nên chọn  $x=\sqrt{3}$ .

**BÀI 2 (TH).** Cho cấp số nhân x, 12, y, 192. Tìm x và y.

🗩 Lời giải.

Bốn số 
$$x, 12, y, 192$$
 lập thành CSN khi 
$$\begin{cases} xy = 12^2 \\ y^2 = 12 \cdot 192 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 48 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x = -3 \\ y = -48. \end{cases}$$

**BÀI 3 (TH).** Tìm x để dãy số 1,  $x^2$ ,  $6 - x^2$  lập thành cấp số nhân.

### 🗭 Lời giải.

Ta có  $1, x^2, 6 - x^2$  lập thành cấp số nhân  $\Leftrightarrow x^4 = 6 - x^2 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{2}$ .

**BÀI 4 (TH).** Viết 6 số xen giữa hai số -2 và 256 để được một cấp số nhân có 8 số hạng. Tìm cấp số nhân này.  $\bigcirc$  Lời giải.

Theo đề ra, ta có  $\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_8 = 256 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -2 \\ u_1 \cdot q^7 = 256 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -2 \\ q = -2. \end{cases}$ 

Cấp số nhân cần tìm là -2: 4: -8: 16: -32: 64: -128: 256

BÀI 5 (VD). Bốn góc của một tứ giác lồi lập thành một cấp số nhân, góc lớn nhất gấp 8 lần góc nhỏ nhất. Tìm 4 góc đó. 

Dừi giải.

Giả sử 4 góc của tứ giác là  $A \le B \le C \le D$ . Suy ra  $A + B + C + D = 360^{\circ}$ .

Theo đề, ta có  $D = 8A \Leftrightarrow Aq^3 = 8A \Leftrightarrow q = 2$ . Khi đó, ta được

$$A(1+q+q^2+q^3) = 360^{\circ} \Rightarrow A = 24^{\circ}.$$

Vậy 4 góc của tứ giác lần lượt là 24°; 48°; 96°; 192°.

**BÀI 6 (VD).** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình sau có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân  $x^3 - 7mx^2 + 2(m^2 + 6m)x - 64 = 0$ .

#### Dèi giải.

+ Điều kiện cần:

Giả sử phương trình đã cho có ba nghiệm phân biệt  $x_1; x_2; x_3$  lập thành một cấp số nhân.

Theo định lý Vi-ét, ta có  $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = 64$ .

Theo tính chất của cấp số nhân, ta có  $x_1 \cdot x_3 = x_2^2$ . Suy ra ta có  $x_2^3 = 64 \Leftrightarrow x_2 = 4$ .

Thay x = 4 vào phương trình đã cho ta được

$$4^{3} - 7m \cdot 4^{2} + 2(m^{2} + 6m) \cdot 4 - 64 = 0 \Leftrightarrow m^{2} - 8m = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} m = 0 \\ m = 8. \end{bmatrix}$$

+ Điều kiện đủ:

Với m=0 thay vào phương trình đã cho ta được:  $x^3-64=0$  hay x=4 (nghiệm kép-loại).

Với m=8 thay vào phương trình đã cho nên ta có phương trình  $x^3-56x^2+224x-64=0$ .

Phương trình này có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số nhân.

Vậy m = 8 là giá trị cần tìm.

# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

CÂU 1. Bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và góc lớn nhất gấp 27 lần góc nhỏ nhất. Tổng của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng

 $(\mathbf{A})56^{\circ}.$ 

(**B**)102°.

(C)168°.

(**D** $)252^{\circ}.$ 

# Lời giải.

Giả sử 4 góc A, B, C, D (với A < B < C < D) theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân thỏa yêu cầu với công bội q. Theo giả thiết ta có

$$\begin{cases} A+B+C+D=360 \\ D=27A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A\left(1+q+q^2+q^3\right)=360 \\ Aq^3=27A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=3 \\ A=9. \end{cases}$$

Suy ra  $D = A \cdot q^3 = 9 \cdot 3^3 = 243$ .

Vây tổng số đo góc lớn nhất và góc bé nhất là  $A + D = 252^{\circ}$ .

Chọn đáp án  $\overline{(D)}$ .....

**CÂU 2.** Xác định x để 3 số 2x-1; x; 2x+1 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân:

$$\bigcirc x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

 $(\mathbf{D})$ Không có giá trị nào của x.

Ba số 2x-1; x; 2x+1 theo thứ tự lập thành cấp số nhân

$$\Leftrightarrow (2x-1)(2x+1) = x^2 \Leftrightarrow 3x^2 = 1 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

Chọn đáp án (C).....

**CÂU 3.** Cho 4 số nguyên dương, trong đó 3 số đầu lập thành cấp số cộng, 3 số cuối lập thành cấp số nhân. Biết tổng số đầu và cuối là 37, tổng 2 số hạng giữa là 36. Hỏi số lớn nhất thuộc khoảng nào sau đây?

 $(\mathbf{D})(22;25).$ 

### Dèi giải.

Giả sử 4 số đó là  $a, b, c, d \ (a, b, c, d \in \mathbb{N}^*).$ 

Do a, b, c lập thành cấp số công nên ta có a + c = 2b (1).

Do b, c, d lập thành cấp số nhân nên ta có  $b \cdot d = c^2$  (\*).

Theo giả thiết ta có 
$$\begin{cases} a+d=37 & (2) \\ b+c=36. & (3) \end{cases}$$

Do 
$$b$$
,  $c$ ,  $d$  lạp thanh cap số nhân nên the Theo giả thiết ta có 
$$\begin{cases} a+d=37 & (2) \\ b+c=36. & (3) \end{cases}$$
Từ  $(1)$ ,  $(2)$ ,  $(3)$  ta có 
$$\begin{cases} a=-d+37 \\ b=\frac{-d+73}{3} \\ c=\frac{d+35}{3}. \end{cases}$$

Thay vào (\*) ta có 
$$\frac{-d+73}{3} \cdot d = \left(\frac{d+35}{3}\right)^2 \Leftrightarrow 4d^2 - 149d + 1225 = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} d=25 \\ d=\frac{49}{4} \end{bmatrix}$$
 (loại).

Với d = 25, ta có a = 12, b = 16, c = 20.

Vậy số lớn nhất là  $25 \in (24; 26)$ .

**CÂU 4.** Ba số x, y, z theo thứ tự lập thành một cấp số nhân với công bội q khác 1 đồng thời các số x, 2y, 3z theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với công sai khác 0. Tìm giá trị của  $q.\,$ 

Chọn đáp án (B).....

$$\mathbf{A} q = -\frac{1}{3}.$$

$$\mathbf{B}q = \frac{1}{9}$$
.

### Lời giải.

Theo giả thiết ta có

$$\begin{cases} y = xq \\ z = xq^2 \\ x + 3z = 2(2y) \end{cases} \Rightarrow x + 3xq^2 = 4xq \Rightarrow x (3q^2 - 4q + 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = 0 \\ 3q^2 - 4q + 1 = 0. \end{bmatrix}$$

Nếu  $x = 0 \Rightarrow y = z = 0 \Rightarrow$  công sai của cấp số cộng x, 2y, 3z bằng 0 (vô lí).

Nếu 
$$3q^2 - 4q + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} q = 1 \\ q = \frac{1}{2} & \Leftrightarrow q = \frac{1}{3} \text{ vì } (q \neq 1). \end{bmatrix}$$

**CÂU 5.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

$$\mathbf{A} u_n = \frac{1}{3^n} - 1.$$

$$\mathbf{C}u_n = n^2 - \frac{1}{3}.$$

Từ các đáp án trên, với dãy  $(u_n)$  cho bởi  $u_n = \frac{1}{3^{n-2}}$  là một cấp số nhân, vì

$$T = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{3^{n-2}}{3^{n-1}} = \frac{1}{3}$$
 (không đổi).

Chọn đáp án (D)......

CÂU 6. Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào là sai?

- $(\mathbf{A})$  Đãy số  $(a_n)$ , với  $a_1=3$  và  $a_{n+1}=\sqrt{a_n+6}$ ,  $\forall n\geq 1$ , vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.
- (B) Dãy số  $(d_n)$ , với  $d_1 = -3$  và  $d_{n+1} = 2d_n^2 15$ ,  $\forall n \geq 1$ , vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.
- $(\mathbf{C})$  Đãy số  $(b_n)$ , với  $b_1=1$  và  $b_{n+1}\left(2b_n^2+1\right)=3, \ \forall n\geq 1$ , vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.
- igotimesDãy số  $(c_n)$ , với  $c_1=2$  và  $c_{n+1}=3c_n^2-10$ ,  $\forall n\geq 1$ , vừa là cấp số cộng vừa là cấp số nhân.

### Dèi giải.

Kiểm tra từng phương án ta có

- $\odot$  Ta có  $a_2 = 3$ ,  $a_2 = 3$ , ... Bằng phương pháp quy nạp toán học chúng ra chứng minh được rằng  $a_n = 3$ ,  $\forall n \geq 1$ . Do đó  $(a_n)$  là dãy số không đổi. Suy ra nó vừa là cấp số cộng (công sai bằng 0) vừa là cấp số nhân (công bội bằng 1).
- $\odot$  Tương tự như phương án trên, chúng ta chỉ ra được  $b_n = 1$ ,  $\forall n \geq 1$ . Do đó  $(b_n)$  là dãy số không đổi. Suy ra nó vừa là cấp số cộng (công sai bằng 0) vừa là cấp số nhân (công bội bằng 1).
- $\Theta$  Tương tự như phương án trên, chúng ta chỉ ra được  $c_n=2,\, \forall n\geq 1.$  Do đó  $(c_n)$  là dãy số không đổi. Suy ra nó vừa là cấp số cộng (công sai bằng 0) vừa là cấp số nhân (công bội bằng 1).
- $\odot$  Ta có  $d_1 = -3$ ,  $d_2 = 3$ ,  $d_3 = 3$ . Ba số hạng này không lập thành cấp số cộng cũng không lập thành cấp số nhân nên dãy số  $(d_n)$  không phải là cấp số cộng và cũng không là cấp số nhân.

Chon đáp án (B).....

**CÂU 7.** Biết rằng tồn tại hai giá trị  $m_1$  và  $m_2$  để phương trình

$$2x^{3} + 2(m^{2} + 2m - 1)x^{2} - 7(m^{2} + 2m - 2)x - 54 = 0$$

có ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị của biểu thức  $P=m_1^3+m_2^3$ .  $\bigcirc P=56.$   $\bigcirc P=-8.$   $\bigcirc P=-56.$ 

$$\bigcirc P = 56$$

$$\bigcirc P = 8.$$

$$P = -8.$$

$$\bigcirc P = -56$$

🗭 Lời giải.

Theo định lý Vi-ét, ta có  $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = -\frac{d}{a} = -\frac{-54}{2} = 27 \Leftrightarrow x_2^3 = 27 \Leftrightarrow x_2 = 3.$ 

Điều kiện cần để phương trình đã cho cố ba nghiệm phân biệt lập thành một cấp số nhân là x=3 phải là nghiệm của phương trình đã cho. Suy ra

$$m^2 + 2m - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} m = 2 \\ m = -4. \end{bmatrix}$$

Vì giả thiết cho biết tồn tại đúng hai giá trị của tham số m nên m=2 và m=-4 là các giá trị thỏa mãn. Vậy  $P = 2^3 + (-4)^3 = -56$ .

Chọn đáp án (D)......

 $\mathbf{CAU}$  8. Cho bốn số a, b, c, d biết rằng a, b, c theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q > 1; còn b, c, d theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng. Tìm q, biết rằng a+d=14 và b+c=12.

$$\mathbf{D}q = \frac{18 + \sqrt{73}}{24}$$

Giả sử a, b, c lập thành cấp số cộng công bội q. Khi đó theo giả thiết ta có

$$\begin{cases} b = aq, \ c = aq^2 \\ b + d = 2c \\ a + d = 14 \\ b + c = 12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} aq + d = 2aq^2 \\ a + d = 14 \\ a(q + q^2) = 12. \end{cases}$$
 (1)

 $\bigcirc$  Nếu  $q=0 \Rightarrow b=c=d=0$ . (Vô lí!)

 $\bigcirc$  Nếu  $q=-1 \Rightarrow b=-a; c=a \Rightarrow b+c=0.$  (Vô lí!)

Vậy  $q \neq 0, q \neq -1$ , từ (2) và (3) ta có d = 14 - a và  $a = \frac{12}{a + a^2}$ . Thay vào (1) ta được

$$\frac{12q}{q+q^2} + \frac{14q^2 + 14q - 12}{q+q^2} = \frac{24q^3}{q+q^2} \Leftrightarrow 12q^3 - 7q^2 - 13q + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow (q+1)\left(12q^2 - 19q + 6\right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} q = -1 & (\text{loại}) \\ q = \frac{19 + \sqrt{73}}{24} \\ q = \frac{19 - \sqrt{73}}{24}. \end{bmatrix}$$

Vì q > 1 nên  $q = \frac{19 + \sqrt{73}}{24}$ .

**CÂU 9.** Cho dãy số tăng a, b, c ( $c \in \mathbb{Z}$ ) theo thứ tự lập thành cấp số nhân; đồng thời a, b + 8, c theo thứ tự lập thành cấp 

$$\bigcirc P = 32.$$

$$\mathbf{B}P = \frac{92}{9}.$$

$$\bigcirc P = 64.$$

$$\mathbf{D}P = \frac{184}{9}$$

🗩 Lời giải.

Theo giả thiết, ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} ac = b^2 \\ a + c = 2(b+8) \\ a(c+64) = (b+8)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ac = b^2 \\ a - 2b = 16 - c \\ ac + 64a = (b+8)^2 \end{cases} . \tag{2}$$

Thay (1) vào (3) ta được  $b^2 + 64a = b^2 + 16b + 64 \Leftrightarrow 4a - b = 4$ . Kết hợp (2) với (4) ta được

$$\begin{cases} a - 2b = 16 - c \\ 4a - b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{c - 8}{7} \\ b = \frac{4c - 60}{7}. \end{cases}$$
 (5)

Thay (5) vào (1) ta được

$$7(c-8)c = (4c-60)^2 \Leftrightarrow 9c^2 - 424c + 3600 = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} c = 36 \\ c = \frac{100}{9} & \Leftrightarrow c = 36. \end{bmatrix}$$
 (Vì  $c \in \mathbb{Z}$ )

Với  $c = 36 \Rightarrow a = 4, b = 12 \Rightarrow P = 4 - 12 + 72 = 64.$ 

**CÂU 10.** Cho 3 số a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết cũng theo thứ tự đó chúng lần lượt là số thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng công sai là d,  $(d \neq 0)$ . Tính  $\frac{a}{d}$ 

 $\frac{4}{3}$ .

 $(c)^{\frac{4}{0}}$ .

 $(\mathbf{D})3.$ 

🗭 Lời giải.

Do a,b,c theo thứ tự lần lượt là số thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng công sai là  $d,(d\neq 0)$  nên  $\left\{\begin{array}{l} b=a+3d\\ c=a+7d\end{array}\right.$ Hơn nữa a, b, c theo thứ tự lập thành cấp số nhân với công bội khác 1 nên  $ac = b^2$ . Khi đó

$$a(a+7d) = (a+3d)^2 \Leftrightarrow a^2 + 7ad = a^2 + 6ad + 9d^2$$
  
$$\Leftrightarrow 9d^2 - ad = 0 \Leftrightarrow 9d = a \Leftrightarrow \frac{a}{d} = 9.$$

Vậy  $\frac{a}{d} = 9$ .

**CÂU 11.** Cho dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân với  $u_n \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$ . Dãy số nào sau đây không phải là cấp số nhân?  $(\mathbf{A})u_1 + 2; u_2 + 2; u_3 + 2; \dots$ **(B)** $3u_1; 3u_2; 3u_3; \ldots$ 

 $(\mathbf{D})u_1; u_3; u_5; \dots$ 

Giả sử  $(u_n)$  là một cấp số nhân với công bội q.

Ta có  $u_2 = u_1 q$ ,  $u_3 = u_1 q^2$ .

Dễ thấy 
$$\frac{u_2+2}{u_1+2} = \frac{u_1q+2}{u_1+2}$$
 và  $\frac{u_3+2}{u_2+2} = \frac{u_1q^2+2}{u_1q+2}$ .

Dễ thấy  $\frac{u_2+2}{u_1+2} = \frac{u_1q+2}{u_1+2}$  và  $\frac{u_3+2}{u_2+2} = \frac{u_1q^2+2}{u_1q+2}$ . Do  $\frac{u_2+2}{u_1+2} \neq \frac{u_3+2}{u_2+2} \Rightarrow$  dãy số  $u_1+2$ ;  $u_2+2$ ;  $u_3+2$ ; ... không phải là cấp số nhân.

**CÂU 12.** Xác định x để 3 số x-2; x+1; 3-x theo thứ tự lập thành một cấp số nhân

 $(\mathbf{B})$ Không có giá trị nào của x.

$$(c)x = -3.$$

 $(\mathbf{D})x = 2.$ 

### Dòi giải.

Ba số x-2; x+1; 3-x theo thứ tự lập thành một cấp số nhân

 $\Leftrightarrow (x-2)(3-x) = (x+1)^2 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x + 7 = 0$  (Phương trình vô nghiệm).

Chọn đáp án  $\bigcirc{B}$ .

**CÂU 13.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát  $u_n$  sau, dãy số nào là một cấp số nhân?

$$\mathbf{B})u_n = \frac{7}{3n}.$$

$$\mathbf{C}u_n = 7 - 3^n.$$

$$\mathbf{D}u_n = 7 - 3n.$$

### Dòi giải.

Từ các đáp án trên, với dãy  $(u_n)$  cho bởi  $u_n = 7 \cdot 3^n$  là một cấp số nhân, vì

$$T = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{7 \cdot 3^{n+1}}{7 \cdot 3^n} = 3 \text{ (không đổi)}.$$

CÁU 14. Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp số cộng với công sai khác 0 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q. Tìm q.

**B** 
$$q = -\frac{3}{2}$$
.

$$\bigcirc q = \frac{3}{2}.$$

$$\bigcirc q = 2$$

### Dòi giải.

Giả sử ba số hạng a; b; c lập thành cấp số cộng thỏa mãn yêu cầu, khi đó b; a; c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân công bội  $q \neq 1$ . Ta có

$$\begin{cases} a+c=2b \\ a=bq; c=bq^2 \end{cases} \Rightarrow bq+bq^2=2b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} b=0 \\ q^2+q-2=0. \end{cases}$$

 $\Theta$  Nếu  $b = 0 \Rightarrow a = b = c = 0$  nên a; b; c là cấp số cộng công sai d = 0. (Vô lí!)

 $\bigcirc$  Nếu  $q^2+q-2=0$  thì q=1 hoặc q=-2. Dễ thấy trường hợp q=1 là không thỏa mãn, vì khi đó a=b=c. Do đó q=-2.

Chọn đáp án (A)......

**CÂU 15.** Ba số x, y, z lập thành một cấp số cộng và có tổng bằng 21. Nếu lần lượt thêm các số 2, 3, 9 vào ba số đó (theo thứ tự của cấp số cộng) thì được ba số lập thành một cấp số nhân. Tính  $F = x^2 + y^2 + z^2$ .

**A** 
$$F = 389$$
 hoặc  $F = 395$ .

**B** 
$$F = 395$$
 hoặc  $F = 179$ . **C**  $F = 441$  hoặc  $F = 357$ . **D**  $F = 389$  hoặc  $F = 179$ .

$$\bigcirc F = 441 \text{ hoặc } F = 357$$

$$(\mathbf{D})F = 389 \text{ hoặc } F = 179$$

#### 🗩 Lời giải.

Theo tính chất của cấp số cộng, ta có x + z = 2y.

Kết hợp với giả thiết x + y + z = 21, ta suy ra  $3y = 21 \Leftrightarrow y = 7$ .

Gọi d là công sai của cấp số cộng thì x = y - d = 7 - d và z = y + d = 7 + d.

Sau khi thêm các số 2, 3, 9 vào ba số x, y, z ta được ba số là x+2, y+3, z+9 hay 9-d, 10, 16+d.

Theo tính chất của cấp số nhân, ta có  $(9-d)(16+d)=10^2 \Leftrightarrow d^2+7d-44=0.$ 

Giải phương trình ta được d = -11 hoặc d = 4.

Với d = -11, cấp số cộng 18, 7, -4. Lúc này F = 389.

Với d=4, cấp số cộng 3, 7, 11. Lúc này F=179.

Chọn đáp án (D).....

# Dang 5. Tính tổng của cấp số nhân

Phương pháp

- $\bigcirc$  Xác định số hạng đầu  $u_1$ , công bội q.
- ❷ Áp dụng công thức tính tổng các số hạng của cấp số nhân.

# 1. Ví du mẫu

**VÍ DỤ 1 (NB).** Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân  $(u_n)$ , biết  $u_1 = -3$  và công bội q = -2. Lời giải.

Ta có: 
$$S_{10} = \frac{u_1 \left(1 - q^{10}\right)}{1 - q} = 1023.$$

**VÍ DU 2 (TH).** Tính tổng 8 số hạng đầu tiên của cấp số nhân  $(u_n)$ , biết  $u_1 = 3$  và  $u_2 = 6$ . Dòi aiải.

Ta có: 
$$u_2 = u_1.q \Leftrightarrow 6 = 3.q \Leftrightarrow q = 2$$
  
 $S_8 = u_1 \frac{1 - q^8}{1 - q} = 3. \frac{1 - 2^8}{1 - 2} = 765.$ 

**VÍ DỤ 3 (TH).** Tính tổng vô hạn 
$$S=1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+...+\frac{1}{2^n}+...$$
 **P Lời giải.**

Đây là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn, với  $u_1 = 1, q = \frac{1}{2}$ . Khi đó

$$S = \frac{u_1}{1 - q} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2.$$

**VÍ DỤ 4 (VD).** Tính tổng 200 số hạng đầu tiên của dãy số 
$$(u_n)$$
 biết  $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n \end{cases}$ .

# Dòi giải.

Dễ thấy dãy đã cho là một cấp số nhân với công bội  $q=3; u_1=1.$ Từ đó  $S_{200}=u_1\frac{q^{200}-1}{q-1}=\frac{3^{200}-1}{2}.$ 

Từ đó 
$$S_{200} = u_1 \frac{q^{200} - 1}{q - 1} = \frac{3^{200} - 1}{2}.$$

**VÍ DỤ 5 (VD).** Một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 3$ , công bội q = 2. Biết  $S_n = 765$ , tìm n. Lời giải.

Áp dụng công thức tính tổng của cấp số nhân ta có  $S_n = \frac{u_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{3\cdot(1-2^n)}{1-2} = 765 \Leftrightarrow n=8.$ 

# 2. Bài tấp tư luân

**BÀI 1.** Một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 3$  và công bội q = 2. Tính tổng 8 số hạng đầu của cấp số nhân. 🗩 Lời giải.

Ta có 
$$S_8 = \frac{u_1(1-q^8)}{1-q} = \frac{3(1-2^8)}{1-2} = 765.$$

**BÀI 2.** Một cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 1$  và công bội q = 3. Tính  $S_{10}$ .

Ta có 
$$S_{10} = \frac{u_1 \left(1 - q^{10}\right)}{1 - q} = 1.\frac{1 - 3^{10}}{1 - 3} = 29524.$$

**BÀI 3.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 4$  và công bội q = 2. Tính  $S_{20}$ . 🗩 Lời giải.

Ta có 
$$S_{20} = \frac{u_1 (1 - q^{20})}{1 - q} = 4194300.$$

**BÀI 4.** Tính tổng  $S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$ 

## Dèi giải.

Đây là tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn với  $u_1 = 1, q = \frac{1}{2}$ 

Suy ra 
$$S = \frac{u_1}{1 - q} = \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{3}{2}.$$

**BÁI 5.** Cho cấp số nhân có  $q=-3, S_6=730$ . Tính  $u_1$ .

$$S_6 = u_1 \cdot \frac{1 - q^6}{1 - q} \Rightarrow u_1 = S_6 \cdot \frac{1 - q}{1 - q^6} = 730 \cdot \frac{1 - (-3)}{1 - (-3)^6} = 4.$$

**BÁI 6.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -5$ ,  $u_2 = 10$ . Tính tổng của 15 số hạng đầu của cấp số nhân đó. Lời giải.

Công bội của cấp số nhân đã cho là:  $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{10}{-5} = -2$ .

Tổng của 15 số hạng đầu của cấp số nhân đó là  $S_{15} = -5 \cdot \frac{1 - (-2)^{15}}{1 - (-2)} = -54615.$ 

**BÀI 7.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = 2$ ,  $u_2 = -2$ . Tính tổng của 9 số hạng đầu của cấp số nhân đó.

Lời giải.

Công bội của cấp số nhân đã cho là:  $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{-2}{2} = -1$ .

Tổng của 9 số hạng đầu của cấp số nhân đó là:  $S_9 = 2 \cdot \frac{1 - (-1)^9}{1 - (-1)} = 2$ .

**BÀI 8.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_3 = 8$ ,  $u_5 = 32$  và công bội q > 0. Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân.

$$\begin{cases} u_3 = 8 \\ u_5 = 32 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q^2 = 8 \\ u_1 \cdot q^4 = 32 \end{cases} \Rightarrow q^2 = \frac{32}{8} = 4 \Rightarrow q = 2, u_1 = 2$$
$$\Rightarrow S_{10} = u_1 \cdot \frac{1 - q^{10}}{1 - q} = 2 \cdot \frac{2 - 2^{10}}{1 - 2} = 2046.$$

**BÀI 9.** Tính tổng S = 2 + 6 + 18 + ... + 13122.

P Lời giải.

Xét cấp số nhân có 
$$u_1 = 2, q = 3$$
. Khi đó  $13122 = u_1.q^{n-1} \Leftrightarrow 13122 = 2.3^{n-1} \Leftrightarrow n = 9$   
Vậy  $S = S_9 = u_1 \frac{1-q^9}{1-q} = 2.\frac{1-3^9}{1-3} = 19682$ 

**BÀI 10.** Tính tổng  $S = 1 + 2 + 4 + 8 + \cdots + 1024$ .

Dèi giải.

Xét cấp số nhân có  $u_1 = 1, q = 2$ . Khi đó  $1024 = u_1.q^{n-1} \Leftrightarrow 1024 = 1.2^{n-1} \Leftrightarrow n = 11$ . Vậy  $S = S_{11} = u_1 \frac{1 - q^{11}}{1 - q} = 1 \cdot \frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2047$ .

Vậy 
$$S = S_{11} = u_1 \frac{1 - q^{11}}{1 - q} = 1.\frac{1 - 2^{11}}{1 - 2} = 2047$$

**BÀI 11.** Một cấp số nhân có  $u_1 = 1, q = 3$ , biết  $S_n = 3280$ . Tìm n.

$$S_n = u_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 \cdot \frac{1 - 3^n}{1 - 3} = 3280 \Rightarrow n = 8.$$

**BÀI 12.** Một cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_4 + u_6 = -540, u_3 + u_5 = 180$ . Tính  $S_5$ .

$$\begin{cases} u_4 + u_6 = -540 \\ u_3 + u_5 = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 \cdot q^3 + u_1 \cdot q^5 = -540 \\ u_1 \cdot q^2 + u_1 \cdot q^4 = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 q^3 (1 + q^2) = -540 \\ u_1 q^2 (1 + q^2) = 180 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2 \\ q = -3 \end{cases}$$

$$\text{Vây } S_5 = u_1 \frac{1 - q^5}{1 - q} = 2 \cdot \frac{1 - (-3)^5}{1 + 3} = 122.$$

**BÁI 13.** Bốn số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, trong đó số hạng thứ hai nhỏ hơn số hạng thứ nhất 35, còn số hạng thứ ba lớn hơn số hạng thứ tư 560. Tìm tổng của bốn số hạng trên, biết công bội mang giá trị dương.

🗭 Lời giải.

Theo đề ta có 
$$\begin{cases} u_1 - u_2 = 35 \\ u_3 - u_4 = 560 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - u_1 q = 35 \\ u_1 q^2 - u_1 q^3 = 560 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 (1 - q) = 35 \quad (1) \\ u_1 q^2 (1 - q) = 560 \quad (2) \end{cases}$$

Thay (1) vào (2) ta được  $q^2 = 16 \Leftrightarrow q$ 

Với q=4 thay vào (1) ta được  $u_1=-\frac{35}{3}$ .

$$S_4 = u_1 \cdot \frac{1 - q^4}{1 - q} = -\frac{2975}{3}.$$

**BÀI 14.** Tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn bằng  $\frac{1}{4}$ , tổng ba số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó bằng  $\frac{7}{27}$ . Tổng của số hạng đầu và công bội của cấp số nhân đó bằng Lời giải.

Gọi  $u_1$  và q với (|q| < 1) lần lượt là số hạng đầu và cộng bội của cấp số nhân lùi vô hạn. Theo giả thiết, ta có

$$\begin{cases} \frac{u_1}{q-1} = \frac{1}{4} \\ u_1 + u_1 q + u_1 q^2 = \frac{7}{27} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{u_1}{q-1} = \frac{1}{4} \\ u_1(1-q^3) = \frac{7}{27}(1-q) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{u_1}{1-q} = \frac{1}{4} \\ q^3 = -\frac{1}{27} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{1}{3} \\ q = -\frac{1}{3}. \end{cases}$$

 $V_{ay} u_1 + q = 0.$ 

BÁI 15. Một du khách vào trường đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20.000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi số tiền lần đặt trước. Người đó thua 10 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 11. Hỏi du khách trên thắng hay thua bao nhiêu tiền? Lời giải.

Số tiền du khách đặt trong mỗi lần (kể từ lần đầu) là một cấp số nhân có  $u_1 = 20.000$  và công bội q = 2. Du khách thua trong 10 lần liên tiếp đầu tiên nên tổng số tiền thua là

$$S_{10} = \frac{u_1(1 - q^{10})}{1 - q} = \frac{20000(1 - 2^{10})}{1 - 2} = 20000(2^{10} - 1)(\mathring{\text{d}}\text{ong}).$$

Số tiền du khách thắng trong lần thứ 11 là  $u_{11} = u_1 q^{10} = 20000.2^{10}$  (đồng). Ta có  $u_{11} - S_{10} = 20000 > 0$ . Vậy du khách thắng 20000 đồng.

# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Cho cấp số nhân  $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n$  với công bội  $q \ (q \neq 0, q \neq 1)$ . Đặt

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n.$$

Ta có 
$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{u_1 (q^n - 1)}{q - 1}$$

$$)\frac{93}{4}$$
.

$$\bigcirc \frac{633}{4}.$$

$$\bigcirc \frac{93}{2}$$
.

🗩 Lời giải.

Gọi  $S_5$  là tổng 5 số hạng đầu của cấp số nhân đã cho. Khi đó ta có

$$S_5 = u_1 \cdot \frac{1 - q^5}{1 - q} = 12 \cdot \frac{1 - \left(\frac{3}{2}\right)^5}{1 - \frac{3}{2}} = \frac{633}{4}.$$

Chọn đáp án  $\bigcirc$ 

**CÂU 3.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có số hạng đầu  $u_1 = 3$ , công bội q = -2. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân

(A) - 1023.

(**B**)1023.

(C)513.

 $(\mathbf{D}) - 513.$ 

Dòi giải.

Tổng của 10 số hạng đầu bằng

$$S_{10} = u_1 \cdot \frac{q^{10} - 1}{q - 1} = 3 \cdot \frac{(-2)^{10} - 1}{-2 - 1} = -1023.$$

Chọn đáp án (A).....

Ta có  $u_5 = u_2 \cdot q^3 \Leftrightarrow q^3 = \frac{u_5}{u_2} = \frac{54}{-2} = -27 = (-3)^3 \Rightarrow q = -3 \text{ và } u_1 = \frac{u_2}{q} = \frac{2}{3}.$ Suy ra  $S_{1000} = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1 - (-3)^{1000}}{1 + 3} = \frac{1 - 3^{1000}}{6}.$ 

CẦU 5. Tính tổng tất cả các số hạng của một cấp số nhân, biết số hạng đầu bằng 18, số hạng thứ hai bằng 54 và số hạng cuối bằng 39366.

(A) 19674.

(**B**)59040.

(C)177138.

(**D**) 6552.

### Dòi giải.

 $u_1 = 18, u_2 = 54 \Rightarrow q = 3.$ 

 $u_n = 39366 \Leftrightarrow u_1 \cdot q^{n-1} = 39366 \Leftrightarrow 18 \cdot 3^{n-1} = 39366 \Leftrightarrow 3^{n-1} = 3^7 \Leftrightarrow n = 8.$ 

Vây  $S_8 = 18 \cdot \frac{1 - 3^8}{1 - 3} = 59040.$ 

Chọn đáp án (B).....

$$\mathbf{A}S = \frac{1023}{2048}$$

$$\mathbf{B}S = \frac{5}{2}.$$

$$\bigcirc \frac{1023}{512}.$$

$$\bigcirc S = 2$$

### 🗭 Lời giải.

Ta có các số hạng của dãy số  $(u_n)$  là  $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \dots, \frac{1}{2^n}$ . Khi đó  $(u_n)$  lập thành một cấp số nhân có  $u_1 = 1$  và công bội  $q = \frac{1}{2}$ .

Suy ra  $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{10} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^9} = \frac{1 \cdot \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}\right]}{1} = \frac{1023}{512}.$ 

**CÂU 7.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -6$  và q = -2. Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho bằng 2046. Tìm

**B**
$$n = 12$$
.

$$n = 11.$$

$$(\mathbf{D})n = 10.$$

🗩 Lời giải.

Ta có  $2046 = S_n = u_1 \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = -6 \cdot \frac{1 - (-2)^n}{1 - (-2)} = 2((-2)^n - 1) \Rightarrow (-2)^n = 1024 \Leftrightarrow n = 10.$ 

**CÂU 8.** Tổng 100 số hạng đầu của dãy số  $(u_n)$  với  $u_n = 2n - 1$  là

$$\mathbf{B}$$
  $2^{100} - 1$ .

🗩 Lời giải.

Ta có  $(u_n)$  là cấp số cộng công sai d=2 và  $u_1=1$ .

Do đó  $S_n = n \cdot u_1 + \frac{n(n-1)}{2} \cdot d = 100 \cdot 1 + \frac{100 \cdot 99}{2} \cdot 2 = 10000.$ 

Chọn đáp án  $\bigcirc$  ......

$$\mathbf{B}S_{2019} = \frac{4039}{2}.$$

$$\mathbf{C}S_{2019} = \frac{6057}{2}.$$

$$\bigcirc S_{2019} = 2020 - \frac{1}{22019}$$

Dèi giải.

Ta có

$$S_{2019} = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_{2019}$$

$$= \left(\frac{1}{2} + 1\right) + \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1\right] + \left[\left(\frac{1}{2}\right)^3 + 1\right] + \dots + \left[\left(\frac{1}{2}\right)^{2019} + 1\right]$$

$$= 2019 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \dots + \left(\frac{1}{2}\right)^{2019}$$

$$= 2019 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{2019}}{1 - \frac{1}{2}} = 2019 + 1 - \frac{1}{2^{2019}}$$

$$= 2020 - \frac{1}{2^{2019}}.$$

**CÂU 10.** Cho  $S = 11 + 101 + 1001 + \cdots + 1000 \dots 01$ . Khẳng định nào sau đây là đúng?

🗩 Lời giải.

Ta có

$$S = (10+1) + (10^{2}+1) + (10^{3}+1) + \dots + (10^{n}+1)$$

$$= (10+10^{2}+10^{3}+\dots+10^{n}) + \underbrace{1+1+1+\dots+1}_{n \text{ số } 1}$$

$$= 10\left(\frac{10^{n}-1}{9}\right) + n.$$

Chọn đáp án  $\bigcirc$ .....

**CÂU 11.** Gọi  $S=1+11+111+\cdots+\underbrace{111\ldots 1}_{(n\text{ số }1)}$  thì S nhận giá trị nào sau đây?

$$\boxed{ \pmb{\mathbb{A}} } \, S = \frac{1}{9} \left[ 10 \left( \frac{10^n - 1}{9} \right) - n \right].$$

$$\mathbf{B}S = \frac{10^n - 1}{81}.$$

$$\mathbf{C}S = 10\left(\frac{10^n - 1}{81}\right) - n.$$

🗭 Lời giải.

Ta có 
$$S = \frac{1}{9}(9 + 99 + 999 + \dots + \underbrace{99\dots9}_{n \text{ số } 9}) = \frac{1}{9} \cdot \left[10 \cdot \frac{1 - 10^n}{1 - 10} - n\right].$$

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 12.** Cho dãy số  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_1 = 1 \\ u_n = 2u_{n-1} + 1, n \ge 2 \end{cases}$ . Tổng  $S = u_1 + u_2 + \dots + u_{20}$  là  $(\mathbf{B}) 2^{21} - 20$ .  $(\mathbf{C}) 2^{20}$ .

$$\bigcirc$$
 2<sup>21</sup> – 20.

$$(\mathbf{B})2^{21} - 22.$$

$$(\mathbf{C})2^{20}$$
.

$$(\mathbf{D})2^{20} - 20.$$

🗩 Lời giải.

Dự đoán công thức số hạng tổng quát  $u_n = 2^n - 1$  (Chứng minh bằng phương pháp quy nạp TH).  $S = 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{20} - 20 = 2 \cdot \frac{1 - 2^{20}}{1 - 2} - 20 = 2^{21} - 22.$ 

$$S = 2^{1} + 2^{2} + \dots + 2^{20} - 20 = 2 \cdot \frac{1 - 2^{20}}{1 - 2} - 20 = 2^{21} - 22$$

Chọn đáp án (B).....

**CÂU 13.** Biết rằng  $S = 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \dots + 11 \cdot 3^{10} = a + \frac{21 \cdot 3^b}{4}$ . Tính  $P = a + \frac{b}{4}$ .

$$\bigcirc P = 3.$$

$$\bigcirc P = 4.$$

$$\mathbf{C}^{4}P = 1.$$

$$\bigcirc P = 2.$$

🗩 Lời giải.

Từ giả thiết suy ra  $3S = 3 + 2 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3^3 + \dots + 11 \cdot 3^{11}$ . Do đó

$$-2S = S - 3S = 1 + 3 + 3^{2} + \dots + 3^{10} - 10 \cdot 3^{11}$$
$$= \frac{1 - 3^{11}}{1 - 3} - 11 \cdot 3^{11} = -\frac{1}{2} - \frac{21 \cdot 3^{11}}{2} \Rightarrow S = \frac{1}{4} + \frac{21}{4} \cdot 3^{11}.$$

$$\text{Vì } S = \frac{1}{4} + \frac{21 \cdot 3^{11}}{4} = a + \frac{21 \cdot 3^b}{4} \Rightarrow a = \frac{1}{4}, \ b = 11 \Rightarrow P = \frac{1}{4} + \frac{11}{4} = 3.$$

# Dạng 6. Kết hợp cấp số cộng và cấp số nhân

Nhắc lại tính chất CSC, CSN

- $\odot$  3 số a, b, c theo thứ tự lập thành CSC thì a + c = 2b.
- $\odot$  3 số a, b, c theo thứ tự lập thành CSN thì  $a.c = b^2$ .

# 1. Ví du mẫu

**VÍ DU 1 (TH).** Ba số x, y, z theo thứ tự đó lập thành một CSN với công bội  $q(q \neq 1)$ , đồng thời các số x, 2y, 3z theo thứ tự đó lập thành một CSC với công sai d. Hãy tìm q?

Lời giái.

Ta có 
$$x + 3z = 2.2y \Leftrightarrow x + 3xq^2 = 2.2xq \Leftrightarrow 1 + 3q^2 = 4q \Leftrightarrow \begin{bmatrix} q = \frac{1}{3} \\ q = 1(L) \end{bmatrix}$$

**VÍ DỤ 2 (TH).** Biết rằng a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một CSC và a, c, b là ba số hạng liên tiếp của một CSN, đồng thời a + b + c = 30. Tìm a, b, c.

#### 🗩 Lời giải.

Theo đề ta có 
$$\begin{cases} a + c = 2b & (1) \\ ab = c^2 & (2) \\ a + b + c = 30 & (3) \end{cases}$$

Từ (1) và (3) ta được 
$$3b=30\Leftrightarrow b=10$$
 Thay  $b=10$  vào (1), (2) ta được 
$$\begin{cases} a+c=20\\ 10a=c^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} c=10, a=10 \ (L)\\ c=-20, a=40(N) \end{cases}$$

**VÌ DỤ 3 (VD).** Ba số x, y, z theo thứ tự đó lập thành một CSN. Ba số x, y - 4, z theo thứ tự đó lập thành CSN. Đồng thời các số x, y - 4, z - 9 theo thứ tự đó lập thành CSC. Tìm x, y, z.

### Lời giái.

Theo đề ta có 
$$\begin{cases} xz = y^2 & (1) \\ xz = (y-4)^2 & (2) \\ x + (z-9) = 2(y-4) & (3) \end{cases}$$

Từ (1) và (2) ta có 
$$y^2 = (y - 4)^2 \Leftrightarrow y = 2$$

Theo đề ta có 
$$\begin{cases} xz = y^2 & (1) \\ xz = (y-4)^2 & (2) \\ x + (z-9) = 2(y-4) & (3) \end{cases}$$
 Từ (1) và (2) ta có  $y^2 = (y-4)^2 \Leftrightarrow y = 2$  Thế  $y = 2$  vào (1) và (3) ta được 
$$\begin{cases} xz = 4 \\ x + z = 5 \end{cases} \Rightarrow x = 4, z = 1 \text{ hoặc } x = 1, z = 4$$

Vậy có 2 bộ (x, y, z) thỏa yêu cầu bài toán là (1, 2, 4) và (4, 2, 1)

**VÍ DU 4 (VD).** Cho a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một CSN và a, b, c - 4 là ba số hạng liên tiếp của một CSC, đồng thời a,b-1,c-5 là ba số hạng liên tiếp của một CSN. Tìm a,b,c biết a,b,c là các số nguyên.

#### **p** Lời giải.

Theo đề ta có 
$$\begin{cases} ac = b^2 & (1) \\ a + c - 4 = 2b & (2) \\ a(c - 5) = (b - 1)^2 & (3) \end{cases}$$
Thay (1) vào (3):  $b^2 - 5a = b^2 - 2b + 1 \Leftrightarrow b = \frac{5a + 1}{2}$ 

Thay (1) vào (3): 
$$b^2 - 5a = b^2 - 2b + 1 \Leftrightarrow b = \frac{5a+1}{2}$$

Thay vào (2) ta được  $a+c-4=5a+1 \Leftrightarrow c=4a+5$ 

Thế 
$$b,c$$
 theo  $a$  vào (1) ta được  $9a^2-10a+1=0 \Leftrightarrow a=1 \lor a=\frac{1}{9}(L)$  Vậy  $a=1,b=3,c=9$ 

**VÍ DU 5 (VDC).** Cho 4 số nguyên dương, trong đó 3 số đầu lập thành một CSC, 3 số hạng sau thành lập CSN. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối là 37, tổng của hai số hạng giữa là 36. Tìm tổng 4 số đó

#### Lời giải.

Gọi 4 số cần tìm lần lượt là a, b, c, d

a, b, c là 3 số hạng liên tiếp của CSC. Ta có a + c = 2b (1)

$$b,c,d$$
 là 3 số hạng liên tiếp của CSN. Ta có  $bd=c^2$  (2) Theo giả thuyết ta có 
$$\begin{cases} a+d=37 \ (3) \\ b+c=36 \ (4) \end{cases}$$

Từ (4) 
$$\Rightarrow b = 36 - c$$
 thay vào (1) ta được  $a = 72 - 3c$ , thay  $a$  vào (3) ta được  $d = -35 + 3c$ 

Thế 
$$b, d$$
 vào (2) ta được  $(36-c)(-35+3c) = c^2 \Rightarrow c = 20 \lor c = \frac{63}{4}(L)$ 

Vậy 
$$c = 20, a = 12, b = 16, d = 95 \Rightarrow S = a + b + c + d = 143$$

# 2. Bài tấp tư luân

**BÁI 1.** Biết x, y, x + 4 theo thứ tự lập thành cấp số cộng và x + 1, y + 1, 2y + 2 theo thứ tự lập thành cấp số nhân với x, ylà số thực dương. Tính x + y.

#### Dòi giải.

Theo giả thiết ta có:

Theo gia timet to co.
$$\begin{cases} x + (x+4) = 2y \\ (x+1)(2y+2) = (y+1)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x+2 \\ (x+1)(2x+6) = (x+3)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \Rightarrow y = 3 \\ x = -3 \Rightarrow y = -1 \end{cases}$$
Do đó  $x + y = 4$ .

**BÁI 2.** Cho 3 số a, b, c theo thứ tự tạo thành một cấp số nhân với công bội khác 1. Biết cũng theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng với công sai  $d \neq 0$ . Tính  $\frac{a}{d}$ 

### 🗩 Lời giải.

a,b,c lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư, thứ tám của một CSC với công sai d

ta có 
$$\begin{cases} b = a + 3d \\ c = a + 7d \end{cases}$$

Mặt khác a, b, c là 3 số hạng liên tiếp của CSN nên

$$a.c = b^2 \Leftrightarrow a(a+7d) = (a+3d)^2 \Leftrightarrow a^2 + 7ad = a^2 + 6ad + 9d^2 \Leftrightarrow 9d^2 = ad \Leftrightarrow \frac{a}{d} = 9.$$

**BAI 3.** Tìm tích các số dương a và b sao cho a, a + 2b, 2a + b lập thành một cấp số cộng và  $(b+1)^2, ab + 5, (a+1)^2$  lập thành một cấp số nhân.

### Lời giải.

Theo tính chất CSC ta có a + (2a + b) = 2(a + 2b) (1)

Theo tính chất CSN ta có  $(b+1)^2 \cdot (a+1)^2 = (ab+5)^2$  (2)

Từ (1) ta được a = 3b, thay vào (2) ta được  $(b+1)^2(3b+1)^2 = (3b^2+5)^2$ 

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} (b+1)(3b+1) = (3b^2+5) \\ (b+1)(3b+1) = -(3b^2+5) \text{ (V\^{o} nghiệm)} \end{cases} \Leftrightarrow b=1, a=3 \Rightarrow ab=3.$$

**BAI 4.** a, b, c  $(a \neq b \neq c)$  là ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng và b, c, a là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, đồng thời a.b.c = 125. Tìm a, b, c.

### 🗩 Lời giải.

a, b, c là ba số hạng liên tiếp của cấp số cộng, nên có a + c = 2b.

b, c, a là ba số hạng liên tiếp của một cấp số nhân, nên có  $b.a = c^2$ .

Ta có hệ 
$$\begin{cases} a + c = 2b & (1) \\ b.a = c^2 & (2) \\ a.b.c = 125 & (3) \end{cases}$$

Thay (2) vào (3) ta được  $c^3 = 125 \Rightarrow c = 5$ 

Thay 
$$c=5$$
 vào (1), (2) ta được hệ 
$$\begin{cases} a+5=2b \\ ab=25 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=2b-5 \\ 2b^2-5b-25=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} b=5\Rightarrow a=5 \\ b=-\frac{5}{2}\Rightarrow a=-10 \end{cases}$$

Vậy 
$$a = -10, b = -\frac{5}{2}, c = 5.$$

BÁI 5. Một cấp số cộng và một cấp số nhân đều là các dãy tăng các số hạng thứ nhất của hai dãy số đều bằng 3, các số hạng thứ hai bằng nhau. Tỉ số giữa các số hạng thứ ba của CSN và CSC là  $\frac{9}{5}$ . Tìm tích ba số hạng của cấp số cộng thỏa mãn tính chất trên.

#### 🗩 Lời giải.

Gọi  $u_1, u_2, u_3$  là 3 số hạng liên tiếp của CSC.

Gọi  $a_1, a_2, a_3$  là 3 số hạng liên tiếp của CSN

Theo đề ta có hệ 
$$\begin{cases} u_1 = a_1 = 3 \\ u_2 = a_2 \\ a_3 = \frac{9}{5}u_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = a_1 = 3 \\ 3 + d = 3q \\ 5(3q^2) = 9(3 + 2d) \end{cases} \Rightarrow q = 3 \lor q = \frac{3}{5}$$

Chon q=3 vì dãy tăng, khi đó d=6.

Vậy 3 số hạng của cấp số cộng là 3; 9;  $15 \Rightarrow 3 \cdot 9 \cdot 15 = 405$ 

BÀI 6. Một CSC và CSN đều có số hạng đầu tiên là bằng 5, số hạng thứ hai của CSC lớn hơn số hạng thứ hai của CSN là 10, còn các số hạng thứ 3 của hai cấp số thì bằng nhau. Tìm tổng các số hạng của cấp số cộng biết công bội của cấp số nhân không âm.

#### Dèi giải.

Gọi  $u_1, u_2, u_3$  là 3 số hạng liên tiếp của CSC với công sai d.

Gọi  $a_1, a_2, a_3$  là 3 số hạng liên tiếp của CSN với công bội q.

Theo đề bài ta có: 
$$\begin{cases} u_1 = a_1 = 5 \\ u_2 - a_2 = 10 \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = a_1 = 5 \\ u_1 + d - a_1 q = 10 \Leftrightarrow \\ u_1 + 2d = a_1 q^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = a_1 = 5 \\ d = 5 + 5q \Rightarrow q = 3 \lor q = -1(L) \\ 5 + 2d = 5q^2 \end{cases}$$

BAI 7. Ba số khác nhau có tổng bằng 114 có thể coi là ba số hạng liên tiếp của một CSN, hoặc coi là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ hai mươi lăm của một CSC. Tìm ba số đó.

#### 🗩 Lời giải.

Gọi  $u_1, u_2, u_3$  là 3 số hạng liên tiếp của CSN với công bội q.

Theo đề  $u_1 = a_1, u_2 = a_4, u_3 = a_{25}$  với  $a_1, a_4, a_{25}$  là 3 số hạng của CSC với công sai d.

Ta có 
$$\begin{cases} a_4 = a_1 + 3d \\ a_{25} = a_1 + 24d \end{cases} \Rightarrow 8a_4 - a_{25} = 7a_1 \Leftrightarrow 8u_2 - u_3 = 7u_1 \Leftrightarrow 8u_1q - u_1q^2 = 7u_1 \Leftrightarrow q^2 - 8q + 7 = 0 \Leftrightarrow q = 1(L) \lor q = 7(N)$$

Theo đề ta cũng có  $u_1 + u_2 + u_3 = 114 \Leftrightarrow u_1 + u_1q + u_1q^2 = 114 \Rightarrow u_1 = 2$ Vậy 3 số cần tìm là 2; 14; 98.

BÀI 8. Ba số khác nhau có tổng là 217 có thể coi là các số hang liên tiếp của một CSN hoặc là các số hang thứ 2 thứ 9 và thứ 44 của một CSC. Tìm 3 số đó.

### Dòi giải.

Gọi  $u_1, u_2, u_3$  là 3 số hạng liên tiếp của CSN với công bội q.

Theo đề  $u_1=a_2, u_2=a_9, u_3=a_{44}$  với  $a_2, a_9, a_{44}$  là 3 số hạng của CSC với công sai d.

Ta có 
$$\begin{cases} a_9 = a_2 + 7d \\ a_{44} = a_2 + 42d \end{cases} \Rightarrow 6a_9 - a_{44} = 5a_2 \Leftrightarrow 6u_2 - u_3 = 5u_1 \Leftrightarrow 6u_1q - u_1q^2 = 5u_1 \\ \Leftrightarrow q^2 - 6q + 5 = 0 \Leftrightarrow q = 1(L) \lor q = 5(N) \end{cases}$$

Theo đề ta cũng có  $u_1+u_2+u_3=217\Leftrightarrow u_1+u_1q+u_1q^2=217\Rightarrow u_1=7$ 

Vậy 3 số cần tìm là 7; 35; 175.

**BÁI 9.** a, b, c là ba số hạng liên tiếp của một CSN và a, b+2, c+9 là ba số hạng liên tiếp của một CSC, đồng thời a, b+2, clà ba số hang liên tiếp của một CSN khác. Tìm a.

### Dòi giải.

Vì a, b, c là ba số hạng liên tiếp của CSN, ta có  $ac = b^2$  (1)

Vì a, b+2, c+9 là ba số hạng liên tiếp của CSC, ta có a+(c+9)=2(b+2) (2)

Vì a, b + 2, c là ba số hạng liên tiếp của CSN, ta có  $a.c = (b + 2)^2$  (3)

Thế (1) vào (3), ta được  $b^2 = (b+2)^2 \Leftrightarrow b = -1$ 

Thay 
$$b = -1$$
 vào (1), (2), ta được 
$$\begin{cases} ac = 1 \\ a + c = -7 \end{cases} \Leftrightarrow a = \frac{-7 + 3\sqrt{5}}{2} \lor a = \frac{-7 - 3\sqrt{5}}{2}$$

**BÀI 10.** Một CSC và CSN có cùng các số hạng thứ m+1, thứ n+1, thứ p+1 và 3 số hạng này là 3 số dương a,b,c. Tính  $T = a^{b-c}.b^{c-a}.c^{a-b}.$ 

### Dòi giải.

$$a = u_1 + md = q^m \cdot v_1$$

$$b = u_1 + nd = q^n \cdot v_1$$

$$c = u_1 + pd = q^p.v_1$$

Suy ra 
$$T = a^{b-c}.b^{c-a}.c^{a-b} = (q^m v_1)^{(n-p)d}.(q^n v_1)^{(p-m)d}.(q^p v_1)^{(m-n)d} = 1$$

**BÀI 11.** Tìm m dương để phương trình  $x^3 + (5-m)x^2 + (6-5m)x - 6m = 0$  (\*) có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số nhân.

#### Lời giải.

$$(*) \Leftrightarrow (x+2)(x^2+(3-m)x-3m) = 0 \Leftrightarrow x = -2 \lor x = -3 \lor x = m.$$

Để (\*) có 3 nghiệm phân biệt thì 
$$m \neq -3$$
 và  $m \neq -2$ .

Do 3 nghiệm này lập thành cấp số nhân, ta sắp xếp các nghiệm này theo thứ tự tăng dần được các dãy số sau

$$\odot$$
 -3; -2;  $m$  lập thành CSN  $\Leftrightarrow$  -3 $m = (-2)^2 \Leftrightarrow m = -\frac{4}{3}$ 

$$\bigcirc$$
 -3; m; -2 lập thành CSN  $\Leftrightarrow$  -3(-2) =  $m^2 \Leftrightarrow m = \pm \sqrt{6}$ 

$$\bigcirc m; -3; -2$$
 lập thành CSN  $\Leftrightarrow m(-2) = (-3)^2 \Leftrightarrow m = -\frac{9}{2}$ 

So với điều kiện thì  $m = \sqrt{6}$  thỏa yêu cầu bài toán.

**BÁI 12.** Tìm tham số m để phương trình  $x^3 - (2m+1)x^2 + 2mx = 0$  (\*) có 3 nghiệm phân biệt lập thành một cấp số cộng, biết m < 0.

#### Dèi giải.

$$(*) \Leftrightarrow x. (x^2 - (2m+1)x + 2m) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \lor x = 1 \lor x = 2m.$$

Để (\*) có 3 nghiệm phân biệt thì 
$$m \neq 0$$
 và  $m \neq \frac{1}{2}$ .

Do 3 nghiệm này lập thành cấp số cộng, ta sắp xếp các nghiệm này theo thứ tự tăng dần được các dãy số sau

$$\odot$$
 2m; 0; 1 lập thành CSC  $\Leftrightarrow$  2m + 1 = 2.0  $\Leftrightarrow$  m =  $-\frac{1}{2}$ 

$$\ensuremath{ \bigodot }$$
0; 2m; 1 lập thành CSC  $\Leftrightarrow 0+1=4m \Leftrightarrow m=\frac{1}{4}$ 

$$\odot$$
 0; 1; 2m lâp thành CSC  $\Leftrightarrow$  0 + 2m = 2.1  $\Leftrightarrow$  m = 1

Vậy 
$$m = -\frac{1}{2}$$
 là giá trị cần tìm.

# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

**CÂU 1.** Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng, đồng thời các số x - 1, y + 2, x - 3y theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Tính  $x^2 + y^2$ .

$$(\mathbf{A})x^2 + y^2 = 25.$$

**B**) 
$$x^2 + y^2 = 40$$
.

$$(\mathbf{C})x^2 + y^2 = 100.$$

$$\mathbf{D}$$
 $x^2 + y^2 = 10.$ 

# D Lời giải.

Theo bài ra, ta có

$$\begin{cases} (x+6y) + (8x+y) = 2(5x+2y) \\ (y+2)^2 = (x-1)(x-3y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 3y \\ (y+2)^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -6 \\ y = -2 \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 = 40.$$

Chọn đáp án (B)

**CÂU 2.** Cho hai số dương a và b không vượt quá 10 sao cho a-b; 2; b theo thứ tự tạo thành một cấp số cộng và a+b; 3a-2b; 5a theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính giá trị của S=a+b.

$$\bigcirc S = 8.$$

**B**
$$S = 20$$
.

$$\mathbf{C}S = 7.$$

$$\bigcirc S = 5.$$

### Dùi giải.

Vì a-b; 2; b theo thứ tự tạo thành một cấp số cộng nên  $2-(a-b)=b-2 \Leftrightarrow a=4$ .

Vì a + b; 3a - 2b; 5a theo thứ tự lập thành một cấp số nhân nên

$$\frac{3a-2b}{a+b} = \frac{5a}{3a-2b} \Leftrightarrow \frac{12-2b}{4+b} = \frac{20}{12-2b} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} b=1 \\ b=16 \text{ (loai)}. \end{bmatrix}$$

Vậy S = a + b = 4 + 1 = 5.

Chọn đáp án (D)

**CÂU 3.** Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp số cộng với công sai khác 0 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q. Tìm q.

$$\bigcirc q = 2.$$

$$\bigcirc$$
  $q = -2$ .

$$\bigcirc q = \frac{3}{2}.$$

$$\bigcirc q = -\frac{3}{2}.$$

### 🗩 Lời giải.

Giả sử ba số hạng a; b; c lập thành cấp số cộng thỏa yêu cầu, khi đó b; a; c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân công bội q.

$$\begin{cases} a+c=2b \\ a=bq; \ c=bq^2 \end{cases} \Rightarrow bq+bq^2=2b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} b=0 \\ q^2+q-2=0. \end{cases}$$

Nếu  $b=0 \Rightarrow a=b=c=0$  nên a;b;c là cấp số cộng công sai d=0 (vô lí).

Nếu  $q^2 + q - 2 = 0 \Leftrightarrow q = 1$  hoặc q = -2 Nếu  $q = 1 \Rightarrow a = b = c$  (vô lí), do đó q = -2.

Neu  $q + q - 2 = 0 \Leftrightarrow q = 1$  noạc q = -2 Neu  $q = 1 \Rightarrow a = b = c$  (vo n), do do q = -2. Chọn đáp án  $\bigcirc{B}$ ......

**CÂU 4.** Cho ba số a, b, c theo thứ tự tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết cũng theo thứ tự đó chúng lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng công sai là  $s \neq 0$ . Tính  $\frac{a}{c}$ .

$$\frac{4}{9}$$
.

$$\bigcirc \frac{4}{3}$$

#### D Lời giải.

Rõ ràng  $a \neq 0$ . Vì s là công sai cấp số cộng nên a, a + 3s, a + 7s lập thành cấp số nhân, do đó

$$a(a+7s) = (a+3s)^2 \Leftrightarrow 9s^2 - as = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} s = 0 & (\text{loai}) \\ a = 9s & \end{cases} \Leftrightarrow \frac{a}{s} = 9.$$

**CÂU 5.** Xét các số thực dương a, b sao cho -25, 2a, 3b là cấp số cộng và 2, a + 2, b - 3 là cấp số nhân. Khi đó  $a^2 + b^2 - 3ab$  bằng



**B**89.

**©** 31.

**D**59.

## 🗩 Lời giải.

-25, 2a, 3b là cấp số cộng  $\Leftrightarrow 2.2a = -25 + 3b \Leftrightarrow b = \frac{1}{3}(4a + 25)$ .

$$\begin{array}{ll} 2,a+2,b-3 \text{ là cấp số nhân} & \Leftrightarrow (a+2)^2=2(b-3) \\ & \Leftrightarrow (a+2)^2=2\left[\frac{1}{3}(4a+25)-3\right] \\ & \Leftrightarrow 3a^2+4a-20=0 \\ & \Leftrightarrow \begin{bmatrix} a=2 \\ a=-\frac{10}{3} \text{ (loại)}. \end{array}$$

Suy ra  $b = 11 \Rightarrow a^2 + b^2 - 3ab = 59$ .

Chon đáp án (D).....

**CÂU 6.** Cho ba số x; 5; 2y theo thứ tự lập thành cấp số cộng và ba số x; 4; 2y theo thứ tự lập thành cấp số nhân thì |x-2y|bằng

(**B**)8.

(**C**)9.

 $(\mathbf{D})6.$ 

### Lời giải.

Theo giả thiết ta có

- $\odot$  Do x; 5; 2y theo thứ tự lập thành một cấp số cộng nên ta có  $5 = \frac{x+2y}{2}$ (1).
- $\odot$  Do x; 4; 2y theo thứ tự lập thành một cấp số nhân nên ta có  $x \cdot 2y = 4^2$ (2).

Từ (1) và (2) ta có 
$$\begin{cases} x+2y=10 \\ x\cdot 2y=16 \end{cases} \Rightarrow \begin{bmatrix} x=2,2y=8 \\ x=8,2y=2 \end{cases} \Rightarrow |x-2y|=6.$$

**CÂU 7.** Cho dãy số tăng a, b, c ( $c \in \mathbb{Z}$ ) theo thứ tự lập thành cấp số nhân; đồng thời a, b + 8, c theo thứ tự lập thành cấp số cộng và a, b + 8, c + 64 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính giá trị biểu thức P = a - b + 2c.

$$P = \frac{184}{9}.$$

**B**
$$P = 64$$
.

$$\bigcirc P = \frac{92}{9}.$$

$$\bigcirc P = 32$$

D Lời giả

Ta có 
$$\begin{cases} ac = b^2 \\ a + c = 2(b+8) \\ a(c+64) = (b+8)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ac = b^2 \quad (1) \\ a - 2b = 16 - c \quad (2) \\ ac + 64a = (b+8)^2 \quad (3) \end{cases}$$
. Thay (1) vào (3) ta được:

$$b^{2} + 64a = b^{2} + 16b + 64 \Leftrightarrow 4a - b = 4.$$
 (4)

Kết hợp (2) với (4) ta được: 
$$\begin{cases} a - 2b = 16 - c \\ 4a - b = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{c - 8}{7} \\ b = \frac{4c - 60}{7}. \end{cases} (5)$$

Thay (5) vào (1) ta được:

$$7(c-8)c = (4c-60)^{2} \Leftrightarrow 9c^{2} - 424c + 3600 = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} c = 36 \\ c = \frac{100}{9} & \Leftrightarrow c = 36 \ (c \in \mathbb{Z}). \end{bmatrix}$$

Với  $c = 36 \Rightarrow a = 4, b = 12 \Rightarrow P = 4 - 12 + 72 = 64$ 

Chọn đáp án (B).....

**CÂU 8.** Cho bốn số a, b, c, d theo thứ tự đó tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1. Biết tổng ba số hạng đầu bằng  $\frac{140}{9}$ , đồng thời theo thứ tự đó a, b, c lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của một cấp số cộng. Tính giá trị của 

(A) 
$$T = -\frac{101}{100}$$

**B**
$$T = \frac{100}{27}$$

$$\mathbf{C}T = -\frac{100}{27}.$$

$$\mathbf{D}T = \frac{101}{27}.$$

# Lời giải

Gọi s  $(s \neq 0)$  là công sai của cấp số cộng. Vì a, b, c theo thứ tự lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ tư và thứ tám của cấp số cộng nên b = a + 3s và c = a + 7s.

Mặt khác, a, b, c theo thứ tự tạo thành cấp số nhân với công bội khác 1 nên

$$ac = b^2 \Leftrightarrow a(a+7s) = (a+3s)^2 \Leftrightarrow as = 9s^2 \Leftrightarrow a = 9s \text{ (vi } s \neq 0).$$

Suy ra b = 12s, c = 16s.

Theo giả thiết

$$a+b+c=\frac{148}{9}\Leftrightarrow 9s+12s+16s=\frac{148}{9}\Leftrightarrow 37s=\frac{148}{9}\Leftrightarrow s=\frac{4}{9}.$$

Suy ra a = 4,  $b = \frac{16}{3}$ ,  $c = \frac{64}{9}$ . Từ đó ta tính được  $d = 4 \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^3 = \frac{256}{27}$ .

Vây 
$$T = a - b + c - d = 4 - \frac{16}{3} + \frac{64}{9} - \frac{256}{27} = -\frac{100}{27}.$$

Chon đáp án (C).....

**CÂU 9.** Cho x và y là các số nguyên thỏa mãn các số x+6y, 5x+2y, 8x+y theo thứ tự lập thành cấp cộng và các số  $x - \frac{5}{3}y$ , y - 1, 2x - 3y theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Tính tổng S = 2x + 3y.





$$(c)$$
 -6.

(**D**) = 9.

### 🗭 Lời giải.

Vì các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y theo thứ tự lập thành cấp cộng nên ta có

$$(x+6y) + (8x + y) = 2(5x + 2y) \Leftrightarrow x = 3y$$

Vì các số  $x - \frac{5}{3}y$ , y - 1, 2x - 3y theo thứ tự lập thành cấp số nhân nên ta có

$$\left(x - \frac{5}{3}y\right)(2x - 3y) = (y - 1)^{2}.$$

Thay x = 3y vào phương trình trên, ta được

$$\left(3y - \frac{5}{3}y\right)(6y - 3y) = (y - 1)^{2}$$

$$\Leftrightarrow 4y^{2} = y^{2} - 2y + 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} y = -1 \\ y = \frac{1}{3} \end{bmatrix}.$$

Ta loại trường hợp  $y = \frac{1}{3}$  vì y là số nguyên. Suy ra x = 3y = 3(-1) = -3. Vậy

$$S = 2x + 3y = 2(-3) + 3(-1) = -9.$$

Chon đáp án (D).....

# Dạng 7. Bài toán thực tế

# 1. Ví du mẫu

**VÍ DU 1 (TH).** Dân số trung bình của Việt Nam năm 2020 là 97,6 triệu người, tỉ lệ tăng dân số là 1,14%/năm.

(Nguồn: Niên giám thống kê của Việt Nam năm 2020, NXB Thống kê, 2021)

Giả sử tỉ lệ tăng dân số không đổi qua các năm.

- a) Sau 1 năm, dân số của Việt Nam sẽ là bao nhiêu triệu người (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?
- b) Viết công thức tính dân số Việt Nam sau n năm kể từ năm 2020.

#### 🗩 Lời giải.

a) Sau 1 năm, dân số của Việt Nam sẽ là

$$u_1 = 97.6 + 97.6 \cdot 0.0114 = 97.6 \cdot (1 + 0.0114)$$
  
=  $97.6 \cdot 1.0114 \approx 98.7 \text{(triệu người)}.$ 

b) Gọi  $u_n$  là dân số của Việt Nam sau n năm. Do tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,14% nên ta có

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-1} \cdot 0.0114 = u_{n-1} \cdot (1 + 0.0114)$$
  
=  $u_{n-1} \cdot 1.0114$  với  $n \ge 2$ .

Do đó,  $(u_n)$  là cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 97.6 \cdot 1,0114$ , công bội q = 1,0114. Vậy dân số của Việt Nam sau n năm kể từ năm 2020 là

$$u_n = 97.6 \cdot 1.0114 \cdot 1.0114^{n-1} = 97.6 \cdot 1.0114^n$$
 (triệu người).

**VÍ DU 2 (TH).** Bác Linh gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng tiền tiết kiệm với hình thức lãi kép, kì hạn 1 năm với lãi suất 6%/năm. Viết công thức tính số tiền (cả gốc và lãi) mà bác Linh có được sau n năm (giả sử lãi suất không thay đổi qua các năm).

Lời giải.


Gọi  $u_n$  là số tiền (cả gốc lẫn lãi) mà bác Linh có được sau n năm. Do lãi suất 1 năm là 6% nên ta có

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-1} \cdot 0.06 = u_{n-1} \cdot (1+0.06)$$
  
=  $u_{n-1} \cdot 1.06$  với  $n > 2$ .

Do đó,  $(u_n)$  là cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 100$  (triệu đồng), công bội q = 1,06. Vây số tiền mà bác Linh có được sau n năm là

$$u_n = 100 \cdot 1,06^{n-1}$$
 (triệu đồng).

VÍ DU 3 (VD). Một hình vuông có cạnh 1 đơn vị dài được chia thành chín hình vuông nhỏ hơn và hình vuông ở chính giữa được tô màu xanh như hình. Mỗi hình vuông nhỏ hơn lai được chia thành chín hình vuông con, và mỗi hình vuông con ở chính giữa lại được tô màu xanh. Nếu quá trình này được tiếp tục lặp lại năm lần, thì tổng diện tích các hình vuông được tô màu xanh là bao nhiêu?



### 🗩 Lời giải.

Lần phân chia thứ nhất, 1 hình vuông thành 9 hình vuông con, diện tích hình vuông tô màu xanh là  $u_1 = \frac{1}{9}$ .

Lần phân chia thứ hai, 8 hình vuông thành 9 hình vuông con, diện tích hình vuông tô màu xanh tăng thêm là  $u_2 = \frac{1}{9} \left( \frac{8}{9} \right)$ .

Lần phân chia thứ ba,  $8^2$  hình vuông thành 9 hình vuông con, diện tích hình vuông tô màu xanh tăng thêm là  $u_3 = \frac{1}{9} \left(\frac{8}{9}\right)^2$ .

Lần phân chia thứ tư,  $8^3$  hình vuông thành 9 hình vuông con, diện tích hình vuông tô màu xanh tăng thêm là  $u_4 = \frac{1}{6} \left(\frac{8}{6}\right)^3$ .

Lần phân chia thứ năm,  $8^4$  hình vuông thành 9 hình vuông con, diện tích hình vuông tô màu xanh tăng thêm là  $u_5 = \frac{1}{9} \left(\frac{8}{9}\right)^4$ .

Như vậy diện tích các hình vuông tăng thêm sau mỗi lần chia tạo thành cấp số nhân có công bội là  $q = \frac{8}{6}$ , số hạng đầu là  $u_1 = \frac{1}{9}.$ 

Do đó, tổng diện tích hình vuông tô màu xanh sau 5 lần chia là

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + u_5 = \frac{1 - q^5}{1 - q} \cdot u_1 = \frac{1 - \left(\frac{8}{9}\right)^5}{1 - \frac{8}{9}} \cdot \frac{1}{9} = \frac{26281}{39366}.$$

**VÍ DU 4 (TH).** Một khay nước có nhiệt độ 23° được đặt vào ngăn đá của tủ lạnh. Biết sau mỗi giờ, nhiệt độ của nước giảm 20%. Tính nhiệt độ của khay nước đó sau 6 giờ theo đơn vi độ C.

#### Lời giải.

Nhiệt độ sau mỗi giờ của khay nước theo thứ tự lập thành cấp số nhân với  $u_1 = 23.(1 - 20\%)$  và q = (1 - 20%).

Ta có  $u_6 = u_1 \cdot q^5 = 23 \cdot (1 - 20\%)^6 \approx 7, 5.$ 

Nhiệt độ của khay nước sau 6 giờ là  $\approx 6.0^{\circ}$ .

VI DU 5 (TH). Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ poloni 210 là 138 ngày, nghĩa là sau 138 ngày, khối lượng của nguyên tố đó chi còn một nửa (theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Poloni-210). Tính khối lượng còn lại của 20 gam poloni 210 sau:

a) 690 ngày;

b) 7314 ngày (khoảng 20 năm).

#### Dèi giải.

- a) Ta có  $\frac{690}{138} = 5$  suy ra khối lượng còn lại sau 690 này là  $\frac{20}{2^5} = 0.625$  gam;
- b) Ta có  $\frac{7314}{138}$  = 53 suy ra khối lượng còn lại sau 7314 này là  $\frac{20}{253}$  gam.

**VÍ DU 6 (TH).** Tế bào E.Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Hỏi sau 24 giờ, tế bào ban đầu sẽ phân chia thành bao nhiều tế bào?

#### Dòi giải.

Lần phân chia thứ nhất, 1 tế bào thành 2 tế bào, số tế bào lần 1 phân chia là  $u_1 = 2$ .

Lần phân chia thứ hai 2, số tế bào lần 2 phân chia là  $u_2 = 2 \cdot 2 = u_1 \cdot 2$ .

Lần phân chia thứ 3 có 4 tế bào phân chia, số tế bào lần 3 phân chia là  $u_3 = 2 \cdot u_2$ .

Như vậy một tế bào phân đôi sẽ tạo thành cấp số nhân có công bội là 2, số hạng đầu là  $u_1 = 2$ .

Sau n lần phân chia từ một tế bào phân được thành  $u_n = 2^{n-1}u_1$ .

Đổi 24 giờ =  $24 \cdot 60 = 72 \cdot 20 \text{ (phút)} \Rightarrow 24$  giờ gấp 72 lần 20 phút.

Do đó, sau 24 giờ số tế bào nhận được là  $u_{72} = 2^{71} \cdot 2 = 2^{72}$  (tế bào).

# 2. Bài tấp tư luân

**BÁI 1 (TH).** Một quốc gia có dân số năm 2011 là P triệu người. Trong 10 năm tiếp theo, mỗi năm dân số tăng a%. Chứng minh rằng dân số các năm từ năm 2011 đến năm 2021 của quốc gia đó tạo thành cấp số nhân. Tìm công bội của cấp số nhân này.

### 🗩 Lời giải.

Coi ngày điều tra dân số năm 2011 và năm 2021 trùng nhau thì từ năm 2011 đến năm 2021 là 10 năm. Vậy dân số nước ta tính đến năm 2021 là

$$u_{10} = P \cdot (1 + a\%)^{10}$$
.

Ta có

$$u_1 = P \cdot (1 + a\%)^1$$
.

$$u_2 = P \cdot (1 + a\%)^2$$
.

Và công bội của cáp số nhân này là  $\frac{u_2}{u_1} = q = \frac{P \cdot (1 + a\%)^2}{P \cdot (1 + a\%)^1} = 1 + a\%.$ 

**BÁI 2 (TH).** Vào năm 2020, dân số của một quốc gia là khoảng 97 triệu người và tốc độ tăng trưởng dân số là 0,91%. Nếu tốc độ tăng trưởng dân số này được giữ nguyên hằng năm, hãy ước tính dân số của quốc gia đó vào năm 2030.

🗩 Lời giải.

Dân số năm 2021 tăng lên so với năm 2020 là  $97 \cdot 0.91\%$  triệu người.

Dân số năm 2021 là

$$97 + 97 \cdot 0.91\% = 97 \cdot (1 + 0.91\%)$$
 triệu người.

Dân số năm 2022 tăng lên so với năm 2021 là  $97 \cdot (1+0.91\%) \cdot 0.91\%$  triệu người.

Dân số năm 2022 là

$$97 \cdot (1 + 0.91\%) + 97 \cdot (1 + 0.91\%) \cdot 0.91\% = 97 \cdot (1 + 0.91\%)^2$$
 triệu người.

Dân số năm 2023 tăng lên so với năm 2021 là  $97 \cdot (1+0.91\%)^2 \cdot 0.91\%$  triều người.

Dân số năm 2023 là

$$97 \cdot (1 + 0.91\%)^2 + 97 \cdot (1 + 0.91\%)^2 \cdot 0.91\% = 97 \cdot (1 + 0.91\%)^3$$
 triệu người.

Tương tự vậy ta có dân số năm 2030 là  $97 \cdot (1 + 0.91\%)^{10} = 106,1973784$  triệu người.

**BÀI 3 (TH).** Một tỉnh có 2 triệu dân vào năm 2020 với tỉ lệ tăng dân số là 1 %/năm. Gọi  $u_n$  là số dân của tỉnh đó sau nnăm. Giả sử tỉ lệ tăng dân số là không đổi.

- a) Viết công thức tính số dân của tỉnh đó sau n năm kể từ năm 2020.
- b) Tính số dân của tỉnh đó sau 10 năm kể từ năm 2020.

#### Dèi giải.

a) Với  $u_n$  là số dân của tỉnh đó sau n năm.

Ta có  $u_1 = 2 \cdot 1,01$  (triệu dân).

$$u_{n+1} = u_n + u_n \cdot 0.01 = 1.01u_n.$$

Do đó,  $(u_n)$  là cấp số nhân với số hạng đầu  $u_1 = 2 \cdot 1,01$  và công bội q = 1,01.

Vậy công thức tính số dân của tỉnh đó sau n năm là  $u_n = u_1 q^{n-1} \Rightarrow u_n = 2 \cdot 1,01^n$ .

b) Số dân của tỉnh đó sau 10 năm kể từ năm 2020 là  $u_{10} = 2 \cdot 1,01^{10} = 2,209$  (triệu dân).

BÁI 4 (TH). Giả sử một thành phố có dân số năm 2022 là khoảng 2,1 triệu người và tốc độ gia tăng dân số trung bình mỗi năm là 0,75%.

a) Dự đoán dân số của thành phố đó vào năm 2032;

b) Nếu tốc độ gia tăng dân số vẫn giữ nguyên như trên thì ước tính vào năm nào dân số của thành phố đó sẽ tăng gấp đôi so với năm 2022?

### 🗩 Lời giải.

a) Giả sử dân số năm 2022 là  $u_1 = 2.1 \cdot 10^6$  thì dân số năm 2023 là  $u_2 = u_1 + 0.0075 u_1 = 1.0075 u_1$ . Tương tự dân số năm 2024 là  $u_3 = 1,0075u_2$ .

Do đó dân số của thành phố qua các năm lập thành một cấp số nhân với  $u_1 = 2,1 \cdot 10^6$ ; q = 1,0075. Vậy dân số năm 2032 tương ứng với  $u_{11} = u_1 \cdot q^{10} = 2, 1 \cdot 10^6 \cdot 1,0075^{10} \approx 2262924$  (người).

b) Giả sử đến năm thứ n thì dân số gấp đôi năm 2022. Suy ra  $u_n = 2u_1 \Leftrightarrow q^{n-1} = 2 \Leftrightarrow 1,0075^{n-1} = 2 \Leftrightarrow n \approx 93,7.$ Vậy 94 năm sau tức là năm 2116 thì dân số thành phố sẽ gấp đôi năm 2022.

BAI 5 (TH). Giả sử anh Tuấn kí hợp đồng lao động trong 10 năm với điều khoản về tiền lương như sau: Năm thứ nhất, tiền lương của anh Tuấn là 60 triệu. Kể từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm tiền lương của anh Tuấn được tăng lên 8%. Tính tổng số tiền lương anh Tuấn lĩnh được trong 10 năm đi làm (đơn vị: triệu đồng, làm tròn đến hàng phần nghìn).

#### Dèi giải.

Gọi  $u_n$  là số tiền lương (triệu đồng) anh Tuấn được lĩnh ở năm làm việc thứ n. Ta có:  $u_1 = 60$ ;

$$u_n = u_{n-1} + u_{n-1} \cdot 0.08 = u_{n-1} \cdot (1 + 0.08) = u_{n-1} \cdot 1.08.$$

Do đó,  $(u_n)$  là cấp số nhân có số hạng đầu  $u_1 = 60$ , công bội q = 1,08. Áp dụng công thức tính tổng  $S_n$ , ta có tổng số tiền lương anh Tuấn lĩnh được trong 10 năm đi làm là

$$S_{10} = \frac{60 \cdot \left(1 - 1,08^{10}\right)}{1 - 1,08} \approx 869,194$$
 (triệu người).

BAI 6 (TH). Một công ty xây dựng mua một chiếc máy ủi với giá 3 tỉ đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá tri của chiếc máy ủi này lại giảm 20% so với giá trị của nó trong năm liền trước đó. Tìm giá trị còn lại của chiếc máy ủi đó sau 5 năm sử dụng. Dòi giải.

Gọi  $u_n$  là Giá trị của máy ủi sau n sử dụng.

Dãy số  $(u_n)$  là một cấp số nhân có  $u_1 = 3.0, 8, q = 0.8$ .

Số hạng tổng quát của cấp số nhân này là  $u_n = 3 \cdot 0.2^n$ .

Ta có  $u_5 = 3 \cdot 0.8^5 = 0.98304$ .

Tương ứng giá trị của chiếc máy ủi sau 5 năm xấp xỉ 983 triệu đồng.

BAI 7 (TH). Một gia đình mua một chiếc ô tô giá 800 triệu đồng. Trung bình sau mỗi năm sử dụng, giá trị còn lại của ô tô giảm đi 4% (so với năm trước đó).

- a) Viết công thức tính giá trị của ô tô sau 1 năm, 2 năm sử dụng.
- b) Viết công thức tính giá trị của ô tô sau n năm sử dụng.
- c) Sau 10 năm, giá trị của ô tô ước tính còn bao nhiêu triệu đồng?


#### Dòi giải.

Gọi  $u_n$  là giá trị còn lại của ô tô sau n năm sử dụng.

- a) Giá trị của ô tô sau 1 năm sử dụng là  $u_1 = 800 800 \cdot 0,04 = 800 \cdot 0,96 = 768$  triệu đồng. Giá trị của ô tô sau 2 năm sử dụng là  $u_2 = u_1 - u_1 \cdot 0.04 = u_1 \cdot 0.96 = 737.28$  triệu đồng.
- b) Ta có  $u_n = u_{n-1} u_{n-1} \cdot 0.04 = u_{n-1} \cdot 0.96$ . Do đó,  $(u_n)$  là cấp số nhân với số hạng đầu  $u_1 = 768$  và công bội q = 0.96. Vậy sau n năm sử dụng, giá trị còn lại của chiếc ô tô là  $u_n = u_1 q^{n-1} \Rightarrow u_n = 768 \cdot 0.96^{n-1}$ .
- c) Sau 10 năm, ước tính giá trị của ô tô còn lại là  $u_{10} = 768 \cdot 0.96^9 \approx 531.87$  triệu đồng.

### **BAI 8 (VD).**

Một người nhảy bungee (một trò chơi mạo hiểm mà người chơi nhảy từ một nơi có địa thế cao xuống với dây đai an toàn buộc xung quanh người) từ một cây cầu và căng một sợi dây dài 100 m. Sau mỗi lần rơi xuống, nhờ sự đàn hồi của dây, người nhảy được kéo lên một quãng đường có độ dài bằng 75% so với lần rơi trước đó và lại bị rơi xuống đúng bằng quãng đường vừa được kéo lên. Tính tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần kéo lên và lại rơi xuống.



### Dèi giải.

Gọi  $u_n$  là quãng đường người đó được kéo lên ở lần thứ n được kéo lên và lại rơi xuống (đơn vị tính: mét).

Ta có  $u_1 = 0.75 \cdot 100 = 100 \cdot 1.5 = 75 \text{ m và } u_n = 0.75 \cdot u_{n-1}.$ 

Vậy  $(u_n)$  là cấp số nhân với số hạng đầu  $u_1 = 75$  và công bội q = 0.75.

Tổng quãng đường người đó đi được sau 10 lần kéo lên và lại rơi xuống là

$$S = 100 + 2u_1 + 2u_2 + \dots + 2u_{10}$$

$$= 100 + 2S_{10} = 100 + 2 \cdot \frac{75(1 - 0.75^{10})}{1 - 0.75}$$

$$\approx 666.2 \text{ m}.$$

**BÁI 9 (TH).** Một cái tháp có 11 tầng. Diện tích của mặt sàn tầng 2 bằng nửa diện tích của mặt đáy tháp và diện tích của mặt sàn mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt sàn mỗi tầng ngay bên dưới. Biết mặt đáy tháp có diện tích là  $12288m^2$ . Tính diện tích của mặt sàn tầng trên cùng của tháp theo đơn vị mét vuông.

### Lời giái.

(Lưu ý: Một số nơi xem tầng 1 là tầng trệt. Nên bài toán này giống bài toán tháp 10 tầng ở phần trên) Do diện tích của mặt sàn tính từ tầng một lập thành một cấp số nhân với  $u_2 = \frac{1}{2}.12288 = 6144$  và  $q = \frac{1}{2}$ .

Ta có 
$$\begin{cases} u_2 = 6144 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 12288 \\ q = \frac{1}{2} \end{cases}$$

Ta có  $u_{11} = u_1 \cdot q^{10} = 12288 \cdot \frac{1}{210} = 12m^2$ . Vậy diện tích của mặt sàn tầng trên cùng là  $12m^2$ .

# **BÀI 10 (TH).**

Cho hình vuông  $C_1$  có canh bằng 4. Người ta chia mỗi canh hình vuông thành bốn phần bằng nhau và nối các điểm chia một cách thích hợp để có hình vuông  $C_2$  . Từ hình vuông  $C_2$  lại làm tiếp tục như trên để có hình vuông  $C_3$ . Cứ tiếp tục quá trình như trên, ta nhận được dãy các hình vuông  $C_1, C_2, C_3, \ldots, C_n, \ldots$  Gọi  $a_n$  là độ dài cạnh hình vuông  $C_n$ . Chứng minh rằng dãy số  $(a_n)$  là cấp số nhân.




#### 🗩 Lời giải.

Gọi cạnh một hình vuông thứ 
$$n,\,n+1$$
 lần lượt là  $a_n,a_{n+1}.$  Do  $MN=\sqrt{MB^2+BN^2}=\sqrt{\left(\frac{AB}{4}\right)^2+\left(\frac{3AB}{4}\right)^2}=AB\cdot\frac{\sqrt{10}}{4}.$ 

Nên ta có cạnh hình vuông thứ n+1 là

$$a_{n+1} = a_n.\frac{\sqrt{10}}{4}.$$
 Vây dãy số  $(a_n)$  là cấp số nhân.



BAI 11 (TH). Một cây đàn organ có tần số âm thanh các phím liên tiếp tạo thành một cấp số nhân. Cho biết tần số phím La trung là 400 Hz và tần số của phím La cao cao hơn 12 phím là 800 Hz (nguồn: https://vi.wikipedia.org/wikiOrgan). Tìm công bội của cấp số nhân nói trên (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

Theo đề ta có 
$$\begin{cases} u_1 = 400 \\ u_{13} = 800 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 400 \\ u_1 q^{12} = 800 \end{cases} \Rightarrow q^{12} = 2 \Rightarrow q = \pm \sqrt[12]{2}.$$

BAI 12 (VD). Một loại thuốc được dùng mỗi ngày một lần. Lúc đầu nồng độ thuốc trong máu của bệnh nhân tăng nhanh, nhưng mỗi liều kế tiếp có tác dụng ít hơn liều trước đó. Lượng thuốc trong máu ở ngày thứ nhất là 50 mg, và mỗi ngày sau đó giảm chỉ còn một nửa so với ngày kề trước đó. Tính tổng lượng thuốc (tính bằng mg) trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp.

#### Lời giải.

Gọi  $u_n$  là giá trị của lượng thuốc trong máu của bệnh nhân trong ngày thứ n.

Đãy số này là một cấp số nhân có  $u_1=50,\,q=\frac{1}{2}.$ 

Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân là  $S_n = u_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$ .

Theo bài toán, ta có  $S_{10} = 50 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{10}}{1 - \frac{1}{2}} \approx 99,902.$ 

Vậy tổng lượng thuốc trong máu của bệnh nhân sau khi dùng thuốc 10 ngày liên tiếp là 99,902 mg.


# 3. Câu hỏi trắc nghiệm

### CÂU 1.

Cho hình vuông có cạnh là 1. Nối các trung điểm của hình vuông trên ta được một hình vuông có diện tích  $S_1$ , tiếp tục quá trình trên với các hình vuông với diện tích là  $S_2$ ;  $S_3$ ;  $\ldots; S_n; \ldots$  Tính tổng vô hạn  $S_1 + S_2 + S_3 + \cdots + S_n + \cdots$ 







Ta có  $S_1 = \frac{1}{2}$ ,  $S_2 = \frac{1}{4}$ ,  $S_3 = \frac{1}{8}$ ,  $\cdots S_n = \frac{1}{2^n}$ , ... tạo thành 1 cấp số nhân với công bội  $q = \frac{1}{2} < 1$ .

Vậy  $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n + \dots = \frac{2}{1 - \frac{1}{2}} = 1.$ 

**CÂU 2.** Cho n là số nguyên dương và n tam giác  $A_1B_1C_1, A_2B_2C_2, \ldots, A_nB_nC_n$ , trong đó các điểm lần  $A_{i+1}, B_{i+1}, C_{i+1}$  lượt nằm trên các cạnh  $B_iC_i$ ,  $A_iC_i$ ,  $A_iB_i$  ( $i=1,2,\ldots,n-1$ ) sao cho  $A_{i+1}C_i=3A_{i+1}B_i$ ,  $B_{i+1}A_i=3B_{i+1}C_i$ ,  $C_{i+1}B_i=3C_{i+1}A_i$ . Gọi S là tổng tất cả các diện tích của tam giác  $A_1B_1C_1, A_2B_2C_2, \dots, A_nB_nC_n$  biết rằng tam giác  $A_1B_1C_1$  có diện tích bằng  $\frac{9}{16}$ . Tìm số nguyên dương sao cho  $S = \frac{16^{29} - 7^{29}}{16^{29}}$ .

$$(\mathbf{A})n = 28.$$

**B**
$$n = 2018$$
.

$$(c)$$
 $n = 30.$ 

$$\bigcirc n = 29.$$

# 🗩 Lời giải.

Gọi  $S_i(i=1,2,3,...,n)$  là diện tích của  $\Delta A_i B_i C_i$ . Ta có  $\frac{S_{A_1B_2C_2}}{S_{A_1B_1C_1}} = \frac{A_1B_2}{A_1C_1} \cdot \frac{A_1C_2}{A_1B_1} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{16}$ . Tương tự, ta có  $\frac{S_{A_2B_1C_2}}{S_{A_1B_1C_1}} = \frac{S_{A_2B_2C_1}}{S_{A_1B_1C_1}} = \frac{3}{16}$ . Do đó  $\frac{S_{A_2B_2C_2}}{S_{A_1B_1C_1}} = 1 - 3 \cdot \frac{3}{16} = \frac{7}{16} \Rightarrow S_2 = \frac{7}{16}S_1$ .

Tương tự, ta có  $S_{i+1} = \frac{l}{16}S_i, i = 1, 2, ..., n$ . Khi đó

$$S = S_1 \left[ 1 + \frac{7}{16} + \dots + \left( \frac{7}{16} \right)^{n-1} \right] = \frac{9}{16} \cdot \frac{1 - \left( \frac{7}{16} \right)^n}{1 - \frac{7}{16}} = 1 - \left( \frac{7}{16} \right)^n.$$

Theo giả thiết ta có  $1 - \left(\frac{7}{16}\right)^n = 1 - \left(\frac{7}{16}\right)^{29} \Leftrightarrow n = 29.$ 

CÂU 3. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện của mặt trên tầng ngay bên dưới và diện tích tầng 1 bằng nửa diện tích của để tháp. Biết để tháp có diện tích là  $12288\,\mathrm{m}^2$ . Tính diện tích mặt trên cùng.

**(A)**  $12 \,\mathrm{m}^2$ .

 $(B)6 \, m^2$ .

 $(\mathbf{C})10\,\mathrm{m}^2.$ 

 $(\mathbf{D})8\,\mathrm{m}^2.$ 

## Lời giải.

Gọi  $S_i$  là diện tích của tầng thứ i với i = 1, 2, ..., 11.

Do giả thiết suy ra  $S_{i+1} = \frac{1}{2}S_i$  với  $i = 1, 2, \dots, 10$ .

Do đó  $\{S_i\}$  là một cấp số nhân với công bội  $q = \frac{1}{2}$ . Do đó  $S_{11} = \frac{1}{2^{10}}S_1 = \frac{1}{2^{11}} \cdot 12288 = 6 \text{ (m}^2)$ .

**CẦU 4.** Cho tứ giác ABCD có bốn góc tạo thành cấp số nhân có công bội q=2. Góc có số đo nhỏ nhất trong bốn góc đó

(**B**)1°.

**(C)**12°.

 $(\mathbf{D})30^{\circ}.$ 

🗩 Lời giải.

Gọi số đo bốn góc của tứ giác ABCD là x, 2x, 4x, 8x.

Có  $x + 2x + 4x + 8x = 360 \Leftrightarrow 15x = 360 \Leftrightarrow x = 24$ .

Chon đáp án (A).....

CÂU 5. Một du khách vào chuồng đua ngưa đặt cược, lần đầu tiên đặt 20000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cược trước. Người đó thua lần 9 liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Hỏi du khách đó thắng hay thua bao nhiêu tiền?

(**A**) Thắng 20000 đồng.

### Lời giải.

Số tiền đặt cược lần thứ n là  $u_n = u_1 \cdot 2^{n-1}$  với  $u_1 = 20000$ .

Ta có: 
$$u_{10} - \sum_{n=1}^{9} u_1 \cdot 2^{n-1} = 20000 \cdot 2^9 - \sum_{n=1}^{9} 20000 \cdot 2^{n-1} = 20000.$$

Vậy du khách thắng 20000 đồng.

Chọn đáp án (A).....

**CÂU 6.** Cho tam giác ABC cân tại A có cạnh đáy BC, đường cao AH và cạnh bên AB theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân công bội q. Giá trị của q là

$$\mathbf{A} q = \frac{1}{2} \sqrt{\sqrt{2} + 1}$$

$$\bigcirc q = \sqrt{2(\sqrt{2}+1)}.$$

(A) 
$$q = \frac{1}{2}\sqrt{\sqrt{2} + 1}$$
. (B)  $q = \sqrt{2} + 1$ . (C)  $q = \sqrt{2(\sqrt{2} + 1)}$ .

# 🗭 Lời giải.

Giả sử  $BC = u_1$ ,  $AH = u_1 \cdot q$  và  $AB = u_1 \cdot q^2$  với  $u_1 > 0, q > 0$ .

Do  $\triangle ABC$  cân tại A suy ra

$$\begin{split} AB^2 &= AH^2 + \frac{BC^2}{4} \Leftrightarrow & u_1^2 \cdot q^4 = \frac{u_1^2}{4} + u_1^2 \cdot q^2 \\ & \Leftrightarrow & 4q^4 - 4q^2 - 1 = 0 \\ & \Leftrightarrow & q^2 = \frac{1 \pm \sqrt{2}}{2}. \end{split}$$

Kết hợp với điều kiện bài toán ta có  $q=\sqrt{\frac{1+\sqrt{2}}{2}}=\frac{1}{2}\sqrt{2(\sqrt{2}+1)}.$ 

Chọn đáp án (D).....

CÂU 7. Giả sử một người đi làm được lĩnh lương khởi điểm là 2.000.000 đồng/tháng. Cứ 3 năm người ấy lại được tăng lương một lần với mức tăng bằng 7% của tháng trước đó. Hỏi sau 36 năm làm việc người ấy lĩnh được tất cả bao nhiêu tiền?

(A) 1.287.968.492 đồng.

(**B**) 10.721.769.110 đồng.

 $(\mathbf{C})7,068289036 \cdot 10^8$  đồng.

(**D**)429.322.830,5 đồng.

## Dòi giải.

Ta có 36 năm tương ứng với 12 kỳ lương; mỗi kỳ lương có 36 tháng và kỳ sau tăng 7% so với kỳ trước. Do đó tổng số tiền

mỗi kỳ lương là một cấp số nhân với  $u_1 = 36 \times 2 = 72$  (triệu đồng) và công bội q = 1,07. Vây tổng số tiền sau 36 năm là  $T = \frac{72 \cdot \left[ (1,07)^{12} - 1 \right]}{1.07 - 1} = 1287,968492$  (triệu đồng).

CÂU 8. Từ độ cao 55,8 (mét) của tháp nghiên Pisa nước Italia người ta thả một quả bóng cao su chạm xuống đất. Giả sử mỗi lần chạm đất bóng lại nảy lên độ cao bằng  $\frac{1}{10}$  độ cao mà bóng đạt trước đó. Tổng độ dài hành trình (mét) của bóng được thả từ lúc ban đầu cho đến khi nó nằm yên trên mặt đất thuộc khoảng nào trong các khoảng sau đây?

 $(\mathbf{A})(69;72).$ 

(**B**)(60; 63).

 $(\mathbf{C})(67;69).$ 

# 🗩 Lời giải.

Đặt  $u_1 = 55.8$  (mét) là quãng đường bóng rơi khi thả xuống,  $u_{n+1} = \frac{1}{10^n} u_1, n \ge 1$  là quãng đường bóng rơi sau lần nảy lên thứ n.

Ta có  $(u_n)$  là dãy cấp số nhân với  $u_1 = 55.8$  và công bội  $q = \frac{1}{10}$ .

Suy ra tổng quãng đường quả bóng rơi xuống là  $\lim_{n \to +\infty} u_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q} = \lim_{n \to +\infty} 55.8 \cdot \frac{1-\left(\frac{1}{10}\right)^n}{1-\frac{1}{1-\frac{1}{10}}} = 62.$ 

Ngoài ra ta còn phải tính tổng quãng đường mà bóng nảy lên. Ta có tổng quãng đường bóng nảy lên bằng tổng quãng đường rơi của bóng trừ đi quãng đường thả rơi xuống.

Vậy tổng quãng đường hành trình của quả bóng là 62 + 62 - 55.8 = 68.2 (mét).

CẦU 9. Một gia đình lập kế hoạch tiết kiệm như sau: Họ lập một sổ tiết kiệm tại một ngân hàng và cứ đầu mỗi tháng họ gửi vào sổ tiết kiệm đó 15 triệu đồng. Giả sử lãi suất tiền gửi không đổi là 0,6 %/tháng và tiền gửi được tính lãi theo hình thức lãi kép. Hỏi sau 3 năm gia đình đó tiết kiệm được số tiền gần nhất với con số nào dười đây?

(A) 543240000 đồng.

(**B**)589269000 đồng.

(C)669763000 đồng.

(**D**)604359000 đồng.

#### Lời giải.

Gọi  $S_0$  triệu đồng là số tiềng<br/>ia đình đó định kỳ gửi tiết kiệm vào đầu hằng tháng, r là lãi suất tiền gửi hằng tháng. Ta có  $S_0 = 15$  triệu đồng, r = 0.6 %/tháng.

Gọi  $S_i$ ,  $i = \overline{1,n}$  là số tiền trong sổ tiết kiệm cuối tháng thứ i.

$$\odot S_1 = S_0 + S_0 \cdot r = S_0(1+r),$$

$$S_3 = [S_0 + S_0(1+r) + S_0(1+r)^2] + [S_0 + S_0(1+r) + S_0(1+r)^2] r, 
= S_0(1+r) + S_0(1+r)^2 + S_0(1+r)^3,$$

**⊘** ...

$$S_n = S_0(1+r) + S_0(1+r)^2 + S_0(1+r)^3 + \dots + S_0(1+r)^n$$

$$= S_0 \left[ (1+r) + (1+r)^2 + (1+r)^3 + \dots + (1+r)^n \right]$$

$$= S_0(1+r) \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{(1+r) - 1} = S_0(1+r) \cdot \frac{(1+r)^n - 1}{r} .$$

Vậy sau 3 năm, tức cuối tháng thứ 36 thì gia đình tiết kiệm được số tiền là

$$S_{36} = 15 \cdot 10^6 (1 + 0.6 \cdot 10^{-2}) \cdot \frac{(1 + 0.6 \cdot 10^{-2})^{36} - 1}{0.6 \cdot 10^{-2}} = 604358538.2 \text{ dồng.}$$

# **ÔN TẬP CHƯƠNG 2**

**CÂU 1.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = (-1)^n . 2n$ . Mệnh đề nào sau đây sai?

$$\mathbf{B}u_2=4.$$

$$u_3 = -6.$$

$$\mathbf{D}u_4 = -8.$$

#### 🗭 Lời giải.

Thay trực tiếp vào kiểm tra, ta có

$$u_1 = -2.1 = -2$$
  
 $u_2 = (-1)^2.2.2 = 4$   
 $u_3 = (-1)^3.2.3 = -6$   
 $u_4 = (-1)^4.2.4 = 8$ .

Chọn đáp án  $\bigcirc$ 

**CÂU 2.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = (-1)^n \cdot \frac{2^n}{n}$ . Tìm số hạng  $u_3$ .

$$\mathbf{A} u_3 = \frac{8}{3}.$$

$$\mathbf{B}u_3=2.$$

$$\mathbf{C}u_3 = -2.$$

$$\mathbf{D}u_3 = -\frac{8}{3}.$$

#### Dèi aiải.

Thay trực tiếp vào kiểm tra, ta có

$$u_3 = (-1)^3 \cdot \frac{2^3}{3} = -\frac{8}{3}.$$

Chọn đáp án (D).....

**CÂU 3.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = \frac{2n+5}{5n-4}$ . Số  $\frac{7}{12}$  là số hạng thứ mấy của dãy số?

(A) 8.

(C)9.

**(D)**10.

# 🗩 Lời giải.

Ta có

$$u_n = \frac{2n+5}{5n-4}$$

$$\Leftrightarrow \frac{7}{12} = \frac{2n+5}{5n-4}$$

$$\Leftrightarrow 24n+60 = 35n-28$$

$$\Leftrightarrow 11n = 88$$

$$\Leftrightarrow n = 8.$$

Vậy số  $\frac{7}{12}$  là số hạng thứ 8.

**CÂU 4.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = 2^n$ . Tìm số hạng  $u_{n+1}$ .

$$\mathbf{A} u_{n+1} = 2^n.2.$$

$$\mathbf{B}u_{n+1} = 2^n + 1$$

**B** 
$$u_{n+1} = 2^n + 1$$
. **C**  $u_{n+1} = 2(n+1)$ .

$$\mathbf{D}u_{n+1} = 2^n + 2.$$

🗩 Lời giải.

Ta có

Chọn đáp án (A).....

Dèi giải.

Thay n bằng n+1 trong công thức  $u_n$  ta được

$$u_{n+1} = 2^{n+1}$$
$$= 2 \cdot 2^n.$$

**CÂU 5.** Cho dãy số  $(u_n)$ , biết  $u_n = 5^{n+1}$ . Tìm số hạng  $u_{n-1}$ .

$$\mathbf{A} u_{n-1} = 5^{n-1}.$$

$$\mathbf{B}u_{n-1}=5^n.$$

$$\mathbf{C}u_{n-1} = 5.5^{n+1}$$
.

$$\mathbf{D}u_{n-1} = 5.5^{n-1}$$

Dòi giải.

Thay n bằng n-1 trong công thức  $u_n$  ta được

$$u_{n-1} = 5^{n-1+1}$$
  
=  $5^n$ .

**CÂU 6.** Cho dãy số có các số hạng đầu là -2; 0; 2; 4; 6; .... Số hạng tổng quát của dãy số này là công thức nào dưới đây?

$$\mathbf{B}u_n=n-2.$$

$$\mathbf{C}u_n = -2(n+1).$$

$$\mathbf{D})u_n = 2n - 4.$$

Dèi giải.

Kiểm tra  $u_1 = -2$  ta loại các đáp án B và C. Tương tự kiểm tra  $u_2 = 0$  ta loại đáp án A.

$$\mathbf{B}u_n = \frac{1}{2} - 2(n-1).$$

$$\mathbf{C}u_n = \frac{1}{2} - 2n.$$

Dòi giải.

Ta có

$$\begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = u_n - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{1}{2} \\ u_2 = -\frac{3}{2} \\ u_3 = -\frac{7}{2} \end{cases}$$

Ta thấy chỉ có đáp án B đều thoả mãn.

Chọn đáp án (B).....

$$\mathbf{B}u_n = \frac{n+1}{n}$$

$$\mathbf{C}u_n = -\frac{n+1}{n}.$$

P Lời giải.

Ta có

$$\begin{cases} u_1 = -2 \\ u_{n+1} = -2 - \frac{1}{u_n} \Rightarrow \begin{cases} u_1 = -2 \\ u_2 = -\frac{3}{2} \end{cases} \end{cases}$$

Ta thấy chỉ có đáp án C thoả mãn.

Chọn đáp án (C).....

**CÂU 9.** Cho cấp số cộng có số hạng đầu  $u_1 = -\frac{1}{2}$ , công sai  $d = \frac{1}{2}$ . Năm số hạng liên tiếp đầu tiên của cấp số này là.

$$\bigcirc$$
  $-\frac{1}{2}$ ; 0; 1;  $\frac{1}{2}$ ; 1.

$$\mathbf{B} - \frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2}.$$

$$\mathbf{C} \frac{1}{2}; 1; \frac{3}{2}; 2; \frac{5}{2}.$$

$$\mathbf{c}$$
 $\frac{1}{2}$ ; 1;  $\frac{3}{2}$ ; 2;  $\frac{5}{2}$ .

$$\bigcirc -\frac{1}{2};0;\frac{1}{2};1;\frac{3}{2}.$$

Dèi giải.

Ta dùng công thức tổng quát  $u_n = u_1 + (n-1)d = -\frac{1}{2} + (n-1)\frac{1}{2} = -1 + \frac{n}{2}$  để tính các số hạng của một cấp số cộng. Ta có

$$u_1 = -\frac{1}{2}, u_2 = 0, u_3 = \frac{1}{2}, u_4 = 1, u_5 = \frac{3}{2}.$$

Chọn đáp án  $\bigcirc$  D.....

CÂU 10. Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số hạng.

🗩 Lời giải.

Giữa 2 và 22 có thêm ba số hạng nữa lập thành cấp số cộng, xem như ta có một cấp số cộng có năm số hạng với  $u_1 =$  $22; u_5 = 22, \text{ ta cần tìm } u_2, u_3, u_4. \text{ Ta có}$ 

$$u_5 = u_1 + 4d$$

$$\Leftrightarrow d = \frac{u_5 - u_1}{4}$$

$$\Leftrightarrow d = 5$$

$$\Rightarrow \begin{cases} u_2 = 7 \\ u_3 = 12 \\ u_4 = 17 \end{cases}$$

**CÂU 11.** Biết các số 
$$C_n^1$$
;  $C_n^2$ ;  $C_n^3$  theo thứ tự lập thành một cấp số cộng với  $n > 3$ . Tìm  $n$ .

**(B)**  $n = 5$ .

**(C)**  $n = 9$ .

$$\mathbf{B}$$
 $n=7.$ 

$$\mathbf{C}n = 9$$

$$(\mathbf{D})n = 11.$$

🗩 Lời giải.

Ba số  $C_n^1; C_n^2; C_n^3$  theo thứ tự  $u_1; u_2; u_3$  lập thành một cấp số cộng nên

$$u_1 + u_3 = 2u_2$$

$$\Leftrightarrow C_n^1 + C_n^3 = 2C_n^2$$

$$\Leftrightarrow n + \frac{(n-2)(n-1)n}{6} = 2 \cdot \frac{(n-1)n}{2}$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{n^2 - 3n + 2}{6} = n - 1$$

$$\Leftrightarrow n^2 - 9n + 14$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} n = 2 \\ n = 7 \end{bmatrix}$$

Kết hợp với điều kiện n > 3, do đó n = 7 thoả mãn yêu cầu bài toán.

**CÂU 12.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có các số hạng đầu lần lượt là 5; 9; 13; 17; .... Tìm số hạng tổng quát  $u_n$  của cấp số cộng.

 $(\mathbf{A})u_n = 5n + 1.$ **(B)**  $u_n = 5n - 1$ .  $(\mathbf{C})u_n = 4n + 1.$ 

Các số 
$$5;9;13;17th;...$$
 theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng  $(u_n)$  nên

$$\begin{cases} u_1 = 5 \\ d = u_2 - u_1 = 4 \end{cases} \Rightarrow u_n = u_1 + (n-1)d = 5 + 4(n-1) = 4n + 1.$$

Chọn đáp án (C).....

**CÂU 13.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 3$  và  $d = \frac{1}{2}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

**AU 13.** Cho cấp số cộng 
$$(u_n)$$
 có  $u_1 = 3$  và  $d = \frac{\pi}{2}$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

**(A)** 
$$u_n = -3 + \frac{1}{2}(n+1)$$
. **(B)**  $u_n = -3 + \frac{1}{2}n - 1$ . **(C)**  $u_n = -3 + \frac{1}{2}(n-1)$ . **(D)**  $u_n = -3 + \frac{1}{4}(n-1)$ .

🗩 Lời giải.

🗩 Lời giải.

Ta có

 $(\mathbf{D})u_n = 4n - 1.$ 

$$\begin{cases} u_1 = -3 \\ d = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow u_n = u_1 + (n-1)d = -3 + \frac{1}{2}(n-1).$$

Chọn đáp án (C)...

CÂU 14. Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

$$\mathbf{A} u_7 = 7 - 3n.$$

$$\mathbf{B}u_7 = 7 - 3^n.$$

$$\mathbf{C}u_7 = \frac{7}{3n}.$$

$$\mathbf{D}u_7 = 7.3^n.$$

🗭 Lời giải.

Dãy  $(u_n)$  là cấp số cộng khi và chỉ khi  $u_n = an + b$  với a, b là hằng số.

**CÂU 15.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = -5$  và d = 3. Mệnh đề nào sau đây đúng?

$$\mathbf{A}u_{15} = 34.$$

$$u_{15} = 45.$$

$$\mathbf{C}$$
 $u_{13} = 31.$ 

$$(\mathbf{D})u_{10} = 35.$$

🗩 Lời giải.

Ta có

$$\begin{cases} u_1 = -5 \\ d = 3 \end{cases} \Rightarrow u_n = 3n - 8 \Rightarrow \begin{cases} u_{15} = 37 \\ u_{13} = 31 \\ u_{10} = 22 \end{cases}$$

Chon đáp án (C).....

**CÂU 16.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có d=-2 và  $S_8=72$ . Tìm số hạng đầu tiên  $u_1$ .

$$\mathbf{A}u_1 = 16$$

$$\mathbf{B}$$
 $u_1 = -16.$ 

$$u_1 = \frac{1}{16}$$
.

$$\mathbf{D}u_1 = -\frac{1}{16}.$$

🗩 Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} d = -2 \\ S_8 = 72 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = -2 \\ 8u_1 + \frac{8.7}{2}d = 72 \end{cases} \Rightarrow 8u_1 + 28.(-2) = 72 \Leftrightarrow u_1 = 16.$$

**CÂU 17.** Một cấp số cộng có số hạng đầu là 1, công sai là 4, tổng của n số hạng đầu là 561. Khi đó số hạng thứ n của cấp số cộng đó là  $u_n$  có giá trị là bao nhiêu?

$$(A) u_n = 57.$$

$$\mathbf{B}u_n = 61.$$

$$\mathbf{C}u_n = 65$$

$$\bigcirc u_n = 69.$$

P Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 = 1, d = 4 \\ S_n = 561 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_{=}1, d = 4 \\ nu_1 + \frac{n(n-1)}{2}d = 561 \end{cases} \Rightarrow n + \frac{n^2 - n}{2}.4 = 561 \Leftrightarrow 2n^2 - n - 561 = 0 \Leftrightarrow n = 17.$$

Từ đây suy ra  $u_{17} = u_1 + 16d = 1 + 16.4 = 65.$ 

Chọn đáp án  $\bigcirc$ .....

**CÂU 18.** Tổng n số hạng đầu tiên của một cấp số cộng là  $S_n = \frac{3n^2 - 19n}{4}$  với  $n \in \mathbb{N}^*$ . Tìm số hạng đầu tiên  $u_1$  và công sai d của cấp số cộng đã cho.

**B**
$$u_1 = -4, d = \frac{3}{2}.$$

**B** 
$$u_1 = -4, d = \frac{3}{2}.$$
 **C**  $u_1 = -\frac{3}{2}, d = -2.$  **D**  $u_1 = \frac{5}{2}, d = \frac{1}{2}.$ 

$$\mathbf{D}u_1 = \frac{5}{2}, d = \frac{1}{2}$$

Ta có 
$$\frac{3n^2 - 19n}{4} = \frac{3}{4}n^2 - \frac{19n}{4} = S_n = nu_1 + \frac{n^2 - n}{2}d = \frac{d}{2}n^2 + \left(u_1 - \frac{d}{2}\right)n.$$

Đồng nhất hai vế của phương trình, ta có  $\begin{cases} \frac{d}{2} = \frac{3}{4} \\ u_1 - \frac{d}{2} = -\frac{19}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -4 \\ d = \frac{3}{2} \end{cases}.$ 

Chon đáp án (B).....

**CÂU 19.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_2 = 2001$  và  $u_5 = 1995$ . Khi đó  $u_{1001}$  bằng.

$$\mathbf{A} u_{1001} = 4005.$$

$$u_{1001} = 4003.$$

$$\mathbf{C}u_{1001} = 3.$$

$$\mathbf{D}$$
 $u_{1001} = 1.$ 

Dòi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_2 = 2001 \\ u_5 = 1995 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d = 2001 \\ u_1 + 4d = 1995 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 2003 \\ d = -2 \end{cases} \Rightarrow u_{1001} = u_1 + 1000d = 3.$$

**CÂU 20.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  biết  $u_n = -1, u_{n+1} = 8$ . Tính công sai d của cấp số cộng đó.

$$\mathbf{A}d = \mathbf{A}$$

$$\mathbf{B}$$
) $d=7$ .

$$(c)d = -7.$$

🗩 Lời giải.

Ta có  $d = u_{n+1} - u_n = 8 - (-1) = 9$ .

Chon đáp án (D).....

**CÂU 21.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $u_2 + u_{23} = 60$ . Tính tổng  $S_2 4$  của 24 số hạng đầu tiên của cấp số cộng đã cho.

$$AS_{24} = 60.$$

$$\mathbf{B}$$
 $S_{24} = 120$ 

$$\mathbf{C}S_{24} = 720.$$

$$S_{24} = 1440.$$

Dòi giải.

Ta có  $u_2 + u_{23} = 60 \Leftrightarrow u_1 + d + u_1 + 22d = 60 \Leftrightarrow 2u_1 + 23d = 60$ . Khi đó  $S_{24} = \frac{24}{2} (u_1 + u_{24}) = 12 (u_1 + u_1 + 23d) = 12.60 = 720$ . Chọn đáp án  $\bigcirc$ 

**CẦU 22.** Một cấp số cộng có 6 số hạng. Biết rằng tổng của số hạng đầu và số hạng cuối bằng 17, tổng của số hạng thứ hai và số hạng thứ tư bằng 14. Tìm công sai d của câp số cộng đã cho.

$$\mathbf{A} d = 2.$$

$$\mathbf{B}$$
  $d=-3$ .

$$\mathbf{C}$$
 $d=4$ .

$$\mathbf{D}$$
) $d=5$ .

Dòi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 + u_6 = 17 \\ u_2 + u_4 = 14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2u_1 + 5d = 17 \\ 2u_1 + 6d = 14 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 16 \\ d = -3 \end{cases}.$$

**CÂU 23.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  thỏa mãn  $\begin{cases} u_7 - u_3 = 8 \\ u_2 u_7 = 75 \end{cases}$ . Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho.

$$\mathbf{C}d = 2.$$

Ta có 
$$\begin{cases} u_7 - u_3 = 8 \\ u_2 u_7 = 75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 6d - u_1 - 2d = 8 \\ (u_1 + d)(u_1 + 6d) = 75 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = 2 \\ (u_1 + 2)(u_1 + 12) = 75 \end{cases}.$$

**CÂU 24.** Ba góc của một tam giác vuông tạo thành cấp số cộng. Hai góc nhọn của tam giác có số đo (độ) là  $\triangle 20^{\circ}$  và  $70^{\circ}$ .

$$\bigcirc$$
 30° và 60°.

Dòi giải.

Ba góc A, B, C của một tam giác vuông theo thứ tự đó (A < B < C) lập thánh cấp số cộng nên C = 90, C + A = 2B.

Ta có 
$$\begin{cases} A+B+C=180 \\ A+C=2B \\ C=90 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A=30 \\ B=60. \\ C+90 \end{cases}$$

**CÂU 25.** Một tam giác vuông có chu vi bằng 3 và độ dài các cạnh lập thành một cấp số cộng. Độ dài các cạnh của tam giác đó là

$$\frac{1}{2}$$
; 1;  $\frac{3}{2}$ .

**B** 
$$\frac{1}{3}$$
; 1;  $\frac{5}{3}$ .

$$\bigcirc \frac{3}{4}; 1; \frac{5}{4}.$$

$$\bigcirc \frac{1}{4}; 1; \frac{7}{4}.$$

Ba cạnh a,b,c,(a < b < c) của một tam giác theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng.

Ta có 
$$\begin{cases} a^2 + b^2 = c^2 \\ a + b + c = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = c^2 \\ 3b = 3 \\ a + c = 2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + b^2 = c^2 \\ b = 1 \\ a = 2 - c \end{cases}$$

Từ đây suy ra  $a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow (2 - c)^2 + 1 = c^2 \Leftrightarrow c = \frac{5}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{4} \\ b = 1 \end{cases}$ .

CÂU 26. Một rạp hát có 30 dãy ghế, dãy đầu tiên có 25 ghế. Mỗi dãy sau có hơn dãy trước 3 ghế. Hỏi rạp hát có tất cả bao nhiêu ghế?

(A) 1635.

(**B**)1792.

 $(\mathbf{C})2055.$ 

 $(\mathbf{D})3125.$ 

🗩 Lời giải.

Số ghế của mỗi dãy (bắt đầu từ dãy đầu tiên) theo thứ tự đó lập thành một cấp số cộng có 30 số hạng có công sai d=3 và

Tổng số ghế là  $S_{30} = 30u_1 + \frac{30.29}{2}d = 2055.$ 

Chon đáp án  $\overline{\mathbb{C}}$ .

**CÂU 27.** Người ta trồng 3003 cây theo một hình tam giác như sau: hàng thứ nhất trồng 1 cây, hàng thứ hai trồng 2 cây, hàng thứ ba trồng 3 cây,... .Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng cây?

(A) 73.

(**B**)75.

(C)77.

(**D**)79.

# Dèi giải.

Số cây mỗi hàng (bắt đầu từ hàng thứ nhất) lập thành một cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 1, d = 1$ . Giả sử có n hàng cây thì  $u_1 + u_2 + \dots + u_n = S_n.$ 

Ta có  $S_n = 1.n + \frac{n(n-1)}{2}.1 = 3003 \Leftrightarrow n = 77.$ 

CÂU 28. Một chiếc đồng hồ đánh chuông, kể từ thời điểm 0 (giờ) thì sau mỗi giờ thì số tiếng chuông được đánh đúng bằng

số giờ mà đồng hồ chỉ tại thời điểm đánh chuông. Hỏi một ngày đồng hồ đó đánh bao nhiêu tiếng chuông?

**(C)**300.

# 🗩 Lời giải.

Kể từ lúc 1 (giờ) đến 24 (giờ) số tiếng chuông được đánh lập thành cấp số cộng có 24 số hạng với  $u_1 = 1$ , công sai d = 1. Vậy số tiếng chuông được đánh trong 1 ngày là  $S_{24} = 1.24 + \frac{24.23}{2}.1 = 300.$ 

Chon đáp án (C).....

CAU 29. Trên một bàn cờ có nhiều ô vuông, người ta đặt 7 hạt dẻ vào ô đầu tiên, sau đó đặt tiếp vào ô thứ hai số hạt nhiều hơn ô thứ nhất là 5, tiếp tục đặt vào ô thứ ba số hạt nhiều hơn ô thứ hai là 5,... và cứ thế tiếp tục đến ô thứ n. Biết rằng đặt hết số ô trên bàn cờ người ta phải sử dụng 25450 hạt. Hỏi bàn cờ đó có bao nhiêu ô vuông?

(A) 98.

(**B**)100.

**(C)**102.

# 🗩 Lời giải.

Số hạt để trên mỗi ô (bắt đầu từ ô thứ nhất) theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 7, d = 5$ . Gọi n là số ô trên

bàn cờ thì  $u_1+u_2+\ldots+u_n=S_n$ . Ta có  $S_n=25450\Leftrightarrow 7n+\frac{n(n-1)}{2}.7=25450\Leftrightarrow n=100$ .

Chọn đáp án (B).....

CAU 30. Một gia đình cần khoan một cái giếng để lấy nước. Họ thuê một đội khoan giếng nước đến để khoan giếng nước. Biết giá của mét khoan đầu tiên là 80.000 đồng, kể từ mét khoan thứ 2 giá của mỗi mét khoan tăng thêm 5000 đồng so với giá của mét khoan trước đó. Biết cần phải khoan sâu xuống 50 mét mới có nước. Vậy hỏi phải trả bao nhiêu tiền để khoan

cái giếng đó? (A) 5.250.000 đồng.

(**B**)10.125.000 đồng.

(**c**)4.00.000 đồng.

(**D**)4.245.000 đồng.

# Lời giái.

Giá tiền khoang mỗi mét (bắt đầu từ mét đầu tiên) lập thành cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_1 = 80000, d = 5000$ . Do cần khoang 50 mét nên tổng số tiền cần trả là  $S_{50} = 80000.50 + \frac{50.49}{2}.5000 = 10125000.$ 

Chọn đáp án (B)..... CÂU 31. Một cấp số nhân có hai số hạng liên tiếp là 16 và 36. Số hạng tiếp theo là

(A) 720.

# 🗩 Lời giải.

Ta có cấp số nhân  $(u_n)$  có  $\begin{cases} u_n = 36 \\ u_{n+1} = 36 \end{cases} \Rightarrow q = \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{9}{4}.$  Từ đây suy ra  $u_{n+2} = u_{n+1}.q = 36.\frac{9}{4} = 81.$ 

**CÂU 32.** Tìm x để các số 2; 8; x; 128 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

(A)x = 14.

**(B)**x = 32.

 $(\mathbf{C})x = 64.$ 

 $(\mathbf{D})x = 68.$ 

# 🗩 Lời giải.

Cấp số nhân2; 8; x; 128 theo thứ tự đó sẽ là  $u_1, u_2, u_3, u_4$ .

Ta có  $\begin{cases} \frac{u_2}{u_1} = \frac{u_3}{u_2} \\ \frac{u_3}{u_2} = \frac{u_4}{u_2} \\ \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{8}{2} = \frac{x}{8} \\ \frac{128}{x} = \frac{x}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 32 \\ x^2 = 1024 \end{cases} \Rightarrow x = 32.$ 

**CÂU 33.** Tìm tất cả giá trị của x để ba số 2x - 11; x; 2x + 1 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân.

$$\mathbf{C}x = \pm\sqrt{3}$$

🗩 Lời giải.

Cấp số nhân 2x-1; x; 2x+1, suy ra  $(2x-1)(2x+1)=x^2 \Leftrightarrow x=\pm \frac{1}{\sqrt{s}}$ 

**CÂU 34.** Với giá trị x, y nào dưới đây thì các số hạng lần lượt là -2; x; -18; y theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân?

$$\begin{cases} x = 6 \\ y = -54 \end{cases}$$

$$\bigcirc \begin{cases} x = -6 \\ y = -54 \end{cases}.$$

🗩 Lời giải.

Cấp số nhân 
$$-2; x; -18; y$$
, suy ra 
$$\begin{cases} \frac{x}{-2} = \frac{-18}{x} \\ \frac{-18}{x} = \frac{y}{-18} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 6 \\ y = \pm 54 \end{cases}$$
. Vậy  $(x, y) = (6; 54)$  hoặc  $(x; y) = (-6; -54)$ .

$$\mathbf{B}$$
  $2x+1$ .

**CÂU 35.** Hai số hạng đầu của của một cấp số nhân là 
$$2x + 1$$
 và  $4x^2 - 1$ . Số hạng thứ ba của cấp số nhân là. **(a)**  $2x - 1$ . **(b)**  $8x^3 - 4x^2 - 2x + 1$ . **(c)**  $8x^3 + 4x^2 - 2x - 1$ .

$$(\mathbf{D})^{3}8x^{3} + 4x^{2} - 2x - 1$$

🗭 Lời giải.

Công bội của cấp số nhân là  $q = \frac{4x^2 - 1}{2x + 1} = 2x - 1$ . Vậy số hạng thứ ba của cấp số nhân là  $(4x^2 - 1)(2x - 1) = 8x^3 - 4x^2 - 2x + 1$ .

**CÂU 36.** Trong các dãy số  $(u_n)$  cho bởi số hạng tổng quát nu sau, dãy số nào là một cấp số nhân

$$\mathbf{A}u_n = \frac{1}{3^{n-2}}.$$

**(a**) 
$$u_n = \frac{1}{3^n} - 1.$$
 **(c**)  $u_n = n + \frac{1}{3}.$ 

$$\mathbf{c}u_n = n + \frac{1}{3}.$$

$$\bigcirc u_n = n^2 - \frac{1}{3}$$

Dãy 
$$u_n = \frac{1}{3^{n-2}} = 3\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$$
 là cấp số nhân có  $u_1 = 3, q = \frac{1}{3}$ .

**CÂU 37.** Một cấp số nhân có 6 số hạng, số hạng đầu bằng 2 và số hạng thứ sáu bằng 486. Tìm công bội q của cấp số nhân đã cho.

$$(\mathbf{A})q = 3.$$

$$\mathbf{C}q=2.$$

$$\bigcirc q = -2$$

🗩 Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_1=2 \\ u_6=486 \end{cases} \Rightarrow u_6=u_1q^5 \Leftrightarrow 486=2.q^5 \Leftrightarrow q=3.$$

**CÂU 38.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -3$  và  $q = \frac{2}{3}$  Mệnh đề nào sau đây đúng.

$$\mathbf{A} u_5 = -\frac{27}{16}.$$

$$\mathbf{B}$$
  $u_5 = -\frac{16}{27}$ .

$$\mathbf{c}u_5 = \frac{16}{27}.$$

$$\mathbf{D}u_5 = \frac{27}{16}.$$

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 = -3 \\ q = \frac{2}{3} \end{cases} \Rightarrow u_5 = u_1 \cdot q^4 = -3 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^4 = -\frac{16}{27}.$$

Chon đáp án (B).....

**CÂU 39.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1=3$  và q=-2. Số 192 là số hạng thứ mấy của cấp số nhân đã cho.

(A) 5. **(C)**7. (**B**)6.

(D)Không là số hạng của cấp số đã cho.

🗩 Lời giải.

Ta có 
$$u_n = u_1.q^{n-1} \Leftrightarrow 192 = 3.(-2)^{n-1} \Leftrightarrow n = 7.$$

CÂU 40. Một cấp số nhân có công bội bằng 3 và số hạng đầu bằng 5. Biết số hạng chính giữa là 32805. Hỏi cấp số nhân đã cho có bao nhiêu số hạng?

(**A**) 18.

**(C)**16.

 $(\mathbf{D})9.$ 

# 🗩 Lời giải.

Ta có  $u_n = u_1.q^{n-1} \Leftrightarrow 32805 = 3.5^{n-1} \Leftrightarrow n = 9$ . Vậy  $u_9$  là số hạng chính giữa của cấp số nhân, nên cấp số nhân đã cho có 17 số hạng.

**CÂU 41.** Cho cấp số nhân  $(u_n)$  có  $u_1 = -3$  và q = -2. Tính tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đã cho.

$$\mathbf{A}$$
 $S_{10} = -511.$ 

$$\mathbf{B}$$
 $S_{10} = -1025.$ 

$$(\mathbf{C})S_{10} = 1025.$$

$$(\mathbf{D})S_{10} = 1023.$$

Dòi giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 = -3 \\ q = -2 \end{cases} \Rightarrow S_{10} = u_1. \frac{q^n - 1}{q - 1} = (-3). \frac{(-2)^{10} - 1}{-2 - 1} = 1023.$$

Chọn đáp án (D).

**CÂU 42.** Cho cấp số nhân có các số hạng lần lượt là 1;4;16;64;... Gọi  $S_n$  là tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó. Mệnh đề nào sau đây đúng?

**B**
$$S_n = \frac{n(1+4^{n-1})}{2}$$
. **C** $S_n = \frac{4^n-1}{3}$ .

$$\mathbf{C}S_n = \frac{4^n - 1}{3}.$$

$$\bigcirc S_n = \frac{4(4^n - 1)}{3}.$$

D Lời giải.

Ta có 
$$\begin{cases} u_1 = -3 \\ q = 4 \end{cases} \Rightarrow S_n = u_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} = \frac{4^n - 1}{3}.$$

Chon đáp án (C)

CÁU 43. Số hạng thứ hai, số hạng đầu và số hạng thứ ba của một cấp số cộng với công sai khác 0 theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân với công bội q. Tìm q.

$$\bigcirc q=2.$$

$$\mathbf{B}$$
 $q=-2.$ 

$$\bigcirc q = \frac{3}{2}.$$

Dèi giải.

Giả sử ba số hạng a;b;c lập thành cấp số cộng thỏa yêu cầu, khi đó b;a;c theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân công bội q.

Ta có 
$$\begin{cases} a+c=2b \\ a=bq \\ c=bq^2 \end{cases} \Rightarrow bq+bq^2=2b \Leftrightarrow \begin{cases} b=0 \\ q^2+q-2=0 \end{cases}.$$

Nếu  $b=0 \Rightarrow a=b=c=0$ nên a;b;c là cấp số cộng công sai d=0 (vô lí).

Nếu 
$$q^2+q-2=0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} q=1\\ q=-2 \end{bmatrix}$$
. Nếu  $q=1 \Rightarrow a=b=c$  (vô lí), do đó  $q=-2$ .

Chon đáp án (B)...

**CÂU 44.** Cho bố số a, b, c, d biết rằng a, b, c theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân công bội q > 1, còn b, c, d theo thứ tự đó lập thành cấp số cộng. Tìm q biết rằng a+d=14 và b+c=12.

$$\mathbf{B} q = \frac{19 + \sqrt{73}}{24}.$$

$$\mathbf{C}$$
  $q = \frac{20 + \sqrt{73}}{24}$ .

🗩 Lời giải.

Giả sử a, b, c lập thành cấp số cộng công bội q. Khi đó theo giả thiết ta có

Gia su 
$$a, b, c$$
 tạp thaim cap so cộng công  $b = aq$ 

$$c = aq^{2}$$

$$b + d = 2c \Rightarrow \begin{cases} aq + d = aq^{2}, & (1) \\ a + d = 14, & (2). \\ a (q + q^{2}) = 12, & (3) \end{cases}$$

$$c + d = 12$$

Nếu  $q = 0 \Rightarrow b = c = d = 0$  (vô lý).

Nếu 
$$q = -1 \Rightarrow b = -a = -c \Rightarrow b + c = 0$$
 (vô lý).

Vậy  $q \neq 0, q \neq -1$ , từ (2) và (3), ta có d = 14 - a và  $a = \frac{12}{q + q^2}$ , thay vào (1), ta được

$$\frac{12q}{q+q^2} + \frac{14q^2 + 14q - 12}{q+q^2} = \frac{24q^3}{q+q^2} \Leftrightarrow 12q^3 - 7q^2 - 13q + 6 = 0 \Leftrightarrow q = \frac{19 \pm \sqrt{73}}{24}.$$

Mà q > 1 nên  $q = \frac{19 + \sqrt{73}}{24}$ 

Chon đáp án (B).....

**CÂU 45.** Gọi  $S=1+11+111+\cdots+111\ldots 1$  (n số 1) thì S nhận giá trị nào sau đây?

**B**
$$S = 10 \cdot \frac{10^n - 1}{21}$$
.

$$\mathbf{C}S = 10 \cdot \frac{10^n - 1}{81} - 1$$

Ta có 
$$S = \frac{1}{9}(9 + 99 + 999 + \dots + 999 \dots 9) = \frac{1}{9}(10 + 100 + 1000 + \dots + 100 \dots 0 - n) = \frac{1}{9}\left[10 \cdot \frac{10^n - 1}{9} - 1\right].$$

**CÂU 46.** Biết rằng 
$$S = 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 3^2 + \dots + 11.3^{10} = a + \frac{21 \cdot 3^b}{4}$$
. Tính  $P = a + \frac{b}{4}$ .

$$\mathbf{A}P = 1.$$

$$\mathbf{B}$$
 $P=2$ 

$$\mathbf{C}P = 3.$$

### Dòi giải.

Từ giả thiết suy ra  $3S=3+2\cdot 3^2+3\cdot 3^3+\cdots+11\cdot 3^{11}.$ 

Do dó 
$$-2S = S - 3S = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^{10} - 10.3^{11} = \frac{1 - 3^{11}}{1 - 3} - 11 \cdot 3^{11} \Rightarrow S = \frac{1}{4} + \frac{21}{4} \cdot 3^{11}.$$

Vậy 
$$a = \frac{1}{4}, b = 11$$
, suy ra  $P = 3$ .

Chọn đấp án (C)......□

**CÂU 47.** Một cấp số nhân có ba số hạng là a,b,c (theo thứ tự đó) trong đó các số hạng đều khác 0 và công bội  $q \neq 0$ . Mệnh đề nào sau đây là đúng.

$$\mathbf{B} \frac{1}{b^2} = \frac{1}{ac}.$$

$$\bigcirc \frac{1}{c^2} = \frac{1}{ba}.$$

Ta có  $ac = b^2 \Rightarrow \frac{1}{b^2} = \frac{1}{ac}$ 

CAU 48. Bốn góc của một tứ giác tạo thành cấp số nhân và góc lớn nhất gấp 27 lần góc nhỏ nhất. Tổng của góc lớn nhất và góc bé nhất bằng.

(**B**)102°.



(**D** $)168^{\circ}.$ 

### Dèi giải.

Giả sử 4 góc A, B, C, D (với A < B < C < D) theo thứ tự đó lập thành cấp số nhân thỏa yêu cầu với công bội q.

Ta có 
$$\begin{cases} A+B+C+D=360 \\ D=27A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A\left(1+q+q^2+q^3\right)=360 \\ Aq^3=27A \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} q=3 \\ A=9 \\ D=243 \end{cases} \Rightarrow A+D=252.$$
Chan đến ến  $C$ 

CÂU 49. Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của để tháp (có diện tích là  $12288m^2$ ). Tính diện tích mặt trên cùng.

(A)  $6m^2$ .

(**B**) $8m^2$ .

 $(\mathbf{C})10m^2$ .

## Lời giải.

Diện tích bề mặt của mỗi tầng (kể từ 1) lập thành một cấp số nhân có công bội  $q = \frac{1}{2}$  và  $u_1 = \frac{12288}{2} = 6144$ . Khi đó diện

tích mặt trên cùng là  $u_{11}=u_1\cdot q^{10}=6144\cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10}=6.$ 

CÂU 50. Một du khách vào chuồng đua ngưa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Hỏi du khác trên thắng hay thua bao nhiêu?

Chọn đáp án <mark>(A)</mark>......□

(A) Hoà vốn.

(**B**) Thua 20000 đồng.

(**C**) Thắng 20000 đồng.

(**D**)Thua 40000 đồng.

### 🗩 Lời giải.

Số tiền du khác đặt trong mỗi lần (kể từ lần đầu) là một cấp số nhân có  $u_1 = 20000$  và công bội q = 2. Du khách thua trong 9 lần đầu tiên nên tổng số tiền thua là  $S_9 = u_1 \cdot \frac{q^9 - 1}{q - 1} = 20000 \cdot \frac{2^9 - 1}{2 - 1} = 10220000.$ 

Số tiền mà du khách thắng trong lần thứ 10 là  $u_{10} = u_1 \cdot q^9 = 20000 \cdot 2^9 = 10240000$ .

Ta có  $u_{10} - S_9 = 20000 > 0$  nên du khách thắng 20000.

Chọn đấp án C.

# 

	Bài 5.	Dãy số	1
	A	Tóm tắt lý thuyết	1
	B	Các dạng toán thường gặp	
		► Dạng 1.Số hạng tổng quát, biểu diễn dãy số	
		Dạng 2.Tìm số hạng cụ thể của dãy số	
		Dạng 3.Xét tính tăng giảm của dãy số	4
		Dạng 4.Xét tính bị chặn của dãy số	6
		Dạng 5.Toán thực tế về dãy số	8
	Bài 6.	Cấp số cộng	9
	A	Tóm tắt lý thuyết	9
	B	Các dạng toán thường gặp	9
		Dạng 1.Nhận diện cấp số cộng, công sai d	9
		Dạng 2.Số hạng tổng quát của cấp số cộng	11
		Dạng 3.Tìm số hạng cụ thể trong cấp số cộng	
		Dạng 4.Các bài toán thực tế	14
	Bài 7.	Cấp số nhân	16
	A	Tóm tắt lý thuyết	16
	B	Các dạng toán thường gặp	16
		Dạng 1.Nhận diện cấp số nhân, công bội q	17
		Dạng 2.Số hạng tổng quát của cấp số nhân	
		Dạng 3.Tìm số hạng cụ thể của CSN	
		Dạng 4.Tìm điều kiện để một dãy số lập thành CSN	
		Dạng 5. Tính tổng của cấp số nhân	
		Dạng 6.Kết hợp cấp số cộng và cấp số nhân	
		Dạng 7.Bài toán thực tế	27
LỜI GIẢI (	CHI TIÊT		34
	Bài 5.	Dãy số	34
	A	Tóm tắt lý thuyết	34
	B	Các dạng toán thường gặp	34
		► Dạng 1.Số hạng tổng quát, biểu diễn dãy số	
		Dạng 2.Tìm số hạng cụ thể của dãy số	36
		Dạng 3.Xét tính tăng giảm của dãy số	40
		Dạng 4.Xét tính bị chặn của dãy số	45
		► Dạng 5.Toán thực tế về dãy số	51
	Bài 6.	Cấp số cộng	54
	A	Tóm tắt lý thuyết	54
	B	Các dạng toán thường gặp	54
		Dạng 1.Nhận diện cấp số cộng, công sai d	54
		Dạng 2.Số hạng tổng quát của cấp số cộng	57
		Dạng 3.Tìm số hạng cụ thể trong cấp số cộng	
		Dạng 4.Các bài toán thực tế	66
1117	VII NGOC BI	liót -	

Bài 7.	Cấp số nhân	73
A	Tóm tắt lý thuyết	73
B	Các dạng toán thường gặp	73
	Dạng 1.Nhận diện cấp số nhân, công bội q	73
	Dạng 2.Số hạng tổng quát của cấp số nhân	77
	Dạng 3. Tìm số hạng cụ thể của CSN	81
	Dạng 4.Tìm điều kiện để một dãy số lập thành CSN	
	Dạng 5. Tính tổng của cấp số nhân	91
	Dạng 6.Kết hợp cấp số cộng và cấp số nhân	
	► Dạng 7.Bài toán thực tế	

