


☑  $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$  với  $(\alpha \neq 0^\circ, 180^\circ)$ .

Góc $\alpha$	$0^\circ$	$90^\circ$	$180^\circ$
$\sin \alpha$	+		+
$\cos \alpha$	+		−
$\tan \alpha$	+		−
$\cot \alpha$	+		−

$\alpha$	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$120^\circ$	$135^\circ$	$150^\circ$	$180^\circ$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	//	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot \alpha$	//	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	//

☑  $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$  với  $(0^\circ < \alpha < 180^\circ, \alpha \neq 90^\circ)$ .



## QUICK NOTE



## 1. Ví dụ minh họa

### VÍ DỤ 1.

- a) Cho  $\sin \alpha = \frac{1}{3}$  với  $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ . Tính  $\cos \alpha$  và  $\tan \alpha$ .
- b) Cho  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$  và  $\sin \alpha > 0$ . Tính  $\sin \alpha$  và  $\cot \alpha$ .
- c) Cho  $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$ , tính giá trị lượng giác còn lại.

### VÍ DỤ 2.

- a) Cho  $\cos \alpha = \frac{3}{4}$  với  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ . Tính  $A = \frac{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$ .
- b) Cho  $\tan \alpha = \sqrt{2}$ . Tính  $B = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin^3 \alpha + 3 \cos^3 \alpha + 2 \sin \alpha}$ .

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho góc  $\alpha$ ,  $0^\circ < \alpha < 180^\circ$  thỏa mãn  $\cos \alpha = \frac{-1}{3}$ .

- a) Tính  $\tan \alpha$ .
- b) Tính giá trị của biểu thức  $P = \tan \alpha + 2 \cot \alpha$ .

**BÀI 2.** Cho góc  $\alpha$  thỏa mãn  $0^\circ < \alpha < 180^\circ$  và  $\tan \alpha = 2$ . Tính giá trị của các biểu thức sau

- a)  $G = 2 \sin \alpha + \cos \alpha$ ;
- b)  $H = \frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}$ .

**BÀI 3.** Cho góc  $\alpha$  với  $90^\circ < \alpha < 180^\circ$  thỏa mãn  $\sin \alpha = \frac{3}{4}$ . Tính giá trị của biểu thức  $F = \frac{\tan \alpha + 2 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$ .

**BÀI 4.** Cho góc  $\alpha$  thỏa mãn  $0^\circ < \alpha < 180^\circ$  và  $\tan \alpha = \sqrt{2}$ . Tính giá trị của các biểu thức sau

$$K = \frac{\sin^3 \alpha + \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha - 4 \cos^3 \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}.$$

## C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

**CÂU 1.** Giá trị của  $\cos 60^\circ + \sin 30^\circ$  bằng bao nhiêu?

- ☐ A  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ . ☐ B  $\sqrt{3}$ . ☐ C  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ . ☐ D 1.

**CÂU 2.** Giá trị của  $\tan 30^\circ + \cot 30^\circ$  bằng bao nhiêu?

- ☐ A  $\frac{4}{\sqrt{3}}$ . ☐ B  $\frac{1 + \sqrt{3}}{3}$ . ☐ C  $\frac{2}{\sqrt{3}}$ . ☐ D 2.

**CÂU 3.** Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **sai**?

- ☐ A  $\sin 0^\circ + \cos 0^\circ = 1$ . ☐ B  $\sin 90^\circ + \cos 90^\circ = 1$ .
- ☐ C  $\sin 180^\circ + \cos 180^\circ = -1$ . ☐ D  $\sin 60^\circ + \cos 60^\circ = 1$ .

**CÂU 4.** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- ☐ A  $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ$ . ☐ B  $\cos 60^\circ = \sin 120^\circ$ .
- ☐ C  $\cos 30^\circ = \sin 120^\circ$ . ☐ D  $\sin 60^\circ = -\cos 120^\circ$ .

**CÂU 5.** Đẳng thức nào sau đây **sai**?

- ☐ A  $\sin 45^\circ + \sin 45^\circ = \sqrt{2}$ . ☐ B  $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ = 1$ .
- ☐ C  $\sin 60^\circ + \cos 150^\circ = 0$ . ☐ D  $\sin 120^\circ + \cos 30^\circ = 0$ .

**CÂU 6.** Giá trị  $\cos 45^\circ + \sin 45^\circ$  bằng bao nhiêu?

- ☐ A 1. ☐ B  $\sqrt{2}$ . ☐ C  $\sqrt{3}$ . ☐ D 0.

### QUICK NOTE

QUICK NOTE

**CÂU 7.** Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **đúng**?

- (A)  $\sin(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ . (B)  $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$ .  
(C)  $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ . (D)  $\sin(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ .

**CÂU 8.** Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **sai**?

- (A)  $\sin 0^\circ + \cos 0^\circ = 0$ . (B)  $\sin 90^\circ + \cos 90^\circ = 1$ .  
(C)  $\sin 180^\circ + \cos 180^\circ = -1$ . (D)  $\sin 60^\circ + \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$ .

**CÂU 9.** Cho  $\alpha$  là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là **đúng**?

- (A)  $\sin \alpha < 0$ . (B)  $\cos \alpha > 0$ . (C)  $\tan \alpha < 0$ . (D)  $\cot \alpha > 0$ .

**CÂU 10.** Giá trị của  $E = \sin 36^\circ \cos 6^\circ - \sin 126^\circ \cos 84^\circ$  là

- (A)  $\frac{1}{2}$ . (B)  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ . (C) 1. (D) -1.

**CÂU 11.** Giá trị của biểu thức  $A = \sin^2 51^\circ + \sin^2 55^\circ + \sin^2 39^\circ + \sin^2 35^\circ$  là

- (A) 3. (B) 4. (C) 1. (D) 2.

**CÂU 12.** Giá trị của biểu thức  $A = \tan 1^\circ \tan 2^\circ \tan 3^\circ \cdots \tan 88^\circ \tan 89^\circ$  là

- (A) 0. (B) 2. (C) 3. (D) 1.

**CÂU 13.** Tổng  $\sin^2 2^\circ + \sin^2 4^\circ + \sin^2 6^\circ + \cdots + \sin^2 84^\circ + \sin^2 86^\circ + \sin^2 88^\circ$  bằng

- (A) 21. (B) 23. (C) 22. (D) 24.

**CÂU 14.** Giá trị của  $A = \tan 5^\circ \cdot \tan 10^\circ \cdot \tan 15^\circ \cdots \tan 80^\circ \cdot \tan 85^\circ$  là

- (A) 2. (B) 1. (C) 0. (D) -1.

**CÂU 15.** Giá trị của  $B = \cos^2 73^\circ + \cos^2 87^\circ + \cos^2 3^\circ + \cos^2 17^\circ$  là

- (A)  $\sqrt{2}$ . (B) 2. (C) -2. (D) 1.

**CÂU 16.** Cho  $\cos x = \frac{1}{2}$ . Tính biểu thức  $P = 3 \sin^2 x + 4 \cos^2 x$

- (A)  $\frac{13}{4}$ . (B)  $\frac{7}{4}$ . (C)  $\frac{11}{4}$ . (D)  $\frac{15}{4}$ .

**CÂU 17.** Biết  $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ . Giá trị đúng của biểu thức  $P = \sin^2 \alpha + 3 \cos^2 \alpha$  là

- (A)  $\frac{1}{3}$ . (B)  $\frac{10}{9}$ . (C)  $\frac{11}{9}$ . (D)  $\frac{4}{3}$ .

**CÂU 18.** Cho biết  $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ . Tính  $\cot \alpha$ .

- (A)  $\cot \alpha = 2$ . (B)  $\cot \alpha = \sqrt{2}$ . (C)  $\cot \alpha = \frac{1}{4}$ . (D)  $\cot \alpha = \frac{1}{2}$ .

**CÂU 19.** Cho biết  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$  và  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ . Tính  $\tan \alpha$ ?

- (A)  $\frac{5}{4}$ . (B)  $-\frac{5}{2}$ . (C)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ . (D)  $-\frac{\sqrt{5}}{2}$ .

**CÂU 20.** Cho  $\alpha$  là góc tù và  $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ . Giá trị của biểu thức  $3 \sin \alpha + 2 \cos \alpha$  là

- (A) 3. (B)  $-\frac{9}{13}$ . (C) -3. (D)  $\frac{9}{13}$ .

**CÂU 21.** Cho biết  $\sin \alpha + \cos \alpha = a$ . Giá trị của  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$  bằng bao nhiêu?

- (A)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = a^2$ . (B)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = 2a$ .  
(C)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1-a^2}{2}$ . (D)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{a^2-1}{2}$ .

**CÂU 22.** Cho biết  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$ . Tính giá trị của biểu thức  $E = \frac{\cot \alpha + 3 \tan \alpha}{2 \cot \alpha + \tan \alpha}$ ?

- (A)  $-\frac{19}{13}$ . (B)  $\frac{19}{13}$ . (C)  $\frac{25}{13}$ . (D)  $-\frac{25}{13}$ .

**CÂU 23.** Cho biết  $\cot \alpha = 5$ . Tính giá trị của  $E = 2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1$ ?

- (A)  $\frac{10}{26}$ . (B)  $\frac{100}{26}$ . (C)  $\frac{50}{26}$ . (D)  $\frac{101}{26}$ .

## QUICK NOTE

**CÂU 24.** Cho  $\cot \alpha = \frac{1}{3}$ . Giá trị của biểu thức  $A = \frac{3 \sin \alpha + 4 \cos \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}$  là

- Ⓐ  $-\frac{15}{13}$ .      Ⓑ  $-13$ .      Ⓒ  $\frac{15}{13}$ .      Ⓓ  $13$ .

**CÂU 25.** Cho biết  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$ . Giá trị của biểu thức  $E = \frac{\cot \alpha - 3 \tan \alpha}{2 \cot \alpha - \tan \alpha}$  bằng bao nhiêu?

- Ⓐ  $-\frac{25}{3}$ .      Ⓑ  $-\frac{11}{13}$ .      Ⓒ  $-\frac{11}{3}$ .      Ⓓ  $-\frac{25}{13}$ .

**CÂU 26.** Biết  $\sin a + \cos a = \sqrt{2}$ . Hỏi giá trị của  $\sin^4 a + \cos^4 a$  bằng bao nhiêu?

- Ⓐ  $\frac{3}{2}$ .      Ⓑ  $\frac{1}{2}$ .      Ⓒ  $-1$ .      Ⓓ  $0$ .

**CÂU 27.** Cho  $\tan \alpha + \cot \alpha = m$ . Tìm  $m$  để  $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha = 7$ .

- Ⓐ  $m = 9$ .      Ⓑ  $m = 3$ .      Ⓒ  $m = -3$ .      Ⓓ  $m = \pm 3$ .

**CÂU 28.** Cho biết  $3 \cos \alpha - \sin \alpha = 1$ ,  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$  Giá trị của  $\tan \alpha$  bằng

- Ⓐ  $\tan \alpha = \frac{4}{3}$ .      Ⓑ  $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ .      Ⓒ  $\tan \alpha = \frac{4}{5}$ .      Ⓓ  $\tan \alpha = \frac{5}{4}$ .

**CÂU 29.** Cho biết  $2 \cos \alpha + \sqrt{2} \sin \alpha = 2$ ,  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ . Tính giá trị của  $\cot \alpha$ .

- Ⓐ  $\cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{4}$ .      Ⓑ  $\cot \alpha = \frac{\sqrt{3}}{4}$ .      Ⓒ  $\cot \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$ .      Ⓓ  $\cot \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**CÂU 30.** Cho biết  $\cos \alpha + \sin \alpha = \frac{1}{3}$ . Giá trị của  $P = \sqrt{\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha}$  bằng bao nhiêu?

- Ⓐ  $P = \frac{5}{4}$ .      Ⓑ  $P = \frac{7}{4}$ .      Ⓒ  $P = \frac{9}{4}$ .      Ⓓ  $P = \frac{11}{4}$ .

**CÂU 31.** Cho biết  $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ . Giá trị của  $P = \sqrt{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha}$  bằng bao nhiêu?

- Ⓐ  $P = \frac{\sqrt{15}}{5}$ .      Ⓑ  $P = \frac{\sqrt{17}}{5}$ .      Ⓒ  $P = \frac{\sqrt{19}}{5}$ .      Ⓓ  $P = \frac{\sqrt{21}}{5}$ .

QUICK NOTE


## Bài 2. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

### A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

#### 1. Định lý cosin

Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = a$ ,  $AC = b$  và  $AB = c$ .

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \Rightarrow \cos A = \dots\dots\dots$
- $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cdot \cos B \Rightarrow \cos B = \dots\dots\dots$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C \Rightarrow \cos A = \dots\dots\dots$




#### 2. Định lý sin

Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $AB = c$  và  $R$  là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

**!** Ghi nhớ: Tỷ lệ "cạnh chia sin góc đối" thì bằng nhau.



#### 3. Công thức tính diện tích tam giác

Gọi  $S$  là diện tích tam giác  $ABC$ . Ta có

- $S = \frac{1}{2}a \cdot h_a = \frac{1}{2}b \cdot h_b = \frac{1}{2}c \cdot h_c$ ,
- $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$ ,
- $S = \frac{abc}{4R}$ ,  $S = p \cdot r$ , (đọc thêm)
- $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ .

Trong đó:

- $h_a, h_b, h_c$  là độ dài đường cao lần lượt tương ứng với các cạnh  $BC, CA, AB$ .
- $R$  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.
- $r$  là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.
- $p = \frac{a+b+c}{2}$  là nửa chu vi tam giác.

### B. CÁC DẠNG TOÁN

1

#### Áp dụng định lý cos

Nhận dạng định lý:

- Cho tam giác biết trước độ dài hai cạnh và số đo của một góc.
- Cho tam giác biết trước độ dài ba cạnh.


#### 1. Ví dụ minh họa

**VÍ DỤ 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $b = 5$ ,  $c = 7$  và  $\cos A = \frac{3}{5}$ . Tính cạnh  $a$  và cosin các góc còn lại của tam giác đó.

**VÍ DỤ 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AC = 10\text{cm}$ ,  $BC = 16\text{cm}$  và  $C = 120^\circ$ , tính độ dài cạnh  $AB$ .

**!** Cho tam giác  $ABC$  có  $m_a, m_b, m_c$  lần lượt là các trung tuyến kẻ từ  $A, B, C$ . Ta có

$$\begin{aligned} \bullet m_a^2 &= \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4}. \\ \bullet m_b^2 &= \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4}. \\ \bullet m_c^2 &= \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4}. \end{aligned}$$




**VÍ DỤ 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 4$  cm,  $AC = 3$  cm và  $BC = 6$  cm. Tính độ dài trung tuyến kẻ từ  $C$  của tam giác  $ABC$ .

**VÍ DỤ 4.** Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = 3$ ,  $CA = 4$  và  $AB = 6$ . Tính cosin của góc có số đo lớn nhất của tam giác đã cho.

### VÍ DỤ 5.

Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí  $A$ , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc  $60^\circ$ . Tàu  $B$  chạy với tốc độ 20 hải lý một giờ. Tàu  $C$  chạy với tốc độ 15 hải lý một giờ. Hỏi sau hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lý?



**VÍ DỤ 6.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = c$ ;  $BC = a$ ;  $CA = b$ . Các cạnh  $a, b, c$  liên hệ với nhau bởi đẳng thức  $b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2)$ . Tính số đo góc  $\widehat{BAC}$ .

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{A} = 60^\circ$ ,  $AB = 6$ ,  $AC = 8$ . Tính  $BC$ .

**BÀI 2.** Cho tam giác  $ABC$  có các cạnh  $BC = 6$ ,  $CA = 4\sqrt{2}$ ,  $AB = 2$ . Tính  $\cos A$  và góc  $\widehat{A}$ .

**BÀI 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 6$  cm;  $AC = 5$  cm và  $\widehat{ACB} = 60^\circ$ . Tính  $BC$ .

**BÀI 4.** Tam giác  $ABC$  có  $b = 6$ ,  $c = 8$  và  $m_a = 5$ . Tính  $a$ ,  $\widehat{A}$ .

**BÀI 5.** Cho tam giác  $ABC$ , gọi  $l_a$  là độ dài đường phân giác trong kẻ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng  $l_a = \frac{bc \sin A}{(b+c) \sin \frac{A}{2}}$ .

**BÀI 6.** Hai lực  $\vec{f}_1$  và  $\vec{f}_2$  cho trước cùng tác dụng lên một vật và tạo thành góc nhọn  $(\vec{f}_1, \vec{f}_2) = \alpha$ . Hãy lập công thức tính cường độ của hợp lực  $\vec{F}$ .

2

### Áp dụng định lý sin

**Nhận dạng định lý:**


- Cho tam giác biết trước độ dài hai cạnh và số đo của một góc.
- Cho tam giác biết trước độ dài một cạnh và số đo của hai góc.
- Cho tam giác biết trước độ dài một cạnh, số đo góc đối diện và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

## 1. Ví dụ minh họa

**VÍ DỤ 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{A} = 120^\circ$  và  $BC = 10$  cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

### VÍ DỤ 2.

Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{A} = 40^\circ$ ,  $\widehat{B} = 55^\circ$  và  $AB = 100$ . Tính độ dài cạnh  $BC$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



### QUICK NOTE

# QUICK NOTE

**VÍ DỤ 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\frac{AB}{2} = \frac{BC}{3}$  và  $\hat{A} = 45^\circ$ . Tính các góc  $B, C$  của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**VÍ DỤ 4.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\hat{A} = 30^\circ$ ,  $\hat{B} = 50^\circ$  và bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 10 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác  $ABC$  (làm tròn đến hàng phần mười).

**VÍ DỤ 5.** Cho tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng  $\sin^2 A = \sin B \sin C$  khi và chỉ khi  $a^2 = bc$ .

**VÍ DỤ 6.** Cho tam giác  $ABC$ . Biết  $AB = 5$  cm,  $BC = 6$  cm và  $2 \sin A = \sin B + \sin C$ . Tính độ dài cạnh  $AC$ .

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\hat{B} = 70^\circ$  và  $AC = 15$  cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**BÀI 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\hat{B} = 30^\circ$ ,  $\hat{C} = 65^\circ$  và  $BC = 50$ . Tính độ dài cạnh  $AB$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**BÀI 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\frac{BC}{3} = \frac{AC}{5}$  và  $\hat{A} = 30^\circ$ . Tính các góc  $B, C$  của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).


**BÀI 4.** Cho tam giác  $ABC$  thỏa mãn  $a \sin B = c \sin A$ . Chứng minh rằng tam giác  $ABC$  cân.

**BÀI 5.** Cho tam giác  $ABC$  thỏa mãn  $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$ . Chứng minh rằng tam giác  $ABC$  vuông.

### BÀI 6.

Cho tam giác  $ABC$ . Gọi  $D$  là điểm thuộc miền trong tam giác  $ABC$  sao cho  $\widehat{BAD} = \widehat{CBD} = \widehat{ACD} = \varphi$ . Chứng minh rằng

$$\sin^3 \varphi = \sin(A - \varphi) \sin(B - \varphi) \sin(C - \varphi).$$



### 3


## Giải tam giác và ứng dụng

Giải tam giác là bài toán tìm độ dài tất cả các cạnh và độ lớn tất cả các góc của tam giác.

## 1. Ví dụ minh họa

### VÍ DỤ 1.


Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = 40$  cm,  $\hat{B} = 30^\circ$ ,  $\hat{C} = 45^\circ$ . Tính góc  $A$  và độ dài các cạnh  $AB, AC$  của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



**VÍ DỤ 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 25$ ,  $AC = 20$ ,  $\hat{A} = 120^\circ$ . Tính cạnh  $BC$  và các góc  $B, C$  của tam giác đó.

### VÍ DỤ 3.


Để đo chiều rộng  $AB$  của một khúc sông, người ta chọn điểm  $C$ . Sau đó, đo khoảng cách  $BC$ , các góc  $B$  và  $C$ . Biết rằng  $BC = 200$  m,  $\hat{B} = 107^\circ$ ,  $\hat{C} = 28^\circ$ . Tìm chiều rộng  $AB$  của khúc sông đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



### VÍ DỤ 4.




Để đo chiều cao  $CH$  của một tháp truyền hình, người ta chọn hai điểm quan sát  $A, B$  trên mặt đất (hình vẽ). Biết  $\widehat{CAH} = 51^\circ$ ,  $\widehat{CBH} = 66^\circ$  và  $AB = 75$  m, tính chiều cao của tháp.



### VÍ DỤ 5.

Trên ngọn đồi có một cái tháp cao 120 m. Đỉnh tháp  $B$  và chân tháp  $C$  nhìn điểm  $A$  ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng  $35^\circ$  và  $60^\circ$  so với phương thẳng đứng. Xác định chiều cao  $HA$  của ngọn đồi. (Làm tròn đến phần mười)




## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 8$ ,  $BC = 10$ ,  $AC = 15$ . Tính  $\widehat{A} + 2\widehat{C}$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**BÀI 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 15$  cm,  $AC = 21$  cm,  $\widehat{A} = 30^\circ$ . Tính cạnh  $BC$  và các góc  $B, C$  của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).


### BÀI 3.

Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 15$ ,  $AC = 12$ ,  $\widehat{A} = 60^\circ$ .  $M$  là điểm thuộc cạnh  $AB$  sao cho  $AM = 2BM$ . Tính cạnh  $CM$ , góc  $\widehat{BCM}$  và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $BCM$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).




### BÀI 4.

Để đo chiều rộng  $AB$  của một khúc sông, người ta chọn điểm  $C$ , đo khoảng cách  $BC$ , các góc  $B$  và  $C$ . Biết rằng  $BC = 250$  m,  $\widehat{B} = 104^\circ$ ,  $\widehat{C} = 31^\circ$ . Tìm chiều rộng  $AB$  của khúc sông đó (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).



### BÀI 5.

Để đo chiều cao  $CH$  của một tháp truyền hình, người ta chọn hai điểm quan sát  $A, B$  trên mặt đất (hình vẽ). Biết  $\widehat{CAH} = 54^\circ$ ,  $\widehat{CBH} = 68^\circ$  và  $AB = 80$  m, tính chiều cao của tháp (Làm tròn đến hàng đơn vị).



### QUICK NOTE

QUICK NOTE

4 Bài tập tổng hợp

## 1. Ví dụ minh họa

**VÍ DỤ 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\hat{A} = 60^\circ$  và  $AB = 8$  cm,  $AC = 5$  cm.

- Tính diện tích của tam giác  $ABC$ .
- Tính độ dài đường cao hạ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$ .
- Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ .

**VÍ DỤ 2.** Cho hình bình hành  $ABCD$  có  $AB = 6$ ,  $BC = 8$  và  $\widehat{ABC} = 60^\circ$ . Tính diện tích hình bình hành  $ABCD$ .

**VÍ DỤ 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\hat{A} = 120^\circ$ ,  $\hat{B} = 30^\circ$ , diện tích tam giác  $ABC$  bằng  $9\sqrt{3}$ . Tính các cạnh của tam giác  $ABC$ .

**VÍ DỤ 4.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 2$ ,  $AC = 2\sqrt{7}$  và  $BC = 4$ .

- Tính góc  $B$  và diện tích tam giác  $ABC$ .
- Tính độ dài đường phân giác trong của góc  $B$  của tam giác  $ABC$ .

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho tam giác với ba cạnh  $a = 13$ ,  $b = 14$ ,  $c = 15$ . Tính diện tích của tam giác và độ dài đường cao  $h_c$ .

**BÀI 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 10$ ,  $BC = 6$  và góc  $\hat{B} = 120^\circ$ .

- Tính  $AC$  và diện tích tam giác  $ABC$ .
- Tính đường cao  $AH$  và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ .
- Tính độ dài đường phân giác trong  $BD$  của tam giác  $ABC$ .

**BÀI 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 2$ ,  $AC = 3$  và  $\widehat{BAC} = 120^\circ$ . Tính độ dài  $BC$ , diện tích tam giác  $ABC$ , độ dài đường phân giác trong  $AD$  của tam giác  $ABC$ .

**BÀI 4.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ . Gọi  $h_a$ ,  $h_b$ ,  $h_c$  lần lượt là các đường cao tương ứng xuất phát từ các đỉnh  $A$ ,  $B$ ,  $C$  và  $r$  là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ . Chứng minh  $\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{r}$ .

**BÀI 5.** Cho tam giác  $ABC$  không vuông ở  $A$ , chứng minh  $S = \frac{1}{4}(b^2 + c^2 - a^2) \tan A$ .

## C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

**CÂU 1.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = 5$ ,  $BC = 7$ ,  $CA = 8$ . Số đo góc  $\hat{A}$  bằng

- ☐ A  $90^\circ$ . ☐ B  $45^\circ$ . ☐ C  $60^\circ$ . ☐ D  $30^\circ$ .

**CÂU 2.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = \sqrt{2}$ ,  $AC = \sqrt{3}$  và  $\hat{C} = 45^\circ$ . Tính độ dài cạnh  $BC$ .

- ☐ A  $BC = \sqrt{5}$ . ☐ B  $BC = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ . ☐ C  $BC = \sqrt{6}$ . ☐ D  $BC = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$ .

**CÂU 3.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = 2$ ,  $AC = 1$  và  $\hat{A} = 60^\circ$ . Tính độ dài cạnh  $BC$ .

- ☐ A  $BC = \sqrt{2}$ . ☐ B  $BC = \sqrt{3}$ . ☐ C  $BC = 1$ . ☐ D  $BC = 2$ .

**CÂU 4.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = 3$ ,  $AC = 6$ ,  $\widehat{BAC} = 60^\circ$ . Tính độ dài đường cao  $h_a$  của tam giác.

- ☐ A  $h_a = 3\sqrt{3}$ . ☐ B  $h_a = \sqrt{3}$ . ☐ C  $h_a = \frac{3}{2}$ . ☐ D  $h_a = 3$ .

**CÂU 5.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$ ,  $BC = \sqrt{3}$ ,  $CA = \sqrt{2}$ . Gọi  $D$  là chân đường phân giác trong góc  $\hat{A}$ . Khi đó góc  $\widehat{ADB}$  bằng

- ☐ A  $90^\circ$ . ☐ B  $45^\circ$ . ☐ C  $60^\circ$ . ☐ D  $75^\circ$ .

**CÂU 6.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = 4$ ,  $BC = 6$ ,  $AC = 2\sqrt{7}$ . Điểm  $M$  thuộc đoạn  $BC$  sao cho  $MC = 2MB$ . Tính độ dài cạnh  $AM$ .

- (A)  $AM = 4\sqrt{2}$ . (B)  $AM = 3\sqrt{2}$ . (C)  $AM = 2\sqrt{3}$ . (D)  $AM = 3$ .

**CÂU 7.** Cho hình thoi  $ABCD$  cạnh bằng 1 cm và có  $\widehat{BAD} = 60^\circ$ . Tính độ dài cạnh  $AC$ .

- (A)  $AC = 2$ . (B)  $AC = \sqrt{3}$ . (C)  $AC = 2\sqrt{3}$ . (D)  $AC = \sqrt{2}$ .

**CÂU 8.** Khoảng cách từ  $A$  đến  $B$  không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm  $C$  mà từ đó có thể nhìn được  $A$  và  $B$  dưới một góc  $78^\circ 24'$ . Biết  $CA = 250$  m,  $CB = 120$  m. Khoảng cách  $AB$  bằng bao nhiêu?


- (A) 266 m. (B) 255 m. (C) 166 m. (D) 298 m.

**CÂU 9.** Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = 2\sqrt{3}$ ,  $AB = \sqrt{6} - \sqrt{2}$ ,  $AC = 2\sqrt{2}$ .  $AD$  là tia phân giác của góc  $\widehat{BAD}$ . Tính góc  $\widehat{BAD}$ .

- (A)  $60^\circ$ . (B)  $90^\circ$ . (C)  $45^\circ$ . (D)  $75^\circ$ .

**CÂU 10.**

Một ô tô muốn đi từ địa điểm  $H$  đến địa điểm  $G$ , nhưng giữa  $H$  và  $G$  là một ngọn núi cao nên ô tô phải đi thành 2 đoạn từ  $H$  lên  $K$  (ô tô leo dốc lên núi) và từ  $K$  đến  $G$  (ô tô xuống núi). Các đoạn đường tạo thành tam giác  $HKG$  với  $HK = 15$  km,  $KG = 20$  km và  $\widehat{HKG} = 120^\circ$ . Giả sử cứ chạy 1 km, ô tô tiêu thụ hết 0,3 lít xăng. Giá thành xăng hiện nay là 13050 đồng một lít xăng. Hỏi ô tô đi từ  $H$  đến  $G$  hết bao nhiêu tiền xăng?



- (A) 137025 đồng. (B) 107025 đồng. (C) 12278 đồng. (D) 137000 đồng.

**CÂU 11.** Cho tam giác  $ABC$  có góc  $\widehat{B} = 45^\circ$ ,  $AC = 28$ ,  $BC = 25$ . Tính số đo góc  $A$  của tam giác (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- (A)  $39,1^\circ$ . (B)  $40,2^\circ$ . (C)  $39,2^\circ$ . (D)  $40^\circ$ .

**CÂU 12.** Cho tam giác  $ABC$  có góc  $\widehat{B} = 30^\circ$ ,  $\widehat{C} = 75^\circ$ ,  $AB = 20$ . Độ dài cạnh  $AC$  là

- (A)  $20(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ . (B)  $10(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ . (C)  $10(\sqrt{6} - 1)$ . (D)  $5(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ .

**CÂU 13.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{B} = 30^\circ$ ,  $\widehat{C} = 45^\circ$  và  $BC = 30$  cm. Tính độ dài cạnh  $AB$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- (A)  $15(\sqrt{3} + 1)$  cm. (B)  $15(\sqrt{3} - 1)$  cm. (C)  $30(2\sqrt{3} - 1)$  cm. (D)  $30(\sqrt{3} - 1)$  cm.

**CÂU 14.** Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = 11$ ,  $\widehat{A} = 30^\circ$ . Độ dài cạnh  $AB$  lớn nhất bằng bao nhiêu?

- (A)  $11\sqrt{3}$ . (B)  $\frac{22\sqrt{3}}{2}$ . (C) 22. (D)  $11(\sqrt{3} + 1)$ .

**CÂU 15.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{C} = 30^\circ$  và  $AB = 30$  cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .


- (A)  $30\sqrt{3}$  cm. (B)  $15\sqrt{3}$  cm. (C) 30 cm. (D) 15 cm.

**CÂU 16.** Cho tam giác  $MNK$  có  $MN = a$ ,  $MK = 3a$ ,  $\widehat{M} = 120^\circ$ . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp  $R$  của tam giác  $MNK$ .

- (A)  $\frac{a\sqrt{39}}{3}$ . (B)  $\frac{a\sqrt{21}}{3}$ . (C)  $\frac{a\sqrt{33}}{3}$ . (D)  $\frac{a\sqrt{42}}{3}$ .

**CÂU 17.**

Để đo bán kính của một chiếc đĩa cổ chỉ còn lại một phần, các nhà khảo cổ chọn 3 điểm trên chiếc đĩa (hình vẽ). Biết  $\widehat{A} = 33^\circ$ ,  $BC = 15,3$  cm, tính bán kính của chiếc đĩa (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



- (A) 13,8cm. (B) 12,6cm. (C) 12,9cm. (D) 13,1cm.

**CÂU 18.** Cho tam giác  $ABC$  có  $b^2 = a^2 + c^2 + ac$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A)  $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C + \sin B \sin C$ . (B)  $\sin^2 B = \sin^2 A + \sin^2 C + \sin A \sin C$ .  
(C)  $\widehat{A} = 120^\circ$ . (D)  $\widehat{A} = 60^\circ$ .

**CÂU 19.** Cho tam giác  $ABC$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

QUICK NOTE

QUICK NOTE

**A**  $\cot A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ .

**C**  $\cot A = \frac{R(b^2 + c^2 - a^2)}{2abc}$ .

**B**  $\cot A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{abc}$ .

**D**  $\cot A = \frac{R(b^2 + c^2 - a^2)}{abc}$ .

**CÂU 20.**


Cho tam giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn tâm  $O$ . Biết  $\widehat{ACB} = 32^\circ$ ,  $\widehat{ADC} = 75^\circ$  và  $BC = 8,8$  cm. Tính bán kính đường tròn đường tròn ( $O$ ). (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

**A** 7,8 cm.

**B** 7,5 cm.

**C** 6,6 cm.

**D** 6,5 cm.



**CÂU 21.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 12$ ,  $BC = 15$ ,  $AC = 18$ . Tính  $\widehat{A} + 2\widehat{C}$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**A**  $129,3^\circ$ .

**B**  $142,7^\circ$ .

**C**  $118,4^\circ$ .

**D**  $138,6^\circ$ .

**CÂU 22.** Cho tam giác  $ABC$  có góc  $\widehat{A} = 60^\circ$ ,  $\widehat{B} = 45^\circ$ ,  $AB = 25$ . Độ dài cạnh  $BC$  gần với giá trị nào nhất dưới đây?

**A** 22.

**B** 22,5.

**C** 24,5.

**D** 21,5.

**CÂU 23.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 8$ ,  $AC = 11$ ,  $\widehat{A} = 30^\circ$ . Số đo góc  $B$  gần với giá trị nào nhất dưới đây?

**A**  $50,5^\circ$ .

**B**  $45,8^\circ$ .

**C**  $65,3^\circ$ .

**D**  $55,2^\circ$ .

**CÂU 24.**


Để đo bán kính của một chiếc đĩa cổ chỉ còn lại một phần, các nhà khảo cổ chọn ba điểm trên chiếc đĩa (hình vẽ). Biết  $AB = 7,1$  cm,  $BC = 16,3$  cm,  $AC = 19,6$  cm, tính bán kính của chiếc đĩa (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**A** 11,1cm.

**B** 9,8cm.

**C** 10,3cm.

**D** 10,1cm.



**CÂU 25.**


Để đo khoảng cách từ  $A$  đến  $B$  ngang qua một đầm lầy, người ta chọn điểm  $C$ , sau đó khoảng cách từ  $A$  đến  $C$  và các góc  $A$ ,  $C$ . Tính khoảng cách từ  $A$  đến  $B$  biết  $AC = 115$  m,  $\widehat{A} = 98^\circ$ ,  $\widehat{C} = 52^\circ$ .

**A** 188,1 m.

**B** 190,7 m.

**C** 181,2 m.

**D** 193,6 m.



**CÂU 26.**


Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 8$ ,  $AC = 10$ ,  $\widehat{A} = 75^\circ$ .  $M$  là điểm thuộc cạnh  $BC$  sao cho  $CM = 2BM$ . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABM$  gần nhất với giá trị nào dưới đây?

**A** 3,8.

**B** 4,1.


**C** 3,6.

**D** 3,5.



**CÂU 27.**

Tàu A rời cảng vào lúc 6h00 và chuyển động với vận tốc 30 km/h. Tàu B rời cảng vào lúc 6h30. Vào lúc 9h30 tàu B gặp tàu A tại điểm C (hình vẽ). Giả sử hai tàu chuyển động thẳng và có vận tốc không đổi trong suốt quá trình di chuyển, tính vận tốc tàu B (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).



**QUICK NOTE**

- ☐ A 42,5 km/h.      ☐ B 44,8 km/h.  
☐ C 41,7 km/h.      ☐ D 45,4 km/h.

**CÂU 28.** Chọn công thức đúng trong các đáp án sau

- ☐ A  $S = \frac{1}{2}bc \sin B$ .      ☐ B  $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ .      ☐ C  $S = \frac{1}{2}ab \sin B$ .      ☐ D  $S = \frac{1}{2}ac \sin A$ .

**CÂU 29.** Cho  $\triangle ABC$  với các cạnh  $AB = c$ ,  $AC = b$ ,  $BC = a$ . Gọi  $R$ ,  $r$ ,  $S$  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác  $ABC$ . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **sai**?

- ☐ A  $S = \frac{abc}{4R}$ .      ☐ B  $R = \frac{a}{\sin A}$ .  
☐ C  $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ .      ☐ D  $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$ .

**CÂU 30.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 4$ ,  $AC = 3$ ,  $\widehat{BAC} = 30^\circ$ . Khi đó diện tích tam giác  $ABC$  bằng

- ☐ A 3.      ☐ B  $4\sqrt{3}$ .      ☐ C  $6\sqrt{3}$ .      ☐ D 6.

**CÂU 31.** Tìm chu vi tam giác  $ABC$ , biết  $AB = 6$  và  $2 \sin A = 3 \sin B = 4 \sin C$ .

- ☐ A 26.      ☐ B 13.      ☐ C  $5\sqrt{26}$ .      ☐ D  $10\sqrt{6}$ .

**CÂU 32.** Cho tam giác  $ABC$  có  $a = 13$  m,  $b = 14$  m,  $c = 15$  m. Tính diện tích  $S$  của tam giác  $ABC$ .

- ☐ A  $S = 84 \text{ m}^2$ .      ☐ B  $S = 90 \text{ m}^2$ .      ☐ C  $S = 76 \text{ m}^2$ .      ☐ D  $S = 80 \text{ m}^2$ .

**CÂU 33.** Cho tam giác  $ABC$ . Biết  $AB = 3$ ,  $AC = 4$ ,  $BC > 5$  và diện tích tam giác  $ABC$  bằng  $3\sqrt{3}$ . Số đo góc  $\widehat{BAC}$  bằng

- ☐ A  $120^\circ$ .      ☐ B  $60^\circ$ .      ☐ C  $135^\circ$ .      ☐ D  $45^\circ$ .

**CÂU 34.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 2$ ,  $AC = 3$ ,  $BC = 4$ . Khi đó độ dài đường cao của tam giác  $ABC$  kẻ từ A bằng

- ☐ A  $\frac{3\sqrt{15}}{2}$ .      ☐ B  $\frac{3\sqrt{15}}{4}$ .      ☐ C  $\frac{3\sqrt{15}}{8}$ .      ☐ D  $3\sqrt{15}$ .

**CÂU 35.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 9\text{cm}$ ,  $AC = 12\text{cm}$  và  $BC = 15\text{cm}$ . Khi đó đường trung tuyến  $BM$  của tam giác  $ABC$  có độ dài là

- ☐ A 117cm.      ☐ B 18,82cm.      ☐ C 10,82cm.      ☐ D 7,5cm.

**CÂU 36.** Tam giác  $ABC$  có các trung tuyến  $m_a = 10$ ,  $m_b = 8$  và  $m_c = 6$ . Tính diện tích  $S$  của tam giác  $ABC$ .

- ☐ A  $S = 32$ .      ☐ B  $S = 24$ .      ☐ C  $S = 48$ .      ☐ D  $S = 64$ .

**CÂU 37.** Cho tam giác  $ABC$  có chu vi bằng 26 cm và  $\frac{\sin A}{2} = \frac{\sin B}{6} = \frac{\sin C}{5}$ . Tính diện tích của tam giác  $ABC$ .


- ☐ A  $2\sqrt{23} \text{ (cm}^2\text{)}$ .      ☐ B  $6\sqrt{13} \text{ (cm}^2\text{)}$ .      ☐ C  $3\sqrt{39} \text{ (cm}^2\text{)}$ .      ☐ D  $5\sqrt{21} \text{ (cm}^2\text{)}$ .

**CÂU 38.** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại C và  $BC = 6$ ,  $CA = 8$ . Tính bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác  $ABC$ .

- ☐ A 2.      ☐ B  $2\sqrt{2}$ .      ☐ C  $\sqrt{2}$ .      ☐ D 4.

**CÂU 39.** Từ vị trí A người ta quan sát một cây cao (Hình vẽ). Biết  $AH = 4$  m,  $HB = 20$  m,  $\widehat{BAC} = 45^\circ$ . Chiều cao của cây gần nhất với giá trị nào sau đây?

## QUICK NOTE



- ☐ A 14 m.
 ☐ B 15 m.
 ☐ C 17 m.
 ☐ D 16 m.

**CÂU 40.** Một miếng giấy hình tam giác  $ABC$  diện tích  $S$  có  $I$  là trung điểm  $BC$  và  $O$  là trung điểm của  $AI$ . Cắt miếng giấy theo một đường thẳng qua  $O$ , đường thẳng này đi qua  $M, N$  lần lượt trên các cạnh  $AB, AC$ . Khi đó diện tích miếng giấy chứa điểm  $A$  có diện tích thuộc đoạn  $[mS; nS]$ . Tính  $T = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ .

- ☐ A  $T = \frac{7}{12}$ .
 ☐ B  $T = 12$ .
 ☐ C  $T = 7$ .
 ☐ D  $T = \frac{12}{7}$ .

# LỜI GIẢI CHI TIẾT


## Bài 1. GTG CỦA MỘT GÓC TỪ $0^\circ$ ĐẾN $180^\circ$

### A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

#### 1. Khái niệm

Điểm  $M(x_0; y_0)$  nằm trên nửa đường tròn đơn vị sao cho  $\widehat{xOM} = \alpha$ . Khi đó

- ☑  $\sin \alpha = y_0$ ;
- ☑  $\cos \alpha = x_0$ ;
- ☑  $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$  với  $(\alpha \neq 90^\circ)$ ;
- ☑  $\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$  với  $(\alpha \neq 0^\circ, 180^\circ)$ .



#### 2. Dấu của giá trị lượng giác.

Góc $\alpha$	$0^\circ$	$90^\circ$	$180^\circ$
$\sin \alpha$	+	+	
$\cos \alpha$	+	-	
$\tan \alpha$	+	-	
$\cot \alpha$	+	-	

#### 3. Bảng giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt cần nhớ

$\alpha$	$0^\circ$	$30^\circ$	$45^\circ$	$60^\circ$	$90^\circ$	$120^\circ$	$135^\circ$	$150^\circ$	$180^\circ$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	//	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0
$\cot \alpha$	//	$\sqrt{3}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	-1	$-\sqrt{3}$	//

#### 4. Tính chất

a) Giá trị lượng giá của hai góc phụ nhau

- ☑  $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ .
- ☑  $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ .
- ☑  $\tan(90^\circ - \alpha) = \cot \alpha$ .
- ☑  $\cot(90^\circ - \alpha) = \tan \alpha$ .

b) Giá trị lượng giác của hai góc bù nhau

- ☑  $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ .
- ☑  $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ .
- ☑  $\tan(180^\circ - \alpha) = -\tan \alpha$ .
- ☑  $\cot(180^\circ - \alpha) = -\cot \alpha$ .

c) Hệ thức cơ bản

- ☑  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ .
- ☑  $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$  với  $(\alpha \neq 90^\circ)$ .
- ☑  $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$  với  $(0^\circ < \alpha < 180^\circ)$ .
- ☑  $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1$  với  $(0^\circ < \alpha < 180^\circ, \alpha \neq 90^\circ)$ .

## B. CÁC DẠNG TOÁN

1

### Tính giá trị biểu thức lượng giác. Chứng minh đẳng thức lượng giác

Áp dụng các công thức lượng giác

#### 1. Ví dụ minh họa

**VÍ DỤ 1.** Tính giá trị biểu thức sau

a)  $A = 2 \cos 30^\circ + 3 \sin 120^\circ$ .

b)  $B = a \cos 60^\circ + 2a \tan 45^\circ - 3a \sin 30^\circ$ .

**Lời giải.**

a)

b) Ta có  $B = \frac{1}{2}a + 2a - \frac{1}{2} \cdot 3a = a$ .

**VÍ DỤ 2.** Cho  $x = 30^\circ$ . Tính  $A = \sin(2x) - 3 \cos x$ .

**Lời giải.**

$$A = \sin 2 \cdot (30^\circ) - 3 \cos 30^\circ = \sin 60^\circ - 3 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} - 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\sqrt{3}.$$

**VÍ DỤ 3.** Biết  $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}$ . Tính giá trị biểu thức  $P = \sin 165^\circ + \cos 75^\circ$ .

**VÍ DỤ 4.** Không dùng máy tính, tính giá trị của các biểu thức sau

a)  $A = \sin 45^\circ \cot 135^\circ + \cos 60^\circ \cdot \sin 150^\circ - \cos 30^\circ \cdot \sin 120^\circ$ .

b)  $B = \tan 135^\circ + \cot 60^\circ \cot 30^\circ - \tan 60^\circ \tan 150^\circ$ .

c)  $C = 2 \sin 60^\circ \tan 150^\circ - \cos 180^\circ \cdot \cot 45^\circ$ .

**Lời giải.**

a) Ta có  $\sin 45^\circ = -\cos 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ,  $\cos 60^\circ = \sin 150^\circ = \frac{1}{2}$  và  $\cos 30^\circ = \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ .

Từ đó suy ra  $A = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{-1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -1$ .

b) Do  $\tan 135^\circ = -1$ ,  $\cot 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ,  $\cot 30^\circ = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$  và  $\tan 150^\circ = \frac{-\sqrt{3}}{3}$  nên

$$B = -1 + \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \sqrt{3} - \sqrt{3} \cdot \left(\frac{-\sqrt{3}}{3}\right) = 1.$$

c) Ta có  $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\tan 150^\circ = \frac{-\sqrt{3}}{3}$ ,  $\cos 180^\circ = -1$  và  $\cot 45^\circ = 1$ .

Suy ra  $C = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{-\sqrt{3}}{3}\right) - (-1) \cdot 1 = 0$ .

**Chú ý.** Nếu để ý đến mối liên hệ giữa các góc có trong biểu thức, như các góc bù nhau, các góc phụ nhau, thì ta có thể giải bài toán theo cách sau

a) Do  $135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$ ,  $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$ ,  $120^\circ = 180^\circ - 60^\circ$  nên

$$\begin{aligned} A &= \sin 45^\circ \cdot (-\cos 45^\circ) + \cos 60^\circ \cdot \sin 30^\circ - \cos 30^\circ \cdot \sin 60^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \left(\frac{-\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{-1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{3}{4} = -1. \end{aligned}$$

b) Do  $135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$ ,  $60^\circ = 90^\circ - 30^\circ$ ,  $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$  nên

$$B = -1 + 1 - \tan 60^\circ \cdot (-\tan 30^\circ) = 1.$$

c) Do  $150^\circ = 180^\circ - 30^\circ$  nên

$$\begin{aligned} C &= 2 \sin 60^\circ \cdot (-\tan 30^\circ) - \cos 180^\circ \cdot \cot 45^\circ \\ &= 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(\frac{-\sqrt{3}}{3}\right) - (-1) \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$



## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Tính giá trị của các biểu thức

- a)  $A = \sin 45^\circ + 2 \sin 60^\circ + \tan 120^\circ + \cos 135^\circ$ ;  
 b)  $B = \tan 45^\circ \cdot \cot 135^\circ - \sin 30^\circ \cdot \cos 120^\circ - \sin 60^\circ \cdot \cos 150^\circ$ ;  
 c)  $C = \cos^2 5^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 45^\circ + \cos^2 65^\circ + \cos^2 85^\circ$ ;  
 d)  $D = \frac{12}{1 + \tan^2 73^\circ} - 4 \tan 75^\circ \cdot \cot 105^\circ + 12 \sin^2 107^\circ - 2 \tan 40^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \tan 50^\circ$ ;  
 e)  $E = 4 \tan 32^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cot 148^\circ + \frac{5 \cot^2 108^\circ}{1 + \tan^2 18^\circ} + 5 \sin^2 72^\circ$ .

 **Lời giải.**

a)

$$\begin{aligned} A &= \sin 45^\circ + 2 \sin 60^\circ + \tan 120^\circ + \cos 135^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \sqrt{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \sqrt{3} - \sqrt{3} = 0. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} B &= \tan 45^\circ \cdot \cot 135^\circ - \sin 30^\circ \cdot \cos 120^\circ - \sin 60^\circ \cdot \cos 150^\circ \\ &= 1 \cdot (-1) - \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -1 + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 0. \end{aligned}$$

c) Do  $5^\circ = 90^\circ - 85^\circ$ ,  $25^\circ = 90^\circ - 65^\circ$  nên

$$\begin{aligned} C &= \cos^2 5^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 45^\circ + \cos^2 65^\circ + \cos^2 85^\circ \\ &= \sin^2 85^\circ + \cos^2 85^\circ + \sin^2 25^\circ + \cos^2 25^\circ + \cos^2 45^\circ \\ &= 1 + 1 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}. \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} D &= \frac{12}{1 + \tan^2 73^\circ} - 4 \tan 75^\circ \cdot \cot 105^\circ + 12 \sin^2 107^\circ - 2 \tan 40^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \tan 50^\circ \\ &= 12 \cos^2 73^\circ - 4 \tan 75^\circ \cdot \cot(180^\circ - 75^\circ) + 12 \sin^2(180^\circ - 73^\circ) - 2 \tan(90^\circ - 50^\circ) \cos 60^\circ \tan 50^\circ \\ &= 12 \cos^2 73^\circ + 4 \tan 75^\circ \cdot \cot 75^\circ + 12 \sin^2 73^\circ - 2 \cot 50^\circ \cdot \tan 50^\circ \cdot \cos 60^\circ \\ &= 12 + 4 - 1 = 15. \end{aligned}$$

e) Ta có do  $148^\circ = 180^\circ - 32^\circ$ ,  $108^\circ = 180^\circ - 72^\circ$  và  $18^\circ = 90^\circ - 72^\circ$  nên

$$\begin{aligned} E &= 4 \tan 32^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cot 148^\circ + \frac{5 \cot^2 108^\circ}{1 + \tan^2 18^\circ} + 5 \sin^2 72^\circ \\ &= -4 \tan 32^\circ \cdot \cos 60^\circ \cdot \cot 32^\circ + 5 \cot^2 108^\circ \cdot \cos^2 18^\circ + 5 \sin^2 72^\circ \\ &= -4 \cdot \frac{1}{2} + 5 \cot^2 108^\circ \cdot \sin^2 72^\circ + 5 \sin^2 72^\circ \\ &= -2 + 5 \sin^2 72^\circ \cdot (1 + \cot^2 108^\circ) \\ &= -2 + 5 \sin^2 72^\circ \cdot \frac{1}{\sin^2 108^\circ} \\ &= -2 + 5 = 3. \end{aligned}$$

**BÀI 2.** Tính giá trị các biểu thức sau:

- a)  $A = \sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \dots + \sin^2 170^\circ + \sin^2 180^\circ$ .  
 b)  $B = \tan 10^\circ \cdot \tan 20^\circ \dots \tan 80^\circ$ .  
 c)  $C = \cot 20^\circ + \cot 40^\circ + \dots + \cot 140^\circ + \cot 160^\circ$ .

**Lời giải.**

- a) Ta có  $\sin 10^\circ = \sin 170^\circ$ ,  $\sin 20^\circ = \sin 160^\circ, \dots$ , suy ra  $C = 2(\sin^2 10^\circ + \sin^2 20^\circ + \dots + \sin^2 80^\circ) + \sin^2 90^\circ$ . Mặt khác ta có  $\sin 80^\circ = \cos 10^\circ$ ,  $\sin 70^\circ = \cos 20^\circ, \dots$ , có 4 cặp như vậy nên ta tính được  $A = 5$ .
- b)  $\tan 10^\circ = \cot 80^\circ$ ,  $\tan 20^\circ = \cot 70^\circ$ ,  $\tan 30^\circ = \cot 60^\circ$ ,  $\tan 40^\circ = \cot 50^\circ$ . Do đó, ta tính được  $B = 1$ .
- c)  $\cot 20^\circ = -\cot 160^\circ$ ,  $\cot 40^\circ = -\cot 140^\circ, \dots$  nên ta tính được  $C = 0$ .

**BÀI 3.** Chứng minh rằng

- a)  $\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$ ;  
 b)  $\sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha = 1 - 3 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$ ;  
 c)  $\sqrt{\sin^4 \alpha + 6 \cos^2 \alpha + 3} + \sqrt{\cos^4 \alpha + 4 \sin^2 \alpha} = 4$ .

**Lời giải.**

- a) Ta có

$$\begin{aligned} \sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha &= (\sin^2 \alpha)^2 + (\cos^2 \alpha)^2 \\ &= (\sin^2 \alpha)^2 + (\cos^2 \alpha)^2 + 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha - 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha \\ &= (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha \\ &= 1 - 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha. \end{aligned}$$

- b) Ta có

$$\begin{aligned} \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha &= (\sin^2 \alpha)^3 + (\cos^2 \alpha)^3 \\ &= (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) \cdot (\sin^4 \alpha - \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha + \cos^4 \alpha) \\ &= (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 3 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha \\ &= 1 - 3 \sin^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha. \end{aligned}$$

- c)

$$\begin{aligned} &\sqrt{\sin^4 \alpha + 6 \cos^2 \alpha + 3} + \sqrt{\cos^4 \alpha + 4 \sin^2 \alpha} \\ &= \sqrt{\sin^4 \alpha + 6(1 - \sin^2 \alpha) + 3} + \sqrt{\cos^4 \alpha + 4(1 - \cos^2 \alpha)} \\ &= \sqrt{\sin^4 \alpha - 6 \sin^2 \alpha + 9} + \sqrt{\cos^4 \alpha - 4 \cos^2 \alpha + 4} \\ &= \sqrt{(3 - \sin^2 \alpha)^2} + \sqrt{(2 - \cos^2 \alpha)^2} \\ &= 3 - \sin^2 \alpha + 2 - \cos^2 \alpha = 5 - (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) = 4. \end{aligned}$$

**BÀI 4.** Cho  $A, B, C$  là các góc của tam giác. Chứng minh các đẳng thức sau:

- a)  $\sin(A + B) = \sin C$ .  
 b)  $\cos(A + B) + \cos C = 0$ .  
 c)  $\sin \frac{A+B}{2} = \cos \frac{C}{2}$ .  
 d)  $\tan(A - B + C) = -\tan 2B$ .

**Lời giải.**

Do  $A, B, C$  là các góc của tam giác nên ta có  $A + B + C = 180^\circ$ .

- a) Ta có  $A + B + C = 180^\circ \Leftrightarrow A + B = 180^\circ - C$ .  
 Từ đó suy ra  $\sin(A + B) = \sin(180^\circ - C) = \sin C$ .
- b) Ta có  $A + B + C = 180^\circ \Leftrightarrow A + B = 180^\circ - C$ .  
 Từ đó suy ra  $\cos(A + B) = \cos(180^\circ - C) = -\cos C \Rightarrow \cos(A + B) + \cos C = 0$ .
- c) Ta có  $A + B + C = 180^\circ \Leftrightarrow \frac{A+B}{2} = \frac{180^\circ - C}{2} = 90^\circ - \frac{C}{2}$ .  
 Từ đó suy ra  $\sin \frac{A+B}{2} = \sin\left(90^\circ - \frac{C}{2}\right) = \cos \frac{C}{2}$ .
- d) Ta có  $\tan(A - B + C) = \tan(A + B + C - 2B) = \tan(180^\circ - 2B) = -\tan 2B$ .

2

## Tìm các GTLG khi biết một GTLG của góc

Áp dụng tính chất về dấu của GTLG của một góc và các công thức lượng giác cơ bản.

### 1. Ví dụ minh họa

#### VÍ DỤ 1.

- a) Cho  $\sin \alpha = \frac{1}{3}$  với  $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ . Tính  $\cos \alpha$  và  $\tan \alpha$ .
- b) Cho  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$  và  $\sin \alpha > 0$ . Tính  $\sin \alpha$  và  $\cot \alpha$ .
- c) Cho  $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$ , tính giá trị lượng giác còn lại.

#### Lời giải.

- a) Vì  $90^\circ < \alpha < 180^\circ$  nên  $\cos \alpha < 0$ , mặt khác  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$  suy ra

$$\cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

$$\text{Do đó } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{1}{3}}{-\frac{2\sqrt{2}}{3}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

- b) Vì  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$  và  $\sin \alpha > 0$ , nên  $\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{5}}{3}$ .

$$\text{Ta có } \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{\sqrt{5}}{3}} = -\frac{2}{\sqrt{5}}.$$

- c) Vì  $\tan \alpha = -2\sqrt{2} < 0 \Rightarrow \cos \alpha < 0$ .

$$\text{Ta có } \tan^2 \alpha + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}, \text{ suy ra } \cos \alpha = -\sqrt{\frac{1}{\tan^2 \alpha + 1}} = -\sqrt{\frac{1}{8 + 1}} = -\frac{1}{3}.$$

$$\text{Do đó } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \Rightarrow \sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = -2\sqrt{2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{2\sqrt{2}}{3}.$$

$$\Rightarrow \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{-\frac{1}{3}}{\frac{2\sqrt{2}}{3}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}}.$$

#### VÍ DỤ 2.

- a) Cho  $\cos \alpha = \frac{3}{4}$  với  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ . Tính  $A = \frac{\tan \alpha + 3 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$ .

- b) Cho  $\tan \alpha = \sqrt{2}$ . Tính  $B = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin^3 \alpha + 3 \cos^3 \alpha + 2 \sin \alpha}$ .

#### Lời giải.

$$\text{a) Ta có } A = \frac{\tan \alpha + 3 \frac{1}{\tan \alpha}}{\tan \alpha + \frac{1}{\tan \alpha}} = \frac{\tan^2 \alpha + 3}{\tan^2 \alpha + 1} = \frac{\frac{1}{\cos^2 \alpha} + 2}{\frac{1}{\cos^2 \alpha}} = 1 + 2 \cos^2 \alpha.$$

$$\text{Suy ra } A = 1 + 2 \cdot \frac{9}{16} = \frac{17}{8}.$$

$$\text{b) Ta có } B = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos^3 \alpha} - \frac{\cos \alpha}{\cos^3 \alpha}}{\frac{\sin^3 \alpha}{\cos^3 \alpha} + \frac{3 \cos^3 \alpha}{\cos^3 \alpha} + \frac{2 \sin \alpha}{\cos^3 \alpha}} = \frac{\tan \alpha (\tan^2 \alpha + 1) - (\tan^2 \alpha + 1)}{\tan^3 \alpha + 3 + 2 \tan \alpha (\tan^2 \alpha + 1)}.$$

$$\text{Suy ra } B = \frac{\sqrt{2}(2+1) - (2+1)}{2\sqrt{2} + 3 + 2\sqrt{2}(2+1)} = \frac{3(\sqrt{2}-1)}{3+8\sqrt{2}}.$$

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho góc  $\alpha$ ,  $0^\circ < \alpha < 180^\circ$  thỏa mãn  $\cos \alpha = \frac{-1}{3}$ .

a) Tính  $\tan \alpha$ .

b) Tính giá trị của biểu thức  $P = \tan \alpha + 2 \cot \alpha$ .

**Lời giải.**

a) Do  $\cos \alpha = \frac{-1}{3} < 0$  nên  $\alpha$  là góc tù và  $\tan \alpha = -\sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1} = -2\sqrt{2}$ .

b) Do  $\tan \alpha \cot \alpha = 1$  và  $\tan \alpha = -2\sqrt{2}$  nên  $\cot \alpha = \frac{-\sqrt{2}}{4}$  và bởi vậy

$$P = -2\sqrt{2} + 2 \cdot \left( \frac{-\sqrt{2}}{4} \right) = \frac{-5\sqrt{2}}{4}.$$

**Nhận xét.** Khi tính  $\tan \alpha$  từ  $\cos \alpha$  nhờ đẳng thức  $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$  sai lầm thường gặp của học sinh là mặc định coi  $\tan \alpha = \sqrt{\frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1}$  mà quên mất  $\tan \alpha < 0$  khi  $\alpha$  là góc tù.

**BÀI 2.** Cho góc  $\alpha$  thỏa mãn  $0^\circ < \alpha < 180^\circ$  và  $\tan \alpha = 2$ . Tính giá trị của các biểu thức sau

a)  $G = 2 \sin \alpha + \cos \alpha$ ;

b)  $H = \frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}$ .

**Lời giải.**

a) Do  $\alpha$  thỏa mãn  $0^\circ < \alpha < 180^\circ$  và  $\tan \alpha = 2$  nên  $\sin \alpha > 0$  và  $\cos \alpha > 0$ .

$$\text{Ta có } \cos \alpha = \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}} = \sqrt{\frac{1}{1 + 4}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{Từ đó } \sin \alpha = \tan \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}.$$

$$\text{Vậy } G = 2 \sin \alpha + \cos \alpha = \frac{4\sqrt{5}}{5} + \frac{\sqrt{5}}{5} = \sqrt{5}.$$

b) Ta có  $H = \frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} = \frac{2 \tan \alpha + 1}{\tan \alpha - 1} = 5$ .

**BÀI 3.** Cho góc  $\alpha$  với  $90^\circ < \alpha < 180^\circ$  thỏa mãn  $\sin \alpha = \frac{3}{4}$ . Tính giá trị của biểu thức  $F = \frac{\tan \alpha + 2 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha}$ .

**Lời giải.**

Do  $\alpha \in (90^\circ; 180^\circ)$  nên  $\cos \alpha < 0$ .

$$\text{Ta có } \cos \alpha = -\sqrt{1 - \sin^2 \alpha} = -\sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = \frac{-\sqrt{7}}{4}.$$

$$\text{Suy ra } \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{-3\sqrt{7}}{7} \text{ và } \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = \frac{-\sqrt{7}}{3}.$$

$$\text{Vậy } F = \frac{\tan \alpha + 2 \cot \alpha}{\tan \alpha + \cot \alpha} = \frac{23}{16}.$$

**BÀI 4.** Cho góc  $\alpha$  thỏa mãn  $0^\circ < \alpha < 180^\circ$  và  $\tan \alpha = \sqrt{2}$ . Tính giá trị của các biểu thức sau

$$K = \frac{\sin^3 \alpha + \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha - 4 \cos^3 \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}.$$

**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} K &= \frac{\sin^3 \alpha + \sin \alpha \cdot \cos^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cdot \cos \alpha - 4 \cos^3 \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha} \\ &= \frac{\cos^3 \alpha (\tan^3 \alpha + \tan \alpha + 2 \tan^2 \alpha - 4)}{\cos^3 \alpha (\tan \alpha \cdot (1 + \tan^2 \alpha) - (1 + \tan^2 \alpha))} \\ &= \frac{\tan^3 \alpha + \tan \alpha + 2 \tan^2 \alpha - 4}{(\tan \alpha - 1)(1 + \tan^2 \alpha)} \end{aligned}$$

$$= \frac{2\sqrt{2} + \sqrt{2} + 2 \cdot 2 - 4}{(\sqrt{2} - 1)(1 + 2)}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} = 2 + \sqrt{2}.$$

## C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

**CÂU 1.** Giá trị của  $\cos 60^\circ + \sin 30^\circ$  bằng bao nhiêu?

- ☐ A  $\frac{\sqrt{3}}{2}$ .
 ☐ B  $\sqrt{3}$ .
 ☐ C  $\frac{\sqrt{3}}{3}$ .
 ☐ D 1.

**Lời giải.**

Ta có  $\cos 60^\circ + \sin 30^\circ = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ .

Chọn đáp án ☒ D.

**CÂU 2.** Giá trị của  $\tan 30^\circ + \cot 30^\circ$  bằng bao nhiêu?

- ☐ A  $\frac{4}{\sqrt{3}}$ .
 ☐ B  $\frac{1 + \sqrt{3}}{3}$ .
 ☐ C  $\frac{2}{\sqrt{3}}$ .
 ☐ D 2.

**Lời giải.**

Ta có  $\tan 30^\circ + \cot 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3} + \sqrt{3} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ .

Chọn đáp án ☐ A.

**CÂU 3.** Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào **sai**?

- ☐ A  $\sin 0^\circ + \cos 0^\circ = 1$ .
 ☐ B  $\sin 90^\circ + \cos 90^\circ = 1$ .
 ☐ C  $\sin 180^\circ + \cos 180^\circ = -1$ .
 ☐ D  $\sin 60^\circ + \cos 60^\circ = 1$ .

**Lời giải.**

Ta có  $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ,  $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$  nên đẳng thức sai là “ $\sin 60^\circ + \cos 60^\circ = 1$ ”.

Chọn đáp án ☐ D.

**CÂU 4.** Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- ☐ A  $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ$ .
 ☐ B  $\cos 60^\circ = \sin 120^\circ$ .
 ☐ C  $\cos 30^\circ = \sin 120^\circ$ .
 ☐ D  $\sin 60^\circ = -\cos 120^\circ$ .

**Lời giải.**

Ta có cặp góc  $60^\circ$ ,  $120^\circ$  bù nhau nên khẳng định sai là “ $\cos 60^\circ = \sin 120^\circ$ ”.

Chọn đáp án ☐ B.

**CÂU 5.** Đẳng thức nào sau đây **sai**?

- ☐ A  $\sin 45^\circ + \sin 45^\circ = \sqrt{2}$ .
 ☐ B  $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ = 1$ .
 ☐ C  $\sin 60^\circ + \cos 150^\circ = 0$ .
 ☐ D  $\sin 120^\circ + \cos 30^\circ = 0$ .

**Lời giải.**

Ta có  $\sin 120^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$  nên đẳng thức sai là “ $\sin 120^\circ + \cos 30^\circ = 0$ ”.

Chọn đáp án ☐ D.

**CÂU 6.** Giá trị  $\cos 45^\circ + \sin 45^\circ$  bằng bao nhiêu?

- ☐ A 1.
 ☐ B  $\sqrt{2}$ .
 ☐ C  $\sqrt{3}$ .
 ☐ D 0.

**Lời giải.**

Ta có  $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$  nên  $\cos 45^\circ + \sin 45^\circ = \sqrt{2}$ .

Chọn đáp án ☐ B.

**CÂU 7.** Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **đúng**?

- ☐ A  $\sin(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ .
 ☐ B  $\sin(180^\circ - \alpha) = -\sin \alpha$ .
 ☐ C  $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ .
 ☐ D  $\sin(180^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ .

**Lời giải.**

Theo tính chất của cặp góc bù nhau thì “ $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ ”.

Chọn đáp án ☐ C.

**CÂU 8.** Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào **sai**?

- ☐ A  $\sin 0^\circ + \cos 0^\circ = 0$ .
 ☐ B  $\sin 90^\circ + \cos 90^\circ = 1$ .

☐  $\sin 180^\circ + \cos 180^\circ = -1.$

☐  $\sin 60^\circ + \cos 60^\circ = \frac{\sqrt{3}+1}{2}.$

**Lời giải.**

Ta có  $\sin 0^\circ = 0$ ,  $\cos 0^\circ = 1$  nên đẳng thức sai là “ $\sin 0^\circ + \cos 0^\circ = 0$ ”.

Chọn đáp án ☐ □

**CÂU 9.** Cho  $\alpha$  là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là **đúng**?

☐  $\sin \alpha < 0.$

☐  $\cos \alpha > 0.$

☐  $\tan \alpha < 0.$

☐  $\cot \alpha > 0.$

**Lời giải.**

Góc tù có điểm biểu diễn thuộc góc phần tư thứ II, suy ra  $\tan \alpha < 0$ .

Chọn đáp án ☐ □

**CÂU 10.** Giá trị của  $E = \sin 36^\circ \cos 6^\circ - \sin 126^\circ \cos 84^\circ$  là

☐  $\frac{1}{2}.$

☐  $\frac{\sqrt{3}}{2}.$

☐ 1.

☐ -1.

**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} E &= \sin 36^\circ \cos 6^\circ - \sin (90^\circ + 36^\circ) \cos (90^\circ - 6^\circ) \\ &= \sin 36^\circ \cos 6^\circ - \cos 36^\circ \sin 6^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án ☐ □

**CÂU 11.** Giá trị của biểu thức  $A = \sin^2 51^\circ + \sin^2 55^\circ + \sin^2 39^\circ + \sin^2 35^\circ$  là

☐ 3.

☐ 4.

☐ 1.

☐ 2.

**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} A &= (\sin^2 51^\circ + \sin^2 39^\circ) + (\sin^2 55^\circ + \sin^2 35^\circ) \\ &= (\sin^2 51^\circ + \cos^2 51^\circ) + (\sin^2 55^\circ + \cos^2 55^\circ) = 2. \end{aligned}$$

Chọn đáp án ☐ □

**CÂU 12.** Giá trị của biểu thức  $A = \tan 1^\circ \tan 2^\circ \tan 3^\circ \cdots \tan 88^\circ \tan 89^\circ$  là

☐ 0.

☐ 2.

☐ 3.

☐ 1.

**Lời giải.**

Ta có  $A = (\tan 1^\circ \cdot \tan 89^\circ) \cdot (\tan 2^\circ \cdot \tan 88^\circ) \cdots (\tan 44^\circ \cdot \tan 46^\circ) \cdot \tan 45^\circ = 1$ .

Chọn đáp án ☐ □

**CÂU 13.** Tổng  $\sin^2 2^\circ + \sin^2 4^\circ + \sin^2 6^\circ + \cdots + \sin^2 84^\circ + \sin^2 86^\circ + \sin^2 88^\circ$  bằng

☐ 21.

☐ 23.

☐ 22.

☐ 24.

**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} S &= \sin^2 2^\circ + \sin^2 4^\circ + \sin^2 6^\circ + \cdots + \sin^2 84^\circ + \sin^2 86^\circ + \sin^2 88^\circ \\ &= (\sin^2 2^\circ + \sin^2 88^\circ) + (\sin^2 4^\circ + \sin^2 86^\circ) + \cdots + (\sin^2 44^\circ + \sin^2 46^\circ) \\ &= (\sin^2 2^\circ + \cos^2 2^\circ) + (\sin^2 4^\circ + \cos^2 4^\circ) + \cdots + (\sin^2 44^\circ + \cos^2 44^\circ) = 22. \end{aligned}$$

Chọn đáp án ☐ □

**CÂU 14.** Giá trị của  $A = \tan 5^\circ \cdot \tan 10^\circ \cdot \tan 15^\circ \cdots \tan 80^\circ \cdot \tan 85^\circ$  là

☐ 2.

☐ 1.

☐ 0.

☐ -1.

**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} A &= (\tan 5^\circ \cdot \tan 85^\circ) \cdot (\tan 10^\circ \cdot \tan 80^\circ) \cdots (\tan 40^\circ \tan 50^\circ) \cdot \tan 45^\circ \\ &= (\tan 5^\circ \cdot \cot 5^\circ) \cdot (\tan 10^\circ \cdot \cot 10^\circ) \cdots (\tan 40^\circ \cot 40^\circ) \cdot \tan 45^\circ = 1. \end{aligned}$$

Chọn đáp án ☐ □

**CÂU 15.** Giá trị của  $B = \cos^2 73^\circ + \cos^2 87^\circ + \cos^2 3^\circ + \cos^2 17^\circ$  là

- (A)  $\sqrt{2}$ . (B) 2. (C) -2. (D) 1.

**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} B &= (\cos^2 73^\circ + \cos^2 17^\circ) + (\cos^2 87^\circ + \cos^2 3^\circ) \\ &= (\cos^2 73^\circ + \sin^2 73^\circ) + (\cos^2 87^\circ + \sin^2 87^\circ) = 2. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (B) □

**CÂU 16.** Cho  $\cos x = \frac{1}{2}$ . Tính biểu thức  $P = 3\sin^2 x + 4\cos^2 x$

- (A)  $\frac{13}{4}$ . (B)  $\frac{7}{4}$ . (C)  $\frac{11}{4}$ . (D)  $\frac{15}{4}$ .

**Lời giải.**

Ta có  $P = 3\sin^2 x + 4\cos^2 x = 3(\sin^2 x + \cos^2 x) + \cos^2 x = 3 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{13}{4}$ .

Chọn đáp án (A) □

**CÂU 17.** Biết  $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ . Giá trị đúng của biểu thức  $P = \sin^2 \alpha + 3\cos^2 \alpha$  là

- (A)  $\frac{1}{3}$ . (B)  $\frac{10}{9}$ . (C)  $\frac{11}{9}$ . (D)  $\frac{4}{3}$ .

**Lời giải.**

Ta có:  $\cos \alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow P = \sin^2 \alpha + 3\cos^2 \alpha = (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha) + 2\cos^2 \alpha = 1 + 2\cos^2 \alpha = \frac{11}{9}$ .

Chọn đáp án (C) □

**CÂU 18.** Cho biết  $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ . Tính  $\cot \alpha$ .

- (A)  $\cot \alpha = 2$ . (B)  $\cot \alpha = \sqrt{2}$ . (C)  $\cot \alpha = \frac{1}{4}$ . (D)  $\cot \alpha = \frac{1}{2}$ .

**Lời giải.**

Ta có  $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \Rightarrow \cot \alpha = \frac{1}{\tan \alpha} = 2$ .

Chọn đáp án (A) □

**CÂU 19.** Cho biết  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$  và  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ . Tính  $\tan \alpha$ ?

- (A)  $\frac{5}{4}$ . (B)  $-\frac{5}{2}$ . (C)  $\frac{\sqrt{5}}{2}$ . (D)  $-\frac{\sqrt{5}}{2}$ .

**Lời giải.**

Do  $0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \tan \alpha < 0$ .

Ta có:  $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \Leftrightarrow \tan^2 \alpha = \frac{5}{4} \Rightarrow \tan \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{2}$ .

Chọn đáp án (D) □

**CÂU 20.** Cho  $\alpha$  là góc tù và  $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ . Giá trị của biểu thức  $3\sin \alpha + 2\cos \alpha$  là

- (A) 3. (B)  $-\frac{9}{13}$ . (C) -3. (D)  $\frac{9}{13}$ .

**Lời giải.**

Ta có  $\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = \frac{144}{169} \Rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{12}{13}$ .

Do  $\alpha$  là góc tù nên  $\cos \alpha < 0$ , từ đó  $\cos \alpha = -\frac{12}{13}$ .

Như vậy  $3\sin \alpha + 2\cos \alpha = 3 \cdot \frac{5}{13} + 2 \left(-\frac{12}{13}\right) = -\frac{9}{13}$ .

Chọn đáp án (B) □

**CÂU 21.** Cho biết  $\sin \alpha + \cos \alpha = a$ . Giá trị của  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha$  bằng bao nhiêu?

- (A)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = a^2$ . (B)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = 2a$ . (C)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{1-a^2}{2}$ . (D)  $\sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{a^2-1}{2}$ .

**Lời giải.**

$$a^2 = (\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha \Rightarrow \sin \alpha \cos \alpha = \frac{a^2 - 1}{2}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

**CÂU 22.** Cho biết  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$ . Tính giá trị của biểu thức  $E = \frac{\cot \alpha + 3 \tan \alpha}{2 \cot \alpha + \tan \alpha}$ ?

- (A)**  $-\frac{19}{13}$ . **(B)**  $\frac{19}{13}$ . **(C)**  $\frac{25}{13}$ . **(D)**  $-\frac{25}{13}$ .

**Lời giải.**

$$\text{Ta có } E = \frac{\cot \alpha + 3 \tan \alpha}{2 \cot \alpha + \tan \alpha} = \frac{1 + 3 \tan^2 \alpha}{2 + \tan^2 \alpha} = \frac{3(\tan^2 \alpha + 1) - 2}{1 + (\tan^2 \alpha)} = \frac{\frac{3}{\cos^2 \alpha} - 2}{\frac{1}{\cos^2 \alpha} + 1} = \frac{3 - 2 \cos^2 \alpha}{1 + \cos^2 \alpha} = \frac{19}{13}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

**CÂU 23.** Cho biết  $\cot \alpha = 5$ . Tính giá trị của  $E = 2 \cos^2 \alpha + 5 \sin \alpha \cos \alpha + 1$ ?

- (A)**  $\frac{10}{26}$ . **(B)**  $\frac{100}{26}$ . **(C)**  $\frac{50}{26}$ . **(D)**  $\frac{101}{26}$ .

**Lời giải.**

$$E = \sin^2 \alpha \left( 2 \cot^2 \alpha + 5 \cot \alpha + \frac{1}{\sin^2 \alpha} \right) = \frac{1}{1 + \cot^2 \alpha} (3 \cot^2 \alpha + 5 \cot \alpha + 1) = \frac{101}{26}.$$

Chọn đáp án **(D)** □

**CÂU 24.** Cho  $\cot \alpha = \frac{1}{3}$ . Giá trị của biểu thức  $A = \frac{3 \sin \alpha + 4 \cos \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \cos \alpha}$  là

- (A)**  $-\frac{15}{13}$ . **(B)**  $-13$ . **(C)**  $\frac{15}{13}$ . **(D)**  $13$ .

**Lời giải.**

$$\text{Ta có } A = \frac{3 \sin \alpha + 4 \sin \alpha \cdot \cot \alpha}{2 \sin \alpha - 5 \sin \alpha \cdot \cot \alpha} = \frac{3 + 4 \cot \alpha}{2 - 5 \cot \alpha} = 13.$$

Chọn đáp án **(D)** □

**CÂU 25.** Cho biết  $\cos \alpha = -\frac{2}{3}$ . Giá trị của biểu thức  $E = \frac{\cot \alpha - 3 \tan \alpha}{2 \cot \alpha - \tan \alpha}$  bằng bao nhiêu?

- (A)**  $-\frac{25}{3}$ . **(B)**  $-\frac{11}{13}$ . **(C)**  $-\frac{11}{3}$ . **(D)**  $-\frac{25}{13}$ .

**Lời giải.**

$$\text{Ta có } E = \frac{\cot \alpha - 3 \tan \alpha}{2 \cot \alpha - \tan \alpha} = \frac{1 - 3 \tan^2 \alpha}{2 - \tan^2 \alpha} = \frac{4 - 3(\tan^2 \alpha + 1)}{3 - (1 + \tan^2 \alpha)} = \frac{4 - \frac{3}{\cos^2 \alpha}}{3 - \frac{1}{\cos^2 \alpha}} = \frac{4 \cos^2 \alpha - 3}{3 \cos^2 \alpha - 1} = -\frac{11}{3}.$$

Chọn đáp án **(C)** □

**CÂU 26.** Biết  $\sin a + \cos a = \sqrt{2}$ . Hỏi giá trị của  $\sin^4 a + \cos^4 a$  bằng bao nhiêu?

- (A)**  $\frac{3}{2}$ . **(B)**  $\frac{1}{2}$ . **(C)**  $-1$ . **(D)**  $0$ .

**Lời giải.**

$$\text{Ta có: } \sin a + \cos a = \sqrt{2} \Rightarrow 2 = (\sin a + \cos a)^2 \Rightarrow \sin a \cdot \cos a = \frac{1}{2}.$$

$$\sin^4 a + \cos^4 a = (\sin^2 a + \cos^2 a) - 2 \sin^2 a \cos^2 a = 1 - 2 \left( \frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{2}.$$

Chọn đáp án **(B)** □

**CÂU 27.** Cho  $\tan \alpha + \cot \alpha = m$ . Tìm  $m$  để  $\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha = 7$ .

- (A)**  $m = 9$ . **(B)**  $m = 3$ . **(C)**  $m = -3$ . **(D)**  $m = \pm 3$ .

**Lời giải.**

$$\text{Ta có } 7 = \tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha = (\tan \alpha + \cot \alpha)^2 - 2 \Rightarrow m^2 = 9 \Leftrightarrow m = \pm 3.$$

Chọn đáp án **(D)** □

**CÂU 28.** Cho biết  $3 \cos \alpha - \sin \alpha = 1$ ,  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ . Giá trị của  $\tan \alpha$  bằng

- (A)**  $\tan \alpha = \frac{4}{3}$ . **(B)**  $\tan \alpha = \frac{3}{4}$ . **(C)**  $\tan \alpha = \frac{4}{5}$ . **(D)**  $\tan \alpha = \frac{5}{4}$ .



**Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } 3 \cos \alpha - \sin \alpha = 1 &\Leftrightarrow 3 \cos \alpha = \sin \alpha + 1 \rightarrow 9 \cos^2 \alpha = (\sin \alpha + 1)^2 \\ &\Leftrightarrow 9 \cos^2 \alpha = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha + 1 \Leftrightarrow 9(1 - \sin^2 \alpha) = \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha + 1 \\ &\Leftrightarrow 10 \sin^2 \alpha + 2 \sin \alpha - 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin \alpha = -1 \\ \sin \alpha = \frac{4}{5} \end{cases} \end{aligned}$$

☑  $\sin \alpha = -1$ : không thỏa mãn vì  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ .

☑  $\sin \alpha = \frac{4}{5} \Rightarrow \cos \alpha = \frac{3}{5} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{4}{3}$ .

Chọn đáp án **(A)**..... □

**CÂU 29.** Cho biết  $2 \cos \alpha + \sqrt{2} \sin \alpha = 2$ ,  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ . Tính giá trị của  $\cot \alpha$ .

**(A)**  $\cot \alpha = \frac{\sqrt{5}}{4}$ .      **(B)**  $\cot \alpha = \frac{\sqrt{3}}{4}$ .      **(C)**  $\cot \alpha = \frac{\sqrt{2}}{4}$ .      **(D)**  $\cot \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } 2 \cos \alpha + \sqrt{2} \sin \alpha = 2 &\Leftrightarrow \sqrt{2} \sin \alpha = 2 - 2 \cos \alpha \rightarrow 2 \sin^2 \alpha = (2 - 2 \cos \alpha)^2 \\ &\Leftrightarrow 2 \sin^2 \alpha = 4 - 8 \cos \alpha + 4 \cos^2 \alpha \Leftrightarrow 2(1 - \cos^2 \alpha) = 4 - 8 \cos \alpha + 4 \cos^2 \alpha \\ &\Leftrightarrow 6 \cos^2 \alpha - 8 \cos \alpha + 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos \alpha = 1 \\ \cos \alpha = \frac{1}{3} \end{cases} \end{aligned}$$

☑  $\cos \alpha = 1$ : không thỏa mãn vì  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ .

☑  $\cos \alpha = \frac{1}{3} \Rightarrow \sin \alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3} \Rightarrow \cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sqrt{2}}{4}$ .

Chọn đáp án **(C)**..... □

**CÂU 30.** Cho biết  $\cos \alpha + \sin \alpha = \frac{1}{3}$ . Giá trị của  $P = \sqrt{\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha}$  bằng bao nhiêu?

**(A)**  $P = \frac{5}{4}$ .      **(B)**  $P = \frac{7}{4}$ .      **(C)**  $P = \frac{9}{4}$ .      **(D)**  $P = \frac{11}{4}$ .

**Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \cos \alpha + \sin \alpha = \frac{1}{3} &\rightarrow (\cos \alpha + \sin \alpha)^2 = \frac{1}{9} \Leftrightarrow 1 + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{9} \Leftrightarrow \sin \alpha \cos \alpha = -\frac{4}{9}. \\ \text{Ta có } P = \sqrt{\tan^2 \alpha + \cot^2 \alpha} &= \sqrt{(\tan \alpha + \cot \alpha)^2 - 2 \tan \alpha \cot \alpha} = \sqrt{\left(\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}\right)^2 - 2} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}\right)^2 - 2} = \sqrt{\left(\frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}\right)^2 - 2} = \sqrt{\left(-\frac{9}{4}\right)^2 - 2} = \frac{7}{4}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **(B)**..... □

**CÂU 31.** Cho biết  $\sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$ . Giá trị của  $P = \sqrt{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha}$  bằng bao nhiêu?

**(A)**  $P = \frac{\sqrt{15}}{5}$ .      **(B)**  $P = \frac{\sqrt{17}}{5}$ .      **(C)**  $P = \frac{\sqrt{19}}{5}$ .      **(D)**  $P = \frac{\sqrt{21}}{5}$ .

**Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } \sin \alpha - \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}} &\rightarrow (\sin \alpha - \cos \alpha)^2 = \frac{1}{5} \Leftrightarrow 1 - 2 \sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{5} \Leftrightarrow \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2}{5}. \\ P = \sqrt{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha} &= \sqrt{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2 - 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - 2(\sin \alpha \cos \alpha)^2} = \frac{\sqrt{17}}{5}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **(B)**..... □


## Bài 2. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

### A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

#### 1. Định lý cosin

Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = a$ ,  $AC = b$  và  $AB = c$ .

- $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A \Rightarrow \cos A = \dots\dots\dots$
- $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca \cdot \cos B \Rightarrow \cos B = \dots\dots\dots$
- $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C \Rightarrow \cos C = \dots\dots\dots$




#### 2. Định lý sin

Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $AB = c$  và  $R$  là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Ta có

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

**!** Ghi nhớ: Tỷ lệ "cạnh chia sin góc đối" thì bằng nhau.



#### 3. Công thức tính diện tích tam giác

Gọi  $S$  là diện tích tam giác  $ABC$ . Ta có

- $S = \frac{1}{2}a \cdot h_a = \frac{1}{2}b \cdot h_b = \frac{1}{2}c \cdot h_c$ ,
- $S = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B = \frac{1}{2}ab \sin C$ ,
- $S = \frac{abc}{4R}$ ,  $S = p \cdot r$ , (đọc thêm)
- $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ .

Trong đó:

- $h_a, h_b, h_c$  là độ dài đường cao lần lượt tương ứng với các cạnh  $BC, CA, AB$ .
- $R$  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.
- $r$  là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác.
- $p = \frac{a+b+c}{2}$  là nửa chu vi tam giác.

### B. CÁC DẠNG TOÁN

1

#### Áp dụng định lý cos

Nhận dạng định lý:

- Cho tam giác biết trước độ dài hai cạnh và số đo của một góc.
- Cho tam giác biết trước độ dài ba cạnh.

#### 1. Ví dụ minh họa

**VÍ DỤ 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $b = 5$ ,  $c = 7$  và  $\cos A = \frac{3}{5}$ . Tính cạnh  $a$  và cosin các góc còn lại của tam giác đó.

**Lời giải.**

Ta có:

$$\begin{aligned} a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos A = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \frac{3}{5} = 32 \Rightarrow a = \sqrt{32} = 4\sqrt{2} \\ \cos B &= \frac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca} = \frac{32 + 49 - 25}{56\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos C &= \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{32 + 25 - 49}{40\sqrt{2}} = \frac{8}{40\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{10}. \end{aligned}$$


**VÍ DỤ 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AC = 10\text{cm}$ ,  $BC = 16\text{cm}$  và  $C = 120^\circ$ , tính độ dài cạnh  $AB$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lý hàm số cosin ta có  $AB^2 = CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cos C$  ta suy ra  $AB = \sqrt{516}\text{cm}$

**!** Cho tam giác  $ABC$  có  $m_a, m_b, m_c$  lần lượt là các trung tuyến kẻ từ  $A, B, C$ . Ta có

$$\begin{aligned} \bullet m_a^2 &= \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4} \\ \bullet m_b^2 &= \frac{a^2 + c^2}{2} - \frac{b^2}{4} \\ \bullet m_c^2 &= \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} \end{aligned}$$




**VÍ DỤ 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 4\text{ cm}$ ,  $AC = 3\text{ cm}$  và  $BC = 6\text{ cm}$ . Tính độ dài trung tuyến kẻ từ  $C$  của tam giác  $ABC$ .

**Lời giải.**

Độ dài trung tuyến kẻ từ  $C$  của tam giác  $ABC$  là

$$m_c^2 = \frac{a^2 + b^2}{2} - \frac{c^2}{4} = \frac{6^2 + 3^2}{2} - \frac{4^2}{4} = \frac{37}{2} \Rightarrow m_c = \frac{\sqrt{74}}{2}.$$



**VÍ DỤ 4.** Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = 3$ ,  $CA = 4$  và  $AB = 6$ . Tính cosin của góc có số đo lớn nhất của tam giác đã cho.


**Lời giải.**

Do  $AB > AC > BC$  nên  $C > B > A$ .

Áp dụng định lý hàm số cosin ta có  $\cos C = -\frac{11}{24}$ .

**VÍ DỤ 5.**

Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí  $A$ , đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc  $60^\circ$ . Tàu  $B$  chạy với tốc độ 20 hải lý một giờ. Tàu  $C$  chạy với tốc độ 15 hải lý một giờ. Hỏi sau hai giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu hải lý?



**Lời giải.**

Sau 2 giờ tàu  $B$  đi được 40 hải lý, tàu  $C$  đi được 30 hải lý.

Vậy tam giác  $ABC$  có  $AB = 40$ ,  $AC = 30$  và  $\widehat{A} = 60^\circ$ .

Áp dụng định lý cosine vào tam giác  $ABC$ , ta có

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cdot \cos A = 30^2 + 40^2 - 2 \cdot 30 \cdot 40 \cdot \cos 60^\circ = 1300 \Rightarrow a \simeq 36.$$

Vậy sau 2 giờ, hai tàu cách nhau khoảng 36 hải lý.

**VÍ DỤ 6.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = c$ ;  $BC = a$ ;  $CA = b$ . Các cạnh  $a, b, c$  liên hệ với nhau bởi đẳng thức  $b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2)$ .

Tính số đo góc  $\widehat{BAC}$ .

**Lời giải.**

Theo định lý hàm cosin, ta có

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{c^2 + b^2 - a^2}{2bc}.$$

Mà

$$\begin{aligned} b(b^2 - a^2) &= c(a^2 - c^2) \\ \Leftrightarrow b^3 - a^2b &= a^2c - c^3 \\ \Leftrightarrow -a^2(b+c) + (b+c)(b^2+c^2-bc) &= 0 \\ \Leftrightarrow b^2+c^2-a^2 &= bc. \end{aligned}$$

$$\text{Khi đó } \cos \widehat{BAC} = \frac{bc}{2bc} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Vậy } \widehat{BAC} = 60^\circ.$$

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\hat{A} = 60^\circ$ ,  $AB = 6$ ,  $AC = 8$ . Tính  $BC$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lý cosine trong tam giác  $ABC$  ta có  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cos 60^\circ = 52 \Rightarrow BC = 2\sqrt{13}$ .

**BÀI 2.** Cho tam giác  $ABC$  có các cạnh  $BC = 6$ ,  $CA = 4\sqrt{2}$ ,  $AB = 2$ . Tính  $\cos A$  và góc  $\hat{A}$ .

**Lời giải.**

Áp dụng hệ quả của định lý cosine ta có

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{2^2 + (4\sqrt{2})^2 - 6^2}{2 \cdot 2 \cdot 4\sqrt{2}} = 0 \Leftrightarrow \hat{A} = 90^\circ.$$

**BÀI 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 6$  cm;  $AC = 5$  cm và  $\widehat{ACB} = 60^\circ$ . Tính  $BC$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lý cosine trong tam giác ta có

$$AB^2 = AC^2 + BC^2 - 2AC \cdot BC \cdot \cos \widehat{ACB} \Rightarrow 6^2 = 5^2 + BC^2 - 2 \cdot 5 \cdot BC \cos 60^\circ$$

$$\Leftrightarrow BC^2 - 5BC - 11 = 0 \Leftrightarrow BC = \frac{5 + \sqrt{69}}{2}.$$

**BÀI 4.** Tam giác  $ABC$  có  $b = 6$ ,  $c = 8$  và  $m_a = 5$ . Tính  $a$ ,  $\hat{A}$ .

**Lời giải.**

Áp dụng công thức đường trung tuyến trong tam giác ta có

$$m_a^2 = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4} \Leftrightarrow 5^2 = \frac{6^2 + 8^2}{2} - \frac{a^2}{4} \Leftrightarrow a = 10.$$

**BÀI 5.** Cho tam giác  $ABC$ , gọi  $l_a$  là độ dài đường phân giác trong kẻ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng

$$l_a = \frac{bc \sin A}{(b + c) \sin \frac{A}{2}}.$$

**Lời giải.**

Gọi  $D$  là chân đường phân giác trong kẻ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$ . Ta có  $l_a = AD$ . Ta có

$$S_{ABC} = S_{ABD} + S_{ACD}$$


$$\Leftrightarrow \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} AB \cdot AD \cdot \sin \frac{A}{2} + \frac{1}{2} AC \cdot AD \cdot \sin \frac{A}{2}$$

$$\Leftrightarrow bc \sin A = l_a (c + b) \sin \frac{A}{2}$$

$$\Leftrightarrow l_a = \frac{bc \sin A}{(b + c) \sin \frac{A}{2}}$$

**BÀI 6.** Hai lực  $\vec{f}_1$  và  $\vec{f}_2$  cho trước cùng tác dụng lên một vật và tạo thành góc nhọn  $(\vec{f}_1, \vec{f}_2) = \alpha$ . Hãy lập công thức tính cường độ của hợp lực  $\vec{s}$ .

**Lời giải.**



Đặt  $\vec{AB} = \vec{f}_1$ ,  $\vec{AD} = \vec{f}_2$  và vẽ hình bình hành  $ABCD$ .

Khi đó  $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD} = \vec{f}_1 + \vec{f}_2 = \vec{s}$ .

Vậy  $|\vec{s}| = |\vec{AC}| = |\vec{f}_1 + \vec{f}_2|$ .

Theo định lý cosin đối với tam giác  $ABC$ , ta có:

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B, \text{ hay } |\vec{s}|^2 = |\vec{f}_1|^2 + |\vec{f}_2|^2 - 2|\vec{f}_1| \cdot |\vec{f}_2| \cdot \cos(180^\circ - \alpha).$$

$$\text{Do đó: } |\vec{s}| = \sqrt{|\vec{f}_1|^2 + |\vec{f}_2|^2 + 2|\vec{f}_1| \cdot |\vec{f}_2| \cdot \cos \alpha}.$$

## 2

### Áp dụng định lý sin

Nhận dạng định lý:

- Cho tam giác biết trước độ dài hai cạnh và số đo của một góc.
- Cho tam giác biết trước độ dài một cạnh và số đo của hai góc.
- Cho tam giác biết trước độ dài một cạnh, số đo góc đối diện và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

## 1. Ví dụ minh họa


**VÍ DỤ 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{A} = 120^\circ$  và  $BC = 10$  cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

 **Lời giải.**

Áp dụng định lí sin ta có  $R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{10}{2 \sin 120^\circ} = \frac{10\sqrt{3}}{3}$  cm.

### VÍ DỤ 2.

Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{A} = 40^\circ$ ,  $\widehat{B} = 55^\circ$  và  $AB = 100$ . Tính độ dài cạnh  $BC$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



 **Lời giải.**

Ta có  $\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B} = 180^\circ - 40^\circ - 55^\circ = 85^\circ$ .

Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow BC = \frac{AB \sin A}{\sin C} = \frac{100 \sin 40^\circ}{\sin 85^\circ} \approx 64,5.$$

**VÍ DỤ 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\frac{AB}{2} = \frac{BC}{3}$  và  $\widehat{A} = 45^\circ$ . Tính các góc  $B, C$  của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

 **Lời giải.**

Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \sin C = \frac{AB \sin A}{BC} = \frac{2 \sin 45^\circ}{3} \Rightarrow \widehat{C} \approx 28,1^\circ.$$

Khi đó  $\widehat{B} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{C} = 180^\circ - 45^\circ - 28,1^\circ = 106,9^\circ$ .

**VÍ DỤ 4.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{A} = 30^\circ$ ,  $\widehat{B} = 50^\circ$  và bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 10 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác  $ABC$  (làm tròn đến hàng phần mười).

 **Lời giải.**

Ta có  $\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B} = 180^\circ - 30^\circ - 50^\circ = 100^\circ$ .

Áp dụng định lí sin

$$AB = 2R \sin C = 2 \cdot 10 \cdot \sin 100^\circ \approx 19,7 \text{ cm};$$

$$BC = 2R \sin A = 2 \cdot 10 \cdot \sin 30^\circ = 10 \text{ cm};$$

$$AC = 2R \sin B = 2 \cdot 10 \cdot \sin 50^\circ \approx 15,3 \text{ cm}.$$

**VÍ DỤ 5.** Cho tam giác  $ABC$ . Chứng minh rằng  $\sin^2 A = \sin B \sin C$  khi và chỉ khi  $a^2 = bc$ .

 **Lời giải.**

Theo định lí sin ta có  $\sin A = \frac{a}{2R}$ ;  $\sin B = \frac{b}{2R}$ ;  $\sin C = \frac{c}{2R}$ .

Do đó

$$\sin^2 A = \sin B \sin C \Leftrightarrow \left(\frac{a}{2R}\right)^2 = \frac{b}{2R} \cdot \frac{c}{2R} \Leftrightarrow a^2 = bc.$$

**VÍ DỤ 6.** Cho tam giác  $ABC$ . Biết  $AB = 5$  cm,  $BC = 6$  cm và  $2 \sin A = \sin B + \sin C$ . Tính độ dài cạnh  $AC$ .

 **Lời giải.**

Theo định lí sin ta có  $\sin A = \frac{BC}{2R}$ ;  $\sin B = \frac{AC}{2R}$ ;  $\sin C = \frac{AB}{2R}$ .

Do đó

$$2 \sin A = \sin B + \sin C \Leftrightarrow \frac{2BC}{2R} = \frac{AC}{2R} + \frac{AB}{2R} \Leftrightarrow 2BC = AC + AB.$$

Suy ra  $AC = 2BC - AB = 12 - 5 = 7$  cm.

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{B} = 70^\circ$  và  $AC = 15$  cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**Lời giải.**

Áp dụng định lý sin ta có  $R = \frac{AC}{2 \sin B} = \frac{15}{2 \sin 70^\circ} \approx 8$  cm.

**BÀI 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{B} = 30^\circ$ ,  $\widehat{C} = 65^\circ$  và  $BC = 50$ . Tính độ dài cạnh  $AB$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**Lời giải.**

Ta có  $\widehat{A} = 180^\circ - \widehat{B} - \widehat{C} = 180^\circ - 30^\circ - 65^\circ = 85^\circ$ .

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AB = \frac{BC \sin C}{\sin A} = \frac{50 \sin 65^\circ}{\sin 85^\circ} \approx 46,9.$$

**BÀI 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\frac{BC}{3} = \frac{AC}{5}$  và  $\widehat{A} = 30^\circ$ . Tính các góc  $B, C$  của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

**Lời giải.**

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \sin B = \frac{AC \sin A}{BC} = \frac{5 \sin 30^\circ}{3} \Rightarrow B \approx 56,4^\circ.$$

Khi đó  $\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B} = 180^\circ - 30^\circ - 56,4^\circ = 93,6^\circ$ .

**BÀI 4.** Cho tam giác  $ABC$  thỏa mãn  $a \sin B = c \sin A$ . Chứng minh rằng tam giác  $ABC$  cân.

**Lời giải.**

Từ giả thiết suy ra  $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin B}$ . (1)

Áp dụng định lý sin ta có  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B}$ . (2)

Từ (1) và (2) suy ra  $\frac{c}{\sin B} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow b = c$ .

Vậy tam giác  $ABC$  cân.

**BÀI 5.** Cho tam giác  $ABC$  thỏa mãn  $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C$ . Chứng minh rằng tam giác  $ABC$  vuông.

**Lời giải.**

Từ định lý sin suy ra  $\sin A = \frac{a}{2R}$ ,  $\sin B = \frac{b}{2R}$ ,  $\sin C = \frac{c}{2R}$ .

Khi đó


$$\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C \Leftrightarrow \left(\frac{a}{2R}\right)^2 = \left(\frac{b}{2R}\right)^2 + \left(\frac{c}{2R}\right)^2 \Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2.$$

Vậy tam giác  $ABC$  vuông tại  $A$ .

**BÀI 6.**

Cho tam giác  $ABC$ . Gọi  $D$  là điểm thuộc miền trong tam giác  $ABC$  sao cho  $\widehat{BAD} = \widehat{CBD} = \widehat{ACD} = \varphi$ . Chứng minh rằng

$$\sin^3 \varphi = \sin(A - \varphi) \sin(B - \varphi) \sin(C - \varphi).$$



**Lời giải.**

Áp dụng định lý sin cho các tam giác  $ABD$ ,  $BCD$  và  $ACD$  ta nhận được

$$\begin{cases} \frac{BD}{\sin \varphi} = \frac{AD}{\sin(B - \varphi)} \\ \frac{CD}{\sin \varphi} = \frac{BD}{\sin(C - \varphi)} \\ \frac{AD}{\sin \varphi} = \frac{CD}{\sin(A - \varphi)} \end{cases} \Rightarrow \frac{BD}{\sin \varphi} \cdot \frac{CD}{\sin \varphi} \cdot \frac{AD}{\sin \varphi} = \frac{AD}{\sin(B - \varphi)} \cdot \frac{BD}{\sin(C - \varphi)} \cdot \frac{CD}{\sin(A - \varphi)}.$$

Rút gọn, ta suy ra  $\sin^3 \varphi = \sin(A - \varphi) \sin(B - \varphi) \sin(C - \varphi)$ .

**3**


**Giải tam giác và ứng dụng**

Giải tam giác là bài toán tìm độ dài tất cả các cạnh và độ lớn tất cả các góc của tam giác.

## 1. Ví dụ minh họa

### VÍ DỤ 1.

Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = 40$  cm,  $\widehat{B} = 30^\circ$ ,  $\widehat{C} = 45^\circ$ . Tính góc  $\widehat{A}$  và độ dài các cạnh  $AB$ ,  $AC$  của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



#### Lời giải.

Ta có  $\widehat{A} = 180^\circ - (\widehat{B} + \widehat{C}) = 180^\circ - (30^\circ + 45^\circ) = 105^\circ$ .

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AB = \frac{BC \sin C}{\sin A} = \frac{40 \sin 45^\circ}{\sin 105^\circ} \approx 29,3 \text{ (cm)};$$

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AC = \frac{BC \sin B}{\sin A} = \frac{40 \sin 30^\circ}{\sin 105^\circ} \approx 20,7 \text{ (cm)}.$$

**VÍ DỤ 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 25$ ,  $AC = 20$ ,  $\widehat{A} = 120^\circ$ . Tính cạnh  $BC$  và các góc  $B$ ,  $C$  của tam giác đó.

#### Lời giải.

Áp dụng định lý cosin ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 25^2 + 20^2 - 2 \cdot 25 \cdot 20 \cos 120^\circ = 1525 \Rightarrow BC = 5\sqrt{61} \approx 39.$$


Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \sin B = \frac{AC \sin A}{BC} = \frac{20 \sin 120^\circ}{5\sqrt{61}} \Rightarrow B \approx 26,3^\circ.$$

Khi đó  $\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B} = 180^\circ - 120^\circ - 26,3^\circ = 33,7^\circ$ .

### VÍ DỤ 3.

Để đo chiều rộng  $AB$  của một khúc sông, người ta chọn điểm  $C$ . Sau đó, đo khoảng cách  $BC$ , các góc  $B$  và  $C$ . Biết rằng  $BC = 200$  m,  $\widehat{B} = 107^\circ$ ,  $\widehat{C} = 28^\circ$ . Tìm chiều rộng  $AB$  của khúc sông đó (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).



#### Lời giải.


Ta có  $\widehat{A} = 180^\circ - \widehat{B} - \widehat{C} = 180^\circ - 107^\circ - 28^\circ = 55^\circ$ .

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AB = \frac{BC \sin C}{\sin A} = \frac{200 \sin 28^\circ}{\sin 55^\circ} \approx 113,6 \text{ m}.$$

### VÍ DỤ 4.

Để đo chiều cao  $CH$  của một tháp truyền hình, người ta chọn hai điểm quan sát  $A$ ,  $B$  trên mặt đất (hình vẽ). Biết  $\widehat{CAH} = 51^\circ$ ,  $\widehat{CBH} = 66^\circ$  và  $AB = 75$  m, tính chiều cao của tháp.



#### Lời giải.

Ta có  $\widehat{ACB} = \widehat{CBH} - \widehat{CAH} = 66^\circ - 51^\circ = 15^\circ$ .


Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{BC}{\sin \widehat{CAH}} \Rightarrow BC = \frac{AB \sin \widehat{CAH}}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{75 \sin 51^\circ}{\sin 15^\circ}.$$

Suy ra  $CH = BC \sin \widehat{CBH} = \frac{75 \sin 51^\circ \sin 66^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 205,7$  m.

### VÍ DỤ 5.

Trên ngọn đồi có một cái tháp cao 120 m. Đỉnh tháp  $B$  và chân tháp  $C$  nhìn điểm  $A$  ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng  $35^\circ$  và  $60^\circ$  so với phương thẳng đứng. Xác định chiều cao  $HA$  của ngọn đồi. (Làm tròn đến phần mười)



### Lời giải.

Ta có  $\widehat{BAC} = 60^\circ - 35^\circ = 25^\circ$ ;  $\widehat{ACH} = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$

Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{AC}{\sin \widehat{ABC}} = \frac{BC}{\sin \widehat{BAC}} \Rightarrow AC = \frac{BC \sin \widehat{ABC}}{\sin \widehat{BAC}} = \frac{120 \sin 35^\circ}{\sin 25^\circ}.$$

Suy ra  $AH = AC \sin \widehat{ACH} = \frac{120 \sin 35^\circ \sin 30^\circ}{\sin 25^\circ} \approx 81,4$  m.

## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 8$ ,  $BC = 10$ ,  $AC = 15$ . Tính  $\widehat{A} + 2\widehat{C}$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

### Lời giải.

Áp dụng định lí cosin ta có

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{8^2 + 15^2 - 10^2}{2 \cdot 8 \cdot 15} = \frac{63}{80} \Rightarrow \widehat{A} \approx 38,04^\circ.$$

$$\cos C = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2 \cdot AC \cdot BC} = \frac{15^2 + 10^2 - 8^2}{2 \cdot 15 \cdot 10} = \frac{87}{100} \Rightarrow \widehat{C} \approx 29,54^\circ.$$

Suy ra  $\widehat{A} + 2\widehat{C} \approx 97,1^\circ$ .

**BÀI 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 15$  cm,  $AC = 21$  cm,  $\widehat{A} = 30^\circ$ . Tính cạnh  $BC$  và các góc  $B$ ,  $C$  của tam giác đó (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

### Lời giải.

Áp dụng định lí cosin ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 15^2 + 21^2 - 2 \cdot 15 \cdot 21 \cos 30^\circ \Rightarrow BC \approx 11 \text{ cm}.$$


Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \sin B = \frac{AC \sin A}{BC} = \frac{21 \sin 30^\circ}{11} \Rightarrow B \approx 72,7^\circ.$$

Khi đó  $\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B} = 180^\circ - 30^\circ - 72,7^\circ = 77,3^\circ$ .

### BÀI 3.

Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 15$ ,  $AC = 12$ ,  $\widehat{A} = 60^\circ$ .  $M$  là điểm thuộc cạnh  $AB$  sao cho  $AM = 2BM$ . Tính cạnh  $CM$ , góc  $\widehat{BCM}$  và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $BCM$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).





**Lời giải.**

Ta có  $AM = 2BM \Rightarrow BM = \frac{1}{3}AB = 5$  và  $AM = \frac{2}{3}AB = 10$ .

Áp dụng định lí côsin ta có

$$CM^2 = AM^2 + AC^2 - 2AM \cdot AC \cos A = 10^2 + 12^2 - 2 \cdot 10 \cdot 12 \cos 60^\circ = 124 \Rightarrow CM = \sqrt{124} \approx 11,1;$$

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 15^2 + 12^2 - 2 \cdot 15 \cdot 12 \cos 60^\circ = 189 \Rightarrow BC = \sqrt{189}.$$

Áp dụng định lí côsin ta có


$$\begin{aligned} BM^2 &= CM^2 + CB^2 - 2CM \cdot CB \cos \widehat{BCM} \\ \Leftrightarrow \cos \widehat{BCM} &= \frac{CM^2 + CB^2 - BM^2}{2CM \cdot CB} \\ \Leftrightarrow \cos \widehat{BCM} &= \frac{124 + 189 - 5^2}{2\sqrt{124} \cdot \sqrt{189}} \\ \Rightarrow \widehat{BCM} &\approx 19,8^\circ. \end{aligned}$$

Áp dụng định lí sin, ta nhận được bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $BCM$  là

$$R = \frac{BM}{2 \sin \widehat{BCM}} \approx 7,4.$$

**BÀI 4.**

Để đo chiều rộng  $AB$  của một khúc sông, người ta chọn điểm  $C$ , đo khoảng cách  $BC$ , các góc  $B$  và  $C$ . Biết rằng  $BC = 250$  m,  $\widehat{B} = 104^\circ$ ,  $\widehat{C} = 31^\circ$ . Tìm chiều rộng  $AB$  của khúc sông đó (làm tròn đến chữ số hàng đơn vị).



**Lời giải.**


Ta có  $\widehat{A} = 180^\circ - \widehat{B} - \widehat{C} = 180^\circ - 104^\circ - 31^\circ = 45^\circ$ .

Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AB = \frac{BC \sin C}{\sin A} = \frac{250 \sin 31^\circ}{\sin 45^\circ} \approx 182 \text{ m}.$$

**BÀI 5.**

Để đo chiều cao  $CH$  của một tháp truyền hình, người ta chọn hai điểm quan sát  $A, B$  trên mặt đất (hình vẽ). Biết  $\widehat{CAH} = 54^\circ$ ,  $\widehat{CBH} = 68^\circ$  và  $AB = 80$  m, tính chiều cao của tháp (Làm tròn đến hàng đơn vị).



**Lời giải.**

Ta có  $\widehat{ACB} = \widehat{CBH} - \widehat{CAH} = 68^\circ - 54^\circ = 14^\circ$ .

Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{AB}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{BC}{\sin \widehat{CAH}} \Rightarrow BC = \frac{AB \sin \widehat{CAH}}{\sin \widehat{ACB}} = \frac{80 \sin 54^\circ}{\sin 14^\circ}.$$


$$\text{Suy ra } CH = BC \sin \widehat{CBH} = \frac{80 \sin 54^\circ \sin 68^\circ}{\sin 14^\circ} \approx 248 \text{ m}.$$

## 1. Ví dụ minh họa

**VÍ DỤ 1.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{A} = 60^\circ$  và  $AB = 8$  cm,  $AC = 5$  cm.

- Tính diện tích của tam giác  $ABC$ .
- Tính độ dài đường cao hạ từ đỉnh  $A$  của tam giác  $ABC$ .
- Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ .

**Lời giải.**



- a) Áp dụng công thức tính diện tích tam giác ta có

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

- b) Áp dụng định lý cosin trong tam giác  $ABC$  ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos 60^\circ = 8^2 + 5^2 - 2 \cdot 8 \cdot 5 \cdot \frac{1}{2} = 49 \Rightarrow BC = 7.$$

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AH \cdot BC \Rightarrow AH = \frac{2S_{\triangle ABC}}{BC} = \frac{2 \cdot 10\sqrt{3}}{7} = \frac{20\sqrt{3}}{7}.$$

- c)  $S_{\triangle ABC} = pr \Rightarrow r = \frac{S_{\triangle ABC}}{p} = \frac{2S_{\triangle ABC}}{AB + BC + AC} = \frac{2 \cdot 10\sqrt{3}}{5 + 8 + 7} = \sqrt{3}.$


**VÍ DỤ 2.** Cho hình bình hành  $ABCD$  có  $AB = 6$ ,  $BC = 8$  và  $\widehat{ABC} = 60^\circ$ . Tính diện tích hình bình hành  $ABCD$ .

**Lời giải.**

Ta có

$$S_{ABCD} = 2S_{\triangle ABC} = 2 \cdot \frac{1}{2} BA \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC}$$

$$= 6 \cdot 8 \cdot \cos 60^\circ = 24$$



**VÍ DỤ 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{A} = 120^\circ$ ,  $\widehat{B} = 30^\circ$ , diện tích tam giác  $ABC$  bằng  $9\sqrt{3}$ . Tính các cạnh của tam giác  $ABC$ .

**Lời giải.**

Ta có  $\widehat{C} = 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{B}) = 30^\circ$ .

Khi đó

$$\begin{cases} \frac{BC}{\sin 120^\circ} = \frac{AC}{\sin 30^\circ} = \frac{AB}{\sin 30^\circ} \\ S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot AC \cdot \sin 30^\circ = 9\sqrt{3} \end{cases}$$


$$\Leftrightarrow \begin{cases} BC = \sqrt{3}AC \\ BC \cdot AC = 36\sqrt{3} \\ AC = AB \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} BC = 6\sqrt{3} \\ AC = 6 \\ AB = 6. \end{cases}$$

Vậy  $BC = 6\sqrt{3}$ ,  $AC = 6$ ,  $AB = 6$ .

**VÍ DỤ 4.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 2$ ,  $AC = 2\sqrt{7}$  và  $BC = 4$ .

- Tính góc  $B$  và diện tích tam giác  $ABC$ .
- Tính độ dài đường phân giác trong của góc  $B$  của tam giác  $ABC$ .

**Lời giải.**




a) Ta có  $\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{4 + 16 - 28}{2 \cdot 2 \cdot 4} = \frac{-1}{2} \Rightarrow \widehat{B} = 120^\circ$ .

Và  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot BC \cdot \sin 120^\circ = 2\sqrt{3}$ .

b) Gọi  $D$  là chân đường phân giác trong của góc  $B$ .  
Ta có

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD} \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{3} &= \frac{1}{2} AB \cdot BD \cdot \sin \widehat{ABD} + \frac{1}{2} CB \cdot BD \cdot \sin \widehat{CBD} \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{3} &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot BD \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot BD \cdot \sin 60^\circ \\ \Leftrightarrow 2\sqrt{3} &= \frac{3\sqrt{3}}{2} BD \Leftrightarrow BD = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$



## 2. Bài tập tự luận

**BÀI 1.** Cho tam giác với ba cạnh  $a = 13, b = 14, c = 15$ . Tính diện tích của tam giác và độ dài đường cao  $h_c$ .

**Lời giải.**

Ta có  $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = 84$  Lại có  $S = \frac{1}{2} h_c \cdot 15 \Rightarrow h_c = 11\frac{1}{5}$ .

**BÀI 2.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 10, BC = 6$  và góc  $\widehat{B} = 120^\circ$ .


- Tính  $AC$  và diện tích tam giác  $ABC$ .
- Tính đường cao  $AH$  và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ .
- Tính độ dài đường phân giác trong  $BD$  của tam giác  $ABC$ .

**Lời giải.**

a) Ta có  $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B} = 14$  và  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC \cdot \sin B = 15\sqrt{3}$ .

b) Ta có

$$\begin{aligned} AH &= \frac{2S_{\triangle ABC}}{BC} = \frac{2 \cdot 15\sqrt{3}}{14} \\ \text{và } r &= \frac{S_{\triangle ABC}}{p} = \frac{15\sqrt{3}}{15} = \sqrt{3} \text{ với } p = \frac{6 + 10 + 14}{2} = 15. \end{aligned}$$



c) Ta có


$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= S_{\triangle ABD} + S_{\triangle BCD} \\ \Leftrightarrow 15\sqrt{3} &= \frac{1}{2} AB \cdot BD \cdot \sin \widehat{ABD} + \frac{1}{2} CB \cdot BD \cdot \sin \widehat{CBD} \\ \Leftrightarrow 15\sqrt{3} &= \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot BD \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot BD \cdot \sin 60^\circ \\ \Leftrightarrow 15\sqrt{3} &= 4\sqrt{3} \cdot BD \Leftrightarrow BD = \frac{15}{4}. \end{aligned}$$

**BÀI 3.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 2, AC = 3$  và  $\widehat{BAC} = 120^\circ$ . Tính độ dài  $BC$ , diện tích tam giác  $ABC$ , độ dài đường phân giác trong  $AD$  của tam giác  $ABC$ .

**Lời giải.**

Ta có

- $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A} = \sqrt{19}$   
và  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \sin A = \frac{3\sqrt{3}}{2}$ .
- Và



$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= S_{\triangle BAD} + S_{\triangle DAC} \\ \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{3}}{2} &= \frac{1}{2}AB \cdot AD \cdot \sin \widehat{BAD} + \frac{1}{2}AC \cdot AD \cdot \sin \widehat{DAC} \\ \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{3}}{2} &= \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot AD \cdot \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot AD \cdot \sin 60^\circ \\ \Leftrightarrow \frac{3\sqrt{3}}{2} &= \frac{5\sqrt{3}}{4}AD \Leftrightarrow AD = \frac{6}{5}. \end{aligned}$$

**BÀI 4.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = c$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ . Gọi  $h_a$ ,  $h_b$ ,  $h_c$  lần lượt là các đường cao tương ứng xuất phát từ các đỉnh  $A$ ,  $B$ ,  $C$  và  $r$  là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  $ABC$ . Chứng minh  $\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{r}$ .

**Lời giải.**

Ta có  $S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}bh_b = \frac{1}{2}ch_c \Rightarrow \frac{1}{h_a} = \frac{a}{2S}$ ,  $\frac{1}{h_b} = \frac{b}{2S}$ ,  $\frac{1}{h_c} = \frac{c}{2S}$  và  $S = pr \Rightarrow \frac{1}{r} = \frac{p}{S}$ .

$$\begin{aligned} VT &= \frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{a}{2S} + \frac{b}{2S} + \frac{c}{2S} \\ &= \frac{a+b+c}{2S} = \frac{2p}{2S} \\ &= \frac{p}{S} = \frac{1}{r}. \end{aligned}$$

**BÀI 5.** Cho tam giác  $ABC$  không vuông ở  $A$ , chứng minh  $S = \frac{1}{4}(b^2 + c^2 - a^2) \tan A$ .

**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2}bc \sin A \\ &= \frac{1}{2}bc \cos A \cdot \frac{\sin A}{\cos A} \\ &= \frac{1}{2}bc \cdot \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \cdot \tan A \\ &= \frac{1}{4}(b^2 + c^2 - a^2) \cdot \tan A. \end{aligned}$$

## C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

**CÂU 1.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = 5$ ,  $BC = 7$ ,  $CA = 8$ . Số đo góc  $\widehat{A}$  bằng

- (A)  $90^\circ$ . (B)  $45^\circ$ . (C)  $60^\circ$ . (D)  $30^\circ$ .

**Lời giải.**

Theo định lý hàm cosine, ta có  $\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC} = \frac{5^2 + 8^2 - 7^2}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{1}{2}$ .

Do đó,  $\widehat{A} = 60^\circ$ .

Chọn đáp án (C) ..... □

**CÂU 2.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = \sqrt{2}$ ,  $AC = \sqrt{3}$  và  $\widehat{C} = 45^\circ$ . Tính độ dài cạnh  $BC$ .

- (A)  $BC = \sqrt{5}$ . (B)  $BC = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ . (C)  $BC = \sqrt{6}$ . (D)  $BC = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$ .

**Lời giải.**

Theo định lý hàm cosine, ta có

$$\begin{aligned} AB^2 &= AC^2 + BC^2 - 2 \cdot AC \cdot BC \cdot \cos \widehat{C} \Rightarrow (\sqrt{2})^2 = (\sqrt{3})^2 + BC^2 - 2 \cdot \sqrt{3} \cdot BC \cdot \cos 45^\circ \\ \Rightarrow BC &= \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (B) ..... □

**CÂU 3.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = 2$ ,  $AC = 1$  và  $\widehat{A} = 60^\circ$ . Tính độ dài cạnh  $BC$ .

- (A)  $BC = \sqrt{2}$ . (B)  $BC = \sqrt{3}$ . (C)  $BC = 1$ . (D)  $BC = 2$ .

**Lời giải.**

Theo định lý hàm cosine, ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A = 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \cos 60^\circ = 3$$

$$\Rightarrow BC = \sqrt{3}.$$

Chọn đáp án (B) □

**CÂU 4.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = 3$ ,  $AC = 6$ ,  $\widehat{BAC} = 60^\circ$ . Tính độ dài đường cao  $h_a$  của tam giác.

- (A)  $h_a = 3\sqrt{3}$ . (B)  $h_a = \sqrt{3}$ . (C)  $h_a = \frac{3}{2}$ . (D)  $h_a = 3$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lý hàm số cosine, ta có  $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 27 \Rightarrow BC = 3\sqrt{3}$ .

$$\text{Ta có } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin A = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 6 \cdot \sin 60^\circ = \frac{9\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{Lại có } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h_a \Rightarrow h_a = \frac{2S}{BC} = 3.$$

Chọn đáp án (D) □

**CÂU 5.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$ ,  $BC = \sqrt{3}$ ,  $CA = \sqrt{2}$ . Gọi  $D$  là chân đường phân giác trong góc  $\widehat{A}$ . Khi đó góc  $\widehat{ADB}$  bằng

- (A)  $90^\circ$ . (B)  $45^\circ$ . (C)  $60^\circ$ . (D)  $75^\circ$ .

**Lời giải.**

Theo định lý hàm cosine, ta có

$$\cos \widehat{BAC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = -\frac{1}{2}.$$


$$\Rightarrow \widehat{BAC} = 120^\circ \Rightarrow \widehat{BAD} = 60^\circ.$$

$$\cos \widehat{ABC} = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\Rightarrow \widehat{ABC} = 45^\circ.$$

Trong  $\triangle ABD$  có  $\widehat{BAD} = 60^\circ$ ,  $\widehat{ABD} = 45^\circ$ .

$$\Rightarrow \widehat{ADB} = 75^\circ.$$



Chọn đáp án (D) □

**CÂU 6.** Tam giác  $ABC$  có  $AB = 4$ ,  $BC = 6$ ,  $AC = 2\sqrt{7}$ . Điểm  $M$  thuộc đoạn  $BC$  sao cho  $MC = 2MB$ . Tính độ dài cạnh  $AM$ .

- (A)  $AM = 4\sqrt{2}$ . (B)  $AM = 3\sqrt{2}$ . (C)  $AM = 2\sqrt{3}$ . (D)  $AM = 3$ .

**Lời giải.**

Theo định lý hàm cosine, ta có

$$\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2 \cdot AB \cdot BC} = \frac{4^2 + 6^2 - (2\sqrt{7})^2}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{1}{2}.$$


$$\text{Do } MC = 2MB \Rightarrow BM = \frac{1}{3}BC = 2.$$

Theo định lý hàm cosine, ta có

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2 \cdot AB \cdot BM \cdot \cos B$$

$$= 4^2 + 2^2 - 2 \cdot 4 \cdot 2 \cdot \frac{1}{2} = 12.$$

$$\Rightarrow AM = 2\sqrt{3}.$$



Chọn đáp án (C) □

**CÂU 7.** Cho hình thoi  $ABCD$  cạnh bằng 1 cm và có  $\widehat{BAD} = 60^\circ$ . Tính độ dài cạnh  $AC$ .

- (A)  $AC = 2$ . (B)  $AC = \sqrt{3}$ . (C)  $AC = 2\sqrt{3}$ . (D)  $AC = \sqrt{2}$ .


**Lời giải.**

Do  $ABCD$  là hình thoi, có  $\widehat{BAD} = 60^\circ \Rightarrow \widehat{ABC} = 120^\circ$ .

Theo định lý hàm cosine, ta có

$$\begin{aligned} AC^2 &= AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \widehat{ABC} \\ &= 1^2 + 1^2 - 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \cos 120^\circ \\ &= 3. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow AC = \sqrt{3}.$$



Chọn đáp án **(B)**..... □

**CÂU 8.** Khoảng cách từ  $A$  đến  $B$  không thể đo trực tiếp được vì phải qua một đầm lầy. Người ta xác định được một điểm  $C$  mà từ đó có thể nhìn được  $A$  và  $B$  dưới một góc  $78^\circ 24'$ . Biết  $CA = 250$  m,  $CB = 120$  m. Khoảng cách  $AB$  bằng bao nhiêu?

**(A)** 266 m.

**(B)** 255 m.

**(C)** 166 m.

**(D)** 298 m.


**Lời giải.**

Áp dụng định lý cosine cho  $\triangle ABC$ , ta có

$$\begin{aligned} AB^2 &= CA^2 + CB^2 - 2CA \cdot CB \cdot \cos C \\ &= 250^2 + 120^2 - 2 \cdot 250 \cdot 120 \cdot \cos 78^\circ 24'. \end{aligned}$$

$$\approx 64835$$

$$\Rightarrow AB \approx 255 \text{ (m)}.$$



Chọn đáp án **(B)**..... □

**CÂU 9.** Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = 2\sqrt{3}$ ,  $AB = \sqrt{6} - \sqrt{2}$ ,  $AC = 2\sqrt{2}$ .  $AD$  là tia phân giác của góc  $\widehat{BAD}$ . Tính góc  $\widehat{BAD}$ .

**(A)**  $60^\circ$ .

**(B)**  $90^\circ$ .

**(C)**  $45^\circ$ .

**(D)**  $75^\circ$ .

**Lời giải.**


$$\begin{aligned} \cos A &= \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} \\ &= \frac{(\sqrt{6} - \sqrt{2})^2 + (2\sqrt{2})^2 - (2\sqrt{3})^2}{2 \cdot (\sqrt{6} - \sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{2})} \\ &= \frac{8 - 4\sqrt{3} + 8 - 12}{2 \cdot (\sqrt{6} - \sqrt{2}) \cdot (2\sqrt{2})} \\ &= \frac{4 - 4\sqrt{3}}{-8 + 8\sqrt{3}} = \frac{-1}{2} \end{aligned}$$

Áp dụng hệ quả định lý cosine trong tam giác  $ABC$ , ta có:

Chọn đáp án **(A)**..... □

**CÂU 10.**

Một ô tô muốn đi từ địa điểm  $H$  đến địa điểm  $G$ , nhưng giữa  $H$  và  $G$  là một ngọn núi cao nên ô tô phải đi thành 2 đoạn từ  $H$  lên  $K$  (ô tô leo dốc lên núi) và từ  $K$  đến  $G$  (ô tô xuống núi). Các đoạn đường tạo thành tam giác  $HKG$  với  $HK = 15$  km,  $KG = 20$  km và  $\widehat{HKG} = 120^\circ$ . Giả sử cứ chạy 1 km, ô tô tiêu thụ hết 0,3 lít xăng. Giá thành xăng hiện nay là 13050 đồng một lít xăng. Hỏi ô tô đi từ  $H$  đến  $G$  hết bao nhiêu tiền xăng?



**(A)** 137025 đồng.

**(B)** 107025 đồng.

**(C)** 12278 đồng.

**(D)** 137000 đồng.

**Lời giải.**

Tổng quãng đường mà ô tô phải đi là  $S = HK + KG = 15 + 20 = 35$  km.

Ô tô đi hết quãng đường tiêu thụ hết số lít xăng là  $35 \cdot 0,3 = 10,5$  lít.

Ô tô đi từ  $H$  đến  $G$  hết số tiền xăng là  $10,5 \cdot 13050 = 137025$  đồng.

Chọn đáp án **(A)**..... □

**CÂU 11.** Cho tam giác  $ABC$  có góc  $\widehat{B} = 45^\circ$ ,  $AC = 28$ ,  $BC = 25$ . Tính số đo góc  $A$  của tam giác (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- (A)  $39,1^\circ$ . (B)  $40,2^\circ$ . (C)  $39,2^\circ$ . (D)  $40^\circ$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \sin A = \frac{BC \sin B}{AC} = \frac{25 \sin 45^\circ}{28} = \frac{25\sqrt{2}}{56} \Rightarrow \widehat{A} \approx 39,2^\circ.$$

Chọn đáp án (C).

**CÂU 12.** Cho tam giác  $ABC$  có góc  $\widehat{B} = 30^\circ$ ,  $\widehat{C} = 75^\circ$ ,  $AB = 20$ . Độ dài cạnh  $AC$  là

- (A)  $20(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ . (B)  $10(\sqrt{6} - \sqrt{2})$ . (C)  $10(\sqrt{6} - 1)$ . (D)  $5(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow AC = \frac{AB \cdot \sin B}{\sin C} = \frac{20 \cdot \sin 30^\circ}{\sin 75^\circ} = 10(\sqrt{6} - \sqrt{2}).$$

Chọn đáp án (B).

**CÂU 13.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{B} = 30^\circ$ ,  $\widehat{C} = 45^\circ$  và  $BC = 30$  cm. Tính độ dài cạnh  $AB$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- (A)  $15(\sqrt{3} + 1)$  cm. (B)  $15(\sqrt{3} - 1)$  cm. (C)  $30(2\sqrt{3} - 1)$  cm. (D)  $30(\sqrt{3} - 1)$  cm.

**Lời giải.**

Ta có  $\widehat{A} = 180^\circ - \widehat{B} - \widehat{C} = 180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = 105^\circ$ .

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AB = \frac{BC \sin C}{\sin A} = \frac{30 \sin 45^\circ}{\sin 105^\circ} = 30\sqrt{3} - 30 \text{ cm}.$$

Chọn đáp án (D).

**CÂU 14.** Cho tam giác  $ABC$  có  $BC = 11$ ,  $\widehat{A} = 30^\circ$ . Độ dài cạnh  $AB$  lớn nhất bằng bao nhiêu?

- (A)  $11\sqrt{3}$ . (B)  $\frac{22\sqrt{3}}{2}$ . (C) 22. (D)  $11(\sqrt{3} + 1)$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lý sin ta có

$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow AB = \frac{BC \sin C}{\sin A} = \frac{11 \sin C}{\sin 30^\circ} \leq 22.$$

Đẳng thức xảy ra khi  $\widehat{C} = 90^\circ$ .

Vậy độ dài cạnh  $AB$  lớn nhất bằng 22.

Chọn đáp án (C).

**CÂU 15.** Cho tam giác  $ABC$  có  $\widehat{C} = 30^\circ$  và  $AB = 30$  cm. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABC$ .

- (A)  $30\sqrt{3}$  cm. (B)  $15\sqrt{3}$  cm. (C) 30 cm. (D) 15 cm.

**Lời giải.**

Áp dụng định lý sin ta có  $R = \frac{AB}{2 \sin C} = \frac{30}{2 \sin 30^\circ} = 30$  cm.

Chọn đáp án (C).

**CÂU 16.** Cho tam giác  $MNK$  có  $MN = a$ ,  $MK = 3a$ ,  $\widehat{M} = 120^\circ$ . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp  $R$  của tam giác  $MNK$ .

- (A)  $\frac{a\sqrt{39}}{3}$ . (B)  $\frac{a\sqrt{21}}{3}$ . (C)  $\frac{a\sqrt{33}}{3}$ . (D)  $\frac{a\sqrt{42}}{3}$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lý cosin ta có

$$NK^2 = MN^2 + MK^2 - 2MN \cdot MK \cos M = a^2 + 9a^2 - 2 \cdot a \cdot 3a \cos 120^\circ = 13a^2 \Rightarrow NK = a\sqrt{13}.$$


Áp dụng định lý sin ta có  $R = \frac{NK}{2 \sin M} = \frac{a\sqrt{13}}{2 \sin 120^\circ} = \frac{a\sqrt{39}}{3}$ .

Chọn đáp án **A** ..... □

**CÂU 17.**

Để đo bán kính của một chiếc đĩa cổ chỉ còn lại một phần, các nhà khảo cổ chọn 3 điểm trên chiếc đĩa (hình vẽ). Biết  $\widehat{A} = 33^\circ$ ,  $BC = 15,3$  cm, tính bán kính của chiếc đĩa (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- A** 13,8cm. **B** 12,6cm. **C** 12,9cm. **D** 13,1cm.



**Lời giải.**

Áp dụng định lý sin suy ra bán kính của chiếc đĩa là

$$R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{15,3}{2 \sin 33^\circ} \approx 13,8 \text{ (cm)}.$$

Chọn đáp án **A** ..... □

**CÂU 18.** Cho tam giác  $ABC$  có  $b^2 = a^2 + c^2 + ac$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A**  $\sin^2 A = \sin^2 B + \sin^2 C + \sin B \sin C$ . **B**  $\sin^2 B = \sin^2 A + \sin^2 C + \sin A \sin C$ .  
**C**  $\widehat{A} = 120^\circ$ . **D**  $\widehat{A} = 60^\circ$ .

**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} b^2 &= a^2 + c^2 + ac \\ \Leftrightarrow (2R \sin B)^2 &= (2R \sin A)^2 + (2R \sin C)^2 + (2R \sin A) \cdot (2R \sin C) \\ \Leftrightarrow \sin^2 B &= \sin^2 A + \sin^2 C + \sin A \sin C. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **B** ..... □

**CÂU 19.** Cho tam giác  $ABC$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

- A**  $\cot A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$ . **B**  $\cot A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{abc}$ . **C**  $\cot A = \frac{R(b^2 + c^2 - a^2)}{2abc}$ . **D**  $\cot A = \frac{R(b^2 + c^2 - a^2)}{abc}$ .

**Lời giải.**

Ta có


$$\cot A = \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc \cdot \frac{a}{2R}} = \frac{R(b^2 + c^2 - a^2)}{abc}.$$

Chọn đáp án **D** ..... □

**CÂU 20.**

Cho tam giác  $ABCD$  nội tiếp đường tròn tâm  $O$ . Biết  $\widehat{ACB} = 32^\circ$ ,  $\widehat{ADC} = 75^\circ$  và  $BC = 8,8$  cm. Tính bán kính đường tròn đường tròn  $(O)$ . (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

- A** 7,8 cm. **B** 7,5 cm. **C** 6,6 cm. **D** 6,5 cm.



**Lời giải.**

Tứ giác  $ABCD$  nội tiếp suy ra  $\widehat{ADB} = \widehat{ACB} = 32^\circ \Rightarrow \widehat{BCD} = \widehat{ADC} - \widehat{ADB} = 43^\circ$ . Khi đó, bán kính đường tròn tâm  $O$  là

$$R = \frac{BC}{2 \sin \widehat{BDC}} = \frac{8,8}{2 \sin 43^\circ} \approx 6,5 \text{ (cm)}.$$

Chọn đáp án **D** ..... □



**CÂU 21.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 12$ ,  $BC = 15$ ,  $AC = 18$ . Tính  $\widehat{A} + 2\widehat{C}$  (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- (A)  $129,3^\circ$ . (B)  $142,7^\circ$ . (C)  $118,4^\circ$ . (D)  $138,6^\circ$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lí côsin ta có

$$\cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} = \frac{12^2 + 18^2 - 15^2}{2 \cdot 12 \cdot 18} = \frac{9}{16} \Rightarrow \widehat{A} \approx 55,77^\circ.$$

$$\cos C = \frac{AC^2 + BC^2 - AB^2}{2 \cdot AC \cdot BC} = \frac{18^2 + 15^2 - 12^2}{2 \cdot 18 \cdot 15} = \frac{3}{4} \Rightarrow \widehat{C} \approx 41,4^\circ.$$

Suy ra  $\widehat{A} + 2\widehat{C} \approx 138,6^\circ$ .

Chọn đáp án (D) □

**CÂU 22.** Cho tam giác  $ABC$  có góc  $\widehat{A} = 60^\circ$ ,  $\widehat{B} = 45^\circ$ ,  $AB = 25$ . Độ dài cạnh  $BC$  gần với giá trị nào nhất dưới đây?

- (A) 22. (B) 22,5. (C) 24,5. (D) 21,5.

**Lời giải.**

Ta có  $\widehat{C} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{B} = 180^\circ - 60^\circ - 45^\circ = 75^\circ$ .

Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{BC}{\sin A} = \frac{AB}{\sin C} \Rightarrow BC = \frac{AB \cdot \sin A}{\sin C} = \frac{25 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 75^\circ} \approx 22,4.$$

Chọn đáp án (B) □

**CÂU 23.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 8$ ,  $AC = 11$ ,  $\widehat{A} = 30^\circ$ . Số đo góc  $B$  gần với giá trị nào nhất dưới đây?

- (A)  $50,5^\circ$ . (B)  $45,8^\circ$ . (C)  $65,3^\circ$ . (D)  $55,2^\circ$ .

**Lời giải.**

Áp dụng định lí côsin ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 8^2 + 11^2 - 2 \cdot 8 \cdot 11 \cos 30^\circ \Rightarrow BC \approx 6,7.$$

Áp dụng định lí sin ta có


$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow \sin B = \frac{AC \sin A}{BC} = \frac{11 \sin 30^\circ}{6,7} \Rightarrow \widehat{B} \approx 55,2^\circ.$$

Chọn đáp án (D) □

**CÂU 24.**

Để đo bán kính của một chiếc đĩa cổ chỉ còn lại một phần, các nhà khảo cổ chọn ba điểm trên chiếc đĩa (hình vẽ). Biết  $AB = 7,1$  cm,  $BC = 16,3$  cm,  $AC = 19,6$  cm, tính bán kính của chiếc đĩa (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

- (A) 11,1cm. (B) 9,8cm. (C) 10,3cm. (D) 10,1cm.



**Lời giải.**

Áp dụng định lí côsin ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A$$

$$\Leftrightarrow \cos A = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2AB \cdot AC}$$

$$\Leftrightarrow \cos A = \frac{7,1^2 + 19,6^2 - 16,3^2}{2 \cdot 7,1 \cdot 19,6}$$

$$\Rightarrow \widehat{A} \approx 52,6427^\circ.$$

Áp dụng định lí sin suy ra bán kính của chiếc đĩa là


$$R = \frac{BC}{2 \sin A} = \frac{16,3}{2 \sin 52,6427^\circ} \approx 10,3 \text{ (cm)}.$$

Chọn đáp án (C) □

**CÂU 25.**

Để đo khoảng cách từ  $A$  đến  $B$  ngang qua một đầm lầy, người ta chọn điểm  $C$ , sau đó khoảng cách từ  $A$  đến  $C$  và các góc  $A, C$ . Tính khoảng cách từ  $A$  đến  $B$  biết  $AC = 115$  m,  $\widehat{A} = 98^\circ$ ,  $\widehat{C} = 52^\circ$ .

- A** 188,1 m.      **B** 190,7 m.      **C** 181,2 m.      **D** 193,6 m.



**Lời giải.**

Ta có  $\widehat{B} = 180^\circ - \widehat{A} - \widehat{C} = 30^\circ$ .

Áp dụng định lí sin ta có


$$\frac{AB}{\sin C} = \frac{AC}{\sin B} \Rightarrow AB = \frac{AC \sin C}{\sin B} = \frac{115 \sin 52^\circ}{\sin 30^\circ} \approx 181,2 \text{ (m)}.$$

Chọn đáp án **C** ..... □

**CÂU 26.**

Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 8$ ,  $AC = 10$ ,  $\widehat{A} = 75^\circ$ .  $M$  là điểm thuộc cạnh  $BC$  sao cho  $CM = 2BM$ . Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABM$  gần nhất với giá trị nào dưới đây?

- A** 3,8.      **B** 4,1.      **C** 3,6.      **D** 3,5.



**Lời giải.**

Áp dụng định lí cosin ta có

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos A = 8^2 + 10^2 - 2 \cdot 8 \cdot 10 \cos 75^\circ \Rightarrow BC \approx 11,072;$$

$$\cos B = \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} \approx 0,4888 \Rightarrow \widehat{B} \approx 60,4^\circ.$$

Ta có  $CM = 2BM \Rightarrow BM = \frac{1}{3}BC = 3,69$ .

Áp dụng định lí cosin ta có

$$AM^2 = AB^2 + BM^2 - 2AB \cdot BM \cos B = 8^2 + 3,69^2 - 2 \cdot 8 \cdot 3,69 \cdot 0,4888 \Rightarrow AM \approx 6,983.$$

Áp dụng định lí sin, suy ra bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  $ABM$  là


$$R = \frac{AM}{2 \sin B} = \frac{6,983}{2 \sin 60,4^\circ} \approx 4.$$

Chọn đáp án **B** ..... □

**CÂU 27.**

Tàu  $A$  rời cảng vào lúc 6h00 và chuyển động với vận tốc 30 km/h. Tàu  $B$  rời cảng vào lúc 6h30. Vào lúc 9h30 tàu  $B$  gặp tàu  $A$  tại điểm  $C$  (hình vẽ). Giả sử hai tàu chuyển động thẳng và có vận tốc không đổi trong suốt quá trình di chuyển, tính vận tốc tàu  $B$  (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

- A** 42,5 km/h.      **B** 44,8 km/h.      **C** 41,7 km/h.      **D** 45,4 km/h.




**Lời giải.**

Khoảng cách từ  $A$  đến  $C$  là  $30 \cdot 2,5 = 75$  km.

Áp dụng định lí sin ta có

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{BC}{\sin A} \Rightarrow BC = \frac{AC \sin A}{\sin B} = \frac{75 \sin 102^\circ}{\sin 55^\circ}.$$

Suy ra vận tốc của tàu  $B$  là  $v = \frac{BC}{2} = \frac{75 \sin 102^\circ}{2 \sin 55^\circ} \approx 44,8 \text{ km/h}$ .


Chọn đáp án **(B)** ..... 

**CÂU 28.** Chọn công thức đúng trong các đáp án sau

- (A)**  $S = \frac{1}{2}bc \sin B$ .      **(B)**  $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ .      **(C)**  $S = \frac{1}{2}ab \sin B$ .      **(D)**  $S = \frac{1}{2}ac \sin A$ .

 **Lời giải.**

Công thức đúng là  $S = \frac{1}{2}bc \sin A$ .


Chọn đáp án **(B)** ..... 

**CÂU 29.** Cho  $\triangle ABC$  với các cạnh  $AB = c$ ,  $AC = b$ ,  $BC = a$ . Gọi  $R$ ,  $r$ ,  $S$  lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và diện tích của tam giác  $ABC$ . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào **sai**?

- (A)**  $S = \frac{abc}{4R}$ .      **(B)**  $R = \frac{a}{\sin A}$ .      **(C)**  $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ .      **(D)**  $a^2 + b^2 - c^2 = 2ab \cos C$ .

 **Lời giải.**

Theo định lý Sin trong tam giác, ta có  $\frac{a}{\sin A} = 2R$ . Nên mệnh đề **sai** là " $R = \frac{a}{\sin A}$ ".


Chọn đáp án **(B)** ..... 

**CÂU 30.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 4$ ,  $AC = 3$ ,  $\widehat{BAC} = 30^\circ$ . Khi đó diện tích tam giác  $ABC$  bằng

- (A)** 3.      **(B)**  $4\sqrt{3}$ .      **(C)**  $6\sqrt{3}$ .      **(D)** 6.

 **Lời giải.**

Ta có  $S_{ABC} = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC} = \frac{4 \cdot 3 \cdot \sin 30^\circ}{2} = 3$ .

Chọn đáp án **(A)** ..... 

**CÂU 31.** Tìm chu vi tam giác  $ABC$ , biết  $AB = 6$  và  $2 \sin A = 3 \sin B = 4 \sin C$ .

- (A)** 26.      **(B)** 13.      **(C)**  $5\sqrt{26}$ .      **(D)**  $10\sqrt{6}$ .

 **Lời giải.**

Từ  $2 \sin A = 3 \sin B = 4 \sin C$  suy ra  $2BC = 3AC = 4AB$ .  
Mà  $AB = 6$  nên  $AC = 8$ ,  $BC = 12$ . Chu vi tam giác bằng 26.

Chọn đáp án **(A)** ..... 

**CÂU 32.** Cho tam giác  $ABC$  có  $a = 13 \text{ m}$ ,  $b = 14 \text{ m}$ ,  $c = 15 \text{ m}$ . Tính diện tích  $S$  của tam giác  $ABC$ .

- (A)**  $S = 84 \text{ m}^2$ .      **(B)**  $S = 90 \text{ m}^2$ .      **(C)**  $S = 76 \text{ m}^2$ .      **(D)**  $S = 80 \text{ m}^2$ .

 **Lời giải.**

Ta có  $p = \frac{a+b+c}{2} = 21$  và  $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = 84 \text{ m}^2$ .

Chọn đáp án **(A)** ..... 

**CÂU 33.** Cho tam giác  $ABC$ . Biết  $AB = 3$ ,  $AC = 4$ ,  $BC > 5$  và diện tích tam giác  $ABC$  bằng  $3\sqrt{3}$ . Số đo góc  $\widehat{BAC}$  bằng

- (A)**  $120^\circ$ .      **(B)**  $60^\circ$ .      **(C)**  $135^\circ$ .      **(D)**  $45^\circ$ .

 **Lời giải.**

Ta có  $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC}$ , suy ra

$$\sin \widehat{BAC} = \frac{2S_{\triangle ABC}}{AB \cdot AC} = \frac{2 \cdot 3\sqrt{3}}{3 \cdot 4} = \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \begin{cases} \widehat{BAC} = 60^\circ \\ \widehat{BAC} = 120^\circ \end{cases}$$

Mặt khác, ta có  $\cos \widehat{BAC} = \frac{AB^2 + AC^2 - BC^2}{2 \cdot AB \cdot AC} < \frac{9 + 16 - 25}{2 \cdot 3 \cdot 4} = 0$ .

Vậy  $\widehat{BAC} = 120^\circ$ .

Chọn đáp án **(A)** ..... 

**CÂU 34.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 2$ ,  $AC = 3$ ,  $BC = 4$ . Khi đó độ dài đường cao của tam giác  $ABC$  kẻ từ  $A$  bằng

- (A)**  $\frac{3\sqrt{15}}{2}$ .      **(B)**  $\frac{3\sqrt{15}}{4}$ .      **(C)**  $\frac{3\sqrt{15}}{8}$ .      **(D)**  $3\sqrt{15}$ .

 **Lời giải.**

Ta có nữa chu vi  $p = \frac{2+3+4}{2} = \frac{9}{2}$ .

$$\text{Suy ra } S_{ABC} = \sqrt{p(p-AB)(p-AC)(p-BC)} = \sqrt{\frac{9}{2} \left(\frac{9}{2} - 2\right) \left(\frac{9}{2} - 3\right) \left(\frac{9}{2} - 4\right)} = \frac{3\sqrt{15}}{4}.$$

$$\text{Suy ra độ dài đường cao kẻ từ } A \text{ bằng } \frac{2S_{ABC}}{BC} = \frac{2 \cdot \frac{3\sqrt{15}}{4}}{4} = \frac{3\sqrt{15}}{8}.$$

Chọn đáp án **(C)** ..... □

**CÂU 35.** Cho tam giác  $ABC$  có  $AB = 9\text{cm}$ ,  $AC = 12\text{cm}$  và  $BC = 15\text{cm}$ . Khi đó đường trung tuyến  $BM$  của tam giác  $ABC$  có độ dài là

**(A)** 117cm.

**(B)** 18,82cm.

**(C)** 10,82cm.

**(D)** 7,5cm.

**Lời giải.**

$$\text{Ta có } m_a^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4} = \frac{2(12^2 + 9^2) - 15^2}{4} = \frac{225}{4} \Rightarrow m_a = 7,5.$$

Chọn đáp án **(D)** ..... □

**CÂU 36.** Tam giác  $ABC$  có các trung tuyến  $m_a = 10$ ,  $m_b = 8$  và  $m_c = 6$ . Tính diện tích  $S$  của tam giác  $ABC$ .

**(A)**  $S = 32$ .

**(B)**  $S = 24$ .

**(C)**  $S = 48$ .

**(D)**  $S = 64$ .

**Lời giải.**

Gọi  $M, N, P$  lần lượt là trung điểm  $BC, CA, AB$ ,  $G$  là trọng tâm tam giác  $ABC$ .


Theo bài ra ta có  $AM = 10, BN = 8, CP = 6$ .

Lấy  $Q$  đối xứng với  $G$  qua  $M$  thì  $BGCQ$  là hình bình hành và ta có  $BQ = CG = \frac{2CP}{3} = 4, QG = 2GM = \frac{2AM}{3} = \frac{20}{3}$ .

Mà  $BG = \frac{2BN}{3} = \frac{16}{3}$  nên  $QG^2 = BG^2 + BQ^2$  hay  $\triangle BGQ$  vuông tại  $B$ .

$$\text{Suy ra } S_{BGQ} = \frac{BG \cdot BQ}{2} = \frac{32}{3}.$$

$$\text{Mà } S_{BGQ} = S_{BGC} = \frac{1}{3} S_{ABC} \Rightarrow S_{ABC} = 32.$$



Chọn đáp án **(A)** ..... □

**CÂU 37.** Cho tam giác  $ABC$  có chu vi bằng 26 cm và  $\frac{\sin A}{2} = \frac{\sin B}{6} = \frac{\sin C}{5}$ . Tính diện tích của tam giác  $ABC$ .

**(A)**  $2\sqrt{23} \text{ (cm}^2\text{)}$ .

**(B)**  $6\sqrt{13} \text{ (cm}^2\text{)}$ .

**(C)**  $3\sqrt{39} \text{ (cm}^2\text{)}$ .

**(D)**  $5\sqrt{21} \text{ (cm}^2\text{)}$ .

**Lời giải.**

$$\text{Ta có } \frac{\sin A}{2} = \frac{\sin B}{6} = \frac{\sin C}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin B = 3 \sin A \\ \sin C = \frac{5}{2} \sin A. \end{cases}$$

$$\text{Mặt khác theo định lý sin trong tam giác } ABC \text{ ta có } \frac{a}{\sin A} = \frac{B}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 3a \\ c = \frac{5}{2}a. \end{cases}$$

$$\text{Mà } a + b + c = 26 \Leftrightarrow a + 3a + \frac{5}{2}a = 26 \Leftrightarrow \frac{13a}{2} = 26 \Leftrightarrow a = 4 \Rightarrow b = 12 \text{ và } c = 10.$$

Vậy diện tích tam giác  $ABC$  là

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{13(13-4)(13-12)(13-10)} = 3\sqrt{39} \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Chọn đáp án **(C)** ..... □

**CÂU 38.** Cho tam giác  $ABC$  vuông tại  $C$  và  $BC = 6$ ,  $CA = 8$ . Tính bán kính đường tròn nội tiếp của tam giác  $ABC$ .

**(A)** 2.

**(B)**  $2\sqrt{2}$ .

**(C)**  $\sqrt{2}$ .

**(D)** 4.


**Lời giải.**

Vì tam giác  $ABC$  vuông tại  $C$  nên  $AB = \sqrt{AC^2 + BC^2} = 10$  và  $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot BC = 24$ .

Mặt khác  $p = \frac{6 + 8 + 10}{2} = 12$ ,  $S_{ABC} = p \cdot r \Rightarrow r = \frac{S_{ABC}}{p} = \frac{24}{12} = 2$ .

Chọn đáp án **(A)** ..... □

**CÂU 39.** Từ vị trí  $A$  người ta quan sát một cây cao (Hình vẽ). Biết  $AH = 4$  m,  $HB = 20$  m,  $\widehat{BAC} = 45^\circ$ . Chiều cao của cây gần nhất với giá trị nào sau đây?



**(A)** 14 m.

**(B)** 15 m.

**(C)** 17 m.

**(D)** 16 m.

**Lời giải.**

Ta có  $AB = \sqrt{AH^2 + BH^2} = \sqrt{4^2 + 20^2} = 4\sqrt{26}$ .


$\tan \widehat{HAB} = \frac{HB}{HA} = \frac{20}{4} = 5 \Rightarrow \widehat{HAB} \approx 78,69^\circ$ .

Do  $AH \parallel BC$  nên  $\widehat{ABC} = \widehat{HAB} \approx 78,69^\circ$ .

$\widehat{ACB} = 180^\circ - 45^\circ - \widehat{ABC} \approx 56,31^\circ$ .

Áp dụng định lí hàm số sin trong tam giác  $ABC$  ta có

$$\frac{BC}{\sin 45^\circ} = \frac{AB}{\sin 56,31^\circ} = \frac{4\sqrt{26}}{\sin 56,31^\circ} \Rightarrow BC \approx 17,33.$$



Chọn đáp án **(C)** ..... □

**CÂU 40.** Một miếng giấy hình tam giác  $ABC$  diện tích  $S$  có  $I$  là trung điểm  $BC$  và  $O$  là trung điểm của  $AI$ . Cắt miếng giấy theo một đường thẳng qua  $O$ , đường thẳng này đi qua  $M, N$  lần lượt trên các cạnh  $AB, AC$ . Khi đó diện tích miếng giấy chứa điểm  $A$  có diện tích thuộc đoạn  $[mS; nS]$ . Tính  $T = \frac{1}{m} + \frac{1}{n}$ .

**(A)**  $T = \frac{7}{12}$ .

**(B)**  $T = 12$ .

**(C)**  $T = 7$ .

**(D)**  $T = \frac{12}{7}$ .


**Lời giải.**

Ta có  $\frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{AM}{AB} \cdot \frac{AN}{AC}$

Dễ thấy  $S_{\triangle ABI} = S_{\triangle ACI} = \frac{1}{2} \cdot S_{\triangle ABC}$ .

Mặt khác

$$\begin{aligned} \frac{S_{\triangle AMO}}{S_{\triangle ABI}} &= \frac{AO}{AI} \cdot \frac{AM}{AB} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{AM}{AB} \Rightarrow \frac{2 \cdot S_{\triangle AMO}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{AM}{AB} \quad (1) \end{aligned}$$



Tương tự  $\frac{2 \cdot S_{\triangle ANO}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{AN}{AC}$  (2). Từ (1) và (2) suy ra

$$\frac{2 \cdot S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{AM}{AB} + \frac{AN}{AC} \right) \Leftrightarrow \frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}} = \frac{1}{4} \cdot \left( \frac{AM}{AB} + \frac{AN}{AC} \right)$$

Theo bất đẳng thức Côsi suy ra

$$\frac{AM}{AB} + \frac{AN}{AC} \geq 2\sqrt{\frac{AM}{AB} \cdot \frac{AN}{AC}} \Leftrightarrow \left(\frac{AM}{AB} + \frac{AN}{AC}\right)^2 \geq 4 \cdot \frac{AM}{AB} \cdot \frac{AN}{AC}$$

Đặt  $t = \frac{S_{\triangle AMN}}{S_{\triangle ABC}}$  điều kiện  $t > 0$ . Khi đó ta có  $16t^2 \geq 4t \Leftrightarrow t \geq \frac{1}{4}$  suy ra  $S_{\triangle AMN} \geq \frac{1}{4} \cdot S_{\triangle ABC}$ .

Khi  $M \equiv B$  suy ra  $N \equiv N'$  khi đó  $S_{\triangle AMN} = S_{\triangle ABN'}$ .

Mà  $S_{\triangle ABN'} = S_{\triangle ABO} + S_{\triangle AON'}$ .

Dễ thấy  $S_{\triangle ABO} = \frac{1}{2} \cdot S_{\triangle ABI} = \frac{1}{4} \cdot S_{\triangle ABC}$ .

Mặt khác từ  $I$  kẻ  $II' \parallel BN'$ , khi đó  $AN' = N'I' = I'C$  nên

$$\frac{S_{\triangle AON'}}{S_{\triangle AIC}} = \frac{AO}{AI} \cdot \frac{AN'}{AC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \Rightarrow S_{\triangle AON'} = \frac{1}{6} \cdot S_{\triangle AIC}$$

Do đó  $S_{\triangle AON'} = \frac{1}{12} \cdot S_{\triangle ABC}$  nên  $S_{\triangle ABN'} = \frac{1}{4} \cdot S_{\triangle ABC} + \frac{1}{12} \cdot S_{\triangle ABC} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC}$ .

Khi  $N \equiv C$  suy ra  $M \equiv M'$  khi đó  $S_{\triangle AMN} = S_{\triangle ACM'}$ .

Chứng minh tương tự, ta có  $S_{\triangle ACM'} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC}$ .

Do đó khi  $MN$  đi thay đổi qua  $O$  suy ra

$$\frac{1}{4} \cdot S_{\triangle ABC} \leq S_{\triangle AMN} \leq \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \Leftrightarrow \frac{1}{4} \cdot S \leq S_{\triangle AMN} \leq \frac{1}{3} \cdot S$$

Do đó  $m = \frac{1}{4}$  và  $n = \frac{1}{3}$  nên  $T = \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = 4 + 3 = 7$ .

Chọn đáp án  ..... 

# MỤC LỤC

<b>Bài 1. GTLG CỦA MỘT GÓC TỪ <math>0^\circ</math> ĐẾN <math>180^\circ</math></b>	<b>1</b>
(A) Tóm tắt lý thuyết.....	1
(B) Các dạng toán.....	2
Dạng 1. Tính giá trị biểu thức lượng giác. Chứng minh đẳng thức lượng giác.....	2
Dạng 2. Tìm các GTLG khi biết một GTLG của góc.....	2
(C) Câu hỏi trắc nghiệm.....	3
<b>Bài 2. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC</b>	<b>6</b>
(A) Tóm tắt lý thuyết.....	6
(B) Các dạng toán.....	6
Dạng 1. Áp dụng định lý cos.....	6
Dạng 2. Áp dụng định lý sin.....	7
Dạng 3. Giải tam giác và ứng dụng.....	8
Dạng 4. Bài tập tổng hợp.....	10
(C) Câu hỏi trắc nghiệm.....	10

## LỜI GIẢI CHI TIẾT 15

<b>Bài 1. GTLG CỦA MỘT GÓC TỪ <math>0^\circ</math> ĐẾN <math>180^\circ</math></b>	<b>15</b>
(A) Tóm tắt lý thuyết.....	15
(B) Các dạng toán.....	16
Dạng 1. Tính giá trị biểu thức lượng giác. Chứng minh đẳng thức lượng giác.....	16
Dạng 2. Tìm các GTLG khi biết một GTLG của góc.....	19
(C) Câu hỏi trắc nghiệm.....	21
<b>Bài 2. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC</b>	<b>26</b>
(A) Tóm tắt lý thuyết.....	26
(B) Các dạng toán.....	26
Dạng 1. Áp dụng định lý cos.....	26
Dạng 2. Áp dụng định lý sin.....	28
Dạng 3. Giải tam giác và ứng dụng.....	31
Dạng 4. Bài tập tổng hợp.....	33
(C) Câu hỏi trắc nghiệm.....	36

