BPT VÀ HỆ BPT BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát là

$$ax + by \le c$$
 (hoặc $ax + by < c$; $ax + by \ge c$; $ax + by > c$),

trong đó a, b, c là những số thực, a và b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.

2. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Cũng như bất phương trình bậc nhất một ẩn, các bất phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm và để mô tả tập nghiệm của chúng, ta sử dụng phương pháp biểu diễn hình học. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm có tọa độ là nghiệm của bất phương trình được gọi là **miền nghiệm** của nó.

Quy tắc thực hành biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $ax+by \leq c$ như sau (tương tự cho bất phương trình $ax+by \geq c$)

- **\Theta** Bước 1: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, vẽ đường thẳng Δ : ax + by = c.
- **oldsymbol{\Theta}** Bước 2: Lấy một điểm $M_0(x_0; y_0)$ không thuộc Δ (ta thường lấy gốc tọa độ O).
- Θ Bước 3: Tính $ax_0 + by_0$ và so sánh $ax_0 + by_0$ với c.
- ❷ Bước 4: Kết luận,
 - Nếu $ax_0 + by_0 < c$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ chứa M_0 là miền nghiệm của $ax_0 + by_0 \le c$.
 - Nếu $ax_0+by_0>c$ thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M_0 là miền nghiệm của $ax_0+by_0\leq c.$

A Miền nghiệm của bất phương trình $ax_0 + by_0 \le c$ bỏ đi đường thẳng ax + by = c là miền nghiệm của bất phương trình $ax_0 + by_0 < c$.

B. CÁC DẠNG TOÁN

ե Dạng 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn và bài toán liên quan

1. Ví du minh hoa

VÍ DỤ 1. Cho bất phương trình: 2x-y<0 . Trong các cặp số (-1;2), (2;0), (0;1), (3;-2), (-1;-2), cặp nào là nghiệm của bất phương trình, cặp nào không phải là nghiệm của bất phương trình?

VÍ DỤ 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình $2x + y \le 3$.

VÍ DU 3. a) Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình -2x + 3y > 0.

b) Cho hai điểm A(2;1) và B(3;3), hỏi hai điểm này cùng phía hay khác phía đối với bờ (d).

VÍ DU 4. a) Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình x + y - 3 < 0.

b) Tìm điều kiện của m và n để mọi điểm thuộc đường thẳng (d'): $(m^2-2)x-y+m+n=0$ đều là nghiệm của bất phương trình trên.



ĐIỂM:

Be yourself; everyone else is already taken.

QUICK NOTE

	•			•		•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	

•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•		

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Dia erm (12 e m) Diem,	· · · · · · · · ·
QUICK NOTE	

2. Bài tấp tư luân

- **BÀI 1.** Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình $2x + y \le 3$.
- **BÀI 2.** Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2x 4y < 8.
- **BÀI 3.** Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x y \le 0$.
- **BÀI 4.** a) Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} < 1$.
- b) Tìm điểm A thuộc miền nghiệm của bất phương trình trên. Biết rằng điểm A là giao điểm của parabol (P) có dạng $y = x^2 5x + 4$ và trục hoành.
- **BÀI 5.** Cho bất phương trình $2x + y 1 \le 0$.
- a) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình đã cho trong mặt phẳng toa đô Oxy.
- b) Tìm tất cả giá trị tham số m để điểm M(m,1) nằm trong miền nghiệm của bất phương trình đã và biểu diễn tập hợp M tìm được trong cùng hệ trực tọa độ Oxy ở câu a).
- **BÀI 6.** Cho bất phương trình x 2y + 4m > 0.
- a) Tùy theo giá trị tham số m, hãy biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình đã cho trong hệ trục tọa độ Oxy.
- b) Gọi A, B lần lượt là giao của đường thẳng x 2y + 4m = 0 với trục hoành và trục tung. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tập nghiệm của bất phương trình đã cho chứa điểm C(2;1) sao cho diện tích tam giác ABC bằng 4.

Dạng 2. Bài toán thực tế liên quan

1. Ví du minh hoa

- **VÍ DỤ 1.** Hà mang 95000 đồng ra chợ mua hoa cúc và hoa hồng. Một bông hoa cúc có giá 4000 đồng, một bông hoa hồng có giá 7000 đồng. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho số tiền mà Hà phải chi để mua x bông hoa cúc và y bông hoa hồng.
- **VÍ DỤ 2.** Mỗi ngày Nga đều dành không quá 30 phút để đọc cả 2 cuốn sách A, B. Nga đọc được 3 trang sách A trong 2 phút, đọc được 2 trang sách B trong 1 phút. Gọi x, y lần lượt là số phút đọc sách A và số phút đọc sách B. Tìm điều kiện của x và y để Nga đọc được ít nhất 35 trang sách trong một ngày.
- **VÍ DỤ 3.** Một cửa hàng bán hai loại trà sữa, trong đó 4 cốc loại 1 có giá 100000 đồng, 1 cốc loại 2 có giá 30000 đồng. Muốn có lãi theo dự tính thì mỗi ngày cửa hàng phải bán được t nhất 5 triệu đồng tiền hàng. Hỏi số cốc trà sữa bán được trong một ngày trong những trường hợp nào thì cửa hàng có lãi như dự tính?

2. Bài tập tự luận

- **BÀI 1.** Giá sách của Hoa có thể chứa được khối lượng sách tối đa là 4 kg. Hoa xếp cả hai loại sách (loại 1 và loại 2) vào giá. Sách loại $1 \text{ có khối lượng } 100 \text{ gam mỗi cuốn và sách loại } 2 \text{ có khối lượng } 200 \text{ gam mỗi cuốn. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho khối lượng của <math>x$ cuốn loại 1 và y cuốn loại 2 có thể được xếp lên giá sách.
- **BÁI 2.** Công ty viễn thông Mobifone tính phí 1 nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng, 2 nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Mỗi tháng Minh gọi điện thoại hết từ 200 đến 300 nghìn đồng. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn mô tả cho số tiền điện thoại trả cho (x) phút gọi nội mạng và (y) phút gọi ngoại mạng trong một tháng.
- **BÀI 3.** Bạn An giải 10 bài Toán trong 20 phút thì đúng được 80% số bài Toán, giải 12 bài Lý trong 15 phút thì đúng được $\frac{3}{4}$ số bài Lý. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn cho thời gian giải x bài Toán đúng và y bài Lý đúng, biết thời gian giải ít hơn 150 phút.
- **BÀI 4.** Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng $100~\mathrm{m}^2$. Diện tích để kê một chiếc ghế là $1~\mathrm{m}^2$, một chiếc bàn là $2~\mathrm{m}^2$ và diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là $24~\mathrm{m}^2$. Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê, hãy viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế và chỉ ra hai nghiệm của bất phương trình.
- **BÀI 5.** Một rạp chiếu phim 2D phục vụ khán giả một bộ phim mới với 2 loại vé khác nhau. Vé loại 1 (từ thứ 2 đến thứ 5) giá 80000 đồng/vé, vé loại 2 (từ thứ 6 đến chủ nhật và ngày lễ) giá 100000 đồng/vé. Để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được ở rạp chiếu phim này phải đạt tối thiểu 150 triệu đồng. Hỏi số lượng vé bán được trong những trường hợp nào thì rạp chiếu phim phải bù lỗ?

BÁI 6. Một bác nông dân cần trồng lúa và khoai trên diện tích đất 6 ha, với lượng phân bón dư trữ là 100 kg và sử dung tối đa 120 ngày công. Để trồng 1 ha lúa cần sử dung 20 kg phân bón, 10 ngày công với lợi nhuận là 30 triệu đồng; để trồng 1 ha khoai cần sử dụng 10 kg phân bón, 30 ngày công với lợi nhuận là 60 triệu đồng. Biết bác nông dân đã trồng x(ha) lúa và y (ha) khoai. Tìm giá tri của x để bác nông dân đạt được lợi nhuân cao nhất.

C. CÂU HỔI TRẮC NGHIỆM

CÂU 1. Trong các bất phương trình sau đây, đâu là bất phương trình bậc nhất hai ẩn

$$\bigcirc 2x^2 - 3x \ge 1.$$

©
$$3x + 1 \le 0$$
.

(D)
$$3x + y = 1$$
.

CÂU 2. Cho bất phương trình $2x + 3y - 6 \le 0$ (1). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

- (A) Bất phương trình (1) chỉ có một nghiệm duy nhất.
- (B) Bất phương trình (1) vô nghiệm.
- (C) Bất phương trình (1) luôn có vô số nghiệm.
- (**D**) Bất phương trình (1) có tập nghiệm là \mathbb{R} .

CAU 3. Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình x-4y+ $1 \ge 0$?

$$(-1;0).$$

B
$$(-2; -1)$$
. **C** $(-1; 3)$.

$$\bigcirc$$
 (-1;3)

$$\bigcirc$$
 (0;0).

CÂU 4. Miền nghiệm của bất phương trình 4(x-1)+5(y-3)>2x-9 là nửa mặt phẳng chứa điểm nào?

$$(\mathbf{C})$$
 (-1; 1).

$$\bigcirc$$
 (2; 5).

CÂU 5. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình x + y - 2 > 0?

$$(A)$$
 (2; 1).

$$(0;0)$$
.

$$(\mathbf{C})(1;0)$$
.

$$\bigcirc$$
 (0;1).

CÂU 6. Điểm A(-1,3) thuộc miền của bất phương trình

$$(\mathbf{D}) 2x - y + 4 > 0.$$

CÂU 7. Tìm tất cả các số thực a sao cho miền nghiệm của bất phương trình $x \leq a$ chứa $\operatorname{di\acute{e}m} M(-1;0).$

(A)
$$a > -1$$
.

B
$$a \ge -1$$
. **C** $a > 0$.

$$\bigcirc$$
 $a \geq 0$.

CÂU 8. Cho đường thẳng d: 7x - 9y + 2 = 0 chia mặt phẳng toạ độ làm hai nửa mặt phẳng, trong đó miền nghiệm của bất phương trình 7x - 9y + 2 > 0 là nửa mặt phẳng


- (A) có bờ là đường thẳng d và không chứa điểm O(0;0).
- (**B**) không có bờ d và chứa điểm O(0;0).
- (**C**) có bờ là đường thẳng d và chứa điểm O(0;0).
- (**D**) không chứa bờ d và không chứa điểm O(0;0).

CÂU 9. Phần gạch chéo trong hình vẽ dưới đây (không bao gồm đường thẳng d) là miền nghiệm cuả bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào sau đây?

B
$$x - 2y < 2$$
.

$$(\mathbf{C}) 2y - x < -2.$$

$$(\mathbf{\overline{D}}) 2x - y > 1.$$





















Y		1	_	<u>'</u> !	C	1	(از	1	I:		r	١L	<u>ر</u>	(_	ľ	V	IJ	/	t	יי	I	2	1	١,			١.		I	-
								(\$)	l		ľ	ē		K	7	ľ	١	ľ	6)	Ī	ľ								
								1	İ	Ì	Ì	1	l	Ì	1	ì	`	ı	ì	į	Ì	1	ľ	į								
•	۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۰	۰	۰	•	•	•	•	•	•	•	


CÂU 10. Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm (phần không gạch sọc) như hình vẽ bên?


- **(A)** 2x y + 1 < 0.
- **B** x y + 1 < 0.
- $\bigcirc 2x 3y + 1 < 0$.
- $(\mathbf{D}) 2x y 1 < 0$




CÂU 11. Miền nghiệm của bất phương trình $x+y \le 2$ là phần không bị gạch sọc của hình vẽ nào trong các hình sau?









CÂU 12. Cho bất phương trình 2x+3y-2<0. Miền nghiệm của bất phương trình là

- lack A nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng 2x+3y-2=0 (không kể bờ).
- $lackbox{\textbf{B}}$ nửa mặt phẳng chứa điểm O có bờ là đường thẳng 2x+3y-2=0 (kể cả bờ).
- **©** nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng 2x+3y-2=0 (không kể bờ).
- (\mathbf{D}) nửa mặt phẳng không chứa điểm O có bờ là đường thẳng 2x + 3y 2 = 0 (kể cả bờ).

CÂU 13. Miền nghiệm của bất phương trình x-2y+5<0 là

- **A** Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ (không bao gồm đường thẳng).
- **B**) Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ (không bao gồm đường thẳng).
- **©** Nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ (bao gồm đường thẳng).
- **D** Nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ, bờ là đường thẳng $y = \frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$ (không bao gồm đường thẳng).

CÂU 14. Cặp điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình $3(x+\sqrt{2}y-\sqrt{3})>8(\sqrt{3}x+2y-\sqrt{2})$?

- **B** $C(-\sqrt{3}; -\sqrt{2})$ và $D(\sqrt{2}; -1 \sqrt{5})$.
- \mathbf{C} $E(\sqrt{2}; \sqrt{2})$ và $F(\sqrt{5}; 1)$.
- \bigcirc $G(-\sqrt{2}; 2 + \sqrt{3})$ và H(1; 4).

.......

..........

CÂU 15. Giao miền nghiệm của ba bất phương trình $y \ge 0; 3x - 2y \ge -6; 3x + 4y \le 12$ tao thành một tam giác có diện tích bằng **(A)** 18. **(C)** 6. **(B)** 9. (**D**) 12.**CÂU 16.** Giao miền nghiệm của ba bất phương trình $x + 4y \ge 8$; $-x + 2y \le 4$; $x + y \le 5$

tạo thành một tam giác có chu vi bằng

(A) $\sqrt{17} + \sqrt{5} + 2\sqrt{2}$.

B $\sqrt{17} + \sqrt{5} + \sqrt{2}$.

 $(\mathbf{C})\sqrt{17} + 2\sqrt{5} + \sqrt{2}.$

 $(\mathbf{D})\sqrt{17} + 2\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$

CÂU 17. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $3x + my - 7 \ge 0$ có miền nghiệm chứa điểm $A(\sqrt{2};1)$.

(A) $m \in [3\sqrt{2} - 7; +\infty).$

B) $m \in (-\infty; 3\sqrt{2} - 7)$.

 $(\mathbf{C}) m \in (-\infty; 7 - 3\sqrt{3}).$

 $(\mathbf{D}) m \in [7 - 3\sqrt{2}; +\infty).$

CÂU 18. Cho bất phương trình $mx + \sqrt{2}y - 1 < 0$ với m là tham số thực. Điểm nào dưới đây luôn luôn **không** thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho?

B) $F(2m^2; m)$.

(**C**) $G(0; 1+m^2)$.

(**D**) $H(0; -1 - m^2)$.

CÂU 19. Với giá trị nào của m thì điểm A(1-m;m) không thuộc miền nghiệm của bất phương trình 2x - 3(y - x) > 4.

 \bigcirc $\frac{1}{9} \leq m \leq 1.$

CÂU 20. Một bác nông dân cần trồng lúa và khoai trên diện tích đất 6 ha, với lượng phân bón dư trữ là 100 kg và sử dụng tối đa 120 ngày công. Để trồng 1 ha lúa cần sử dụng 20 kg phân bón, 10 ngày công với lợi nhuận là 30 triệu đồng; để trồng 1 ha khoai cần sử dụng 10 kg phân bón, 30 ngày công với lợi nhuận là 60 triệu đồng. Để đạt lợi nhuận cao nhất, bác nông dân đã trồng x (ha) lúa và y (ha) khoai. Giá trị của x là

(A) 2.

(B) 3.

(**D**) 5.

CÂU 21. Một người thợ mộc tốn 6 giờ để làm một cái bàn và 4 giờ để làm một cái ghế. Goi x, y lần lượt là số bàn và số ghế mà người thơ mộc sản xuất trong một tuần. Viết bất phương trình biểu thi mối liên hệ giữa x và y biết trong một tuần người thơ mộc có thể làm tối đa 50 giờ.

(A) $3x + 2y \le 25$.

(B) 3x + 2y > 25. **(C)** 3x + 2y > 25.

CÂU 22. Một gian hàng trưng bày bàn và ghế rộng 60 m². Diện tích để kê một chiếc ghế là 0.6 m^2 , một chiếc bàn là 1.3 m^2 . Gọi x là số chiếc ghế, y là số chiếc bàn được kê. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y cho phần mặt sàn để kê bàn và ghế, biết diện tích mặt sàn dành cho lưu thông tối thiểu là 10 m^2 .

(A) $0.6x + 1.3y \ge 50$.

(B) $0.6x + 1.3y \le 50$.

(C) 1.3x + 0.6y < 50.

 $(\mathbf{D}) 1.3x + 0.6y > 50.$

CÂU 23. Bạn Nam đang sưu tầm các đồng tiền vàng và bạc để vào một các túi, trọng lượng tối đa mà túi chứa được là 20 gam. Mỗi đồng xu vàng nặng khoảng 14 gam, mỗi đồng xu bạc nặng khoảng 7 gam. Bất phương trình nào sau đây mô tả số đồng tiền vàng (x) và số đồng tiền bạc (y) có thể được chứa trong túi?

(A) $7x + 14y \le 20$.

(B) 7x + 14y > 20.

(C) $14x + 7y \le 20$. **(D)** 14x + 7y > 20.

CÂU 24. Trong 1 lạng (100 g) thịt bò chứa khoảng 26 g protein và 1 lạng cá rô phi chứa khoảng 20 g protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 g protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người đàn ông nên ăn trong một ngày. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người đàn ông trong một ngày.

(A) $26x + 20y \le 52$. (B) 26x + 20y < 52. (C) $13x + 10y \ge 26$. (D) 13x + 10y > 26.

CÂU 25. Công ty viễn thông Viettel có gói cước Hi School tính phí là 1190 đồng mỗi phút gọi nội mạng và 1390 đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Một bạn học sinh đăng kí gói cước trên và sử dụng x phút gọi nội mạng, y phút gọi ngoại mạng trong một tháng. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để mô tả số tiền bạn đó phải trả trong một tháng ít hơn 100 nghìn đồng.

(A) $119x + 139y \ge 10000$.

(B) 139x + 119y < 10000.

(C) 119x + 139y < 10000.

 (\mathbf{D}) 119x + 139y < 10000.

CÂU 26. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé được bán ra có hai loại: loại 1 dành cho trẻ từ 6-13 tuổi, giá

♥ Địa chỉ: KDC Mỹ Điền, TT. Tuy
QUICK NOTE
•••••

vé là 50000 đồng/vé và loại 2 dành cho người trên 13 tuổi, giá vé là 80000 đồng/vé. Gọi xlà số vé loai 1 và y là số vé loai 2 bán được. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để biểu diễn điều kiện sao cho số tiền bán vé thu được tối thiểu 10 triệu đồng.

$$(A)$$
 $5x + 8y \ge 100.$

B
$$5x + 8y > 1000$$

(**A**)
$$5x + 8y \ge 100$$
. (**B**) $5x + 8y > 1000$. (**C**) $8x + 5y \ge 1000$. (**D**) $5x + 8y \ge 1000$.

(D)
$$5x + 8y \ge 1000$$
.

CÂU 27. Ngoài giờ học, bạn Nam làm thêm việc phụ bán cơm được 15 nghìn đồng/một giờ và phụ bán tạp hóa được 10 nghìn đồng/một giờ. Gọi x, y lần lượt là số giờ phụ bán cơm và phụ bán tạp hóa trong mỗi tuần. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y sao cho Nam kiếm thêm tiền mỗi tuần được ít nhất là 900 nghìn đồng.

(A)
$$3x + 2y \le 180$$
.

B
$$3x + 2y > 180$$
. **C** $3x + 2y \ge 180$.

(c)
$$3x + 2y \ge 180$$

(D)
$$3x + 2y < 180$$
.

CÂU 28. Anh A muốn thuê một chiếc ô tô (có người lái) trong một tuần. Giá thuê xe như sau: từ thứ hai đến thứ sáu phí cố định là 900 nghìn đồng/ngày và phí tính theo quãng đường di chuyển là 10 nghìn đồng/km còn thứ bảy và chủ nhật thì phí cố định là 1200 nghìn đồng/ngày và phí tính theo quãng đường di chuyển là 15 nghìn đồng/km. Gọi x, y lần lượt là số km mà anh A đi trong các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và trong hai ngày cuối tuần. Viết bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y sao cho tổng số tiền anh A phải trả không quá 20 triệu đồng.


A
$$10x + 15y \le 20000$$
.

(B)
$$2x + 3y \ge 2720$$
.


$$\bigcirc$$
 $10x + 15y \ge 20000.$


$$(\mathbf{D}) 2x + 3y < 2720.$$


CẦU 29. Một cửa hàng làm kệ sách và bàn làm việc. Mỗi kệ sách cần 4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng cửa hàng có tối đa 240 giờ làm việc. Hãy biểu diễn đồ thị mô tả số giờ làm việc trong mỗi tháng của cửa hàng theo số kệ sách hoàn thiện (x) và số bàn hoàn thiện (y).




CÂU 30. Một gia đình cần x kg thịt bò và y kg thịt lợn trong một ngày, giá tiền 1 kg thịt bò là 200 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 60 nghìn đồng. Biểu diễn đồ thị mô tả chi phí gia đình đó mua thit bò và thit lơn mỗi ngày để số tiền bỏ ra trong một ngày không quá 300 nghìn đồng









Bài 2. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- $oldsymbol{\Theta}$ Cặp số $(x_0; y_0)$ là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi $(x_0; y_0)$ đồng thời là nghiệm của tất cả các bất phương trình trong hệ đó.

2. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng toạ độ

- $oldsymbol{\Delta}$ Ôn tập: Phương trình của trực Ox là y=0 và phương trình của trực Oy là x=0.
 - ❤ Trong mặt phẳng toạ độ, tập hợp các điểm có toạ độ là nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.
 - ❷ Miền nghiệm của hệ là giao các miền nghiệm của các bất phương trình trong hệ.
- * Cách xác định miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:
 - **❷ Bước 1:** Trên cùng một mặt phẳng toạ độ, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
 - **O** Bước 2: Miền không bị gạch là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

3. Ứng dụng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Nhận xét: Tổng quát, người ta chứng minh được rằng giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) của biểu thức F(x;y) = ax + by, với (x;y) là toạ độ các điểm thuộc miền đa giác $A_1A_2 \dots A_n$, tức là các điểm nằm bên trong hay nằm trên các cạnh của đa giác, đạt được tại một trong các đỉnh của đa giác đó.

B. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1. Biểu diễn hình học của tập nghiệm

- a) Cách xác định miền nghiệm của bất phương trình $ax + by < c (a^2 + b^2 > 0)$.
 - \odot Vẽ đường thẳng d: ax + by = c;
 - \odot Lấy điểm $M(x_0; y_0) \notin d$.
 - Nếu $ax_0 + by_0 < c$ thì nửa mặt phẳng không kể bờ d chứa M_0 là miền nghiệm của ax + by < c.
 - Nếu $ax_0 + by_0 > c$ thì nửa mặt phẳng không kể bờ d **không** chứa M_0 là miền nghiệm của ax + by < c.

_	•	_			_	-	-
ລ	ш		_	Ν			
-	•		ĸ	N	u	и	
		_			•		

🗣 Địa chỉ: KDC Mỹ Điền, TT. Tuy F	Phước 🗣
QUICK NOTE	▲ Miền nghiệm
	nghiệm của be
	$k \mathring{e} \ c \mathring{a} \ b \eth \ d).$
	b) Cách xác định miềr
	✓ Với mỗi bất ph
	bỏ miền còn lạ
	❷ Sau khi làm n
	cùng mặt phẩ
	của hệ bất phi
	1 Ví du minh hao
	1. Ví dụ minh hoạ
	VÍ DỤ 1. Biểu diễn hình h
	VÍ DỤ 2. Biểu diễn hình h
	VÍ DỤ 3. a) Biểu diễn
	-2x + 3y > 0.
	b) Cho hai điểm $A(2;1)$
	(d).
	VÍ DỤ 4. Biểu diễn hình h
	VÍ DỤ 5. Biểu diễn hình h
	VÍ DỤ 6. Biểu diễn hình h
	VI DO 6. Dieu dien minn n
	VÍ DỤ 7. Biểu diễn hình h
	•
	2. Bài tập tự luận
	BÀI 1. Biểu diễn hình học
	DÀI 9 D:2 112 15 1 1
	BÀI 2. Biểu diễn hình học
	I .

- **A** Miền nghiệm của bất phương trình $ax + by \le c \ (a^2 + b^2 > 0)$ bao gồm miền nghiệm của bất phương trình ax + by < c và đường thắng d (nửa mặt phẳng kể cả bờ d).
- b) Cách xác định miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 - ❷ Với mỗi bất phương trình trong hệ, ta xác định miền nghiệm của nó và gạch bỏ miền còn lai.
 - Sau khi làm như trên lần lượt đối với các bất phương trình trong hệ và trên cùng mặt phẳng tọa độ, miền còn lại không bị gạch chính là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
- **VÍ DỤ 1.** Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn 2x-4y < 8.
- **VÍ DỤ 2.** Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x + y \ge 3$.
- **VÍ DỤ 3.** a) Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn -2x + 3y > 0.
 - b) Cho hai điểm A(2;1) và B(3;3), hỏi hai điểm này cùng phía hay khác phía đối với bờ (d).
- **VÍ DỤ 4.** Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} x + y > 1 \\ x - y < 2 \end{cases}$$

VÍ DỤ 5. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} x + y < 2 \\ x - y > 1 \\ y > - \end{cases}$$

VÍ DỤ 6. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} 2x + 5y > 2\\ x - 3y \ge 1\\ x + y < 3 \end{cases}$$

VÍ DỤ 7. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} 2x + y \ge 2\\ x - 2y \le 1\\ y \le 2\\ x \le 3 \end{cases}$$

BÀI 1. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

$$x + \frac{3}{2}y \ge 1 - x + \frac{1}{2}.$$

BÀI 2. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

$$-2022x - 2023y \le 2021y.$$

- **BÀI 3.** a) Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn $\frac{x}{3} + \frac{y}{6} < 1$.
 - b) Tìm điểm A thuộc miền nghiệm của bất phương trình trên. Biết rằng điểm A là giao điểm của parabol $(P): y = x^2 5x + 4$ và trục hoành.

BÀI 4. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} x + 2y \ge 1\\ 3x - y \le 2 \end{cases}$$

BÀI 5. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} x - 2y < 1 \\ x + 3y < -2 \\ -x + y < 2 \end{cases}$$

BÀI 6. Biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau

$$\begin{cases} 3x + y \le 5 \\ x + y \le 4 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases}$$

3. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 7y - 3 > 0 \\ x - 2y \ge 0 \end{cases}$?

- **(A)** P(-1; -5).
- **B**) O(0;0).
- \bigcirc M(3;-1).

CÂU 2. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x-5y-1>0\\ 2x+y+5>0 \end{cases}$ chứa điểm nào trong các x+y+1<0

điểm sau?

- (A) (0;0).
- **B**) (1; 0).
- (\mathbf{C}) (0; -2).

CÂU 3. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y \geq 3 \\ 2x+y < 4 \end{cases}$ chứa điểm nào trong các điểm

- (A) (1; -3).
- **B**) (-2;1).
- \bigcirc (3; -2).
- (\mathbf{D}) (4; 1).

CÂU 4. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x-y>0\\ x+y\geq -1 \text{ không chứa điểm nào trong}\\ x-y<-2 \end{cases}$

các điểm sau?

- (A) (5;8).
- **B**) (6; 9).
- (\mathbf{C}) (4; 7).
- $(\mathbf{D})(3,4).$

CÂU 5. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x+3y-1>0\\ 5x-y+4<0. \end{cases}$

- **B** (-2;0).

CÂU 6. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} y \geq 0 \\ 3x + 2y - 6 < 0 \end{cases}$ có miền nghiệm S và bốn điểm O(0;0),

A(2;3), B(-1;1), C(-1;3). Trong các điểm đã cho, có bao nhiêu điểm thuộc S?

CÂU 7. Xét hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\leq 2\\ x-2y\geq -1 \text{ và bốn điểm }A(1;1),\ B(2;1),\ C(0;1),\\ y\geq 1 \end{cases}$

D(-2;0). Trong các điểm trên, có bao nhiêu điểm thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

- **(A)** 1.
- **(B)** 2.
- (**D**) 4.

CÂU 8. Cặp số (x;y) nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x+3y-1>0\\ 5x-y+4\leq 0 \end{cases}$?

- (A) (0; 4).
- **(B)** (0; 0).

				_
\boldsymbol{a}	W	CK	Ν	П.
•	w	$\mathbf{L} \cdot \mathbf{N}$	II N	

CÂU 9. Trong các cặp số (x; y) sau, cặp số nào **không là** nghiệm của hệ bất phương trình

$$\begin{cases} x - y - 2 \le 0 \\ 3x - 2y + 2 > 0 \end{cases}$$
?

(A)
$$(x; y) = (0; 0).$$
 (C) $(x; y) = (-1; 1).$

B
$$(x;y) = (1;1).$$

$$(x;y) = (-1;1)$$

$$(\mathbf{D})(x;y) = (-1;-1)$$

CÂU 10. Cặp số (x;y)=(0;0) không là nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?

$$\left(\mathbf{B}\right) \begin{cases} 2x + y < 1 \\ x \ge 0 \\ y < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - y < 1 \\ x \ge 0 \\ y \le 1 \end{cases} \qquad \textcircled{\textbf{B}} \begin{cases} 2x + y < 1 \\ x \ge 0 \\ y < 0 \end{cases} \qquad \textcircled{\textbf{C}} \begin{cases} 2x - y < 1 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0 \end{cases} \qquad \textcircled{\textbf{D}} \begin{cases} 2x + y < 1 \\ x \le 0 \\ y < 1 \end{cases}$$

CÂU 11. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 5x + 3y - 19 \le 0 \\ 12x - 5y - 13 \ge 0 \end{cases}$?

(A)
$$N(1+\sqrt{2};\sqrt{2})$$
.

B
$$N(1+\sqrt{2};2+\sqrt{2})$$

$$(\hat{\mathbf{C}}) N(1; 3 + \sqrt{2}).$$

$$(\mathbf{\overline{D}}) N(5+\sqrt{2};\sqrt{2})$$

CÂU 12. Cặp số (x;y)=(-1;3) là nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?

autong trình sau?
$$\begin{cases} x - y \le 2 \\ 3x + 2y \ge 2 \\ y \le 0 \\ x < 0 \end{cases}$$
 B
$$\begin{cases} x - y \le 2 \\ 3x + y \ge 2 \\ y \le 0 \\ x < 0 \end{cases}$$
 C
$$\begin{cases} x - y \le 2 \\ 3x + y \ge 2 \\ y \ge 0 \\ x < 0 \end{cases}$$
 D
$$\begin{cases} x - y \le 2 \\ 3x + 2y \ge 2 \\ y \ge 0 \\ x < 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x - y \le 2\\ 3x + y \ge \\ y \le 0\\ x < 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{C} \begin{cases}
 \begin{cases}
 x - y \le 2 \\
 3x + y \ge 2 \\
 y \ge 0 \\
 x < 0
 \end{cases}$$

CÂU 13. Hệ bất phương trình $\begin{cases} y \leq x+1 \\ y+x>3 \end{cases}$ nhận cặp số (x;y) nào sau đây làm nghiệm của

nó?

$$(x; y) = (2; 1).$$

B)
$$(x;y) = (2;3)$$

$$(x;y) = (3;0)$$

(D)
$$(x;y) = (1;3)$$

$$lackbox{\textbf{B}} S_2 \subset S_1.$$

$$(\widehat{\mathbf{C}})$$
 $S_2 \subset S$.

$$\widehat{\mathbf{D}}) S = S_1 \cup S_2.$$

trình (1), S_2 là nghiệm của bất phương trình (2) và S là tập nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Khẳng định nào sau đay là đúng?

$$lackbox{\textbf{B}} S_2 \subset S_1.$$

$$\bigcirc S_2 \cup S = S_1$$

$$\bigcirc S_1 \subset S.$$

một tam giác có diện tích bằng 6.

$$\bigcirc a = -4.$$

$$\bigcirc a = 6.$$

CÂU 17. Tính diện tích S của miền nghiệm hệ bất phương trình $\begin{cases} y+x \leq 3 \\ y-x \leq 3. \\ y \geq -1 \end{cases}$

A
$$S = 8$$
.

$$\bigcirc{\mathbf{B}} S = 25$$

$$\bigcirc$$
 $S = 16$

$$\bigcirc S = 12.$$

CÂU 18. Tính diện tích S của miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq -3 \\ y+x \leq 8 \\ y-x \geq -2 \end{cases}$

A
$$S = 48$$
.

$$\bigcirc S = 64.$$

C
$$S = 81$$

$$\mathbf{\widehat{D}} S = 49.$$

CÂU 19. Tính chu vi P của miền nghiệm hệ bất phương trình $\begin{cases} x \leq 6 \\ y \leq 5 \\ y \geq -6 \end{cases}$

CÂU 20. Tìm giá trị của số thực a sao cho miền nghiệm của hệ bất phương trình

có diên tích bằng 6.

- **(A)** a = -3.

- $(\mathbf{D}) a = -8.$

CÂU 21. Tìm giá trị của số thực a sao cho miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y\geq a\\ x\leq 0\\ y\geq 0 \end{cases}$

là một tam giác có diện tích bằng 4.

- $(\mathbf{A}) \ m=2.$
- $\bigcirc m = \frac{1}{4}.$

CÂU 23. Tìm giá trị của số thực m sao cho miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq 2 \\ y \leq -1 \end{cases}$

có chu vi bằng 8.

- **(A)** m = -3.

- $(\mathbf{D}) m = -2.$

CÂU 24. Tìm giá trị của số thực dương m sao cho miền nghiệm của hệ bất phương trình

 $y \ge 0$ $2x + 3y \le 12$ có diện tích bằng 8. $mx + y \ge 2$ **(B)** m = 3.

- $\bigcirc m = \frac{1}{2}.$

CAU 25. Ngoài giờ học, bạn Nam làm thêm việc phụ bán cơm được 15 nghìn đồng/một giờ và phụ bán tạp hóa được 10 nghìn đồng/một giờ. Nam không thể làm thêm việc nhiều hơn 15 giờ mỗi tuần. Gọi x, y lần lượt là số giờ phụ bán cơm và phụ bán tạp hóa. Hệ bất phương trình nào sau đây xác định số giờ để làm mỗi việc nếu Nam muốn kiếm được ít nhất 100 nghìn đồng mỗi tuần?

 $(\mathbf{A}) \begin{cases} x + y \ge 15 \end{cases}$ $\begin{cases} 15x + 10y \ge 100. \\ x + y \le 15 \\ 15x + 10y \ge 100. \end{cases}$

 $\begin{cases} x+y \leq 15 \\ 15x+10y > 100. \end{cases}$ $\begin{cases} x+y > 15 \\ 15x+10y < 100 \end{cases}$

CÂU 26. Để trở thành một thành viên của ban nhạc thì một sinh viên phải đạt điểm trung bình các môn học ít nhất là 7,0 và phải có tối thiểu 5 lần thực hành sau giờ học. Gọi x là điểm trung bình các môn học và y là số lần thực hành sau giờ học, hãy chọn hệ bất phương trình thể hiện tốt nhất tình huống này.

- trong các khẳng định sau. (A) $(1;-1) \in S$.

CÂU 28. Điểm $A\left(0;\frac{5}{3}\right)$ luôn thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình dưới đây (với m là tham số thực)?


$$(A) (m^2 - 4)x + 3y - 5 \le 0.$$

B)
$$(m^2 - 4)x + 3y - 5 > 0$$
.

$$(\mathbf{C})(m^2-4)x+3y-5<0.$$

$$(m^2 - 4)x + 3y + 7 \le 0.$$

CÂU 29. Hình vẽ dưới đây là biểu diễn hình học tập nghiệm của hệ bất phương trình nào? (với miền nghiệm là miền **không** gạch sọc và chứa bờ)



$$\begin{cases} 3x + 4y - 8 \leq 0 \\ 5x - 12y - 3 \leq 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x + 4y - 3 \geq 0 \\ 5x - 12y - 8 \leq 0. \end{cases}$$


CÂU 30.

Phần mặt phẳng không bị gạch, kể cả phần biên của nó trên đường thẳng y = 0 trong hình vẽ bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?

$$\bigcirc$$
 $\begin{cases} 2x - 2y > 0 \\ 2x + y > 1 \end{cases}$

$$\begin{cases} x + y < 2 \\ y \ge 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} y \le 0 \\ x + y < 1. \end{cases}$$




CÂU 31.

Phần mặt phẳng không bị gạch, kể cả phần biên của nó trên đường thẳng d trong hình vẽ bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?

$$\begin{cases} x - 2y < 1 \\ 3x + 2y < 3 \end{cases}$$


$$\bigcirc \begin{cases} 2x + 3y < 6 \\ 2x + y \le 2. \end{cases}$$



CÂU 32.

Cho hệ bất phương trình Biết rằng $A,\,B,\,C$ là

giao điểm của hai trong ba đường thẳng x = -2, y = -2, x + y = 2 (được cho như hình vẽ). Khẳng định nào dưới đây là đúng?




- (\mathbf{A}) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác ABC bao gồm cả các cạnh AB, AC, BC.
- (**B**) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác ABC bao gồm các cạnh AC, BC ngoại trừ điểm A, điểm B.
- (\mathbf{C}) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác ABC bao gồm các cạnh AB, AC, BC ngoại trừ điểm A, điểm B, điểm C.
- (\mathbf{D}) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác ABC bao gồm các cạnh AB, BC ngoại trừ điểm A, điểm C.

CÂU 33.

Miền không bị gạch chéo (kể cả đường thẳng d_1 và d_2) là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?

$$\begin{cases} x - y \le -2 \\ -2x - y \ge -2. \end{cases}$$




CÂU 34.

Miền tam giác không bị gạch kể cả 3 cạnh của nó trong hình bên là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?

$$\begin{cases} y \ge 0 \\ 5x - 4y \le 10 \\ 5x + 4y \le 10. \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \ge 0 \\ 4x - 5y \le 10 \\ 5x + 4y \le 10. \end{cases}$$

$$\begin{array}{c}
x \ge 0 \\
5x - 4y \le 10 \\
4x + 5y < 10
\end{array}$$



CÂU 35.

2	ΠC	N	
		 N	


Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ sau?

$$\mathbf{A} \begin{cases} y \ge 0 \\ 2x - 3y \ge 6 \\ x + y \le 3. \end{cases}$$


$$\begin{pmatrix}
x \ge 0 \\
-2x + 3y \ge -6 \\
x + y \le 3.
\end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c}
x \ge 0 \\
-2x + 3y \le -6 \\
x + y \le 3.
\end{array}$$

$$\mathbf{D} \begin{cases} y \ge 0 \\ 2x - 3y \le -6 \\ x + y \le 3. \end{cases}$$



CÂU 36. Phần mặt phẳng không bị gạch, kể cả phần biên của nó nằm trên đường thẳng d trong hình vẽ nào sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} y < 0 \\ 2x + y \le 4. \end{cases}$




CÂU 37.

Hệ bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch có hai bờ là hai đường thẳng a và b như hình bên?

$$\begin{cases} 2x + y \le -2\\ 2x + y \ge 2. \end{cases}$$


$$\bigcirc \begin{cases} 2x - y \le 2 \\ 2x - y \ge -2. \end{cases}$$

$$\begin{array}{c} (\mathbf{D}) \begin{cases} 2x - y \le -2 \\ 2x - y \ge 2. \end{cases}
\end{array}$$




CÂU 38.

Hệ bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch như hình bên (kể cả các điểm nằm trên hai đường thẳng a, b và không thuộc miền bị gach)?



$$\bigcirc \begin{cases} 2x + y \ge 2 \\ -2x + y \ge -2 \end{cases}$$




CÂU 39.

Hệ bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần mặt phẳng không bị gạch như hình bên (kể cả các điểm nằm trên các đường thẳng a, b, c và không thuộc miền bị gach)?

$$\mathbf{C} \begin{cases}
2x + y \le 1 \\
x - 2y \ge 2 \\
x \ge 0.
\end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x & y \le 1 \\ x - 2y \ge 2 \\ y \le 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2x - y \le 1 \\ x - 2y \ge 2 \\ x \ge 0. \end{cases}$$



CÂU 40. Tìm tất cả các số thực a, b sao cho miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq a \\ y < b \end{cases}$ chứa điểm M(-1;1).

(A)
$$a \ge -1$$
; $b \le 1$.

(B)
$$a < -1$$
; $b \ge 1$

©
$$a \le -1; b > 1$$

(A)
$$a \ge -1$$
; $b \le 1$. (B) $a < -1$; $b \ge 1$. (C) $a \le -1$; $b > 1$. (D) $a \le -1$; $b < 1$.

CÂU 41. Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng y=m có điểm chung với miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x \geq -2 \\ y \geq -2 \\ x + y \leq 2. \end{cases}$ $\mathbf{A} \ m \geq -2. \qquad \mathbf{B} \ m \leq 4. \qquad \mathbf{C} \ -2 \leq m \leq 4. \qquad \mathbf{D} \ -2 < m < 4.$ $\mathbf{CÂU 42.} \ \text{Cho hệ bất phương trình} \ \begin{cases} (a-2)x + (a-4)y \geq 2 \\ (a+1)x + (3a+2)y \leq -1 \end{cases} \text{với } a \in \mathbb{R}, \ a \neq 0 \text{ và } a \neq \frac{1}{2}.$

$$(\widehat{\mathbf{A}}) \ m \geq -2.$$

$$(\mathbf{B}) \ m < 4.$$

©
$$-2 \le m \le 4$$

$$\bigcirc$$
 $-2 < m < 4.$

$$\mathbf{A} M \left(\frac{-3}{2a-1}; \frac{7}{2a-1} \right)$$

©
$$P\left(\frac{7}{2a-1}; \frac{-3}{2a-1}\right)$$
.

CÂU 43. Miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} \sqrt{2}x+\sqrt{3}y-1\leq 0\\ \sqrt{3}x-\sqrt{2}y+1\geq 0 \text{ là}\\ y\geq -4 \end{cases}$

- (A) tam giác vuông kể cả các điểm nằm trên ba cạnh của tam giác.
- (B) tam giác đều kể cả các điểm nằm trên ba canh của tam giác.
- (C) tam giác từ kể cả các điểm nằm trên ba cạnh của tam giác.
- (**D**) tam giác cân (không vuông) kể cả các điểm nằm trên ba cạnh của tam giác.

CÂU 44. Miền nghiệm của bất phương trình $|x+y|+|x-y| \le 4$ là

- (A) một hình vuông (không kể biên).
- (**B**) một hình chữ nhật (không phải là hình vuông và không kể biên).
- (**C**) một hình chữ nhật (không phải là hình vuông và kể cả biên).
- (**D**) một hình vuông (kể cả biên).

\blacktriangleright Dạng 2. Tìm cực trị của biểu thức F=ax+by trên một miền đa giác

a) Bài toán:

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức F = ax + by (a, b) là hai số đã cho không đồng thời bằng 0) với x, y thỏa mãn hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn (có miền nghiệm là miền đa giác $A_1 A_2 \dots A_i A_{i+1} \dots A_n$).

•																											
	•																										
	•																										
•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

₱ Địa chỉ: KDC Mỹ Điền, TT. Tư
QUICK NOTE

- b) Người ta chứng minh được: Biểu thức F = ax + by có giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất tại một trong các đỉnh của đa giác $A_1 A_2 \dots A_i A_{i+1} \dots A_n$.
- c) Phương pháp:
 - Θ Bước 1. Tìm miền đa giác $A_1A_2...A_iA_{i+1}...A_n$ là miền nghiệm của hệ bất phương trình.
 - Θ Bước 2. Tìm tọa độ các đỉnh A_1, A_2, \ldots, A_n .
 - Θ Bước 3. Tính $F(x_i; y_i)$ trong đó $A_i(x_i; y_i)$ với i = 1, 2, ..., n.
 - ❷ Bước 4. Kết luân Giá trị lớn nhất $M = \max_{i=1,2,...n} F\left(x_i;y_i\right)$. Giá trị nhỏ nhất $m = \min_{i=1,2,...n} F\left(x_i;y_i\right)$.

1. Ví du minh hoa

VÍ DỤ 1. Cho cặp (x;y) là nghiệm của hệ $\begin{cases} 3x-y\geq -1\\ 2x+y\leq 6\\ x+3y>3 \end{cases}$. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất

của biểu thức f(x;y) = 2x - 3y + 1.

VÍ DU 2. Quảng cáo sản phẩm trên truyền hình là một hoạt động quan trong trong kinh doanh của các doanh nghiệp.

Theo Thông báo số 10/2019, giá quảng cáo trên VTV1 là 30 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khoảng 20h30; là 6 triệu đồng cho 15 giây/1 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 - 17h00.

Một công ty dự định chi không quá 900 triệu đồng để quảng cáo trên VTV1 với yêu cầu quảng cáo về số lần phát như sau: ít nhất 10 lần quảng cáo vào khoảng 20h30 và không quá 50 lần quảng cáo vào khung giờ 16h00 - 17h00.

VÍ DU 3. Một hộ nông dân dự định trồng đậu và cà trên diện tích 8 ha. Nếu trồng đậu thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng cà thì cần 30 công và thu 4 triêu đồng trên diên tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diên tích là bao nhiêu để thu về được nhiều tiền nhất, biết rằng tổng số công không quá 180.

2. Bài tấp tư luân

BÀI 1. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng mỗi ngày gia đình này chỉ mua tối đa 1,5 kg thịt bò và 1 kg thịt lợn, giá tiền 1 kg thịt bò là 200 nghìn đồng, 1 kg thịt lợn là 100 nghìn đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kg thit mỗi loai để số tiền bỏ ra là ít nhất.

BÀI 2. Người ta định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất $120~{
m kg}$ hóa chất Avà 9 kg hóa chất B. Từ mỗi tấn nguyên liêu loại I giá 4 triệu đồng có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0.6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng có thể chiết xuất được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiều tấn nguyên liệu mỗi loại để chi phí mua nguyên liệu là ít nhất. Biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II.

BÁI 3. Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Nhóm	Số máy trong mỗi nhóm	Số máy trong từng xuất ra một đơn v Loại I	
A	10	2	2
В	4	0	2
С	12	2	4

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Hãy lập phương án để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất.

BÀI 4. Một nhà khoa học nghiên cứu về tác động phối hợp của vitamin A và vitamin B đối với cơ thể con người. Kết quả như sau:

- a) Một người có thể tiếp nhận được mỗi ngày không quá 600 đơn vị vitamin A và không quá 500 đơn vị vitamin B.
- b) Một người mỗi ngày cần từ 400 đến 1000 đơn vị vitamin cả A lẫn B.
- c) Do tác động phối hợp của hai loại vitamin, mỗi ngày số đơn vị vitamin B phải nhiều hơn $\frac{1}{2}$ số đơn vị vitamin A nhưng không nhiều hơn ba lần số đơn vị vitamin A. Biết giá một đơn vị vitamin A là 9 đồng và giá một đơn vị vitamin B là 7,5 đồng.

Tìm phương án dùng vitamin A và vitamin B thỏa mãn các điều kiện trên sao cho số tiền phải trả ít nhất.

3. Bài tập trắc nghiệm

CÂU 1. Tìm giá trị lớn nhất M của biểu thức z=3x+2y biết rằng $x,\,y$ thỏa mãn hệ bất

$$\text{phương trình} \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 4 \\ x - y \leq 1. \end{cases}$$

- \bigcirc M = 10
- \bigcirc M=6.
- $(\mathbf{D}) M = 9$

CÂU 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức F(x;y)=x-y-1 với x,y thỏa mãn hệ $\begin{cases} x-2y+2\geq 0\\ 3x+8y-24\leq 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} x - 2y + 2 \ge 0 \\ 3x + 8y - 24 \le 0 \\ x \ge 0 \\ y \ge 0. \end{cases}$$

- **A** 5.
- **B** 6.
- **(C)** 7.
- **(D)** 8

CÂU 3. Tìm giá trị lớn nhất a và giá trị nhỏ nhất b của F(x;y)=3x+9y với (x;y) là

nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y+1 \leq 0 \\ 2x-y+4 \geq 0 \\ x+y+1 \geq 0 \\ 2x+y-4 \leq 0 \end{cases}$

- \mathbf{A} a = 21, b = 1.
- **B** a = 21, b =
- **C**) a = 36, b = 1
- \bigcirc a = 36, b = -3.

CÂU 4. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \le x \le 5 \\ 0 \le y \le 10 \\ 5x + 3y \ge 15 \\ -x + y \ge 2 \end{cases}$ và biểu thức P(x;y) = 2x - 2y + 3 với

(x;y) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Tìm giá trị nhỏ nhất của P.

- (A) -17.
- (B) -34.
- \bigcirc -7
- $(\mathbf{D}) 14.$

CÂU 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức F=y-x trên miền xác định bởi hệ $\begin{cases} y-2x \leq 2 \\ 2y-x \geq 4 \\ x+y \leq 5 \end{cases}$

- \bigcirc min F=2 khi x=0, y=2.
- $(\mathbf{C}) \min F = 3 \text{ khi } x = 1, y = 4.$
- $(\mathbf{D}) \min F = -1 \text{ khi } x = 2, y = 1.$

CÂU 6. Tìm giá trị nhỏ nhất T của biểu thức z = 5x + 7y biết rằng x, y là các số không

âm thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + 3y \ge 0 \\ 3x - y \le 15 \\ -x + y \le 4 \\ 2x + 5y < 2 \end{cases}$

- **(A)** T = 12.
- $\bigcirc T = 14$
- **(c)** T = 28
- **D** T = 18.

QUICK NOTE	CÂU 7. Tìm các cặp số $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình dưới đây sao cho nó làm cho biểu thức $S=2x+y$ đạt giá trị lớn nhất.
	$0 \le y \le 2$
	$\begin{cases} 0 \le y \le 2 \\ y \le x \\ x + y \le 5 \\ x \le 4 \end{cases}$
	$\begin{cases} x-y \leq 5 \end{cases}$
	$x \leq 4$
	A $(x;y) = (4;0)$. B $(x;y) = (4;1)$. C $(x;y) = (3;2)$. D $(x;y) = (2;2)$.
	CÂU 8. Khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày cho người ăn kiêng cần cung cấp ít nhất 300
	calo, 36 đơn vị vitamin A và 90 đơn vị vitamin C . Một tách thức uống X có giá 5 nghìn đồng và cung cấp 60 calo, 12 đơn vị vitamin A và 10 đơn vị vitamin C . Một tách thức uống
	Y có giá 6 nghìn đồng và cung cấp 60 calo, 6 đơn vị vitamin A và 30 đơn vị vitamin C . Một tach thực tong
	ngày nên uống bao nhiều tách mỗi loại để có được chi phí tối ưu và vẫn đáp ứng được yêu
	cầu dinh dưỡng hàng ngày? (A) 1 tách loại X , 4 tách loại Y . (B) 3 tách loại X , 2 tách loại Y .
	CAU 9. Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị prô-tê-in và 400 đơn vị li-pít trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kí-lô-gam thịt bò chứa 800 đơn vị prô-tê-in và 200 đơn vị li-pít. Mỗi kí-lô-gam
	thịt lợn chứa 600 đơn vị prô-tê-in và 400 đơn vị li-pít. Biết rằng gia đình này chỉ mua tối
	đa 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn; giá tiền 1 kg thịt bò là 45000 đồng, 1 kg thịt lợn là
	35000 đồng. Hỏi gia đình đó phải mua bao nhiêu kí-lô-gam thịt mỗi loại để số tiền bỏ ra là ít nhất?
	$oxed{\mathbf{A}}$ 0,3 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. $oxed{\mathbf{B}}$ 0,6 kg thịt bò và 0,7 kg thịt lợn.
	\bullet 1,6 kg thịt bò và 1,1 kg thịt lợn. \bullet 0,6 kg thịt lợn và 0,7 kg thịt bò.
	CÂU 10. Một cửa hàng làm kệ sách và bàn làm việc. Mỗi kệ sách cần 5 giờ chế biến gỗ và
	4 giờ hoàn thiện. Mỗi bàn làm việc cần 10 giờ chế biến gỗ và 3 giờ hoàn thiện. Mỗi tháng
	cửa hàng có 600 giờ lao động để chế biến gỗ và 240 giờ để hoàn thiện. Lợi nhuận của mỗi kệ sách là 400 nghìn đồng và mỗi bàn là 750 nghìn đồng. Có bao nhiêu sản phẩm mỗi loại
	cần được làm mỗi tháng để thu được lợi nhuận tối đa?
	A 24000. B 45000. C 45600. D 46000.
	CÂU 11. Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-1 \leq 2 \\ y+1 \leq 3 \end{cases}$ và biểu thức $P(x;y) = 3x + 2y - 5$ với
	(x;y) thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho. Tìm giá trị lớn nhất của P .
	A 16. B -16 . C 8. D -8 .
	CÂU 12. Người ta dự định dùng hai loại nguyên liệu để chiết xuất ít nhất 140 kg chất A
	và 9 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng, có thể chiết xuất được 20 kg chất A và 0,6 kg chất B. Từ mỗi tấn nguyên liệu loại II giá 3 triệu đồng có thể chiết xuất
	được 10 kg chất A và 1,5 kg chất B. Hỏi phải dùng bao nhiều tấn nguyên liệu mỗi loại để
	chi phí mua nguyên liệu là ít nhất, biết rằng cơ sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp
	không quá 10 tấn nguyên liệu loại I và không quá 9 tấn nguyên liệu loại II? (A) 2,5 tấn loại I và 9 tấn loại II. (B) 10 tấn loại I và 9 tấn loại II.
	C 10 tấn loại I và 2 tấn loại II. D 5 tấn loại I và 4 tấn loại II.
	CAU 13. Giá trị nhỏ nhất F_{\min} của biểu thức $F(x;y)=y-x$ trên miền xác định bởi hệ $y-2x\leq 2$
	$\left \begin{array}{c} y & 2x \leq 2 \\ 2y - x > 4 \end{array} \right $
	$\begin{cases} 2y - x \ge 4 & \text{là} \\ x + y \le 5 \end{cases}$
	(a) $F_{\min} = 1$. (b) $F_{\min} = 2$. (c) $F_{\min} = 3$. (d) $F_{\min} = 4$.
	CÂU 14. Một nhà máy sản xuất, sử dụng ba loại máy đặc chủng để sản xuất sản phẩm A
	và sản phẩm B trong một chu trình sản xuất. Đề sản xuất một tấn sản phẩm A lãi 4 triệu
	đồng người ta sử dụng máy I trong 1 giờ, máy II trong 2 giờ và máy III trong 3 giờ. Để sản
	xuất ra một tấn sản phẩm B lãi được 3 triệu đồng người ta sử dụng máy I trong 6 giờ, máy II trong 3 giờ và máy III trong 2 giờ. Biết rằng máy I chỉ hoạt động không quá 36 giờ, máy
	hai hoạt động không quá 23 giờ và máy III hoạt động không quá 27 giờ. Hãy lập kế hoạch
	sản xuất cho nhà máy để tiền lãi được nhiều nhất.
	(\mathbf{A}) Sản xuất 9 tấn sản phẩm A và không sản xuất sản phẩm B .

GV VŨ NGOC PHÁT — ĐT: 0962.940.819

- (\mathbf{B}) Sản xuất 7 tấn sản phẩm A và 3 tấn sản phẩm B.
- Sản xuất $\frac{45}{8}$ tấn sản phẩm A và $\frac{81}{16}$ tấn sản phẩm B.
- \bigcirc Sản xuất 6 tấn sản phẩm B và không sản xuất sản phẩm A.

CÂU 15. Biểu thức F=y-x đạt giá trị nhỏ nhất với điều kiện $\begin{cases} -2x+y \le -2 \\ x-2y \le 2 \\ x+y \le 5 \end{cases}$ tại điểm

S(x;y) có toạ độ là

CÂU 16. Giá trị lớn nhất của biểu thức F(x;y) = x + 2y, với điều kiện $\begin{cases} 0 \le y \le 4 \\ x \ge 0 \\ x - y - 1 \le 0 \\ x + 2y - 10 \le 0 \end{cases}$

là

- **(A)** 6.
- **B**) 8.
- (\mathbf{C}) 10.

				3	j	Į						(١					ľ							
•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

										•	•			•													•	•				-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•		•	•	•	•	•	•			•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			•	•	•	•
	•																															•
																																•
		•				•	•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•							•	•				-
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•		•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•
•			•	•		•	•		•																							•
•			•	•		•	•		•																							•
				•																												
																																•

BPT VÀ HỆ BPT BẬ	C NHẤT HAI ẨN	1
Bài 1.	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn	1
A	Tóm tắt lý thuyết	
B	Các dạng toán	1
	Dạng 1.Bất phương trình bậc nhất hai ẩn và bài toán liên quan	
	► Dạng 2.Bài toán thực tế liên quan	2
	Câu hỏi trắc nghiệm	3
Bài 2.	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn	7
A	Tóm tắt lý thuyết	7
B	Các dạng toán	7
	Dạng 1.Biểu diễn hình học của tập nghiệm	7
	ightharpoonup Dạng 2. Tìm cực trị của biểu thức $F=ax+by$ trên một miền đa giác	15

