



السكر

النسبة الطبيعية للسكر في الدم هي 70 - 110 .

مرض مزمن يسبب ارتفاع تركيز السكر في الدم نتيجة لتقصّ الإنسولين أو عدم قدرته على التأثير على خلايا الجسم.

العناية بالمريض



الرياضة (المشي يومياً نصف ساعة).

بالإضافة إلى ما ذكر سابقاً في الوقاية:

المتابعة مع الطبيب.
قياس السكر كل فترة.

يجب الأكل بعد الدواء مباشرة.

قائمة الممنوعات:

العنب + التين + البليح +
الموز + العيش الغينو +
العيش الشامي

التوجه للطبيب في حالة وجود قرح أو جروح في القدم.

حفظ حقن الإنسولين في الثلاجة.

العناية بالقدم و تنشيفها جيداً بعد الوضوء + لبس شرا ب قطن أو شيشب في المنزل + استخدام القصافة و ليس المقص.

الوقاية للسليم

1. الرياضة (المشي يومياً نصف ساعة).
2. الإكثار من الفواكه و الخضراوات.
3. التقليل من الدهون و السكريات و النشويات و المشروبات الغازية.
4. استبدال السمن بالزيت.
5. قياس السكر كل فترة (خاصة إن توافرت الأسباب).

الأعراض

1. ضعف الإبصار.
2. الجوع و العطش الشديد.
3. فقدان الوزن الملحوظ.
4. التعب و الضعف العام.
5. دخول الحمام بكثرة (و خاصة أثناء النوم).

الأسباب

1. الوراثة.
2. زيادة الوزن.
3. مرض الضغط (يعتبر من مسببات السكر و العكس صحيح).

خليك فاكّر: في حالة الشعور بدوخة، باكل حاجة مسكرة (عشان ما تحصلش له غيبوبة سكر) و بروح لأقرب وحدة صحية.

مضاعفات مرض السكر



ضعف أو فقدان البصر



الفشل الكلوي



أمراض القلب و الضغط



التهاب الأعصاب



القدم السكري

فكر: ماذا تفعل في حالة غيبوبة السكر؟

ارتفاع ضغط الدم (القاتل الصامت)

120 على 80	من 120 على 80 حتى 140 على 90	من 140 على 90 حتى 160 على 100	من 160 على 100 حتى 180 على 110	أعلى من 180
الطبيعي	"احتريش" ما قبل ارتفاع ضغط الدم	مرضى ارتفاع ضغط دم (خفيف)	مرضى ارتفاع ضغط دم متوسط الخطورة	بالغ الخطورة!! (أعراض) يجب التوجه للطوارئ في الحال.

مضاعفات ارتفاع ضغط الدم:

المخيف في الضغط مش أعراضه لكن مضاعفاته.
الضغط هو السبب الأول في العالم لموت الفجأة.

ذبحة صدرية



نزيف في المخ



فقدان البصر



الفشل الكلوي



انفجار الأوعية الدموية



الموت



خليك فاكتر:

الضغط مرض مزمن
(عمره ما هيروح) لكن
ممكن أتحكم فيه بالدواء.

أحمي نفسي منه إزاي؟



✓ نزود الخضار و الفاكهة و نستبدل الأملاح و الدهون
(مسبك - سمن - لحم سمين) بالبصل أو الخل.



✓ التمشية كل يوم لنصف ساعة (إن لم يوجد مانع طبي)
و تقليل الوزن.



✓ الابتعاد عن التدخين (و أماكن تواجد المدخنين).

✓ قياس الضغط كل شهر للسليم و كل أسبوعين للمريض.

بالنسبة لمريض الضغط:

✓ لازم تتابع مع الدكتور و تلتزم بالدواء اللي كتبه (طول ما أنت
بتأخذ الدواء طول ما أنت كويس).
✓ ما ينفعش أبداً توقف الدواء فجأة.
✓ لازم تقيس الضغط كل أسبوعين (حتى لو مش تعبان لأن زي
ما اتفقنا مقيش أعراض).

أسبابه:

ممكن أتحكم
فيها

لا يمكن التحكم
فيها

- أمراض القلب، الكلى،
الدم.
- تصلب الشرايين.
- الوراثة.
- زيادة الوزن.
- التوتر.
- التدخين.
- الأملاح و الدهون.

أعراضه:

- يسمى بالقاتل الصامت لعدم وجود أعراض إلا إذا تجاوز
الضغط 180 و هي مرحلة شديدة الخطورة و **تحتاج**
التدخل الطبي السريع.
- هذه الأعراض هي صداع، دوخة، بقع حمراء في العين،
نزيف في الأنف.
- الطريقة الوحيدة لتشخيص ارتفاع ضغط الدم **المزمن**
هي عن طريق قياس الضغط.

الأم المفصل:

يمكن تكون بسبب كبر السن أو نقص الكالسيوم أو العادات اليومية الخاطئة.

كيف نحصى أنفسنا من آلام المفصل:

- ✓ ممارسة الرياضة (كالمشي يوميًا لمدة 15 دقيقة) وتقليل الوزن.
- ✓ الإقلاع عن التدخين (و هو السبب في كثير من الأمراض).
- ✓ تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل منتجات الألبان.
- ✓ تناول الأطعمة الغنية بفيتامين دال مثل الكبد و صفار البيض و الأسماك الدهنية كالمكرويل.
- ✓ رفع الأثياء و الجلوس بطريقة صحيحة (كما هو موضح بالصورة).
- ✓ تجنب الجلوس لفترات طويلة. ينصح بأخذ استراحة و المشي ل 5 دقائق بعد كل ساعة جلوس.
- ✓ تعريض الرضع لشمس الشروق أو آخر النهار.

في حالة الإصابة بالأم المفصل:

- ✓ الراحة و وضع كمادات تلج على مكان الألم لمدة 15 دقيقة.
- ✓ استخدام الدهانات الموضعية كزيت الزيتون. تجنب تناول المسكنات بدون وصف الطبيب.
- ✓ المتابعة مع الطبيب و الالتزام بالتعليمات.

نصائح عامة

التغذية:

- غسل الخضار و الفاكهة جيدًا بالمياه الجارية (مياه الحنفية).
- بعد غسلها ورقة ورقة ، تنقع الخضراوات الورقية في الخل لقتل البكتيريا.
- تغطية الطعام جيدًا و الحفظ عليه في الثلاجة بعيدًا عن الحشرات.
- غسل اليدين جيدًا قبل و بعد تناول الطعام.
- الإكثار من الخضراوات و الفواكه.
- التقليل من الدهون (بخاصة الدهون الحيوانية و استبدال السمن بالزيت) و التقليل من الأملاح.
- تناول الأطعمة البيضاء كاللبن و الجبن و البيض، و الخضراوات كالخضراوات و السوداء و التي يتسود كالبنانجان و العسل الأسود و الكبد و الموز و التفاح.
- التقليل من الشاي و القهوة و عدم شربهم بعد الطعام مباشرة (الشرب بعد ساعتين على الأقل).
- طهو الطيور جيدًا لمنع الإصابة بإنتونزا الطيور.
- الاهتمام بوجبة الإفطار.
- التعرض للشمس وقت الشروق و العصر.
- بالنسبة لمرضى الحموضة و ارتجاع المرئ يجب الامتناع عن شرب النعناع.

الأم:

- الامتناع عن شرب الشاي و القهوة.
- الإكثار من الخضراوات و الأطعمة السوداء (و التي يتسود كالبنانجان و العسل الأسود و الكبد و الموز و التفاح).

الاسهال و الجفاف:

- أكبر مشكلة يسببها الإسهال المستمر هي الجفاف و قد تؤدي للوفاة في حالة الإهمال.
- لمنع الإسهال يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية و نظافة الغذاء (+مذكر الوفاة من الديدان).
- لمنع الجفاف الناتج عن الإسهال يجب الإكثار من السوائل كالعصائر و المشروبات الدافئة أو مياه الرز، و الطعام سهل الهضم كالبطاطس المسلوقة.
- يمكن استخدام محلول الجفاف من الصيدلية أو صنعه في المنزل عن طريق إضافة ملعقتين سكر + ملعقة ملح إلى كوب ماء و إعطائه للطفل (ملعقة كل دقيقة للرضع أو رشقات واحدة واحدة للأطفال). في حالة إن الطفل رجع ننظر 10 دقائق و ندله كوب آخر (رشقة رشفة).
- ممنوع إعطاء أدوية توقف الإسهال إلا بإذن الطبيب.
- يجب التوجه للطبيب مباشرة إن استمر الإسهال لأكثر من 3 أيام، أو إذا صاحبه ارتفاع في درجات الحرارة أو تغير لون البراز، أو فقدان الوعي و تدهور حالة الطفل.
- في حالة الرضع ممنوع تمامًا إيقاف الرضاعة بالعكس نزود عددها.
- ممنوع لف الطفل في بطانية.



التدخين



إزاي تبطل؟

- (1) حدد وقت تبدأ تبطل فيه السجائر و وقت تكون خلاص بطلتها فيه.
 - (2) استعن بالله و ابدأ بالتدريج (عشان ما تتعشى).
 - (3) عرف أهلك و اللي حواليك عشان يساعدوك و ابعد عن المدخنين.
 - (4) أول أما توقف هتجيبك كحة و تحس إنك دايم عصبى و محتاجها، اصبر لأن في خلال أسبوعين ثلاثة كل ده هيتفتي.
 - (5) خلى السواك دايم في إيدك يشغلك عنها.
 - (6) لو مش قادر قوم اتمسى أو اتوضى و صلى.
 - (7) افكر دايم فوائد الإقلاع عن التدخين:
- ✓ صحتك هتتحسن.
 - ✓ على المدى البعيد ضغطك هيرطب و نشاطك البدني هيتحسن.
 - ✓ مش هتأثر بالسلب على صحة ولادك و أهلك.
 - ✓ الفلوس اللي هتوفرها هتنتفع نفسك و أهلك بيها و ممكن تطلع بيها عمرة لو حوشتها.

المدخن مش مجرد بيئذى نفسه، لا كمان اللي حواليه عن طريق التدخين السلبي (دخان السجائر) و اللي ممكن اللي حواليه يستشقه على طول أو حتى بعد ما يبطل لو بيئذى في مكان مقفول.

أضرار التدخين

- (1) جلطات و سرطان المخ.
- (2) مشاكل في الإبصار.
- (3) التهاب اللثة و قرح الفم.
- (4) سرطان الحنجرة و الرئة.
- (5) قرح و سرطان المعدة و المثانة.
- (6) هشاشة العظام.
- (7) ضعف القدرة الجنسية.

التدخين السلبي

- (1) الكحة و الصداق و الحساسية.
- (2) تشوهات الأجنة أو الولادة المبكرة أو الإجهاض.
- (3) الإصابة بالسرطان.



الغرق

يحدث عند دخول الماء إلى الرئتين ما يمنع دخول الهواء. يمكن الغرق في المياه العميقة أو المياه الضحلة إذا غطى الماء وجهه و أنف الرضيع أو الأطفال.

إسعافات الأولية:

حاول إخراج المصاب من الماء عن طريق سحبه بعضا طويلة أو حبل. احرص درجة وعي المصاب و علاماته الحيوية و استدع الإسعاف إن تطلب الأمر. إذا كان المصاب فاقدًا للوعي و لا يوجد تنفس أو نبض يجب إنعاش القلب و الرئة. إذا كان المصاب فاقدًا للوعي و التنفس قم بعمل التنفس الصناعي. إذا كان المصاب فاقدًا للوعي فقط، ضعه في وضعية الإفاقة. اعمل على تنفئة المصاب حتى وصول الإسعاف.

نظ أن:

يجب إرسال المصاب إلى المستشفى حتى و لو ظهر عليه التعافي التام.

كيفية استخدام البخاخات

يجب استخدام الدواء الموصوف من الطبيب فقط. في حالة الاحتياج لأخذ أكثر من جرعة، انتظر دقيقة بين كل جرعة و الأخرى.



5. تنفس ببطء و أغلق الغطاء.

4. امسك نفسك لمدة 10 ثواني.

3. ضع البخاخة في فمك و أغلق عليها جيدًا، ثم خذ نفسًا و أنت تضغط على البخاخة.

2. اخرج نفس كبير (زفير)

1. اخلع الغطاء و رج العلبة

مشاكل التنفس + البخاخة

- تحدث مشاكل التنفس بسبب الإصابات أو بعض الأمراض أو التسمم أو الصعق الكهربائي.
- تشمل الأعراض:
- زيادة أو نقص معدل التنفس.
- قد يعاني المصاب من شهقات، و قد يشعر بالدوار و يكون مشوش الذهن.
- قد تلاحظ على المصاب زرقة الشفاه.
- الإسعافات الأولية:
- قم باستدعاء الإسعاف.
- ساعد المصاب على تناول علاجه الموصوف (إن وجد).
- قم بترك أي ملابس ضيقة حول رقبته و ساعده على اتخاذ وضع مريح.
- قم بطمأنئة المصاب و لاحظته حتى وصول الإسعاف.

الإغماء

- فقد الشخص لوعيه نتيجة لنقص إمداد المخ بالدم و لذلك لفترة قصيرة.
- يحدث نتيجة للوقوف الطويل، الخوف أو الألم أو الإنهاك أو قلة الطعام.
- أعراضه:
- غثيان مع الإحساس بفقدان الوعي أو دوام وصعوبة في التركيز.
- الإسعافات الأولية:
- مساعد المصاب على الاستلقاء على ظهره أو الجلوس و وضع رأسه بين قدميه.
- إذا فقد الشخص وعيه قم باستدعاء الإسعاف.
- أرخ الملابس الضيقة و قم باستدعاء الإسعاف.

السكر

- قد يكون فقدان مريض السكر للوعي بسبب زيادة أو نقصان السكر و لكن لعدم القدرة على التفريق بين الاثنين يتم التعامل على أنها حالة نقص سكر (لأنها الأخطر).
- الأعراض:
- تغير في سلوك المصاب (قلق أو عصبية أو توتر) مع عدم التركيز أو التلعثم في نطق الكلمات و عدم القدرة على الحركة.
- رعشة في الأطراف و قد يتطور الأمر إلى التشنجات أو فقدان الوعي.
- الإسعافات الأولية:
- قم بإعطاء المصاب سكر أو عصير أو قطعة حلوى.
- من المتوقع أن تتوقف الأعراض في 15 دقيقة و إذا استمرت يجب تكرار السابق.
- متى يتم استدعاء الإسعاف؟
- في حال فقدان المريض للوعي (مع وضعه في وضع الإنفاة).
- المصاب واع ولكنه غير مستجيب و لا يستطيع البلع (لا تقم بإعطائه أي شيء في الفم).
- المصاب بدأ في التشنج.
- لا تتحسن حالة المصاب على الرغم من إعطائه السكر أكثر من مرة.

التشنجات

- حركة غير طبيعية لعضلات الجسم نتيجة لنشاط كهربائي غير طبيعي في المخ.
- قد يحدث بسبب مرض الصرع، ارتفاع شديد في درجة الحرارة، إصابات الرأس ونقص نسبة السكر في الدم.
- الإسعافات الأولية:
- ضعه مستلقيًا على الأرض.
- ضع شيئًا طريًا تحت رأس المصاب.
- فك الملابس حول رقبته.
- ابعد عنه ما يمكن أن يصيبه.
- إذا نقيًا المصابز يجب لف رأسه إلى الجانب لمنعه من ابتلاع القيء.
- بعد انتهاء التشنجات ضعه في وضع الإنفاة.

التشنجات الحرارية في الأطفال: الإسعافات الأولية

- اتصل بالإسعاف.
- خفف ملابس الطفل واستخدم كمادات ماء فاتر على الرأس و الجبهة و حول الرقبة و تحت الإبطين و أعلى الفخذين.

لاحظ:

- لا تحاول أن توقف التشنجات.
- لا تحاول وضع أي شيء في فم المصاب.

اطلب الإسعاف في حال

- استمرار التشنجات لأكثر من 5 دقائق أو تكررت التشنجات.
- تعرضت امرأة حامل لحذوث التشنجات.
- تعرض المصاب للتشنجات لأول مرة.
- عانى المصاب من مرض السكر.
- استمرار المصاب في فقدان الوعي بعد 5 - 10 دقائق من توقف التشنجات.

الإسعافات الأولية: برّد و غطي

الحروق الكهربائية

- استدع الإسعاف.
- أفصل التيار الكهربى و ابعد أي أسلاك عن المصاب.
- افحص التنفس و النبض.
- ابحت عن مكاني الحرق في الجسم (مكان دخول و خروج الكهرباء).
- برّد أماكن الحروق بالماء الجاري لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- لاحظ المصاب.

الحروق الكيميائية

- ارتد أدوات الحماية الشخصية.
- استدع الإسعاف أو اتصل بمركز السموم.
- انزع ملابس المصاب.
- في حال وجود مواد كيميائية جافة يجب إزالتها أولاً.
- اغسل مكان الإصابة بكميات غزيرة من المياه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.
- في حالة إصابة العين، اغسلها بالماء جيّداً، مع وضع العين المصابة للأسفل.
- غط الحروق بشاش فارلين ثم غط المصاب بملاء نظيفة.

الحروق الكبيرة

- استدع الإسعاف.
- إذا كانت ملابس المصاب مشتعلة، (خليه يقع و يتحرك على الأرض) أو أطفئه باستخدام سجادة أو بطانية صوف أو اغمره بالماء.
- قم بتبريد الأجزاء المحترقة بجسم المصاب بالماء الجاري لمدة لا تقل عن 10 دقائق.
- غط المصاب ببطانية.
- إذا أحس بالعطش، أعطه رشقات قليلة من الماء.
- لاحظ المصاب.

الحروق البسيطة

- تأكد أن المكان آمن لك و للمصاب.
- ابعد المصاب عن مصدر الحرق (أو ابعد مصدر الحرق).
- انزع الملابس غير الملتصقة.
- انزع الخواتم أو الساعة قبل حدوث تورم.
- ضع الجزء المحترق تحت تيار ماء جار بارد لمدة 10 دقائق على الأقل.
- ضع شاش فارلين أو غيار نظيف فوق الجزء المحترق (لا تستخدم أقطان).

تذكر:

- ✓ لا تنزع أي شيء ملتصق لاجزاء المحترق.
- ✓ لا تضع أي زيوت على الجزء المحترق.
- ✓ لا تستخدم ثلج أو ماء مثلج لتبريد الحرق.
- ✓ لا تضع قطعاً طبيياً فوق الحرق مباشرة.
- ✓ لا تقم بفتح الفقاعات في مكان الحرق.

التسمم

هو وصول أي مادة للجسم ينتج عنها تأثير ضار سواء عن طريق البلع أو الاستنشاق أو الجلد أو الحقن و قد يتراوح الضرر من إصابة بسيطة لإصابة خطيرة و قد يؤدي التسمم إلى الوفاة.

الأعراض

- قد تكون الأعراض مفاجئة و تظهر خلال دقائق من التعرض للمادة السامة، و قد تظهر ببطء و على فترات زمنية طويلة.
- تغير في لون الجلد، تورم، حرق موضعي.
- ألم بالمعدة، غثيان، إسهال، قيء.
- عطش، كحة، ضيق تنفس، اختناق.
- تغير في درجة الوعي، تشنجات، ضعف عام، دوخة، و إحساس بالإغماء.

الإسعافات الأولية لكل أنواع التسمم

- اهتم بسلامتك و سلامة المحيطين بك.
- حاول أن تعرف المعلومات الآتية:
- نوع المادة السامة و كميتها.
- زمن تناولها، استنشاقها أو تعاطيها.
- إذا ظهرت على المصاب أعراض تهدد الحياة مثل فقدان الوعي فاتصل بالإسعاف مباشرة.
- إذا كانت الأعراض بسيطة و المصاب واعيًا فاتصل بمركز السموم و اشرح لهم ما حدث و هم سيقومون بتوجيهك.
- في حال وجود مواد كيميائية جافة يجب إزالتها أولاً قبل غسل مكان الإصابة بكميات غزيرة من المياه.

الإسعافات الأولية للتسمم بالبلع

- ضع المصاب مستلقيًا على جانبه الأيسر.
- لا تحدث للمصاب قيئًا صناعيًا و لا تعطه ما ياكله أو يشربه إلا إن طلب ذلك عن طريق مركز السموم.
- إذا لم تتعرف على المادة السامة و كان المصاب يتقيأ فاحفظ بعينة من القيء لتحليلها فيما بعد.
- استمر في ملاحظة المصاب حتى وصول الإسعاف.

الإسعافات الأولية للتسمم بالغاز

- إذا لم تكن هناك خطورة عليك فقم على الفور بنقل المصاب إلى الهواء الطلق.
- لتصل بمركز السموم و اتصل بالإسعاف إن تطلب الأمر.
- قم بغسل العينين و الجلد المكتشوف بالماء الجاري.
- استمر في ملاحظة المصاب.

رقم مراكز السموم:
02-24346127
02-23640402



في حال وجود زنيق على الأرض:

- قم بتهوية المكان سريعًا.
- أخرج الأطفال من المكان.
- أغلق الأبواب التي تؤدي لباقي أجزاء المنزل (افصل الغرفة عن باقي المنزل).
- اخرج من الغرفة على الأقل لمدة ربع ساعة.
- (لا تنس استخدام قفازات) اسحب الزنيق باستخدام سرنجة بدون الإبرة و ضعه في برطمان ماء. اغلقه جيدًا و ضعه في كيس و تخلص منه.

تسمم الزنيق

ضربة الشمس

إصابة خطيرة تهدد الحياة.
الإسعافات الأولية:

1. قم باستدعاء الإسعاف.
2. انقل المصاب إلى منطقة باردة جيدة التهوية.
3. يجب تبريد المصاب بأسرع ما يمكن بوضعه في الماء من القدم حتى الذقن، أو رشه بكميات كبيرة من الماء، أو كمادات ماء بارد على الجبهة، الرقبة، تحت الإبطين، وأعلى الفخذين مع تغييرهم كل فترة.
4. استمر في عملية التبريد حتى وصول الإسعاف.



الإجهاد الحراري

الإسعافات الأولية:

1. انقل المصاب إلى منطقة باردة جيدة التهوية.
2. خفف ملابس المصاب، و يمكن رشه بالماء.
3. إذا كان المصاب واعيًا وقادرًا على البلع، أعطه محلول الجفاف.
4. قم بملاحظة المصاب، إن لم تتحسن حالته استدع الإسعاف.

البرودة الشديدة

قضمة الصقيع: مرحلة متقدمة، تتميز بتتمول و برودة و ظهور تجاعيد في الجلد، مع تغير لونه، و قد تظهر فقاعات و يتحول لون الجلد للأسود.

الإسعافات الأولية:

- قم بإسعافات البرودة الشديدة.
- لا تفتح الفقاعات و راقب المصاب حتى وصول الإسعاف.
- ضع الجزء المصاب في ماء دافئ لمدة 20-30 دقيقة.
- ضع شاش معقم على الأجزاء المصابة و بين الأصابع. قم بلف الجزء المصاب برباط شاش لحين وصول الإسعاف.
- لاحظ المصاب حتى وصول الإسعاف.

الإسعافات الأولية:

- استدع الإسعاف فورًا.
- انقل المصاب إلى مكان دافئ.
- إذا كان المصاب يرتجف، قم بتغطيته ببطانية.
- إذا توقف عن الارتجاف، ضعه أمام نار أو قم بوضع كمادات دافئة غير مباشرة.
- إذا كان المصاب واعيًا أعطه مشروبات دافئة (تجنب المشاي و القهوة).

الأعراض:

- برودة في الجلد و الأطراف.
- ارتجاف.
- تغير في درجات الوعي.
- شحوب الوجه و زرقة الشفاه و الأطراف.
- عدم القدرة على التحرك.

- قد يفقد المصاب وعيه وتنتهي الحالة بالوفاة.



عضات الحيوانات

1. قم بإيقاف النزيف أولاً (إن وجد).
2. إذا كان النزيف بسيط و الجرح سطحي، اغسل مكان العضة جيداً بتيار غزير من الماء الجاري و الصابون لمنع التلوث.
3. لف الجزء المصاب بشاش.
4. اذهب فوراً لأقرب مركز طبي لأخذ مصل داء الكلب و التيتانوس.

لاحظ:

- تنطبق هذه الإسعافات على عضات جميع الحيوانات سواء كلب أو قطة أو حمار أو خنثاء.
- هذه الإسعافات مهمة جداً لتقليل التلوث.
- التطعيم أساسي لمنع الإصابة بداء الكلب (السعار) و الذي يؤدي إلى إلى الوفاة.

لسعات النحل

1. حاول إخراج كيس السم من الجلد عن طريق الأظافر أو بطاقة.
2. اغسل مكان اللسعة بماء و صابون.
3. غط مكان اللسعة بشاش.
4. ضع كمادات باردة على مكان اللسعة لتقليل الألم.
5. راقب المصاب، في حالة حدوث أعراض الحساسية الشديدة ، انقله فوراً للمستشفى.

لاحظ:

- لا تضغط أبداً على كيس السم.

أعراض الحساسية:

- احمرار و حكة في الجلد
- صعوبة في التنفس
- تورم الوجه و الرقبة و الشفتان.
- آلام بالمعدة، قيء، إسهال.
- قد تصل لفقدان الوعي.

لدغات الثعابين

1. قم بتهدئة المصاب.
2. استدع الإسعاف فوراً (حتى إن لم تظهر أعراض خطيرة في الحال).
3. ضع المصاب في وضع مريح و حافظ على الجزء المصاب تحت مستوى القلب.
4. اغسل مكان الإصابة بالماء و الصابون.
5. غط مكان الإصابة، و لف الطرف المصاب كاملاً برباط ضاغط لتقليل التورم و تقليل انتشار السم.

لاحظ:

- لا تنس التأكد من أمان المكان و تنبيه من حولك في حالة وجود الثعابين.
- يشعر المصاب بألم مكان اللدغة مع احمرار الجلد و تورم مكان الإصابة، و وجود جرحان (مكان دخول الفكين إلى الجلد).
- قد يفقد المصاب وعيه، و قد يتوقف النبض و التنفس.

ممنوع:

- التشريط أو مص السم.
- وضع ثلج على مكان الإصابة.
- ربط الطرف المصاب.

لدغات العقرب

1. قم بتهدئة المصاب.
2. استدع الإسعاف فوراً (حتى إن لم تظهر أعراض خطيرة في الحال).
3. اغسل مكان الإصابة بالماء و الصابون.
4. ضع كمادات باردة غير مباشرة على مكان الإصابة لتقليل الألم و التورم.

لاحظ:

- لا تنس التأكد من أمان المكان و تنبيه من حولك في حالة وجود العقرب.
- الأعراض مشابهة لللدغة لاثعابين مع وجود جرح واحد فقط، مصحوبة بأعراض الحساسية الشديدة و قد تؤدي إلى التشنجات أو الإغماء.



التغذية

- نقص التغذية او التغذية الخاطئة للاطفال تؤدي الى ضعف البنية الجسدية و نقص القدرات العقلية مدى الحياة.



- سوء التغذية في مرحلة المراهقة يمنع اخر فرصة لزيادة الطول و يزيد خطر الاصابة بهشاشة العظام في المستقبل.



الطبق الصحي يتكون من:

- الثلث الاول: نشويات مثل الخبز او المكرونة او البطاطس
- الثلث الثاني: خضار وفاكهة
- الثلث الثالث: ينقسم الى نصفين:
 1. منتجات الالبان (الجبن والحليب والزبادي)
 2. مصدر بروتين (الببيض - العدس - اللحوم - الفول)

