

Příklad 9.6: a) $\int_0^{-\infty} (x+1)e^{3x} \, dx = \frac{6}{2}$ b) $\int_{-\infty}^0 x e^x \, dx = +\infty$.

Věta 9.1 (srovnavací kritérium):

- a) Necht $|f| \leq g$ na (a,b) , f je na (a,b) po částech spojitá a $\int_a^b g(x) \, dx$ konverguje. Pak konverguje také $\int_a^b f(x) \, dx$.
- b) Necht $f \leq g \leq h$ na (a,b) , g je na (a,b) po částech spojitá a $\int_a^b h(x) \, dx = +\infty$ $\left(\int_a^b g(x) \, dx = -\infty \right)$.

$\int_a^b g(x) \, dx = +\infty$ $\left(\int_a^b g(x) \, dx = -\infty \right)$.

- Příklad 9.7:** a) $\int_1^0 x^\alpha \, dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha > -1$,
b) $\int_{-\infty}^1 x^\alpha \, dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha < -1$,
c) pro $c \in \mathbb{R}$ konverguje $\int_{c+1}^c (x-c)^\alpha \, dx$ právě tehdy, když $\alpha > 0$.

(Výsledky Příkladů 9.6 a 9.7 často využíváme ve srovnávacím kritériu.)

Příklad 9.8: $\int_{-\infty}^0 e^{cx} \, dx$ konverguje právě tehdy, když $\alpha < 0$.

Příklad 9.9: Mějme polynom P a Q , kde polynom Q nemá kořen v intervalu (a, ∞) . Z kapitoly o limitech víme, že se pro $x \rightarrow \infty$ podíl $\frac{P}{Q}$ chová jako funkce $Bx^{st_P-st_Q}$, kde B je podíl koeficientů u nejvyšších mocnin v polynomech P a Q . Na základě výsledku Příkladu 9.7,b) můžeme usuzovat, že by integrál $\int_a^\infty \frac{Q(x)}{P(x)} \, dx$ měl konvergovat právě tehdy, když $st_P - st_Q < -1$, neboť pokud stupně jmenovatele je alespoň o dvě větší než stupně čitatele.

Podívejme se, že to opravdu platí. Označme $k = st_Q - st_P$. Pak $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{Q(x)}{P(x)} = A \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, kde A je podíl koeficientů u nejvyšších mocnin polynomů P a Q . Předpokládejme, že $A > 0$ (pro $A < 0$ by byl postup obdobný). Z definice limity existuje pro $\varepsilon = \frac{2}{3}$ číslo $b \geq a$, b takové, že pro každé $x > b$ platí $\frac{2}{3}A \leq \frac{Q(x)}{P(x)} \leq \frac{4}{3}A$. Dohlí odhad podílů $\frac{Q(x)}{P(x)}$ a druhá část srovnávacího kritéria nám spolu s Příkladem 9.7,b) říká, že pro $k \leq 1$ (kdy $-k \geq -1$) integrál $\int_b^\infty \frac{Q(x)}{P(x)} \, dx$ diverguje. Na druhou stranu, protože $0 < b < \frac{2}{3}A$, můžeme pro $k > 1$ integrál $\int_b^\infty \frac{Q(x)}{P(x)} \, dx$ konverguje. Tím jsme dostali, že integrál $\int_b^\infty \frac{Q(x)}{P(x)} \, dx$ konverguje právě tehdy, když $k > 1$. Potřebujeme se ještě podívat, jak je to s konvergencí integrálu $\int_a^b \frac{Q(x)}{P(x)} \, dx$. Protože je ale na intervalu (a, b) funkce $\frac{Q}{P}$ spojitá, a tedy i omezená, je tento integrál vlastně, a tím také konečný, bez ohledu na to, jaké jsou stupně polynomů P a Q . Podmínky pro konvergenci integrálu funkce $\frac{Q}{P}$ jsou tak na intervalu (a, ∞) stejně jako na intervalu (b, ∞) . Zjistili jsme tak, že pokud polynom Q nemá kořen v intervalu (a, ∞) ,

$\int_a^\infty \frac{Q(x)}{P(x)} \, dx$ konverguje právě tehdy, když $st_Q \geq st_P + 2$.

Příklad 9.10: Vyzkoušejte konvergenční integrály a) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x}}$, b) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
c) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, d) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
e) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, f) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
g) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, h) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
i) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, j) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
k) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, l) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
m) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, n) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
o) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, p) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
q) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, r) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
s) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, t) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
u) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, v) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
w) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, x) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$,
y) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$, z) $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$.

b) Na intervalu $(0, 1)$ máme $\frac{1}{1+x^2} \leq \frac{x\sqrt{1+x^2}}{1+x^2} \leq \frac{1}{1+x^2}$. Podle Příkladu 9.7a) integrál $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$ diverguje k $+\infty$, takže také integrál $\int_1^\infty \frac{1}{1+x^2} \, dx$ diverguje k $+\infty$, a tím podle Věty 9.1b) k $+\infty$ diverguje i integrál $\int_1^\infty \frac{dx}{x\sqrt{1+x^2}}$.

Příklad 9.11: a) $\int_{-\infty}^2 \arctg x \, dx$ konverguje, b) $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} \, dx$ diverguje k $+\infty$.

KAPITOLA 9: Nevlastní integrál

singulární bod integrace funkce f na (a,b) :

- a, je-li $a = -\infty$; b, je-li $b = +\infty$
- $c \in (a,b)$, je-li f nemezená na každém prstencovém okolí bodu c (pro $c = a$ nebo $c = b$ uvažujeme jen příslušná jednostranná okolí)

Definice:

- Necht $-\infty < a < b \leq +\infty$, b je singulární bod integrace funkce f na (a,b) a necht pro každé $\beta \in (a,b)$ existuje $\int_\beta^a f(x) \, dx$ (tedy b je *jediny* singulární bod integrace funkce f na (a,b)). Potom definujeme **nevlastní integrál vzhledem k horní mezi** předpisem $\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\beta \rightarrow b^-} \int_\beta^a f(x) \, dx$

jestliže limita vpravo existuje.

- Necht $-\infty \leq a < b < +\infty$, a je singulární bod integrace funkce f na (a,b) a necht pro každé $\alpha \in (a,b)$ existuje $\int_a^\alpha f(x) \, dx$ (tedy a je *jediny* singulární bod integrace funkce f na (a,b)). Potom definujeme **nevlastní integrál vzhledem k dolní mezi** předpisem $\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\alpha \rightarrow a^+} \int_a^\alpha f(x) \, dx$,

jestliže limita vpravo existuje.

- Jestliže daná limita existuje a je konečná, říkáme, že integrál **konverguje**, je-li rovna $+\infty$ $(-\infty)$, říkáme, že integrál **diverguje** k $+\infty$ $(-\infty)$.

Poznámka: Je-li funkce f spojitá na (a,b) resp. (a,b) a F je primitivní funkce k funkci f na (a,b) , pak podle Věty 8.9 (Newton-Leibnizova formule) můžeme díky spojitosti funkce F na (a,b) psát

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\beta \rightarrow b^-} [F(x)]_a^\beta = \lim_{\beta \rightarrow b^-} (F(\beta) - F(a)) = \overline{\lim_{\beta \rightarrow b^-} (F(\beta) - F(a))} = \overline{\lim_{\beta \rightarrow b^-} F(\beta) - F(a)} = \overline{\lim_{\beta \rightarrow b^-} F(\beta)} - F(a).$$

resp.

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{\alpha \rightarrow a^+} [F(x)]_a^\alpha = \lim_{\alpha \rightarrow a^+} (F(\alpha) - F(b)) = \overline{\lim_{\alpha \rightarrow a^+} (F(\alpha) - F(b))} = \overline{\lim_{\alpha \rightarrow a^+} F(\alpha)} - F(b).$$

Integrál přitom v prvním případě existuje právě tehdy, když existuje $\lim_{\beta \rightarrow b^-} F(\beta)$, ve druhém, když existuje $\lim_{\alpha \rightarrow a^+} F(\alpha)$.

Integrál nevlastní vlivem meze $a = -\infty$ nebo $b = +\infty$
Integrál nevlastní vlivem funkce f není omezená na (a,b)

Připustné dělení intervalu (a,b) $(-\infty \leq a < b \leq +\infty)$ pro funkci f :

$$D = \{c_0, c_1, \dots, c_n\}, \text{ kde } a = c_0 < c_1 < \dots < c_n = b \text{ a pro } i = 1, \dots, n \text{ je } \int_{c_{i-1}}^{c_i} f(x) \, dx \text{ nevlastní (nejvýše) vzhledem k jedné mezi}$$

Definice:

- Nechť $\mathcal{D} = \{c_0, c_1, \dots, c_n\}$ je přípustné dělení intervalu (a, b) pro funkci f . Pak definujeme

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{c_{i-1}}^{c_i} f(x) dx,$$

jestliže všechny integrály vpravo existují a je definován jejich součet (tj. nejsou mezi nimi jak integrály divergující k $+\infty$, tak i integrály divergující k $-\infty$).

- Jestliže součet existuje a je konečný, říkáme, že integrál **konverguje**, je-li součet roven $+\infty$ ($-\infty$), říkáme, že integrál **diverguje** k $+\infty$ ($-\infty$).
- Jestliže alespoň jeden z bodů c_0, \dots, c_n je singulárním bodem integrace funkce f na (a, b) , mluvíme o **nevlastním integrálu**, jinak o **integrálu vlastním**.

Poznámky: a) Existence a hodnota $\int_a^b f(x) dx$ nezávisí na volbě dělení \mathcal{D} .

b) Jestliže integrál existuje podle předchozí definice a je vlastní, existuje i jako Riemannův a je mu roven.

c) Pro $a > b$ opět pokládáme $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.

d) Speciálně, jestliže je funkce f spojitá na intervalu (a, b) a má na tomto intervalu primitivní funkci F (singulárními body integrace funkce f na (a, b) jsou tedy nejvýše body a, b), pak pro každé $c \in (a, b)$ je $\mathcal{D} = \{a, c, b\}$ přípustné dělení intervalu (a, b) pro funkci f a platí

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = [F(x)]_a^c + [F(x)]_c^b = \\ &= \underbrace{(F(c-) - F(a+))}_{F(c)} + \underbrace{(F(b-) - F(c+))}_{F(c)} = F(b-) - F(a+) = [F(x)]_a^b. \end{aligned}$$

Výraz vpravo je přitom zřejmě definován právě tehdy, když je definován součet $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$, tj. když existuje integrál $\int_a^b f(x) dx$.

Příklad 9.1: a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ – integrál nevlastní vlivem (obou) mezí; konverguje ($= \pi$)

b) $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ – integrál nevlastní vlivem funkce; diverguje k $+\infty$

c) $\int_{-1}^1 \frac{x}{1-x^2} dx$ – integrál nevlastní vlivem funkce; neexistuje (protože tu není definován součet $\int_{-1}^0 + \int_0^1$)

d) $\int_0^{\infty} \cos x dx$ – integrál nevlastní vlivem meze; neexistuje (protože tu neexistuje limita primitivní funkce v $+\infty$)

e) $\int_0^1 \sin \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2} dx$ – integrál nevlastní vlivem funkce; neexistuje
(protože tu neexistuje limita zprava primitivní funkce $\cos \frac{1}{x}$ v nule)

Příklad 9.2: Vypočtěte $\int_2^{\infty} \frac{2}{x^2-1} dx$.

Řešení: Integrál je nevlastní vlivem meze. Máme

$$\begin{aligned} \int_2^{\infty} \frac{2}{x^2-1} dx &= \int_2^{\infty} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right) dx = [\ln|x-1| - \ln|x+1|]_2^{\infty} = \\ &= \left[\ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| \right]_2^{\infty} = 0 - \ln \frac{1}{3} = \ln 3. \end{aligned}$$

Všimněte si na tomto příkladu, že pro nevlastní integrály nemusí platit rovnost $\int_a^b (f-g) = \int_a^b f - \int_a^b g$, protože rozdíl vpravo nemusí být definován. (Zde např. máme $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x-1} = [\ln|x-1|]_2^{\infty} = +\infty = [\ln|x+1|]_2^{\infty} = \int_2^{\infty} \frac{dx}{x+1}$.)

Příklad 9.3: Vypočtěte integrály (integrandy budeme značit f):

a) $\int_{-1}^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$... singulárním bodem integrace funkce f na intervalu $(-1, 8)$ je bod 0

$$\int_{-1}^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = \int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx + \int_0^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx = \left[\frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} \right]_{-1}^0 + \left[\frac{3}{2} \sqrt[3]{x^2} \right]_0^8 = \left(0 - \frac{3}{2} \right) + \left(6 - 0 \right) = \frac{9}{2}$$

b) $\int_1^4 \frac{1}{(x-2)^2} dx$... singulárním bodem integrace funkce f na intervalu $(1, 4)$ je bod 2

$$\int_1^4 \frac{1}{(x-2)^2} dx = \int_1^2 \frac{1}{(x-2)^2} dx + \int_2^4 \frac{1}{(x-2)^2} dx = \left[\frac{-1}{x-2} \right]_1^2 + \left[\frac{-1}{x-2} \right]_2^4 = (+\infty - 1) + \left(-\frac{1}{2} - (-\infty) \right) = +\infty$$

c) $\int_{-1}^2 \frac{1}{x-1} dx$... singulárním bodem integrace funkce f na intervalu $(-1, 2)$ je bod 1

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{x-1} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{x-1} dx + \int_1^2 \frac{1}{x-1} dx = [\ln|x-1|]_{-1}^1 + [\ln|x-1|]_1^2 = \langle (-\infty - \ln 2) + (\ln 1 - (-\infty)) \rangle = \text{neexistuje}$$

d) $\int_{-1}^2 \frac{1}{|x-1|} dx$... singulárním bodem integrace funkce f na intervalu $(-1, 2)$ je bod 1

$$\int_{-1}^2 \frac{1}{|x-1|} dx = \int_{-1}^1 \frac{-1}{x-1} dx + \int_1^2 \frac{1}{x-1} dx = [-\ln|x-1|]_{-1}^1 + [\ln|x-1|]_1^2 = \langle (+\infty - (-\ln 2)) + (\ln 1 - (-\infty)) \rangle = +\infty$$

Poznámka: K výpočtu integrálů, které nemají singulární bod uvnitř integračního oboru, můžeme použít metodu substituce. Při použití metody substituce se někdy může stát, že přejdeme od integrálu nevlastního k integrálu vlastnímu nebo naopak. Při použití integrace per partes přímo pro nevlastní integrál musíme být opatrní. Může se stát, že i když integrál konverguje, dojdeme při výpočtu k rozdílu limit, který není definovaný.

Příklad 9.4: Vypočtěte $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin^2 x} dx$.

Řešení: Integrál je vlastní, při použití metody substituce ale přejdeme k nevlastnímu integrálu. Máme totiž

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+\sin^2 x} dx &= \left| \begin{array}{ll} \operatorname{tg} x &= t \\ x &= \operatorname{arctg} t \\ \frac{dx}{-\frac{\pi}{2}} &\rightsquigarrow -\infty \\ &\rightsquigarrow \frac{\pi}{2} \rightsquigarrow +\infty \end{array} \right| = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+\frac{t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{1}{1+t^2} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+2t^2} dt = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+(\sqrt{2} t)^2} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} [\operatorname{arctg} \sqrt{2} t]_{-\infty}^{+\infty} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi. \end{aligned}$$

Nyní už můžeme dopočítat Příklad 8.11. Z předchozího pro něj dostáváme

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} \frac{1}{1+\sin^2 x} dx = 4 \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \pi \right) = 2\sqrt{2}\pi.$$

Příklad 9.5: Vypočtěte integrály (integrandy budeme opět značit f):

a) $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2-2x+5} dx$... singulárními body integrace funkce f na intervalu $(-\infty, \infty)$ jsou krajní body intervalu

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2-2x+5} dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{(x-1)^2+4} dx = \frac{1}{4} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\left(\frac{x-1}{2}\right)^2+1} dx = \left| \begin{array}{ll} \frac{x-1}{2} &= t \\ \frac{1}{2} dx &= dt \\ -\infty &\rightsquigarrow -\infty \\ +\infty &\rightsquigarrow +\infty \end{array} \right| = \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{t^2+1} dt = \frac{1}{2} [\operatorname{arctg} t]_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

b) $\int_{-1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}^2 x}{1+x^2} dx$... singulárními body integrace funkce f na intervalu $(-1, \infty)$ je bod ∞

$$\int_{-1}^{\infty} \frac{\operatorname{arctg}^2 x}{1+x^2} dx = \left| \begin{array}{ll} \operatorname{arctg} x &= t \\ \frac{1}{x^2+1} dx &= dt \\ -1 &\rightsquigarrow -\frac{\pi}{4} \\ +\infty &\rightsquigarrow +\frac{\pi}{2} \end{array} \right| = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} t^2 dt = \left[\frac{t^3}{3} \right]_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi^3}{3} \left(\frac{1}{8} - \left(-\frac{1}{64} \right) \right) = \frac{\pi^3}{64}$$