

Vzájemná poloha afinních podprostorů

Odpřednesenou látku naleznete v kapitolách 7.1, 7.2
a 7.3 skript *Abstraktní a konkrétní lineární algebra*.

Co již víme? (přednášky z teorie soustav lineárních rovnic)

- Pro $\mathbf{A} : \mathbb{F}^s \rightarrow \mathbb{F}^r$ a \mathbf{b} z \mathbb{F}^r je obecné řešení soustavy $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ tvaru $\mathbf{p} + \ker(\mathbf{A})$.
Množina $\mathbf{p} + \ker(\mathbf{A})$ je **d -dimensionální afinní podprostor** (kde $d = \text{def}(\mathbf{A})$) v prostoru \mathbb{F}^s . Tato plocha **prochází** bodem \mathbf{p} .
- Jakoukoli podmnožinu prostoru \mathbb{F}^s tvaru $\mathbf{p} + W$, kde W je **lineární podprostor** prostoru \mathbb{F}^s a \mathbf{p} je bod \mathbb{F}^s , lze považovat za množinu řešení nějaké vhodné soustavy rovnic $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

Dnešní přednáška

- Zaměříme^a se na **afinní podprostory** prostoru \mathbb{R}^n nad \mathbb{R} .
- Budeme studovat **vzájemnou polohu** afinních podprostorů prostoru \mathbb{R}^n .


^aCelá dnešní přednáška projde v prostorech typu \mathbb{F}^n nad \mathbb{F} , kde \mathbb{F} je těleso.

Definice

Množině $\mathbf{p} + W = \{\mathbf{p} + \mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in W\}$, kde W je lineární podprostor prostoru \mathbb{R}^n a \mathbf{p} je bod z \mathbb{R}^n , říkáme **afinní podprostor** prostoru \mathbb{R}^n .

Dimense^a afinního prostoru $\mathbf{p} + W$ je číslo $\dim(W)$. Lineárnímu prostoru W říkáme **směr** afinního podprostoru $\mathbf{p} + W$.

^aAfinním podprostorům v \mathbb{R}^n dimense 0 budeme říkat **body**, afinním podprostorům v \mathbb{R}^n dimense 1 budeme říkat **přímky**, afinním podprostorům v \mathbb{R}^n dimense 2 budeme říkat **roviny**.



Příklady afinních podprostorů prostoru \mathbb{R}^4

Množiny

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 10 \\ 9 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}\right), \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

jsou afinní podprostory prostoru \mathbb{R}^4 . Jejich dimenze jsou postupně 0, 1, 2 a 3. A jejich směry jsou:

$$\left\{\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right\}, \quad \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}\right), \quad \text{span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}\right), \quad \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

Příklad (vzájemná poloha přímk v \mathbb{R}^3 , intuitivní výpočet)

- ❶ Přímk $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ jsou
rovnoběžné.

Obě přímk mají **stejný směr**, je jím vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- ❷ Přímk $\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ a $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ jsou
různoběžné.

To zjistíme následujícím způsobem: přímk **nejsou** rovnoběžné:

rovnost $\text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ **neplatí**. Navíc mají obě

přímk **společný bod**, je jím vektor $\begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$.

Příklad (vzájemná poloha přímek v \mathbb{R}^3 , pokrač.)

- 3 Přímky $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ a $\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ jsou **mimoběžné**.

To zjistíme následujícím způsobem: přímky **nejsou** rovnoběžné: rovnost $\text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ **neplatí**. Navíc obě přímky **nemají společný bod**: neexistují reálná čísla s, t tak, že

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

O tom se lze snadno přesvědčit řešením příslušné soustavy rovnic.

Jak postupovat v \mathbb{R}^n ?

Potřebujeme **dobré definice** a **dobrá kritéria** vzájemné polohy!

Definice (vzájemná poloha afinních podprostorů)


Ať $\pi = \mathbf{p} + W$ a $\pi' = \mathbf{p}' + W'$ jsou dva afinní podprostory prostoru \mathbb{R}^n . Řekneme, že

- ① π a π' jsou **rovnoběžné**, pokud platí $W \subseteq W'$ nebo $W' \subseteq W$.
- ② π a π' jsou **různoběžné**, pokud nejsou rovnoběžné a mají alespoň jeden společný bod.
- ③ π a π' jsou **mimoběžné**, pokud nejsou rovnoběžné a nemají žádný společný bod.

Dimensi lineárního podprostoru $W \cap W'$ budeme říkat **stupeň rovnoběžnosti** afinních podprostorů π a π' .

Poznámka

Pro dva afinní podprostory π a π' prostoru \mathbb{R}^n platí:



Tvrzení (charakterisace rovnoběžných disjunktních afinních podprostorů)

Ať $\pi = \mathbf{p} + W$ a $\pi' = \mathbf{p}' + W'$ jsou dva afinní podprostory prostoru \mathbb{R}^n . Ať $W' \subseteq W$. Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:

1. Afinní podprostory π a π' jsou **disjunktní**.
2. Pro jakýkoli vektor \mathbf{x} v π a jakýkoli vektor \mathbf{x}' v π' vektor $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$ neleží ve W .
3. **Vektor $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$ neleží ve W .**
4. Existuje vektor \mathbf{x} v π a existuje vektor \mathbf{x}' v π' tak, že vektor $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$ neleží ve W .

Důkaz.

Bez důkazu. Pro zájemce: Tvrzení 7.2.4 **skript**.



Tvrzení (charakterisace různoběžných afinních podprostorů)

Ať $\pi = \mathbf{p} + W$ a $\pi' = \mathbf{p}' + W'$ jsou dva afinní podprostory prostoru \mathbb{R}^n , které nejsou rovnoběžné. Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1 Afinní podprostory π a π' jsou různoběžné.
- 2 Pro jakýkoli vektor \mathbf{x} v π a jakýkoli vektor \mathbf{x}' v π' vektor $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$ leží ve $W \vee W'$.
- 3 Vektor $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$ leží ve $W \vee W'$.
- 4 Existuje vektor \mathbf{x} v π a existuje vektor \mathbf{x}' v π' tak, že vektor $\mathbf{x} - \mathbf{x}'$ leží ve $W \vee W'$.

Důkaz.

Bez důkazu. Pro zájemce: Tvrzení 7.2.5 skript.



Tvrzení (charakterisace **mimoběžných** afinních podprostorů)

Ať $\pi = \mathbf{p} + W$ a $\pi' = \mathbf{p}' + W'$ jsou dva afinní podprostory prostoru \mathbb{R}^n , které nejsou rovnoběžné. Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:

1. Afinní podprostory π a π' jsou **mimoběžné**.
2. Vektor $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$ neleží ve $W \vee W'$.

Důkaz.

Bez důkazu. Pro zájemce: Tvrzení 7.2.6 **skript**. ■

Popis afinního podprostoru v \mathbb{R}^n pomocí směrové matice

Pro afinní podprostor $\pi = \mathbf{p} + W$ v prostoru \mathbb{R}^n dimenze d je možné nalézt matici $\mathbf{S} : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ tak, že

$$\text{im}(\mathbf{S}) = W \quad \text{def}(\mathbf{S}) = 0$$

Stačí definovat $\mathbf{S} = (\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_d)$, kde sloupce $\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_d$ matice \mathbf{S} tvoří bázi W .

Každý bod v prostoru π je tedy tvaru

$$\mathbf{p} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{t}$$

pro jednoznačně určený vektor \mathbf{t} z \mathbb{R}^d .

Tomuto popisu říkáme **parametrický zápis** afinního podprostoru π a matici \mathbf{S} říkáme **směrová matice** afinního podprostoru π .

Tvrzení (charakterisace rovnoběžných disjunktních afinních podprostorů)

Ať $\pi = \mathbf{p} + W$ a $\pi' = \mathbf{p}' + W'$ jsou dva afinní podprostory prostoru \mathbb{R}^n , zadány parametricky jako $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{t}$ a $\mathbf{x}' = \mathbf{p}' + \mathbf{S}' \cdot \mathbf{t}'$.

① Následující podmínky jsou ekvivalentní:

- ① Platí $W' \subseteq W$.
- ② Platí $\text{span}(\mathbf{s}'_1, \dots, \mathbf{s}'_{d'}) \subseteq \text{span}(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_d)$, kde $\mathbf{S}' = (\mathbf{s}'_1, \dots, \mathbf{s}'_{d'})$ a $\mathbf{S} = (\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_d)$.
- ③ Simultánní soustava $(\mathbf{S} \mid \mathbf{S}')$ má řešení.

② Ať $W' \subseteq W$. Následující podmínky ekvivalentní:

- ① Afinní podprostory π a π' jsou **disjunktní**.
- ② Pro jakýkoli vektor \mathbf{x} v π a jakýkoli vektor \mathbf{x}' v π' soustava $(\mathbf{S} \mid \mathbf{x} - \mathbf{x}')$ nemá řešení.
- ③ **Soustava $(\mathbf{S} \mid \mathbf{p} - \mathbf{p}')$ nemá řešení.**
- ④ Existuje vektor \mathbf{x} v π a existuje vektor \mathbf{x}' v π' tak, že soustava $(\mathbf{S} \mid \mathbf{x} - \mathbf{x}')$ nemá řešení.

Důkaz.

Přednáška.

Tvrzení (charakterisace různoběžných afinních podprostorů)

At' $\pi = \mathbf{p} + W$ a $\pi' = \mathbf{p}' + W'$ jsou dva afinní podprostory prostoru \mathbb{R}^n , které nejsou rovnoběžné. At' π a π' zadány parametricky jako $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{t}$ a $\mathbf{x}' = \mathbf{p}' + \mathbf{S}' \cdot \mathbf{t}'$. Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:

- 1 Afinní podprostory π a π' jsou různoběžné.
- 2 Pro jakýkoli vektor \mathbf{x} v π a jakýkoli vektor \mathbf{x}' v π' soustava $(\mathbf{S}', \mathbf{S} \mid \mathbf{x} - \mathbf{x}')$ má řešení.
- 3 Soustava $(\mathbf{S}', \mathbf{S} \mid \mathbf{p} - \mathbf{p}')$ má řešení.
- 4 Existuje vektor \mathbf{x} v π a existuje vektor \mathbf{x}' v π' tak, že soustava $(\mathbf{S}', \mathbf{S} \mid \mathbf{x} - \mathbf{x}')$ má řešení.

Důkaz.

Přednáška.



Tvrzení (charakterisace **mimoběžných** afinních podprostorů)

At' $\pi = \mathbf{p} + W$ a $\pi' = \mathbf{p}' + W'$ jsou dva afinní podprostory prostoru \mathbb{R}^n , které nejsou rovnoběžné. At' π a π' zadány parametricky jako $\mathbf{x} = \mathbf{p} + \mathbf{S} \cdot \mathbf{t}$ a $\mathbf{x}' = \mathbf{p}' + \mathbf{S}' \cdot \mathbf{t}'$. Potom jsou následující podmínky ekvivalentní:


1. Afinní podprostory π a π' jsou **mimoběžné**.
2. Soustava $(\mathbf{S}', \mathbf{S} \mid \mathbf{p} - \mathbf{p}')$ nemá řešení.

Důkaz.

Přednáška. 

Důležitá poznámka

Při rozhodování o vzájemné poloze afinních podprostorů π a π' je velmi rozumné postupovat podle obrázku



Povšimněte si, že tak tomu bude ve všech následujících příkladech.

Příklad 1 (vzájemná poloha dvou rovin v \mathbb{R}^5)

V \mathbb{R}^5 rozhodněte o vzájemné poloze afinních podprostorů

$$\pi = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right) \quad \pi' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}\right)$$

❶ Rovnoběžnost: ani jedna ze simultánních soustav

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right) \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

nemá řešení. Takže π a π' nejsou rovnoběžné.

Příklad 1 (vzájemná poloha dvou rovin v \mathbb{R}^5 , pokrač.)

- ① Různoběžnost: stačí zjistit, zda soustava^a

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

má řešení. Protože řešení neexistuje, jsou π a π' **mimoběžné**.

Závěr: roviny π a π' jsou **mimoběžné**.

^aPravá strana je $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$.

Příklad 2 (vzájemná poloha přímek v \mathbb{R}^3)

Rozhodněte o vzájemné poloze přímek $\pi = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ a

$$\pi' = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

- ❶ Rovnoběžnost: obě simultánní soustavy

$$\left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right) \qquad \left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right)$$

mají zjevně řešení; π a π' jsou **rovnoběžné**.

- ❷ Jsou π a π' disjunktní? Stačí zjistit, zda soustava rovnic

$$\left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{array} \right)$$

má řešení. Pravá strana je $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$.

Příklad 2 (vzájemná poloha přímk v \mathbb{R}^3 , pokrač.)

Soustava

$$\left(\begin{array}{c|c} 0 & 0 \\ 2 & -2 \\ 1 & 0 \end{array} \right)$$

evidentně řešení nemá; přímky π a π' jsou **disjunktní**.

Závěr: přímky π a π' jsou **rovnoběžné a disjunktní**.

Příklad 3 (vzájemná poloha přímk v \mathbb{R}^3)

Rozhodněte o vzájemné poloze přímek $\pi = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ a

$$\pi' = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

Příklad 3 (vzájemná poloha přímek v \mathbb{R}^3 , pokrač.)

- ① Rovnoběžnost: žádná ze simultánních soustav

$$\left(\begin{array}{c|c} 0 & 3 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c|c} 3 & 0 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right)$$

řešení nemá; přímky π a π' **nejsou rovnoběžné**.

- ② Různoběžnost: protože soustava^a

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

má řešení, jsou přímky π a π' **různoběžné**.

Závěr: přímky π a π' jsou **různoběžné**.

^aPravá strana je $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$.

Příklad 4 (vzájemná poloha přímk v \mathbb{R}^3)

Rozhodněte o vzájemné poloze přímek $\pi = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ a

$$\pi' = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right).$$

① Rovnoběžnost: žádná ze simultánních soustav

$$\left(\begin{array}{c|c} 0 & 3 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{c|c} 3 & 0 \\ 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{array} \right)$$

řešení nemá; přímky π a π' nejsou rovnoběžné.

Příklad 4 (vzájemná poloha přímek v \mathbb{R}^3 , pokrač.)

② Různoběžnost: soustava^a

$$\left(\begin{array}{cc|c} 0 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

nemá řešení, přímky π a π' jsou **mimoběžné**.

Závěr: přímky π a π' jsou **mimoběžné**.

^aPravá strana je $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$.

Příklad 5 (vzájemná poloha dvou rovin v \mathbb{R}^4)

V \mathbb{R}^4 rozhodněte o vzájemné poloze afinních podprostorů

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \quad \pi' = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{span}\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$$

❶ Rovnoběžnost: řešíme simultánní soustavy

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Roviny budou rovnoběžné, pokud alespoň jedna simultánní soustava má řešení.

Příklad 5 (vzájemná poloha dvou rovin v \mathbb{R}^4 , pokrač.)

❶ Pomocí Gaussovy eliminace dostáváme

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 - 3R_1 \\ R_4 - R_1 \end{array}$$

Simultánní soustava

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

tedy řešení nemá.

Příklad 5 (vzájemná poloha dvou rovin v \mathbb{R}^4 , pokrač.)

❶ Pomocí Gaussovy eliminace dostáváme

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_4 \\ R_2 \\ R_1 \\ R_3 \end{array} \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{array}{l} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ R_4 - 3R_1 \end{array}$$

Ani simultánní soustava

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

tedy řešení nemá.

Ukázali jsme, že π a π' nejsou rovnoběžné.

Příklad 5 (vzájemná poloha dvou rovin v \mathbb{R}^4 , pokrač.)

- ② Různoběžnost: stačí zjistit, zda soustava^a

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

má řešení.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 - 3R_1 \\ R_4 - R_1 \end{matrix} \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \begin{matrix} R_1 \\ R_2 \\ R_3 \\ 3R_4 - R_3 \end{matrix}$$

Řešení existuje, π a π' jsou různoběžné.

Závěr: roviny π a π' jsou různoběžné.

^aPravá strana je $\mathbf{p} - \mathbf{p}'$.

Závěrečná poznámka

Tvrzení o rovnoběžnosti, různoběžnosti, mimoběžnosti, existenci parametrického zápisu a rovnicového zápisu lze **stejným způsobem** dokázat v prostoru \mathbb{F}^n , kde \mathbb{F} je **jakékoli těleso**.^a

^aTo znamená: **rozumíme** například pojmům rovnoběžnosti, různoběžnosti, mimoběžnosti afinních podprostorů prostoru \mathbb{C}^6 nad \mathbb{C} . Nebo například v prostoru $(\mathbb{Z}_{7919})^{12\,378\,516}$ nad \mathbb{Z}_{7919} .

Co příště a přes příště?

- 1 Zavedeme **vektorový součin** v \mathbb{R}^n , kde $n \geq 2$.
- 2 Naučíme se počítat **vzájemné vzdálenosti** afinních podprostorů prostoru \mathbb{R}^n .

Budeme pracovat^a v \mathbb{R}^n se **standardním skalárním součinem**.

^aJde pracovat i v \mathbb{R}^n s obecným metrickým tensorem \mathbf{G} . To nebudeme dělat.