

KAPITOLA 8: Riemannův integrál

určitý integrál

motivace: výpočet obsahu plochy pod grafem funkce

8.1 Úvod

(nejdříve jen pro $a < b$)

Definice:

řekneme, že množina $\mathcal{D} \subset \langle a, b \rangle$ je **dělením intervalu** $\langle a, b \rangle$, jestliže je konečná a $a, b \in \mathcal{D}$.

Prvky dělení $\mathcal{D} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ intervalu $\langle a, b \rangle$ čislujeme tak, že platí

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b.$$

Pro funkci f omezenou na $\langle a, b \rangle$ označíme

$$m_i x = \inf_{x \in (x_{i-1}, x_i)} f(x), \qquad M_i x = \sup_{x \in (x_{i-1}, x_i)} f(x).$$

Definice:

Je-li f funkce omezená na $\langle a, b \rangle$ a $\mathcal{D} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ dělení intervalu $\langle a, b \rangle$, pak čísla

$$\underline{S}(f, \mathcal{D}) = \sum_{i=1}^t m_i x \cdot (x_i - x_{i-1}) \qquad \text{a} \qquad \underline{S}(f, \mathcal{D}) = \sum_{i=1}^t M_i x \cdot (x_i - x_{i-1}),$$

nazýváme **dolním a horním Riemannovým (integrálním) součtem** funkce f na $\langle a, b \rangle$.

Věta 8.1:

Pro každé dělení \mathcal{D} intervalu $\langle a, b \rangle$ platí

$$(b - a) \cdot \inf_{x \in (a, b)} f(x) \leq \underline{S}(f, \mathcal{D}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{D}) \leq (b - a) \cdot \sup_{x \in (a, b)} f(x).$$

Důkaz: Zřejmě platí $\underline{S}(f, \mathcal{D}) \geq \sum_n \inf_{x \in (a, b)} f(x) (x_i - x_{i-1}) = \inf_{x \in (a, b)} f(x) \sum_n (x_i - x_{i-1}) = \inf_{x \in (a, b)} f(x) \cdot (b - a)$.

Podobně dostáváme i poslední nerovnost. Nerovnost $\overline{S}(f, \mathcal{D}) \leq \overline{S}(f, \mathcal{D})$ vyplývá přímo z definice.

Definice:

Dělení \mathcal{D}' intervalu $\langle a, b \rangle$ nazýváme **zjemněním** dělení \mathcal{D} intervalu $\langle a, b \rangle$, je-li $\mathcal{D} \subset \mathcal{D}'$.

Poznámka: Je-li $\mathcal{D} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ a $\mathcal{D}_1 = \mathcal{D} \cup \{x\}$, kde $x \notin \mathcal{D}$, pak zřejmě platí

$$\underline{S}(f, \mathcal{D}_1) \geq \underline{S}(f, \mathcal{D}) \qquad \text{a} \qquad \overline{S}(f, \mathcal{D}_1) \leq \overline{S}(f, \mathcal{D}).$$

Uvědomíme-li si nyní, že jakoliv zjemnění \mathcal{D}' dělení \mathcal{D} lze získat z dělení \mathcal{D} postupným přidáváním jednoho bodu, dostaneme, že i pro toto obecné zjemnění platí

$$\underline{S}(f, \mathcal{D}') \geq \underline{S}(f, \mathcal{D}) \qquad \text{a} \qquad \overline{S}(f, \mathcal{D}') \leq \overline{S}(f, \mathcal{D}).$$

Jsou-li $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ dělení intervalu $\langle a, b \rangle$, pak

Věta 8.2:

Důkaz: Dělení $\mathcal{D}' = \mathcal{D}_1 \cup \mathcal{D}_2$ je zjemněním obou dělení \mathcal{D}_1 a \mathcal{D}_2 . Tedy $\underline{S}(f, \mathcal{D}_1) \leq \underline{S}(f, \mathcal{D}') \leq \overline{S}(f, \mathcal{D}') \leq \overline{S}(f, \mathcal{D}_2)$.

Definice:

Je-li

$$\sup\{\underline{S}(f, \mathcal{D}) \mid \mathcal{D} \text{ dělení } \langle a, b \rangle\} = \inf\{\overline{S}(f, \mathcal{D}) \mid \mathcal{D} \text{ dělení } \langle a, b \rangle\} = I,$$

pak číslo I nazýváme **Riemannovým** (určitým) **integrálem** funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$ a píšeme

$$I = \int_a^b f(x) \, dx \quad \left(\text{případně} \quad (R) \int_a^b f(x) \, dx \quad \text{nebo stručně jen} \quad \int_a^b f \right).$$

(používané názvy: $a \dots$ dolní mez; $b \dots$ horní mez; $f \dots$ integrand)

Poznámka: Riemannův integrál je definován jen pro funkce omezené - pro jiné funkce totiž není definován horní a dolní Riemannův součet.

Poznámka: Jak uvidíme ve Větě 8.6, nemá na existenci a hodnotu Riemannova integrálu vliv, změníme-li hodnotu integrované funkce v konečně mnoha bodech. Díky tomu lze připustit, aby integrovaná funkce nebyla v konečně mnoha bodech intervalu definována. Mohou totiž nastat jen dvě možnosti:

- Ať dodefinujeme funkci v bodech, kde nebyla definována, jakýmkoliv způsobem, integrál existovat bude a bude pokaždé stejný.
- Ať dodefinujeme funkci v bodech, kde nebyla definována, jakýmkoliv způsobem, integrál existovat nebude.

Poznámka: Pro každé dělení \mathcal{D} intervalu $\langle a, b \rangle$ zřejmě platí

$$\underline{S}(f, \mathcal{D}) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq \overline{S}(f, \mathcal{D}).$$

(Samozřejmě za předpokladu, že $\int_a^b f$ existuje.)

Poznámka: Riemannův integrál lze zavést také pomocí **Riemannových integrálních součtů** (už ne horních a dolních). K tomu kromě dělení $\mathcal{D} = \{x_0, \dots, x_n\}$ uvažujeme ještě množinu $\tau = \{t_1, \dots, t_n\}$, takovou, že $t_i \in \langle x_{i-1}, x_i \rangle$, a položíme

$$S(f, \mathcal{D}, \tau) = \sum_{i=1}^n f(t_i) (x_i - x_{i-1}).$$

Integrál pak definujeme jako limitu těchto součtů, pokud půjde norma dělení, tj. maximální délka intervalu vzniklého dělením, k nule. Obě definice Riemannova integrálu jsou ekvivalentní, tedy existuje-li integrál podle jedné z definic, existuje i podle druhé a jeho hodnoty jsou v obou případech stejné. Všimněte si, že pro f spojitou odpovídá dolní součet tomu, že za body t_i vybereme body minima funkce f na intervalech $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$, a pro horní součet analogicky volíme body maxima.

Věta 8.3:

Integrál $\int_a^b f(x) \, dx$ existuje a je roven A právě tehdy, když existuje posloupnost $(\mathcal{D}_n)_{n=1}^\infty$ dělení intervalu $\langle a, b \rangle$ taková, že

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{S}(f, \mathcal{D}_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{S}(f, \mathcal{D}_n) = A.$$

Poznámka: Pro $(\mathcal{D}_n)_{n=1}^\infty$ z Věty 8.3 zřejmě platí

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\overline{S}(f, \mathcal{D}_n) - \underline{S}(f, \mathcal{D}_n)) = 0. \quad (1)$$

I když k tomu, aby měly dvě posloupnosti stejnou limitu, obecně nestačí, když jejich rozdíl má limitu nulovou (uvažujme například posloupnosti $a_n = b_n = (-1)^n$, které limitu nemají, jejich rozdíl je ale nulová posloupnost s limitou nula), z vlastností dolních a horních Riemannových součtů se dá ukázat, že pokud najdeme posloupnost dělení $(\mathcal{D}_n)_{n=1}^\infty$ splňující (1), pak limity jím odpovídajících dolních a horních Riemannových součtů existují a jsou si rovny. V takovém případě tedy z Věty 8.3 víme, že Riemannův integrál existuje. Jen čemu se integrál rovná, nám limita (1) neřká.

Příklad 8.1: Pro $k \in \mathbb{R}$ pevně je $\int_a^b k \, dx = k \cdot (b - a)$.

Příklad 8.10: Předpokládejme, že f je periodická s periodou T a po částech spojitá na \mathbb{R} . Pak pro $k \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \beta < T$ a $\alpha = kT + \beta$ platí

Aa)

$$\begin{aligned} \int_{\beta}^{\beta+T} f(t) \, dt &= \int_{\beta}^T f(t) \, dt + \int_T^{\beta+T} \underbrace{f(t)}_{f(t-T)} \, dt = \left| \begin{array}{rcl} u & = & t - T \\ du & = & dt \\ T & \rightsquigarrow & 0 \\ \beta + T & \rightsquigarrow & \beta \end{array} \right| = \\ &= \int_{\beta}^T f(t) \, dt + \int_0^{\beta} f(u) \, du = \int_0^T f(t) \, dt \end{aligned}$$

(protože nezáleží na označení integrační proměnné v určitém integrálu),

Ab)

$$\int_{\alpha}^{\alpha+T} \underbrace{f(x)}_{f(x-kT)} \, dx = \left| \begin{array}{rcl} t & = & x - kT \\ dt & = & dx \\ \alpha & \rightsquigarrow & \alpha - kT = \beta \\ \alpha + T & \rightsquigarrow & \beta + T \end{array} \right| = \int_{\beta}^{\beta+T} f(t) \, dt \stackrel{Aa)}{=} \int_0^T f(t) \, dt.$$

Tedy při integraci periodické funkce nezáleží na tom, přes který interval délky periody integrujeme. Integrál je vždy stejný.

B) Je-li navíc $d \in \mathbb{R}$, pak

$$\int_{\beta}^{\beta+d} \underbrace{f(x)}_{f(x+kT)} \, dx = \left| \begin{array}{rcl} t & = & x + kT \\ dt & = & dx \\ \beta & \rightsquigarrow & \beta + kT = \alpha \\ \beta + d & \rightsquigarrow & \alpha + d \end{array} \right| = \int_{\alpha}^{\alpha+d} f(t) \, dt.$$

Tedy posun intervalu o násobek periody integrál nezmění.

Příklad 8.11: Vypočtete $\int_{-2\pi}^{2\pi} f(x) \, dx$, kde $f(x) = \frac{1}{1 + \sin^2 x}$.

Řešení: Funkce f je spojitá na intervalu $\langle -2\pi, 2\pi \rangle$, tedy integrál existuje. Vhodná substituce zde je $t = \operatorname{tg} x$. Funkce tangens však není definována na celém intervalu $\langle -2\pi, 2\pi \rangle$. Proto náš integrál roztrhneme na několik integrálů:

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} f = \int_{-2\pi}^{-\frac{3\pi}{2}} f + \int_{-\frac{3\pi}{2}}^{-\frac{\pi}{2}} f + \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} f.$$

Funkce f je π -periodická, tedy podle Příkladů 8.9 a 8.10 máme

$$\int_{-2\pi}^{2\pi} f \stackrel{\text{Pr. 8.10B}}{=} \int_{-2\pi}^{-\frac{3\pi}{2}} f + 3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} f \stackrel{\text{Pr. 8.10B}}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f + 3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f + \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 f = 4 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f.$$

Hodnotu integrálu $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} f$ vypočteme v Příkladu 9.3.

8.4 Věta o střední hodnotě**Věta 8.10 (o střední hodnotě):**

Nechť f je spojitá na $\langle a, b \rangle$. Pak existuje $c \in (a, b)$ tak, že

$$\int_a^b f(x) \, dx = f(c) \cdot (b - a).$$

$f(c) = \frac{\int_a^b f(x) \, dx}{b - a} \quad \dots \quad$ střední hodnota funkce f na intervalu $\langle a, b \rangle$

Poznámka: Předpoklad $a < b < c$ ve Větě 8.5 lze nahradit předpokladem existence integrálu $\int_a^\beta f(x) dx$, kde $\alpha = \min\{a, b, c\}$ a $\beta = \max\{a, b, c\}$.

Věta 8.6:

Nechť existuje $\int_a^b f(x) dx$. Jestliže se g liší od f na $\langle a, b \rangle$ v nejvýše konečně mnoha bodech, pak existuje

$$\int_a^b g(x) dx \text{ a platí } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx.$$

Důkaz: Nechť $c_1 < c_2 < \dots < c_k$ jsou právě ty body z intervalu (a, b) , ve kterých $f \neq g$. Pak opakovaným použitím Věty 11.5 dostaneme

$$\int_a^b f = \int_a^{c_1} f + \int_{c_1}^{c_2} f + \dots = \int_a^{c_1} f + \int_{c_1}^{c_2} f + \dots + \int_{c_k}^b f.$$

Položme $c_0 = a$, $c_{k+1} = b$ a $h = f - g$. Pro $i \in \{1, \dots, k+1\}$, $n \in \mathbb{N}$ uvažujme posloupnost dělení

$$\mathcal{D}_{i,n} = \{c_{i-1}, c_{i-1} + \frac{1}{3} \cdot \frac{c_i - c_{i-1}}{n}, c_i - \frac{1}{3} \cdot \frac{c_i - c_{i-1}}{n}, c_i\}$$

intervalu $\langle x_{i-1}, x_i \rangle$. Předpokládejme například, že $h(c_{i-1}) > 0$, $h(c_i) < 0$ (jinak bychom postupovali podobně). Pak protože $h(x) = 0$ na (c_{i-1}, c_i) , máme

$$\underline{S}(h, \mathcal{D}_{i,n}) = 0 \cdot \frac{c_i - c_{i-1}}{3n} + 0 \cdot \frac{(3n-1)(c_i - c_{i-1})}{3n} + h(c_i) \cdot \frac{c_i - c_{i-1}}{3n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

$$\overline{S}(h, \mathcal{D}_{i,n}) = h(c_{i-1}) \cdot \frac{c_i - c_{i-1}}{3n} + 0 \cdot \frac{(3n-1)(c_i - c_{i-1})}{3n} + 0 \cdot \frac{c_i - c_{i-1}}{3n} = h(c_{i-1}) \cdot \frac{c_i - c_{i-1}}{3n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Protože posloupnost dolních součtů a posloupnost horních součtů mají stejnou limitu a ta je rovna nule, je podle Věty 8.3 $\int_{c_{i-1}}^{c_i} h(x) dx = 0$. Tedy podle Věty 8.5 o aditivitě integrálu vzhledem k integračnímu oboru máme

$$\int_a^b h(x) dx = \sum_{i=1}^{k+1} \int_{c_{i-1}}^{c_i} h(x) dx = 0.$$

Nyní už stačí jen využít toho, že integrál z rozdílu je rozdílem integrálů (viz části a), b) následující Věty 8.7), a dostaneme

$$\int_a^b g(x) dx = \int_a^b (f(x) - h(x)) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b h(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

Poznámka: Na základě vět 8.4, 8.5 a 8.6 stačí k existenci $\int_a^b f(x) dx$, když je funkce f na $\langle a, b \rangle$ po částech spojitá (tj. má tam jen konečně mnoho bodů nespojitosti a v nich má konečné jednostranné limity).

Věta 8.7:

Nechť existují $\int_a^b f(x) dx$, $\int_a^b g(x) dx$ a $c \in \mathbb{R}$. Potom

$$\text{a) } \int_a^b (f + g)(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx,$$

$$\text{b) } \int_a^b (c \cdot f)(x) dx = c \cdot \int_a^b f(x) dx.$$

Je-li navíc $a < b$, pak

$$\text{c) je-li } f \geq 0 \text{ na } \langle a, b \rangle, \text{ pak } \int_a^b f(x) dx \geq 0,$$

Důkaz: Zřejmé – sčítáme nezáporná čísla.

$$\text{d) je-li } f \leq g \text{ na } \langle a, b \rangle, \text{ pak } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \quad (\text{tzv. monotonie integrálu}),$$

$$\textbf{Důkaz: } g - f \geq 0 \text{ na } \langle a, b \rangle, \text{ tedy podle a), b), c) je } \int_a^b g - \int_a^b f = \int_a^b (g - f) = \int_a^b (g - f) \stackrel{\text{c)}}{\geq} 0.$$

$$\text{e) existuje } \int_a^b |f(x)| dx \text{ a platí } \left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx,$$

$$\textbf{Důkaz odhadu: } -|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)| \text{ pro každé } x \in \langle a, b \rangle, \text{ tedy } -\int_a^b |f| \stackrel{\text{b)}}{=} \int_a^b (-|f|) \stackrel{\text{d)}}{\leq} \int_a^b f \stackrel{\text{d)}}{\leq} \int_a^b |f|.$$

$$\text{f) je-li } |f| \leq M \text{ na } \langle a, b \rangle, \quad A, B \in \langle a, b \rangle, \text{ pak } \left| \int_A^B f(x) dx \right| \leq M |B - A|.$$

$$\textbf{Důkaz: } 1) \text{ pro } \underline{A=B} \text{ zřejmé; } 2) \text{ pro } \underline{A < B}: \quad \left| \int_A^B f \right| \stackrel{\text{e)}}{\leq} \int_A^B |f| \stackrel{\text{d)}}{\leq} \int_A^B M = M(B - A) = M|B - A|;$$

$$3) \text{ pro } \underline{B < A}: \quad \left| \int_A^B f \right| = \left| -\int_B^A f \right| = \left| \int_B^A f \right| \stackrel{2)}{\leq} M|A - B| = M|B - A|.$$

Věta 8.8 (integrál jako funkce horní meze):

Nechť existuje $\int_a^b f(t) dt$ a $c \in \langle a, b \rangle$. Pak pro funkci

$$F_c(x) = \int_c^x f(t) dt, \quad x \in \langle a, b \rangle$$

platí:

a) F_c je spojitá na $\langle a, b \rangle$, $F_c(c) = 0$.

b) Je-li f spojitá v $x_0 \in \langle a, b \rangle$, pak $F'_c(x_0) = f(x_0)$.

(Existuje-li jen jednostranná limita funkce f v x_0 , pak je rovna odpovídající jednostranné derivaci funkce F v x_0 .)

Poznámka: Z Věty 8.8 vyplývá, že funkce spojitá na intervalu I má na I primitivní funkci (viz Větu 7.2). Je-li totiž $c \in I$, pak $F_c(x) = \int_c^x f(t) dt$ je primitivní funkcí k f na I . Navíc pro libovolnou primitivní funkci F k f na I platí

$$F(x) = F_c(x) + F(c) = \int_c^x f(t) dt + F(c).$$

Příklad 8.5: Pro funkci $f(x) = \int_0^x (e^{t^2} - e^4) dt$ vyšetřete body lokálních extrémů, intervaly monotonie, konvexity a konkávity.

Věta 8.9 (Newton-Leibnizova formule):

Jestliže existuje $\int_a^b f(x) dx$ a F je primitivní funkce k f na $\langle a, b \rangle$, pak platí

$$\int_a^b f(x) dx = F(b-) - F(a+) \quad \left(= \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x) \right).$$

Píšeme:

$$F(b-) - F(a+) = [F(x)]_a^b.$$

Poznámka: Na volbě primitivní funkce ve Větě 8.9 nezáleží. Jsou-li totiž F_1, F_2 primitivní funkce k f na $\langle a, b \rangle$, pak existuje $\tilde{c} \in \mathbb{R}$ tak, že $F_2 = F_1 + \tilde{c}$ na $\langle a, b \rangle$, tedy

$$[F_2(x)]_a^b = F_2(b-) - F_2(a+) = (F_1(b-) + \tilde{c}) - (F_1(a+) + \tilde{c}) = F_1(b-) - F_1(a+) = [F_1(x)]_a^b.$$

$$\textbf{Příklad 8.6: } \text{ a) } \int_a^b k dx = [kx]_a^b = kb - ka = k(b - a), \quad \text{ b) } \int_a^b x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_a^b = \frac{b^2 - a^2}{2}.$$

$$\textbf{Příklad 8.7: } \text{ Pro funkci } f(x) = \frac{\sqrt{2}}{\cos x + 3} \text{ vypočtěte } \int_0^{2\pi} f(x) dx.$$

Řešení: Funkce f je spojitá na $\langle 0, 2\pi \rangle$, tedy integrál existuje. Podle Příkladu 7.23 je $G(x) = \arctg \frac{\tg \frac{x}{2}}{\sqrt{2}}$ primitivní funkce k f , ovšem pouze na intervalech $((2k-1)\pi, (2k+1)\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$, ne tedy na celém intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$. Musíme proto rozdělit náš integrál na dva:

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) dx &= \int_0^\pi f(x) dx + \int_\pi^{2\pi} f(x) dx = \left[\arctg \frac{\tg \frac{x}{2}}{\sqrt{2}} \right]_0^\pi + \left[\arctg \frac{\tg \frac{x}{2}}{\sqrt{2}} \right]_\pi^{2\pi} = \\ &= \left(\frac{\pi}{2} - 0 \right) + \left(0 - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = \pi. \end{aligned}$$

Je také možné použít funkci

$$F(x) = \begin{cases} \arctg \frac{\tg \frac{x}{2}}{\sqrt{2}} & \text{na } (0, \pi) \\ \frac{\pi}{2} & \text{pro } x = \pi \\ \arctg \frac{\tg \frac{x}{2}}{\sqrt{2}} + \pi & \text{na } (\pi, 2\pi) \end{cases}$$

která je, opět podle Příkladu 7.23, primitivní funkcí k f na celém intervalu $\langle 0, 2\pi \rangle$. Pak dostaneme

$$\int_0^{2\pi} f(x) dx = F(2\pi-) - F(0+) = \lim_{x \rightarrow 2\pi^-} \left(\arctg \frac{\tg \frac{x}{2}}{\sqrt{2}} + \pi \right) - \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\arctg \frac{\tg \frac{x}{2}}{\sqrt{2}} \right) = \pi - 0 = \pi.$$

Poznámka: Už před výpočtem jsme si mohli všimnout, že funkce f je zdola omezená kladnou konstantou, tedy