

KAPITOLA 12: Číselné řady

Označení:

- $\mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\} = \mathbb{R}$

- $\mathbb{C} \cup \{\infty\} = \mathbb{C}$ – rozšířená komplexní rovina (∞ – nevlastní hodnota, číslo, bod)

$U_\varepsilon(a) = \{x \in \mathbb{C} \mid |x - a| < \varepsilon\}$ pro $a \in \mathbb{C}$, $\varepsilon > 0$

$U_K(\infty) = \{x \in \mathbb{C} \mid |x| > K\}$ pro $K \geq 0$

definujeme pro $a \in \mathbb{C}$:

$a \pm \infty = \infty$, $a \cdot \infty = \infty$ (jen pro $a \neq 0$), $\frac{\infty}{d} = 0$, $\infty \cdot \infty = \infty$

nedělnujeme:

$0 \cdot \infty, \frac{\infty}{\infty}, \infty \pm \infty$

Posoupenosti komplexních čísel

$(a_n)_{n=1}^\infty = (\alpha_n + j\beta_n)_{n=1}^\infty = (\alpha_n)_{n=1}^\infty + j(\beta_n)_{n=1}^\infty$, $\alpha_n, \beta_n \in \mathbb{R}$

definice limity jako v reálném případě

Plati:

• $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{(\operatorname{Re} a_n)^2 + (\operatorname{Im} a_n)^2} = 0$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{C} \Leftrightarrow \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re} a_n = \operatorname{Re} a \vee \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im} a_n = \operatorname{Im} a \right)$

• $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$

– k tomu stačí, když platí $\lim_{n \rightarrow \infty} |\operatorname{Re} a_n| = +\infty$ nebo $\lim_{n \rightarrow \infty} |\operatorname{Im} a_n| = +\infty$ (není to ovšem nutné – viz

posoupenost $(a_n)_{n=1}^\infty = (1, 2j, 3, 4j, \dots)$, pro kterou ani jedna z uvedených dvou limit neexistuje)

12.1 Úvod

$(a_n)_{n=1}^\infty$ – posoupenost reálných nebo komplexních čísel

$\sum_{n=1}^\infty a_n$ (nekonечná) řada reálných nebo komplexních čísel, $a_n - n$ -tý člen řady

obecněji: $\sum_{n=1}^{N_0} a_n$; $\sum_{n=1}^{P(n)} a_n$, kde $P(n)$ je nějaký výrok (např. “3 nedělí n ”); \dots

Definice:

Nechť $N \in \mathbb{N}$. Pak N -tý částečný součet řady $\sum_{n=1}^N a_n$ definujeme předpisem:

$s_N = a_1 + a_2 + \dots + a_N.$

Existuje-li $s = \lim_{N \rightarrow \infty} s_N$, nazýváme s součtem řady $s = \sum_{n=1}^\infty a_n$. Píseme $s = \sum_{n=1}^\infty a_n$.

Řekneme, že řada **konverguje** (**diverguje** | **osciluje**), jestliže posoupenost částečných součtů $(s_N)_{N=1}^\infty$ má limitu vlastní (nevlastní | nemá limitu).

Poznámka: Změna konečné mnoha členů řady nemá vliv na to, zda řada konverguje, diverguje či osciluje.

Příklad 12.1: $\sum_{n=1}^\infty n$ diverguje $[s_N = \frac{N(N+1)}{2}]$; $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n$ osciluje $[s_N = (-1, 1, 0, -1, 0, -1, 0, \dots)]$; $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n n$ osciluje v \mathbb{R} , ale diverguje v \mathbb{C} $[(s_N)_{N=1}^\infty = (-1, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \dots)]$

Příklad 12.2: Geometrická řada s kvocientem q : $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, kde $a_0, q \in \mathbb{R}$, $a_{n+1} = q \cdot a_n$, tj. $a_n = a_0 \cdot q^n$

- Speciálně pro $\underline{a_0 = 1}$ je

$$\sum_{n=0}^N a_n = \sum_{n=0}^N q^n = s_N = 1 + q + q^2 + \dots + q^N.$$

Je-li $\underline{q = 1}$, pak zřejmě platí $s_N = N + 1$. Pro $\underline{q \neq 1}$ máme

$$s_{N+1} = 1 + q + q^2 + \dots + q^N + q^{N+1} = \begin{cases} s_N + q^{N+1} \\ 1 + q \cdot s_N \end{cases}$$

tedy

$$s_N + q^{N+1} = 1 + q \cdot s_N,$$

$$s_N = \frac{1 - q^{N+1}}{1 - q}.$$

To nám dává pro $|q| < 1$

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1 - q}$$

a obecněji

$$\sum_{n=N_0}^{\infty} q^n = \sum_{n=N_0}^{\infty} q^{N_0} \cdot q^{n-N_0} \stackrel{m=n-N_0}{=} \sum_{m=0}^{\infty} q^{N_0} \cdot q^m = q^{N_0} \cdot \frac{1}{1 - q}.$$

Pro ostatní kvocienty q z vyjádření s_N dostáváme

$$\diamond \text{ v } \mathbb{R}: \quad \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \begin{cases} +\infty & \text{pro } q \geq 1 \\ \text{osciluje} & \text{pro } q \leq -1 \end{cases}$$

$$\diamond \text{ v } \mathbb{C}: \quad \sum_{n=0}^{\infty} q^n = \begin{cases} \infty & \text{pro } |q| > 1 \text{ nebo } q = 1 \\ \text{osciluje} & \text{pro } |q| = 1, q \neq 1 \end{cases}$$

- Pro obecné $a_0 \neq 0$ všechny součty vynásobíme číslem a_0 .

Speciálně pro $|q| < 1$ dostáváme

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_0 q^n = a_0 \cdot \frac{1}{1 - q},$$

a obecněji jako výše

$$\sum_{n=N_0}^{\infty} a_n = \sum_{n=N_0}^{\infty} a_0 q^n = a_0 q^{N_0} \cdot \frac{1}{1 - q} = a_{N_0} \cdot \frac{1}{1 - q}.$$

- Pro $a_0 = 0$ je součet řady nulový (všechny členy řady jsou nulové).

Příklad 12.3: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3}{(-4)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(-\frac{1}{4}\right)^n = 3 \cdot \frac{1}{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)} = \frac{12}{5}$

Příklad 12.4: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$. Máme totiž $a_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, takže

$$s_N = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \dots + \left(\frac{1}{N-1} - \frac{1}{N}\right) + \left(\frac{1}{N} - \frac{1}{N+1}\right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 1.$$

Věta 12.1:

Je-li $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = A \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{\infty, -\infty\}$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = B \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{\infty, -\infty\}$ a $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, pak platí

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = A + B, \quad \sum_{n=1}^{\infty} c \cdot a_n = c \cdot A,$$

pokud je výraz vpravo definován.

Poznámka („limitní verze“ srovnávacího kritéria): Uvažujeme řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ s kladnými členy. Předpokládáme, že existuje vlastní limita $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$ (zřejmě $c \geq 0$). Pokud je $c \neq 0$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje právě tehdy, když konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Z definice limity totiž existuje k $\varepsilon = \frac{c}{2} > 0$ index $n_1 \in \mathbb{N}$ takový, že pro každé $n \geq n_1$ je $\frac{1}{2}c = c - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < c + \varepsilon = \frac{3}{2}c$, a tedy $\frac{1}{2}cb_n < a_n < \frac{3}{2}cb_n$. Použijeme-li nyní srovnávací kritérium na řady s členy $c_n \stackrel{\text{ozn.}}{=} \frac{1}{2}cb_n$, a_n a $d_n \stackrel{\text{ozn.}}{=} \frac{3}{2}cb_n$, zjistíme, že jestliže konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$, a pokud konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} d_n$, konverguje i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Řady $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ a $\sum_{n=1}^{\infty} d_n$ přitom zřejmě konvergují právě tehdy, když konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$. Pokud je $c = 0$, pak nám konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ dává konvergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Z definice limit totiž k $\varepsilon = 1$ existuje index $n_1 \in \mathbb{N}$ takový, že pro každé $n \geq n_1$ je $\frac{a_n}{b_n} < 0 + \varepsilon = 1$, tedy $a_n < b_n$. Konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nám na základě limity $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ o konvergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ nic neříká.

Příklad 12.8 – dodatek: K důkazu konvergence řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ můžeme použít také výše uvedenou limitní verzi srovnávacího kritéria: Máme $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2}\right) / \left(\frac{1}{n(n+1)}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{n^2} = 1$ a řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ konverguje.

Věta 12.6 (podílové kritérium – D'Alembertovo):

Nechť $a_n > 0$ pro všechna $n \geq n_1$. Potom platí:

- a) Jestliže existuje $0 < q < 1$ tak, že $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$ pro všechna $n \geq n_1$, pak $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje.
mm
b) Jestliže $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ pro všechna $n \geq n_1$, pak $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje.

Důkaz: Důkaz provedeme pro případ $n_1 = 1$. V ostatních případech bychom postupovali analogicky.

- a) Jestliže pro všechna $n \in \mathbb{N}$ platí $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q$, pak $a_{n+1} \leq q a_n \leq q^2 a_{n-1} \leq q^3 a_{n-2} \leq \dots \leq q^n a_1$. Tedy pro všechna $n \in \mathbb{N}$ máme $a_n \leq b_n$, kde $b_n = q^{n-1} a_1$ a $0 < q < 1$. Protože geometrická řada $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ konverguje, konverguje podle srovnávacího kritéria (Věta 12.5) i řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

- b) Jestliže $\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$, pak je posloupnost $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ neklesající a pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $a_n \geq a_1 > 0$.

Tedy nemůže být $\lim_{n \rightarrow \infty} a = 0$. Není tím splněna nutná podmínka konvergence (Věta 12.3) a řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ nekongruje.

Protože podle Věty 12.4 má řada s nezápornými členy vždy součet, musí tato řada divergovat. \square

Věta 12.7 (limitní podílové kritérium):

Nechť $a_n > 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Potom platí:

- a) Jestliže existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, pak $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje.
b) Jestliže existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$, pak $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje.

Důkaz: Označme $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = A$. Protože členy řady jsou kladné, je $A \geq 0$.

- a) Je-li $A < 1$, pak z definice limity posloupnosti pro $\varepsilon = \frac{1-A}{2} > 0$ existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna $n \geq n_0$ platí $|\frac{a_{n+1}}{a_n} - A| < \varepsilon$, tedy též $\frac{a_{n+1}}{a_n} < A + \varepsilon = A + \frac{1-A}{2} = \frac{1+A}{2} < 1$. Řada tedy splňuje předpoklady první části podílového kritéria (Věty 12.6) s $q = \frac{1+A}{2}$, a je tedy podle tohoto kritéria konvergentní.

- b) Jestliže je $A > 1$, pak z definice limity existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro všechna $n \geq n_0$ platí $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$. Tedy jsou splněny předpoklady druhé části podílového kritéria a daná řada diverguje. \square

Věta 12.8 (odmocninové kritérium – Cauchyovo):

Nechť $a_n \geq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Potom platí:

- a) Jestliže existuje $0 < q < 1$ tak, že $\sqrt[n]{a_n} \leq q$ pro všechna $n \geq n_1$, pak $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje.
b) Jestliže $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$ pro nekonečně mnoho n , pak $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverguje.

Řešení: Máme $a_n = \left(\frac{\pi}{2}\right)^n \geq 0$ a

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\sqrt[n]{n^2}} = \frac{\frac{\pi}{2}}{(\sqrt[n]{n})^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2}}{1^2} = \frac{\pi}{2} > 1.$$

Tedy podle limitního odmocninového kritéria řada diverguje. Divergenci můžeme dostat také pomocí limitního podílového kritéria, protože

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^n} = \frac{\pi}{2} \frac{n^2}{(n+1)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2} \cdot 1 = \frac{\pi}{2} > 1.$$

Příklad 12.19: Vyšetřete konvergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2n)!}$.

Řešení: Máme $a_n = \frac{n^n}{(2n)!} > 0$ a

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(n+1)^{n+1}}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{n^n} = \frac{(n+1)(n+1)^n}{(2n+2)(2n+1)n^n} = \frac{1}{2(2n+1)} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \\ &= \frac{1}{2(2n+1)} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \cdot e = 0 < 1. \end{aligned}$$

Tedy podle limitního podílového kritéria řada konverguje.

Příklad 12.20: Vyšetřete konvergenci řady $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2n^2 - 6n + 5}{(n^2 - 3n + 2)^2}$.

Řešení: Rozkladem na jednoduché zlomky dostaneme $a_n = \frac{1}{(n-1)^2} + \frac{1}{(n-2)^2}$. Protože je na intervalu $(3, \infty)$ funkce $f(x) = \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x-2)^2}$ nezáporná a nerostoucí a $\int_3^{\infty} f(x) dx = \left[-\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x-2}\right]_3^{\infty} = 0 - \left(-\frac{1}{2} - 1\right) = \frac{3}{2}$, daná řada konverguje. Podílové ani odmocninové kritérium zde nepomohou, protože $\frac{a_{n+1}}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ (ověřte) a dá se ukázat, že také $\sqrt[n]{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$.

Příklad 12.21: Vyšetřete konvergenci a absolutní konvergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{(3n+2)\arctg n}$.

Řešení: Označíme-li a_n členy dané řady, pak $a_n = (-1)^n b_n$, kde $(b_n)_{n=1}^{\infty} = \left(\frac{1}{(3n+2)\arctg n}\right)_{n=1}^{\infty}$ je nezáporná nerostoucí posloupnost, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \left\langle \frac{1}{\infty \cdot \frac{\pi}{2}} \right\rangle = 0$. Podle Leibnizova kritéria tedy řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje. Zkoumejme

nyní absolutní konvergenci řady. Máme $|a_n| = \frac{1}{(3n+2)\arctg n} \geq \frac{1}{(3n+2n)\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{5\pi n}$. Protože řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{5\pi n}$

diverguje, dostáváme ze srovnávacího kritéria, že i řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ diverguje. Daná řada tedy absolutně nekongruje.

Dostali jsme tak, že zkoumaná řada konverguje neabsolutně. (Při zkoumání absolutní konvergence jsme mohli použít také limitní verzi srovnávacího kritéria: $\frac{|a_n|}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{(3n+2)\arctg n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{3\pi} \in (0, \infty)$ a řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverguje).

Příklad 12.22: Vyšetřete konvergenci a absolutní konvergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(3n-1)(n+2)}{n^2+3}$.

Řešení: Protože $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \langle \text{neex.} \cdot 3 \rangle$ neexistuje, není splněna nutná podmínka konvergence, a daná řada proto nekongruje. Nekongruje tedy ani absolutně.

Příklad 12.23: Vyšetřete konvergenci a absolutní konvergenci řady $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{\sqrt[3]{2n+5}}{n!}$.

Řešení: Protože $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{2n+7}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{\sqrt[3]{2n+5}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{\frac{2n+7}{2n+5}} \cdot \frac{1}{n+1} = 1 \cdot 0 = 0$, daná řada konverguje absolutně, a tedy i konverguje. Mohli jsme také nejdřív pomocí Leibnizova kritéria dokázat prostou konvergenci, a pak až zkoumat konvergenci absolutní. Pro použití Leibnizova kritéria bychom ale nejdřív museli ověřit, že posloupnost $\left(\frac{\sqrt[3]{2n+5}}{n!}\right)_{n=1}^{\infty}$ je nerostoucí. To je možné, ale nepřijemné.

Podposoupnost lichých částecných součtů je tak nerostoucí a má, jako každá monotonií posoupnost, limitu. Označme tuto limitu s . Potřebujeme ukázat, že s je limitou celé posoupnosti částecných součtů. Pro suše částecné součty platí $s_{2N} = s_{2N-1} - b_{2N}$, takže $\lim_{N \rightarrow \infty} s_{2N} = \lim_{N \rightarrow \infty} (s_{2N-1} - b_{2N}) = s - 0 = s$. Jelikož podposoupnosti lichých a sudých částecných součtů řady obsahují všechny částecné součty řady, je s limitou celé posoupnosti částecných součtů dané řady. Tato řada tedy součet má a je jím s . Zbývá ukázat, že $s \in \mathbb{R}$. Protože posoupnost lichých částecných součtů je nerostoucí, je $s_1 \geq s$. Z monotonie posoupnosti $(b_n)_{n=1}^\infty$ je $a_{2k-1} + a_{2k} = b_{2k-1} - b_{2k} \geq 0$, takže všechny suče částecné součty jsou nutně nezáporné. Tedy i jejich limita s je nezáporná. Dostali jsme tak pro s nerovnosti $0 \leq s \leq s_1$, z kterých

uz plyne, že $s \in \mathbb{R}$ a řada $\sum_{n=1}^\infty (-1)^{n+1} b_n$ konverguje. □

Příklad 12.15: Řada $\sum_{n=1}^\infty (-1)^{n+1} \frac{n}{1 - \frac{2}{1} + \frac{3}{1} - \frac{4}{1} + \dots}$ konverguje neabsolutně.

Poznámky :

a) Je-li $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ prostě zobrazení, pak řadu $\sum_{n=1}^\infty a_{f(n)}$ nazýváme **převráněním řady** $\sum_{n=1}^\infty a_n$. Platí:

1) Jestliže řada konverguje absolutně, pak konverguje absolutně i každé její převránění a má stejný součet.

2) Jestliže reálná řada konverguje neabsolutně, pak každé reálné číslo je součtem některého převránění této řady. Totež platí pro $\pm\infty$. Řadu lze převrátat i tak, že nová řada bude oscilovat.

b) **Cauchyovým součinem** řad $\sum_{n=0}^\infty a_n, \sum_{n=0}^\infty b_n$ nazýváme řadu $\sum_{n=0}^\infty c_n$, kde $c_0 = a_0b_0, c_1 = a_0b_1 + a_1b_0, \dots, c_n = a_0b_n + a_1b_{n-1} + \dots + a_nb_0 = \sum_{k=0}^n a_kb_{n-k}$ (srovnáje se s výpočtem koeficientů při násobení dvou polynomů).

Platí: Jestliže řady $\sum_{n=0}^\infty a_n, \sum_{n=0}^\infty b_n$ konvergují a alespoň jedna z nich konverguje absolutně, pak konverguje i jejich Cauchyův součin $\sum_{n=0}^\infty c_n$ a platí $(\sum_{n=0}^\infty a_n)(\sum_{n=0}^\infty b_n) = \sum_{n=0}^\infty c_n$. Konvergují-li absolutně obe řady, pak konverguje

absolutně i jejich Cauchyův součin.

12.4 Příkladý

Příklad 12.16: Zjistěte, pro jaká $x \in \mathbb{R}$ konverguje řada $\sum_{n=1}^\infty \left(x + \frac{2}{5}\right)^n$ a pro tato x řadu sečtěte.

Řešení: Jde o geometrickou řadu s kvocientem $q = \frac{x + 2}{5}$, která podle Příkladu 12.2 konverguje právě tehdy, když $\left|\frac{x + 2}{5}\right| < 1$. Toto nastává, právě když $5 < |x + 2|$, tj. pro $x > -2 + 5 = 3$ a pro $x < -2 - 5 = -7$. Uvedená řada

tak konverguje pro $x \in (-\infty, -7) \cup (3, \infty)$. Ze vzorce pro součet geometrické řady pro tato x dostáváme

$$\sum_{n=1}^\infty \left(\frac{x + 2}{5}\right)^n = \frac{x + 2}{5} \cdot \frac{1}{1 - \frac{x + 2}{5}} = \frac{x + 2}{5} \cdot \frac{5}{x + 2} = \frac{x - 3}{5}.$$

Příklad 12.17: Vyšetřete konvergeni řady $\sum_{n=1}^\infty 3^{2n(n-1)} \frac{(4n+7)^n}{9^n}$.

Řešení: Máme $a_n = \frac{(4n+7)^n}{9^n(n-1)^n} \geq 0$ a

$$\sqrt[n]{a_n} = \frac{(4n+7)}{9(n-1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{4}{9} > 1.$$

Tedy podle limitního odmocninového kritéria řada diverguje. Divergeni můžeme dostat také pomocí prostého odmocninového kritéria, protože pro $n \geq 4$ je $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$.

Příklad 12.18: Vyšetřete konvergeni řady $\sum_{n=1}^\infty \frac{n^2}{(\arcsin 1)^n}$.

Důkaz: a) V tomto případě pro všechna $n \geq n_1$ platí $a_n < q^n$. Protože geometrická řada $\sum_{n=1}^\infty q^n$ s kvocientem $0 < q < 1$ konverguje, konverguje podle srovnávacího kritéria (Věta 12.5) i řada $\sum_{n=1}^\infty a_n$.

b) Jestliže pro nekonečně mnoho n platí $\sqrt[n]{a_n} \geq 1$, pak také pro nekonečně mnoho n platí $a_n \geq 1$, takže nemůže platit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ a podle Věty 12.3 daná řada nekoneverguje. Protože ale podle Věty 12.4 existuje její součet, musí být tento součet nekonečný, takže řada diverguje. □

Věta 12.9 (limitní odmocninové kritérium) :

Nechť $a_n \geq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Potom platí:

- a) Jestliže existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} < 1$, pak $\sum_{n=1}^\infty a_n$ konverguje.
- b) Jestliže existuje $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} > 1$, pak $\sum_{n=1}^\infty a_n$ diverguje.

Důkaz by probíhal stejně jako u limitního podliového kritéria, pouze s odkazem na odmocninové kritérium (Věta 12.8.) místo odkazu na kritérium podliové. □

Poznámky :

- a) V nelimitních kritériích pro konvergeni nestací $\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$ pro všechna n (viz např. harmonická řada: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1} < 1$, ale řada diverguje).
- b) Limitní kritéria nepomohou, je-li $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ nebo $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ (viz např. řady: $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2}$ diverguje, $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$ – konverguje).
- c) U podliového kritéria pro divergeni nestací: „pro nekonečně mnoho n “ (viz příklad 12.10).
- d) Lze-li ukázat, že řada konverguje pomocí podliového kritéria, lze to i pomocí odmocninového. Pro divergeni to ale neplatí (viz např. řadu $\sum_{n=1}^\infty \frac{n-1}{n}$, jejíž divergeni lze ukázat pomocí podliového kritéria, ne však pomocí odmocninového).

Připomenutí – užitečné limity (viz [P11.6]):

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ pro $a > 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

Příklad 12.9: $\sum_{n=1}^\infty \frac{n!}{1}$ konverguje podle kritéria podliového $(\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{1} \leq \frac{2}{1} < 1)$, podliového limitního $(\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{1} \rightarrow 0 < 1)$, odmocninového limitního $(\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \frac{1}{\infty} = 0 < 1)$, srovnávacího (pro $n \geq 2$ je $n! \geq (n-1)n \geq \frac{n}{2}$, tedy $a_n \leq \frac{n}{2}$, a přitom řada $\sum_{n=1}^\infty \frac{n}{2}$ konverguje).

Příklad 12.10: $\sum_{n=1}^\infty a_n$, kde $a_n = \frac{1}{n}$ pro n -sude a $a_n = \frac{1}{5^n}$ pro n -liché, konverguje podle odmocninového kritéria (podliové ale nepomůže, protože $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ nemá lichá n ; nelze použít ani limitní odmocninové kritérium, protože $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n}$ neexistuje; vhodné je ale použít srovnávacího kritéria, protože pro každé n platí $a_n \leq (\frac{2}{3})^n$).

Příklad 12.11: U řad $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^\alpha}$, $\alpha > 0$, podliové ani odmocninové kritérium nepomůže.

Věta 12.10 (integrální kritérium) :

Nechť f je nezáporná a nerostoucí funkce na intervalu (N, ∞) , kde $N \in \mathbb{N}$. Pak řada $\sum_{n=N}^\infty f(n)$ konverguje právě tehdy, když konverguje integrál $\int_N^\infty f(x) dx$.

Důkaz: Důkaz provedeme pro případ $N = 1$. Jinak by se postupovalo analogicky.

Protože je funkce f nerostoucí na intervalu $(1, \infty)$, pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $x \in \langle n, n+1 \rangle$ platí $f(n) \geq f(x) \geq f(n+1)$. Tedy pro každé $n \in \mathbb{N}$ je

$$f(n) = \int_n^{n+1} f(n) dx \geq \int_n^{n+1} f(x) dx \geq \int_n^{n+1} f(n+1) dx = f(n+1)$$

(využili jsme toho, že integrál z konstanty je konstanta krát délka intervalu). Pro každé $M \in \mathbb{N}$ tak platí

$$\sum_{n=1}^M f(n) \geq \sum_{n=1}^M \int_n^{n+1} f(x) dx = \int_1^{M+1} f(x) dx \geq \sum_{n=1}^M f(n+1) = \sum_{n=2}^{M+1} f(n).$$

Limitním přechodem pro $M \rightarrow \infty$ v nerovnosti vlevo dostáváme $\sum_{n=1}^{\infty} f(n) \geq \int_1^{\infty} f(x) dx$. Takže pokud konverguje řada, konverguje i integrál. Provedeme-li limitní přechod pro $M \rightarrow \infty$ v nerovnosti vpravo, získáme pro součet řady odhad

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = f(1) + \sum_{n=2}^{\infty} f(n) \leq f(1) + \int_1^{\infty} f(x) dx.$$

Je-li tedy integrál konečný, je konečný i součet řady. \square

Příklad 12.12: Podle integrálního kritéria řada $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ konverguje právě tehdy, když $\alpha > 1$ (využití ve srovnávacím kritériu).

Příklad 12.13: Vyšetřete konvergenci řady $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$.

Řešení: Máme $\frac{1}{n \ln n} = f(n)$ pro funkci $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$, která je na intervalu $(2, \infty)$ nezáporná a nerostoucí. Můžeme tedy zkusit použít integrální kritérium. Protože

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x \ln x} dx = [\ln |\ln x|]_2^{\infty} = \infty - \ln(\ln 2) = \infty,$$

zkoumaná řada podle integrálního kritéria diverguje.

Poznámka: Pokud ve Větě 12.10 s $N = 1$ řada konverguje a její součet je roven A , pak pro chybu $r_k = A - \sum_{n=1}^k f(n)$ ($= \sum_{n=k+1}^{\infty} f(n)$), které se dopustíme, když místo celé řady sečteme jen jejích prvních k členů, platí

$$\int_{k+1}^{\infty} f(x) dx \leq r_k \leq \int_k^{\infty} f(x) dx.$$

Příklad 12.14: Odhadněte chybu součtu $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$, jestliže sečteme jen prvních 100 členů. (Součet uvedený řady lze získat pomocí Fourierových řad, které budete mít později.)

Řešení: Máme $\frac{1}{n^2} = f(n)$ pro funkci $f(x) = \frac{1}{x^2}$, která je na intervalu $(1, \infty)$ nezáporná a nerostoucí. K odhadu chyby $r_{100} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} - \sum_{n=1}^{100} \frac{1}{n^2}$, tedy můžeme použít předchozí poznámku. Ta nám dává odhady

$$\begin{aligned} r_{100} &\geq \int_{101}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_{101}^{\infty} = \frac{1}{101} = 0,0099 \\ r_{100} &\leq \int_{100}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{x} \right]_{100}^{\infty} = \frac{1}{100} = 0,01. \end{aligned}$$

Pro hledanou chybu r_{100} tak máme odhad $0,0099 \leq r_{100} \leq 0,01$.

12.3 Řady s obecnými členy

Věta 12.11:

Jestliže pro řadu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ platí $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \neq 0$, pak tato řada diverguje.

Důkaz: Jestliže je $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n > 0$, existuje podle věty o zachování znaménka (Věta 11.3) index $n_1 \in \mathbb{N}$ takový, že pro všechna $n \geq n_1$ je $a_n > 0$. Posloupnost $(s_N)_{N=n_1}^{\infty}$, kde $s_N = a_1 + a_2 + \dots + a_N$, je tedy rostoucí a má tak podle Věty 11.5 limitu. Stejnou limitu má i celá posloupnost částečných součtů řady $(s_N)_{N=1}^{\infty}$. Protože tu není splněna nutná podmínka konvergence, musí být tato limita nekonečná. Tedy v tomto případě řada diverguje k $+\infty$. Pokud by byla $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n < 0$, analogicky bychom ukázali, že řada diverguje k $-\infty$. \square

Platí: Řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje právě tehdy, když pro každé $\varepsilon > 0$ existuje n_0 takové, že $|\sum_{n=N+1}^M a_n| = |s_M - s_N| < \varepsilon$, kdykoliv $n_0 \leq N < M$ (tj. řada splňuje tzv. Bolzano-Cauchyovu podmínku (B.C.P.) pro konvergenci řad)

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < +\infty \quad \dots \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **konverguje absolutně**

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = +\infty, \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konverguje $\dots \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ **konverguje neabsolutně (relativně)**

Poznámka: Konverguje-li reálná řada neabsolutně, pak „součet“ jejích kladných členů je $+\infty$, záporných $-\infty$. Tj. označíme-li $a_n^+ = \max\{a_n, 0\}$, $a_n^- = \max\{-a_n, 0\}$ (všimněte si, že $a_n = a_n^+ - a_n^-$, $|a_n| = a_n^+ + a_n^-$), pak $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^+ = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^- = +\infty$.

Příklad 12.14: Řada $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$ konverguje absolutně.

Poznámka: Absolutní konvergenci řad lze zkoumat pomocí kritérií z odstavce 12.2.

Věta 12.12:

Konverguje-li řada absolutně, pak konverguje.

(Obrácené tvrzení neplatí.)

Důkaz: Ukážeme, že když konverguje řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$, pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ splňuje Bolzano-Cauchyovu podmínku pro konvergenci řad, a tedy také konverguje. Mějme dáno $\varepsilon > 0$. Protože řada $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ konverguje, splňuje B.C.P. pro řady, a tedy pro naše dané ε existuje $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že $\left| \sum_{n=N+1}^M |a_n| \right| < \varepsilon$, kdykoliv $n_1 \leq N < M$. Vezmeme nyní libovolnou dvojici indexů M a N , pro které platí $n_1 \leq N < M$. Pak $\left| \sum_{n=N+1}^M a_n \right| \leq \left| \sum_{n=N+1}^M |a_n| \right| < \varepsilon$. Řada $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ splňuje tedy také B.C.P. pro řady – k danému $\varepsilon > 0$ můžeme vzít stejné n_0 jako v případě řady $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$.

Věta 12.13 (Leibnizovo kritérium):

Nechť $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ je nerostoucí posloupnost nezáporných čísel. Pak řada $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + \dots$ (tzv. **alternující řada**) konverguje právě tehdy, když $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

Důkaz: 1) Předpokládejme nejdříve, že řada konverguje. Pak z nutné podmínky konvergence (Věta 12.3) musí platit $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1} b_n = 0$. Z vlastností limit posloupností (Věta 11.9a) odtud dostáváme $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} |(-1)^{n+1} b_n| = 0$.

2) Nechť nyní platí $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Položme $a_n = (-1)^{n+1} b_n$. Protože $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ je nerostoucí posloupnost nezáporných čísel, je pro každé $k \in \mathbb{N}$

$$a_{2k} + a_{2k+1} = (-1)^{2k+1} b_{2k} + (-1)^{2k+2} b_{2k+1} = -b_{2k} + b_{2k+1} \leq 0.$$

Tedy pro liché částečné součty řady platí

$$s_1 = b_1 \geq s_1 + (-b_2 + b_3) = s_3 \geq s_3 + (-b_4 + b_5) = s_5 \geq s_5 + (-b_6 + b_7) = s_7 \geq \dots$$