

KAPITOLA 1: Reálná čísla

1.1. Číselné množiny

Přirozená čísla ... $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

nula ... $0, \quad \mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$

Celá čísla ... $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, 3, \dots\}$

Racionální čísla ... $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$

Věta 1.1 :

Číslo $\sqrt{2}$ není racionální.

Platí : Desetinný rozvoj každého racionálního čísla je **periodický**.

Reálná čísla ... \mathbb{R} – lze je vyjádřit desetinným rozvojem
(konečným nebo nekonečným)
periodu 9 neuvažujeme

Iracionální čísla ... $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$

Věta 1.3 :

Jsou-li a, b reálná čísla, $a < b$, pak v intervalu (a, b) leží alespoň jedno racionální číslo a alespoň jedno číslo iracionální.

Speciálně mezi každými dvěma racionálními čísly leží alespoň jedno číslo iracionální a mezi každými dvěma iracionálními čísly leží alespoň jedno číslo racionální.

Důsledek 1.4 :

Jsou-li a, b reálná čísla, $a < b$, pak v intervalu (a, b) leží nekonečně mnoho racionálních čísel a také nekonečně mnoho čísel iracionálních.

1.2. Reálná čísla

absolutní hodnota čísla $a \in \mathbb{R}$

- $|a| = a$ pro $a \geq 0$
- $|a| = -a$ pro $a \leq 0$

Platí pro všechna $a, b, c \in \mathbb{R}$:

$$\text{a) } |a| = |-a|, \quad |a \cdot b| = |a| \cdot |b|, \quad \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad \text{pro } b \neq 0$$

$$\text{!!! b) } |a + b| \leq |a| + |b| \quad \dots \quad \text{trojúhelníková nerovnost}$$

$$\text{c) } |c - a| \geq |c| - |a| \quad (\text{v b) stačí vzít } b = c - a)$$

Platí pro $c, x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$:

$$\bullet \quad |x - c| < \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad c - \varepsilon < x < c + \varepsilon$$


$$\text{tj.} \quad x \in (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$$

$$\bullet \quad |x - c| \leq \varepsilon \quad \Leftrightarrow \quad c - \varepsilon \leq x \leq c + \varepsilon$$

$$\text{tj.} \quad x \in \langle c - \varepsilon, c + \varepsilon \rangle$$

c – střed intervalu

ε – poloměr intervalu



$$c = \frac{a + b}{2}$$

$$\varepsilon = \frac{b - a}{2}$$

Definice :

Okolím bodu $c \in \mathbb{R}$ **o poloměru** $\varepsilon > 0$ nazýváme množinu

$$U_\varepsilon(c) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - c| < \varepsilon\}$$
$$[= (c - \varepsilon, c + \varepsilon)].$$

Prstencovým okolím bodu $c \in \mathbb{R}$ **o poloměru** $\varepsilon > 0$ nazýváme množinu

$$P_\varepsilon(c) = U_\varepsilon(c) \setminus \{c\}$$
$$[= (c - \varepsilon, c) \cup (c, c + \varepsilon)].$$

Definice :

Pravým (levým) okolím bodu $c \in \mathbb{R}$ o poloměru $\varepsilon > 0$ nazýváme množinu

$$U_{\varepsilon}^{+}(c) = \langle c, c + \varepsilon \rangle$$

$$(U_{\varepsilon}^{-}(c) = (c - \varepsilon, c))$$

Pravým (levým) prstencovým okolím bodu $c \in \mathbb{R}$ o poloměru $\varepsilon > 0$ nazýváme množinu

$$P_{\varepsilon}^{+}(c) = (c, c + \varepsilon)$$

$$(P_{\varepsilon}^{-}(c) = (c - \varepsilon, c))$$

1.3. Supremum a infimum

Definice :

Řekneme, že $b \in M$ je **největším prvkem** (**maximem**) množiny $M \subset \mathbb{R}$, jestliže v M neexistuje prvek větší než b . Píšeme

$$b = \max M.$$

Řekneme, že $a \in M$ je **nejmenším prvkem** (**minimem**) množiny $M \subset \mathbb{R}$, jestliže v M neexistuje prvek menší než a . Píšeme

$$a = \min M.$$

Příklad 1.2:

a) $\min \{3, 57, 25, -2, 8\} = -2,$

$$\max \{3, 57, 25, -2, 8\} = 57;$$

b) $\min \mathbb{N} = 1,$

$\max \mathbb{N}$ neexistuje;

c) $\min \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\} = 0 \quad (= 1 - \frac{1}{1}),$

$\max \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ neexistuje;

d) $\min \{x \mid 3 < x \leq 6\}$ neexistuje,

$$\max \{x \mid 3 < x \leq 6\} = 6.$$

Příklad 1.3:

Celá část čísla $x \in \mathbb{R}$: $[x] = \max \{k \in \mathbb{Z} \mid k \leq x\} \quad (\in \mathbb{Z})$

Příklad 1.4:

- a) $\{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x\}$... množina je omezená jen zdola
- b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3\}$... množina je omezená jen shora
- c) $\langle -5, 1 \rangle$... množina je omezená shora i zdola, tj. je omezená
- d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > 10\}$... množina není omezená ani shora ani zdola
(jde o množinu $(-\infty, -\sqrt{10}) \cup (\sqrt{10}, \infty)$).

Definice :

Řekneme, že množina $M \subset \mathbb{R}$ je **shora omezená**, jestliže existuje číslo $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x \in M$ platí

$$x \leq K.$$

Číslo K nazýváme **horní mezí** množiny M .

Řekneme, že množina $M \subset \mathbb{R}$ je **zdola omezená**, jestliže existuje číslo $L \in \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x \in M$ platí

$$L \leq x.$$

Číslo L nazýváme **dolní mezí** množiny M .

Definice :

Řekneme, že množina $M \subset \mathbb{R}$ je **omezená**, jestliže je omezená shora i zdola.

Množina $M \subset \mathbb{R}$ je **omezená**, právě když existuje $S \in \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x \in M$ platí

$$|x| \leq S .$$

Definice :

Řekneme, že číslo $b \in \mathbb{R}$ je **supremem** neprázdné množiny $M \subset \mathbb{R}$, jestliže je nejmenší horní mezí množiny M . Píšeme

$$b = \sup M.$$

Poznámka:

Pro **supremum** b množiny M platí :

- Každý prvek množiny M je menší nebo roven b (protože b je horní mez).
- Vezmeme-li jakékoliv číslo c menší než b , pak už to není horní mez (b je nejmenší horní mez). Tedy v M najdeme prvek, který je větší než c .

Příklad: Ukažte, že pro $M = \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$ je $\sup M = 1$.

Řešení: • Pro každé $n \in \mathbb{N}$ zřejmě platí $1 - \frac{1}{n} \leq 1$, tedy číslo 1 je horní mezí dané množiny.

• Chceme ukázat, že číslo 1 je nejmenší horní mez. Mějme tedy dáno číslo $K < 1$ (libovolné). Ukažme, že to není horní mez.

Hledáme $n \in \mathbb{N}$ takové, že $1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n} > K$.

Postupně dostáváme, že hledané n má splňovat

$$\begin{aligned}\frac{n-1}{n} &> K \\ n-1 &> nK \\ n(1-K) &> 1 \\ n &> \frac{1}{1-K}\end{aligned}$$

Tato nerovnost je splněna např. pro $n = \lceil \frac{1}{1-K} \rceil + 1$. Prvek množiny M , který odpovídá tomuto n , je větší než K . Tedy číslo K není horní mezí množiny M .

Definice :

Řekneme, že číslo $a \in \mathbb{R}$ je **infimem** neprázdne množiny $M \subset \mathbb{R}$, jestliže je největší dolní mezí množiny M . Píšeme

$$a = \inf M.$$

Poznámka:

Pro **infimum** a množiny M platí:

- Každý prvek množiny M je větší nebo roven a (protože a je dolní mez).
- Vezmeme-li jakékoliv číslo c větší než a , pak už to není dolní mez (a je největší dolní mez). Tedy v M najdeme prvek, který je menší než c .

Platí: Má-li množina M největší (nejmenší) prvek, pak je tento prvek i supremem (infimem) množiny M .

Příklad 1.5: (srovnejte s Příkladem 1.2.)

a) $M = \{3, 57, 25, -2, 8\} \dots$

$$\dots \inf M = \min M = -2, \sup M = \max M = 57;$$

b) $M = \mathbb{N} \dots \inf M = \min M = 1, \sup M = ??;$

c) $M = \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\} \dots \inf M = \min M = 0, \sup M = 1;$

d) $M = \{x \mid 3 < x \leq 6\} \dots \inf M = 3, \sup M = \max M = 6.$

Věta 1.2 (o supremu a infimu) :

Nechť $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná množina.

Je-li M shora omezená, pak existuje $\sup M \in \mathbb{R}$.

Je-li M zdola omezená, pak existuje $\inf M \in \mathbb{R}$.

1.4. Rozšíření množiny reálných čísel

nevlastní čísla (hodnoty) ... $(+)\infty, -\infty$

$\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{+\infty, -\infty\}$... **rozšířená reálná osa**

Uspořádání na $\overline{\mathbb{R}}$ – stejné jako na \mathbb{R} , jen navíc přidáváme

- $-\infty < +\infty$,
- $-\infty < a, \quad a < +\infty$ pro každé $a \in \mathbb{R}$

Okolí bodů $+\infty, -\infty$ ($K, L \in \mathbb{R}$)

- $U_K(+\infty) = U_K^-(+\infty) = P_K(+\infty) = P_K^- (+\infty) = (K, +\infty)$
- $U_L(-\infty) = U_L^+(-\infty) = P_L(-\infty) = P_L^+(-\infty) = (-\infty, L)$

Všechny intervaly i okolí, které uvažujeme, obsahují pouze reálná (tj. konečná) čísla.

Aritmetické operace s nevlastními hodnotami ($a \in \mathbb{R}$)

Definujeme:

- $a + \infty = a - (-\infty) = \infty$
 $a - \infty = a + (-\infty) = -\infty$
- $\infty + \infty = \infty \quad (= \infty - (-\infty))$
 $-\infty - \infty = -\infty \quad (= -\infty + (-\infty))$

- $a \cdot \infty = \begin{cases} \infty & \text{pro } a > 0 \\ -\infty & \text{pro } a < 0 \end{cases}$

$$a \cdot (-\infty) = \begin{cases} -\infty & \text{pro } a > 0 \\ \infty & \text{pro } a < 0 \end{cases}$$

- $\infty \cdot \infty = (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$

$$\infty \cdot (-\infty) = -\infty$$

- $\frac{\pm\infty}{a} = (\pm\infty) \cdot a^{-1} \quad \text{pro } a \neq 0, \quad \frac{a}{\pm\infty} = 0$

Ne definujeme:

- $\infty - \infty$, $\infty + (-\infty)$
- $(\pm\infty) \cdot 0$
- $\frac{\pm\infty}{\pm\infty}$, $\frac{\pm\infty}{0}$, $\frac{a}{0}$

Definice :

Nechť $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná množina. Je-li M shora neomezená, pak pokládáme

$$\sup M = +\infty,$$

je-li M zdola neomezená, pokládáme

$$\inf M = -\infty.$$

Příklad 1.5:

a) $M = \{3, 57, 25, -2, 8\} \quad \dots$

$$\dots \quad \inf M = \min M = -2, \quad \sup M = \max M = 57;$$

b) $M = \mathbb{N} \quad \dots \quad \inf M = \min M = 1, \quad \sup M = +\infty;$

c) $M = \{1 - \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\} \quad \dots \quad \inf M = \min M = 0, \quad \sup M = 1;$

d) $M = \{x \mid 3 < x \leq 6\} \quad \dots \quad \inf M = 3, \quad \sup M = \max M = 6.$