

IRYSY

Analiza danych wybranych gatunków

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest porównanie wybranych cech trzech gatunków irysów na podstawie dostępnego zbioru danych /150 próbek po 50 dla każdego gatunku/. Analiza pozwala sprawdzić, czym badane gatunki różnią się między sobą i które cechy najlepiej pokazują te różnice.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA DANYCH

Zbiór danych obejmuje obserwacje trzech gatunków irysów. Dla każdej rośliny uwzględniono podstawowe cechy budowy kwiatu, takie jak długość i szerokość kielicha oraz długość i szerokość płatków. Dane zostały przygotowane w sposób umożliwiający ich bezpośrednie porównanie.


PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY

Dane zostały sprawdzone pod kątem kompletności i spójności. Nie stwierdzono brakujących wartości, a zbiór był gotowy do dalszej analizy.

ŚREDNIE CECHY BADANYCH GATUNKÓW IRYSÓW

```
<Axes: title={'center': 'Średnie wartości dł. i szer. kielicha oraz płatków kwiatu badanych gatunków'}, xlabel='gatunek'>
```

Średnie wartości dł. i szer. kielicha oraz płatków kwiatu badanych gatunków



Wykres pokazuje, że badane gatunki Irysa różnią się między sobą wymiarami kielicha i płatków. Najwyraźniejsze różnice dotyczą długości i szerokości płatków, dzięki czemu łatwiej odróżnić poszczególne gatunki.

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY BADANYMI CECHAMI

W części badania, dotyczącego zależności między cechami kielicha i płatków widać zauważalne relacje między długością kielicha a długością płatka. Jednocześnie dostrzeżono również pojedyncze odstępstwo od ogólnego schematu, widoczne na przykładzie gatunku *Iris-setosa*.

INTERPRETACJA OBSERWOWANEGO ODSTĘPSTWA

Zaobserwowane odstępstwo można interpretować ostrożnie na dwa sposoby. Może ono wynikać z naturalnej zmienności w obrębie badanego gatunku albo z niewielkiej niejednorodności danych. Nie zmienia to jednak podstawowego obrazu analizy, według którego trzy badane gatunki irysów pozostają wyraźnie zróżnicowane.

WNIOSKI

Klimat, gleba ale również odpowiednia ilość światła wpływają na cechy gatunków. Ich analiza ma duże znaczenie dla przedstawicieli nauki i hodowców całego świata.

Analiza danych potwierdza, że trzy badane gatunki irysów różnią się między sobą pod względem podstawowych cech budowy kwiatu. Najbardziej widoczne różnice dotyczą wymiarów płatków, które okazały się szczególnie użyteczne w odróżnianiu poszczególnych gatunków. Zauważone odstępstwo nie podważa całości wyników, lecz stanowi dodatkową obserwację, która może być punktem wyjścia do dalszej analizy.