

# 1 loeng I

## 1.1 Meenutusi Algebra I-st

$A \neq \emptyset$   $A^n = AxAx...A = \{(a_1, \dots, a_n) | a_i \in A\}$

n - tuple  $|A^0| = 1$  ( $A^0 = \{\emptyset\}$ )  $\omega : A^n \rightarrow A$  n-kohaline algebraline tehe hulgal A

n-aarne:

1. n=1 unaarne tehe
2. n=2 binaarne tehe
3. n=0 nullarne tehe

## 1.2 $\Omega$ -algebra

Def. 1.1.1 Hulka  $\Omega$  nimetatakse tüübiks ehk signatuuriks kui ta on esitatud mittelikkuvate alamhulkade  $\Omega_1 yhend \Omega_2 \dots$

Def 1.1.2 Olgu  $\Omega$  tp. Mittetühja hulka A nimetatakse  $\Omega$ -algebraks, kui iga a korral igale  $\omega \in \Omega_n$  vastab n-aarne tehe hulgal A, mida thistatakse sama sümboliga  $\omega$ .

Kui tahetakse rihutada, mis tüüpi algebraga on tegemist, siis thistatakse  $\Omega$  algebrad paarina  $(A; \Omega)$

Nited:

1. Rühmoid - hulk  $\Omega$  binaarse tehtega, st.  $\Omega = \Omega_2 = \{*\}$
2. Poolrühm - sama signatuur mis rühmoidil
3. Monoid - ühikelemendiga poolrühm, vaatame seda tihti laiemal signatuuriga,  $\Omega = \Omega_0 yhend \Omega_2, \Omega_0 = \{1\}$  - ühikelemendi fikseerimine,  $\Omega_2 = \{*\}$
4. Rühm - saab kirjeldada eelnevate signatuuride kaudu, aga parem kirjeldada jrgnevalt:  $\Omega = \Omega_0 yhend \Omega_1 yhend \Omega_2$ , kus  $\Omega_1 = \{-1\}$
5. Ring - algebraline struktuur signatuuriga (signatuuris):  $\Omega = \Omega_0 yhend \Omega_1 yhend \Omega_2$ , kus  $\Omega_2 = \{+, *\}$ ,  $\Omega_1 = \{-(vastandelement, pole vajalikkuiskalaarigakorrutamisesisestoodud)\}$ ,  $\Omega_0 = \{0, 1\}$
6. Vektorruum - struktuur signatuuriga:  $\Omega = \Omega_0 yhend \Omega_1 yhend \Omega_2$ , kus  $\Omega_2 = \{+, *\}$ ,  $\Omega_1 = \{-(vastandelement, pole vajalikkuiskalaarigakorrutamisesisestoodud)\}$ ,  $\Omega_0 = \{0\}$  - samuti avaldatavskalaarigakorrutamiseks kaudu

### 1.3 Morfismid

Def 1.2.1 Kujutust  $\phi$   $\Omega$ -algebrast  $A$   $\Omega$ -algebrasse  $B$  nimetatakse homomorfismideks, kui iga  $n, \omega \in \Omega_n$  ja suvaliste  $a_1, \dots, a_n \in A$  korral kehtib vrdus  $\phi(\omega(a_1, \dots, a_n)) = \omega(\phi(a_1), \dots, \phi(a_n))$

$$\text{Hom}(A, B) = \{\phi | \phi \text{ on homomorfism } A \rightarrow B\}$$

Nide:

Olgu  $A, B$  sellised  $\Omega = \{1\}, \{-1\}, \{*\}$   $\phi : A \rightarrow B$  homomorfismid  $\phi(1) = 1, \phi(1) = \phi(1 * 1) = \phi(1) * \phi(1) \implies \phi(1) = 1$  (kolmandajal)  $\phi(x^{-1}) = \phi(x)^{-1}, 1 = \phi(1) = \phi(x^{-1}x) = \phi(x^{-1})\phi(x)$  (kolmandajal)  $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$

Taandub kolmanda omanduse kontrollimisele.

Lineaarkujutis on vektorruumide isomorfism.

Olgu meil  $\Omega$ -algebrad  $A, B, C$  ning nende homomorfismid  $\phi : A \rightarrow B, \psi : B \rightarrow C, (\psi\phi) = \psi(\phi(x)), x \in A$ . Siis see kompositsioon on samuti homomorfism (kui teda saab nii defineerida).

Testame: Veendume, et  $(\psi\phi)(\omega(a_1, \dots, a_n)) = \omega((\psi\phi)(a_1, \dots, a_n))$ . See on samavärne sellega, te  $\psi(\phi(\omega(a_1, \dots, a_n))) = \psi(\omega(\phi(a_1), \dots, \phi(a_n)))$ ...

Endomorfism ( $\text{End}(A) = \text{Hom}(A, A)$ ).

Lause 1.2.2 ( $\text{End}(A); *$ ) on monoid.

Testus: Assotatiivsus on selge, tuleneb homomorfismide omadustest. Ühikelement  $? id_A : A \rightarrow A, id_A(x) = x, x \in A$

Def 1.2.3 Bijektiivne homomorfismi nimetatakse isomorfismiks.

Lause 1.2.3 Isomorfism on ekvivalentsiseos kigi  $\Omega$ -algebrade klassis, ehk ta on refleksiivne, sümmeetriline ja transitiivne.

Testus:

1. Refleksiivsus, st.  $A \text{ isom } A, id_A : A \rightarrow A$
2. Sümmeetria. Olgu  $\phi : A \rightarrow B$  isomorfism. Vaja  $\psi : B \rightarrow A$  mis oleks isomorfism. Valime selleks  $\phi^{-1}$  Vaja niidat, et iga  $b_1, \dots, b_n \in B$  korral  $\phi^{-1}(\omega(b_1, \dots, b_n)) = \omega(\phi^{-1}(b_1), \dots, \phi^{-1}(b_n))$  Rakendame mlemale poole  $\phi$ .  $\phi(\omega(\phi^{-1}(b_1), \dots, \phi^{-1}(b_n))) = \omega(\phi(\phi^{-1}(b_1), \dots, \phi^{-1}(b_n)))$ ....
3. Transitiivsus - ise!

Isomorfismi thtsus. Kui meid huvitab tehe ja tema omadused, siis need jvad samaks isomorfismi klassi tpsusega.

$\text{Aut}(A)$

Lause 1.2.4  $\text{Aut}(A)$  on rhm.

Testus:  $\phi, \psi \in \text{Aut } A$ ,

$\psi\phi \in \text{End}(A),$   
 $\phi\psi \in \text{Aut} A$   
 $\text{id}_a \in \text{Aut} A$   
 $\phi \in \text{Aut} A \implies \phi^{-1} \in \text{Aut} A$   
 Nited:  
 $C$  kompleksarue korpus  $\phi : C \rightarrow C, \phi(\alpha) = \bar{\alpha}$   
 $G$  suvaline rühm  
 $g \in G$   
 $\phi : G \rightarrow \dots$   
 $\phi(x) = g^{-1}xg$

## 1.4 Alamalgebra

def 1.3.1. Mte :  $B \subset A, b_1, \dots, b_n : \omega^B(b_1, \dots, b_n) = \omega^A(b_1, \dots, b_n) (\in B)$ . Algebra alamhulk, mis on kinnine tehete suhtes on alamalgebra.

Nide:  $(A; *)$  poolrühm.  $B \subset A, x, y \in B \implies xy \in B$ , kui  $B = \emptyset$ , siis ei ole alamalgebra aga rahuldab definitsiooni. Tiendame: Algebra **mittetihi** alamhulk, mis on kinnine tehete suhtes on alamalgebra.

$B \leq A \iff B \text{ on } A \text{ alamalgebra}$

$B \leq A, \tau : B \rightarrow A$

$\tau(x) = x, x \in B$

$\tau \in \text{Hom}(B, A), \tau$  üksühene.

1.3.1 testus:

$\phi \in \text{Hom}(B, A)$   $\phi$  üksühene.  $\phi(B) \subset A \ B \rightarrow \phi(B) = \{\phi(x) | x \in B\}$

$\phi \in \text{Hom}(A, B) \ C \leq A, D \leq B$

$\phi(C) \leq B, \phi^{-1}(B) \leq A$

Esimese ise. Teine:

$\phi^{-1}(B) \leq A$

$a_1, \dots, a_n \in \phi^{-1}(D), \omega \in \Omega_N$

$\omega(a_1, \dots, a_t \dots)$

## 2 loeng II

**Lause 1.3.3** Olgu antud  $\omega$ -algebra  $A$  alamalgebrate süsteem  $B_i, i \in I$ , kuju suures  $B = \bigcup_{i \in I} B_i \neq \emptyset$  Siis  $B \leq A$ .

**Testus ...**

Vaatleme alamhulka  $X: \emptyset \neq X \subset A$  Vaatleme hulka  $\{B | X \leq B \leq A\} \neq \emptyset$ . Vastavalt lausele 1.3.3 on tegemist alamalgebraga. Sellist alamalgebrad thistatakse  $\langle X \rangle$  Kui  $\langle X \rangle = A$  ehk  $X$  on  $A$  moodustajate süsteem.

## 2.1 Faktoralgebra

Eesmärgiks on tükeldada  $\omega$ -algebra mittelikuvateks osadeks, nii et nende osade hulgal saaks loomulikult viisil defineerida  $\omega$ -algebra struktuuri.

$\rho \in \text{Eqv}(A), \rho \subset A \times A$ , vastab kolmele tingimusele:

1. refleksiivne
2. transitiivne
3. sümmeetriline

$a \in A, \{x \in A | a\rho x\} = a\rho, a \in a\rho$  Faktorhulgaks  $A\rho = \{a\rho | a \in A\}$

$$a_1\rho = a_2\rho \iff a_1\rho a_2$$

Vtame  $\omega \in \Omega_n, a_1/\rho, \dots, a_n/\rho \in A/\rho$ .

$$\omega(a_1/\rho, \dots, a_n/\rho) = \omega(a_1, \dots, a_n)/\rho$$

Lisame  $\omega$ -le lisatingimise:  $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n) \in \rho \iff (\omega(x_1, \dots, x_n), \omega(y_1, \dots, y_n)) \in \rho$

Olgu  $\rho \in \text{Eqv}(A)$ . Eksisteerib kujutis  $\pi: A \rightarrow A/\rho, \pi(a) = a/\rho$  - loomulik kujutus faktorhulgale, projektsioon.

Vtame  $\omega \in \Omega_n, a_1, \dots, a_n \in A$

$$\pi(\omega(a_1, \dots, a_n)) = \omega(a_1/\rho, \dots, a_n/\rho) = \dots$$

## 2.2 Def - tuum

### 2.3 Lause 1.4.3

**Testus**

Olgu  $\phi: A \rightarrow B$  homomorfism.  $\rho$  -  $\phi$  tuum. Valime  $\omega \in \Omega_n, a_1, \dots, a_n, a'_1, \dots, a'_n$ . Kas  $\omega(a_1, \dots, a_n)\rho\omega(a'_1, \dots, a'_n)$  kehtib? ...

## Homomorfismiteoreem

**Testus** Olgu  $\psi : A/\rho \rightarrow B, \psi(a/\rho) := \phi(a)$ . Kas on üheselt määratud? Ehk kas  $a_1/\rho = a_2/\rho \iff \phi(a_1) = \phi(a_2)$ . Siit saaksime kätte ka injektiivsuse. Piisab arvesse võtta, et eelnev tähendab, et  $a_1 \rho a_2$ , ning kuna  $\rho$  on  $\phi$  tuum, siis on tulemus selge. Surjektiivsuses tuleb sellest, et  $\phi$  surjektiivne. Kas  $\psi$  on homomorfism? Olgu  $\omega \in \Omega_n, a_1, \dots, a_n \in A$ . Siis  $\psi(\omega(a_1/\rho, \dots, a_n/\rho)) = \psi(\omega(a_1, \dots, a_n)/\rho) = \phi(\omega(a_1, \dots, a_n)) = \omega(\phi(a_1), \dots, \phi(a_n)) = \omega(\psi(a_1/\rho), \dots, \psi(a_n/\rho))$ .

**Lause 1.4.4** Olgu  $\rho$   $\Omega$ -algebra  $A$  kongruents,  $D \leq A/\rho$  ning  $\pi$  kongruents  $\rho$  tuum. Siis  $\text{Disomeetiline } C/\rho|_C, \text{ kus } C = \pi^{-1}(D)$ .

**Testus** Olgu  $\pi^{-1}(D) = C \leq A$ . Olgu  $\alpha$   $\pi$  ahend  $C$ -le ( $\alpha = \pi|_C$ ). Siis  $\alpha : C \rightarrow D$ ,  $\alpha$  on homomorfism. Vidame, et  $\alpha$  on surjektiivne. Kuna  $\pi$  oli surjektiivne, siis  $\forall x \in A \pi(x) = y$ . Seega  $\alpha(x) = y$ .

Küsimus: kui kaks korda faktoriseerime, mis siis juhtub, kas me saame midagi uut? Vimalik asendada isomorfismi tpsuseni kaks korda faktoriseerimisega.

Olgu antud  $\rho$  ja  $\sigma$   $\Omega$ -algebra  $A$  kongruentsid, kusjuures  $\rho \leq \sigma, (x, y) \in \rho \implies (x, y) \in \sigma$ . Defineerime faktoralgebral  $A/\rho$  binaarse seos:

$$\sigma/\rho = \{(x/\rho, y/\rho) | (x, y) \in \sigma\}$$

Vime veenduda, et nii defineeritud seos  $\sigma/\rho$  on faktoralgebra  $A/\rho$  kongruents.

**Teoreem 1.4.2** Olgu  $\rho \in \text{Con}(A), \tau \in \text{Con}(A/\rho)$ .  $\pi : A \rightarrow A/\rho$ . Olgu  $x, y \in A$ . Defineerime  $\sigma : (x, y) \in \sigma \iff \pi(x)\tau\pi(y)$

Vide:  $\sigma \in \text{Con}(A)$ . Veendume, et  $\sigma \in \text{Eqv}(A)$ . Olgu  $x, y, z \in A, (x, y), (y, z) \in \sigma$ , st.  $(\pi(x), \pi(y)), (\pi(y), \pi(z)), (\pi(x), \pi(z)) \in \tau$ .

## 3 loeng III

### 3.1 Lagrange'i teoreem

Lpiku rühma järk (elementide arv) jagub tema iga alamrühma järkuga.

### 3.2 $\Omega$ -algebrate otsekorrutis

Viis kuidas saada mitmest algebrast uus algebra.

Vime defineerida funktsioonid, mis kirjeldavad jadasid.  $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$ , mis rahuldab tingimust  $\phi(i) \in A_i$ , iga  $i \in \mathbb{N}$  korral.

Projektsioonid - seavad jadale vastavuse mingi kindla elemendi. Thistame  $\pi_i$ .

### 1.6.1

**Testus**  $\omega \in \Omega_n, a^1 = (a_i^1)_{i \in I}, \dots, a^n = (a_i^n)_{i \in I} \dots$

## 3.3 Vred

**(Osaliselt) Jrjestatud hulk** Binaarne seas, mis on reflektiivne, transitiivne ja antisimeetriline. Lineaarselt jrjestatud hulk on selline, kus iga element on mingis seoses iga teisega.

### Teoreem 2.2.1

**Testus** 4) Neeldevus (absorbition)

Tarvilikkus:

$$x \leq y \iff x = xaluminerajay$$

## 4 Loeng 4

$$[a, b] = \{x \in L | a \leq x \leq b\}$$

$$Con(A/\rho) \longleftrightarrow \{\sigma \in Con(A) | \rho \leq \sigma\}$$

**Teoreem 2.2.2** Distributiivsed vred.

**Lause 2.3.1** Ahelad on distributiivsed vred.

**Lause 2.3.2** Ththis distributiivne vre  $(P(A); \text{intersection}; \text{union})$