

Geometría IMA-113
Listado de ejercicios

1. Grafique el lugar geométrico definido por cada una de las siguientes ecuaciones: (indique vértices, focos, centros asíntotas según corresponda)

a) $y^2 + 4y - 6x + 22 = 0$

h) $25x^2 + 16y^2 + 100x - 96y - 156 = 0$

b) $(y - 1)^2 = 2x + 4$

i) $x^2 + y^2 + 4x - 3y + 9 = 0$

c) $3x^2 - 5y^2 + 6x + 10y = 32$

j) $y^2 - 4y - 8x + 28 = 0$

d) $x^2 - 4x - 4y = 0$

k) $9x^2 - 4y^2 - 54x + 8y + 113 = 0$

e) $x^2 + y^2 - 12x - 12y + 36 = 0$

l) $4x^2 - 3y^2 + 8x + 16 = 0$

f) $x^2 - 4x + y^2 - 16y + 4 = 0$

m) $4x^2 + 9y^2 - 8x = 32$

g) $x^2 + 3y^2 + 6x + 6 = 0$

2. Califique como Verdadera o falsa cada una de las proposiciones. Justifique formalmente su respuesta.

a. La ecuación $x^2 + y^2 + ax + by = c$ representa una circunferencia para todos los números reales diferentes de cero a,b,c.

b. La distancia entre los focos de la gráfica de $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ es $2\sqrt{a^2 - b^2}$

c. La ecuación $x^2 + y^2 - 2kx + 4 = 0$ describe una circunferencia si y sólo si $k \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

d. El vértice de una parábola es el foco de la otra parábola y viceversa, si la ecuación de una de ellas es $y^2 - 2y - 4x + 1 = 0$, entonces la ecuación de la otra parábola es $y^2 + 2y + 2x - 4 = 0$

e. La cónica de ecuación $y = x^2 + 2x - 1$, tiene su foco en $(1, 0)$.

f. Sea la parábola P , cuya ecuación es $P : 2y^2 - 3y + 5x + 2 = 0$, su foco tiene por coordenadas $F_a \left(-\frac{107}{40}, \frac{3}{4}\right)$

3. Determine la ecuación de la circunferencia que tiene como centro el vértice de la parábola que tiene por ecuación $x + 3y^2 - y = 0$, y contiene al foco de la misma.

Resp. $\left(x - \frac{1}{12}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{6}\right)^2 = \frac{1}{144}$.

4. Una circunferencia tiene por ecuación $x^2 + (y - 2)^2 = 1$. La recta de ecuación $y = kx$ donde $k \in \mathbb{R}$, es tangente a la circunferencia. Halle todos los valores posibles de k .

Resp. $k = \pm\sqrt{3}$

5. Determine la ecuación del conjunto de puntos $P(x, y)$ tales que la suma de la distancia de P a los puntos $(-4, 0)$ y $(4, 0)$ es 14.

Resp. $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{33} = 1$

6. Determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ tales que la distancia al punto $(1, -3)$ es dos veces la distancia a la recta definida por la ecuación $x - 4 = 0$.

Resp. $\frac{(x-5)^2}{4} - \frac{(y+3)^2}{12} = 1$

7. Un avión sigue una trayectoria tal que su distancia a una estación de radar situada en el punto $(2, 0)$ es igual a un tercio de su distancia a una carretera que sigue el trayecto de la recta definida por $x = -2$. Determine la ecuación de la trayectoria que sigue el avión.

Resp. $\frac{\left(x - \frac{5}{2}\right)^2}{\frac{9}{4}} + \frac{y^2}{2} = 1$

8. Determine la ecuación del lugar geométrico compuesto de puntos $P(x, y)$ que cumplen con la condición de que su distancia al eje y es el doble que su distancia al punto $(2, -3)$.

Resp. $3x^2 + 4y^2 - 16x + 24y + 52 = 0$

9. Un punto se mueve de tal manera que su distancia al punto $(2, -2)$ es siempre igual a un tercio de su distancia al punto $(4, 1)$. Determine la ecuación del lugar geométrico,

Resp. $8x^2 + 8y^2 - 28x + 38y + 55 = 0$

10. Determine la ecuación general del lugar geométrico definido por el conjunto de puntos (x, y) ubicados en el plano tales que la distancia al punto $(-1, -2)$ es el doble de la distancia a la recta definida por la ecuación $x - 3 = 0$.

Resp. $3x^2 - y^2 - 26x - 4y + 31 = 0$

11. Determine la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que la distancia a la recta $x + 3 = 0$ es siempre dos unidades mayor que su distancia al punto $(1, 1)$.

Resp. $y^2 - 2y - 4x + 1 = 0$

12. Sea $P : \begin{cases} x^2 + 4y^2 - 25 = 0 \\ 2x^2 - 2y^2 - 5 = 0 \end{cases}$. Encuentre el conjunto solución S .

Resp. $S = \{(\sqrt{7}, \frac{3}{2}\sqrt{2}), (\sqrt{7}, -\frac{3}{2}\sqrt{2}), (-\sqrt{7}, \frac{3}{2}\sqrt{2}), (-\sqrt{7}, -\frac{3}{2}\sqrt{2})\}$

13. Hallar los valores de b para los cuales el sistema: $\begin{cases} x^2 + y^2 = 4 \\ y = x + b \end{cases}$ tiene solución única.

Resp. $b = \pm 2\sqrt{2}$

14. Sea el sistema $\begin{cases} y^2 - 8y - a_1x + 3a_1 + 16 = 0 \\ y^2 - 8y - a_2x - 2a_2 + 16 = 0 \end{cases}$, $a_1, a_2 \in \mathbb{R}^+$. Encuentre los valores de a_1, a_2 para que el sistema tenga solución en \mathbb{R}^2 .

Resp. $a_1 > a_2 > 0$

15. Encontrar el conjunto solución de los siguientes sistemas

1. $\begin{cases} y = x^2 \\ y = 2x + 3 \end{cases}$

3. $\begin{cases} yx^2 = 20 \\ y = 9 - x^2 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 25 \\ x^2 - 6y = 9 \end{cases}$

4. $\begin{cases} x^2 + y^2 = 12 \\ x^2 - y^2 = 4 \end{cases}$

Resp. 1. $S_1 = \{(3, 9), (-1, 1)\}$

2. $S_2 = \{(\sqrt{21}, 2), (-\sqrt{21}, 2)\}$

3. $S_3 = \{(2, 5), (-2, 5), (\sqrt{5}, 4), (-\sqrt{5}, 4)\}$

$S_4 = \{(2\sqrt{2}, 2), (2\sqrt{2}, -2), (-2\sqrt{2}, 2), (-2\sqrt{2}, -2)\}$

16. Hallar la ecuación de la recta que contiene al punto $(-1, 6)$ y es tangente al lugar geométrico que tiene por ecuación $x^2 + y^2 - 2x - 6y - 3 = 0$.

Resp. $2x - 3y + 20 = 0$

17. Hallar la ecuación de la recta que tiene pendiente $-\frac{3}{2}$ y es tangente al lugar geométrico que tiene por ecuación $4x^2 + 4y^2 + 8x + 4y - 47 = 0$.

Resp. $y = -\frac{1}{2}x + \frac{9}{2}$ o $y = -\frac{1}{2}x - \frac{17}{2}$

18. Hallar la ecuación de la recta que es paralela a la recta que tiene por ecuación $x + 4y + 31 = 0$ y es tangente al lugar geométrico que tiene por ecuación $x^2 + y^2 + 6x - 8 = 0$.

Resp. $y = -\frac{1}{4}x + \frac{7}{2}$ o $y = -\frac{1}{4}x - 5$

19. Determine la ecuación de la recta l que contiene al centro de la elipse de ecuación $4x^2 + 9y^2 + 8x - 36y + 4 = 0$ y contiene al foco de la parábola de ecuación $x^2 - 6x - 4y + 5 = 0$.

Resp. $x + 2y - 3 = 0$

20. Determine la ecuación de la parábola que es cóncava hacia arriba y contiene tres de los vértices de la elipse cuya ecuación es $9x^2 + 4y^2 = 36$.

Resp. $x^2 = -\frac{4}{3}(y - 3)$

21. Determine el valor de la distancia mínima entre la circunferencia \mathcal{C} y la recta \mathcal{L} , si sus ecuaciones son respectivamente $\mathcal{C} : x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0$ y $\mathcal{L} : x - 2y - 6 = 0$.

Resp. $d = \frac{11}{\sqrt{5}} - 1$

22. Dadas una circunferencia \mathcal{C} y una elipse \mathcal{E} que son concéntricas de las cuales se conoce la ecuación de la elipse $\mathcal{E} : 9x^2 + 16y^2 + 18x - 64y - 62 = 0$ y que \mathcal{C} es tangente al eje, determine la ecuación de \mathcal{C} .

Resp. $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 22$

23. Demostrar que la ecuación de la recta tangente a la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$, en el punto (x_1, y_1) perteneciente a la circunferencia es: $x_1x + y_1y = r^2$.