

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

AD-LIVER

Dạng bào chế: Viên nang mềm, hình thuôn dài, màu nâu, bên trong chứa hỗn dịch thuốc màu nâu đen, mùi thơm dược liệu, vị hơi đắng.

Thành phần: Mỗi viên nang mềm có chứa:

Cao khô Diệp hạ châu (*Extractum Phyllanthi urinariae siccum*).....100 mg

Tương đương với 1,0 g Diệp hạ châu (*Herba Phyllanthi urinariae*)

Cao khô Nhân trần (*Extractum Adenosmatis caerulei siccum*).....50 mg

Tương đương với 0,5 g Nhân trần (*Herba Adenosmatis caerulei*)

Cao khô Cỏ nhọ nồi (*Extractum Ecliptae siccum*).....50 mg

Tương đương với 0,5 g Cỏ nhọ nồi (*Herba Ecliptae*)

Tá dược: Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Lecithin, Gelatin, Glycerin, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Vanilin, Titan dioxyd, Màu Brown HT vừa đủ 1 viên.

Chỉ định: Hỗ trợ điều trị trong các trường hợp:

- Viêm gan cấp và mãn tính, đặc biệt viêm gan siêu vi B.
- Suy giảm chức năng gan gây mệt mỏi, ăn uống khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.

Tiêu độc trong các trường hợp đình rêu, mụn nhọt, lở ngứa.

Chống chỉ định:

Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Phụ nữ có thai.

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa ghi nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc: Chưa có báo cáo về các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai

Thuốc dùng được cho phụ nữ đang cho con bú

Liều dùng - cách dùng:

Dùng đường uống, uống trước bữa ăn 30 phút.

Người lớn: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 2 viên.

Trẻ em: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên hoặc dùng theo chỉ định của thầy thuốc.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc: Tương tác thuốc chưa có báo cáo. Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với thuốc khác.

Quá liều và cách xử trí:

1. Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.

2. Xử trí: Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

Bảo quản:

Đề nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Quy cách đóng gói: Hộp 12 vỉ x 5 viên, kèm hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- Để xa tầm tay trẻ em.

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Đ/c: 102 Chi Lăng, P. Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.

ĐT: 02203.858.344 * Fax: 02203.853.848