



Rx Thuốc kê đơn

CEGINKTON[®]

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

1- Thành phần công thức thuốc:

Thành phần hoạt chất	
Cao đặc rễ Đinh lăng (<i>Extractum Radix Polysciacis siccus</i>) (tương đương với 2500 mg rễ Đinh lăng (<i>Radix Polysciacis</i>))	250 mg
Cao khô lá Bạch quả (<i>Extractum Folii Ginkgo siccus</i>) (tương đương không dưới 24% <i>Ginkgo flavonoid</i> toàn phần)	100 mg
Thành phần tá dược: Dầu đậu nành, Dầu cọ, Sáp ong trắng, Gelatin, Glycerin, Lecithin, Titan dioxyd, Nipagin, Nipasol, Dung dịch Sorbitol 70%, Vanilin, Màu Brown HT	với 1 viên

2- Dạng bào chế:

Viên nang mềm, hình thuôn dài, màu nâu, dịch thuốc bên trong màu nâu, vị đắng.

3- Chỉ định: Phòng và điều trị các bệnh sau:

- Suy giảm trí nhớ, thiếu năng tuần hoàn não, hội chứng tiền đình, rối loạn tuần hoàn não. Suy tuần hoàn não, có các biểu hiện: Đau đầu, chóng mặt, mất ngủ, mất thăng bằng.
- Giảm chức năng não bộ: Giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh.
- Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi do làm việc trí óc căng thẳng.

4- Cách dùng - Liều dùng:

- Người lớn: Uống 1 viên/lần. Ngày uống 2 - 3 lần.
- Trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 1 viên.

5- Chống chỉ định:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
- Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú, trẻ em dưới 12 tuổi.
- Người đang chảy máu, xuất huyết, phụ nữ rong kinh, đa kinh.

6- Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp

7- Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

8- Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Chưa có bằng chứng về ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

9- Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc:

Không dùng đồng thời với thuốc chống đông máu, thuốc cầm máu, thuốc kháng tiểu cầu, thuốc chỉ huyết.

10- Tác dụng không mong muốn:

Hiếm gặp: Rối loạn tiêu hóa, nhức đầu, dị ứng da. Thường do dùng thuốc lâu ngày. Có thể kéo dài thời gian chảy máu.

11- Quá liều và cách xử trí:

11.1- Quá liều:

Dùng liều quá cao có thể xảy ra ỉa chảy, buồn nôn, nôn mửa, kích ứng và bồn chồn.

11.2- Xử trí:

Cần xử trí bằng cách rửa dạ dày và tham vấn nhân viên y tế.

12- Quy cách đóng gói: Hộp 3 vi x 10 viên, 5 vi x 10 viên, kèm theo hướng dẫn sử dụng

13- Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc:

- **Điều kiện bảo quản:** Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
- **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Tiêu chuẩn chất lượng:** TCCS

Cơ sở sản xuất:

NHÀ MÁY HDPHARMA EU - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Thửa đất số 307, cụm Công nghiệp Cẩm Thượng, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn