

Rx EFFE-C TP

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc

Thành phần:

Thành phần hoạt chất: Vitamin C (Acid ascorbic) 500mg

Thành phần tá dược: Acid citric, natri hydrocarbonat, aspartam, đường kính, PEG 6000, PVP K30, natri benzoat, FD&Yellow No.6, hương cam.

Dạng bào chế: Viên nén sùi hình tròn, màu cam, thành và cạnh viên lành lặn.

Chỉ định:

Điều trị bệnh do thiếu vitamin C.

Cách dùng, liều dùng:

Hòa tan viên thuốc trong ly nước.

Liều lượng: Người lớn: 1 viên/lần x 1-2 lần/ngày.

Chống chỉ định:

Quá mẫn với vitamin C hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.

Chống chỉ định dùng vitamin C liều cao cho người thiếu hụt G6DP.

Không dùng cho bệnh nhân suy thận.

Không dùng cho bệnh nhân có sỏi oxalat ở thận và có các bệnh liên quan đến dự trữ sắt (thiếu máu tan máu, thừa sắt, thiếu máu nguyên hồng cầu).

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc, khi giảm liều sẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin C.

Tránh dùng vitamin C liều cao cho bệnh nhân bị sỏi calci oxalat ở thận. Dùng thận trọng với người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và rối loạn chuyển hóa oxalat. Sử dụng quá mức và kéo dài các chế phẩm chứa vitamin C uống có thể gây ăn mòn men răng.

Uống vitamin C liều cao trong thời gian dài có thể gây bệnh cơ tim nguy hiểm ở người có lượng sắt dự trữ cao hoặc người bị nhiễm sắc tố sắt mô.

Chế phẩm chứa tá dược aspartam, một nguồn phenylalanin, không dùng cho bệnh nhân bị phenylketon niệu.

Mỗi viên thuốc có chứa 227 mg natri, cần lưu ý với bệnh nhân có chế độ ăn hạn chế natri.

Bệnh nhân có bệnh lý di truyền hiếm gặp như không dung nạp fructose, kém hấp thu glucose - galactose, thiếu hụt sucrase - isomaltase không nên dùng vì thuốc có chứa đường.

Dùng vitamin C có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm glucose trong nước tiểu.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Vitamin C qua được nhau thai và phân bố trong sữa mẹ. Có thể dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú với liều thông thường. Tuy nhiên, dùng liều lớn vitamin C trong thời kỳ mang thai có thể dẫn đến bệnh scorbut ở trẻ sơ sinh.

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

Thuốc không gây ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ:

Dùng đồng thời vitamin C với sắt làm tăng hấp thu sắt qua đường tiêu hóa.

Dùng đồng thời vitamin C với aspirin làm tăng bài tiết vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu.

Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazin làm giảm nồng độ fluphenazin huyết tương.

Sự acid hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc khác.

Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B12, nên dùng cách nhau 1 giờ.

Vitamin C có thể làm giảm hấp thu selen, nên uống cách nhau ít nhất 4 giờ.

Vitamin C có thể làm tăng tác dụng của nhóm hydroxyd, làm giảm tác dụng của amphetamin.

Sự có mặt vitamin C trong nước tiểu dẫn đến sai lệch kết quả xét nghiệm glucose trong nước tiểu.

Tác dụng không mong muốn (ADR):

Rất hiếm gặp: Phản ứng quá mẫn trên da và hệ hô hấp.

Tần suất chưa rõ: Thiếu máu tan máu, tăng oxalat máu, tăng oxalat niệu.

Quá liều và cách xử trí:

Triệu chứng: sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày, ỉa chảy.

Xử trí: Ngừng thuốc và điều trị triệu chứng. Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn. Bù nước và điện giải trong trường hợp tiêu chảy.

Dược lực học:

Mã ATC: A11GA01. **Nhóm dược lý:** Vitamin.

Vitamin C (Acid ascorbic) là một vitamin hòa tan trong nước. Vitamin C là yếu tố cần thiết trong một số quá trình oxy hóa quan trọng trong cơ thể, bao gồm sự hình thành collagen, chất dẫn truyền thần kinh 5-hydroxytryptamin, noradrenalin và sự sinh tổng hợp carnitin. Vitamin C có vai trò quan trọng trong chuyển hóa ion kim loại, bao gồm sự hấp thu và vận chuyển sắt giữa huyết tương và các cơ quan dự trữ. Cũng có bằng chứng cho thấy sự cần thiết của vitamin C cho chức năng bạch cầu bình thường và sự tham gia của vitamin C vào quá trình giải độc qua hệ thống microsom gan.

Thiếu hụt vitamin C dẫn đến bệnh scorbut (scurvy) biểu hiện với các triệu chứng cơ thể mệt mỏi, đau nhức xương, chậm liền vết thương, xuất huyết và bầm máu, chảy máu nướu răng, thiếu máu và các rối loạn tạo máu khác, giảm sức đề kháng.

Dược động học:

Vitamin C được hấp thu dễ dàng qua đường tiêu hóa và phân bố rộng rãi trong các mô của cơ thể. Lượng vitamin C dự trữ trong cơ thể khoảng 1,5g. Nồng độ vitamin C trong bạch cầu, tiểu cầu cao hơn trong hồng cầu và huyết tương. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết hợp với protein. Lượng vitamin C vượt quá nhu cầu cơ thể (khoảng 200 mg mỗi ngày) được thải trừ nhanh chóng. Vitamin C không biến đổi và các chất chuyển hóa không có hoạt tính được bài tiết chủ yếu trong nước tiểu.

Quy cách đóng gói: Tuýp 20 viên. Tuýp 10 viên. Hộp 5 vỉ x 4 viên. Hộp 2 vỉ x 4 viên.

Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẮC NINH

Lô C1-1, Khu công nghiệp Quế Võ, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh