

LACI-EYE

(Hydroxypropyl methylcellulose 0,3%)

Để xa tầm tay trẻ em

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Thành phần

Mỗi 0,4 ml dung dịch có chứa:

Thành phần hoạt chất:

Hydroxypropyl methylcellulose 1,2 mg.

Tá dược: vừa đủ

Dạng bào chế: Dung dịch nhỏ mắt

Mô tả: Dung dịch trong, không màu, không có tiểu phân lạ

pH: 6,0 – 7,8

Chỉ định

Làm dịu các cảm giác khô mắt, cay, ngứa, cộm như bụi trong mắt, mỏi mắt, đỏ mắt do lượng nước mắt tiết ra không đủ, do các yếu tố môi trường như không khí khô, sương mù, khói, bụi gió, ánh nắng mặt trời, ngồi phòng điều hòa, máy sưởi.

Dùng làm nước mắt nhân tạo để ngăn ngừa tổn thương giác mạc ở bệnh nhân viêm giác kết mạc khô có kèm theo viêm khớp dạng thấp, bệnh khô mắt bất thường do viêm kết mạc gây ra bởi sự thiếu hụt nước mắt và do thiếu vitamin A (xerophthalmias) hoặc trong quá trình kiểm tra góc dẫn lưu của mắt (gonioscopy).

Làm ẩm kính áp tròng cứng và để bôi trơn mắt nhân tạo.

Liều dùng và cách dùng

1 -2 giọt / lần x 3 lần/ ngày.

Hoặc sử dụng theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Chỉ sử dụng sản phẩm cho mắt.

Chống chỉ định

Quá mẫn với hydroxypropyl methylcellulose hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Khi dùng có thể đau nhức nhẹ thoáng qua hoặc nhìn mờ tạm thời. Nếu bị kích ứng kéo dài hoặc nặng hơn, hoặc nhức đầu, đau mắt, thay đổi thị lực, nên ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Để đảm bảo vô khuẩn, tránh tiếp xúc đầu nhỏ giọt của ống vào mắt hoặc các vật khác.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Hydroxypropyl methylcellulose là một chất trơ do đó không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến khả năng sinh sản.

Chưa có các thông tin và dữ liệu đầy đủ khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú.

Ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc

Do tác dụng không mong muốn trên mắt gây nhìn mờ nên thận trọng khi lái xe và vận hành máy móc.

Tương tác, tương kỵ của thuốc

Hydroxypropyl methylcellulose kéo dài thời gian tiếp xúc của thuốc bôi ngoài sử dụng trong nhãn khoa.

Tác dụng không mong muốn của thuốc

Các tác dụng không mong muốn đã được báo cáo sau khi sử dụng hydroxypropyl methylcellulose lên mắt với tần suất chưa được thống kê như sau:

Các tác dụng không mong muốn xảy ra tại mắt như: Nhìn mờ, đau mắt, cảm giác có dị vật trong đôi mắt, kích ứng mắt, xung huyết mắt.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

Quá liều và cách xử trí

Do hydroxypropyl methylcellulose là một chất trơ, không có hoạt tính dược lý nên không có độc tính khi sử dụng quá liều hay vô tình nuốt phải dung dịch.

Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: Thuốc dùng điều trị mắt, tai, mũi họng

Mã ATC: S01X A20

Cơ chế tác dụng

Hydroxypropyl methylcellulose dưới dạng dung dịch có tác dụng làm dịu, mềm với các thuộc tính và cách dùng tương tự như methylcellulose. Hydroxypropyl methylcellulose có ưu điểm vượt trội hơn so với các methylcellulose là trong và ít chứa các tiểu phân dạng sợi không phân tán hơn so với các methylcellulose. Nó kéo dài tác dụng của thuốc nhỏ mắt khác và được sử dụng như là nước mắt nhân tạo trong hội chứng khô mắt.

Đặc tính dược động học

Hydroxypropyl methylcellulose là một chất trơ, không có hoạt tính dược lý và không hấp thu. Do đó, các đặc tính dược động học chưa được nghiên cứu.

Quy cách đóng gói:

Hộp 4 vỉ x 5 ống nhựa 0,4 ml, hộp 10 vỉ x 5 ống nhựa 0,4 ml.

Bảo quản: Bảo quản trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở.

Hướng dẫn sử dụng



Tách ống ra khỏi vỉ, kiểm tra tính nguyên vẹn của ống trước khi mở



Vặn nắp rời ống thuốc và giữ sạch đầu nắp



Giữ ống càng gần mắt càng tốt nhưng không chạm vào mắt, bóp nhẹ, nhỏ từng giọt vào mắt



Đậy nắp lại sau khi sử dụng

Nhà sản xuất



Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội
Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình,
Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.