

(Rx) THUỐC BÁN THEO ĐƠN

Nhỏ mắt

LEVOFOXAXIME

Levofloxacin 0,5%

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em
Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không
mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ.

PHẦN THÔNG TIN DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH

1. Thành phần: (cho 5ml):

Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrate)	25mg
Acid boric, natri tetraborat, benzalkonium clorid, nước cất pha tiêm	Vừa đủ 5ml

2. Mô tả sản phẩm:

Dạng bào chế: Dung dịch thuốc nhỏ mắt

Tính chất: Dung dịch trong, không màu hoặc ngà vàng.

3. Quy cách đóng gói:

Hộp 1 lọ 5ml, kèm hướng dẫn sử dụng.

4. Thuốc dùng cho bệnh gì:

- Điều trị các nhiễm khuẩn mắt như viêm mí mắt, viêm túi lệ, viêm màng kết, viêm giác mạc, loét giác mạc gây ra bởi các chủng vi khuẩn nhạy cảm.

5. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

- Ngày thứ nhất và thứ 2: nhỏ 1 đến 2 giọt vào mắt bị nhiễm khuẩn cứ mỗi 2 giờ khi thức. Không nhỏ quá 8 lần trong một ngày.

- Ngày thứ 3 đến ngày thứ 7: nhỏ 1 đến 2 giọt vào mắt bị nhiễm khuẩn cứ mỗi 4 giờ khi thức. Không nhỏ quá 4 lần trong một ngày.

6. Khi nào không nên dùng thuốc này:

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với Levofloxacin, với các kháng sinh khác thuộc nhóm quinolon, hoặc mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

7. Tác dụng không mong muốn:

Các tác dụng không mong muốn được ghi nhận là giảm thị lực thoáng qua, sốt, đau đầu nóng mắt, đau mắt, viêm họng và sợ ánh sáng (chiếm 1-3%). Các phản ứng khác như phản ứng dị ứng, phù mắt, khô mắt và ngứa mắt (dưới 1%).

8. Nên tránh dùng những loại thực phẩm hay thuốc gì khi đang sử dụng thuốc này?

Các nghiên cứu về tương tác thuốc cụ thể với thuốc nhỏ mắt Levofloxacin chưa được tiến hành.

Nồng độ đỉnh của Levofloxacin trong huyết tương sau khi nhỏ mắt thấp hơn ít nhất 1000 lần so với khi uống, do đó tương tác thuốc khi dùng Levofloxacin theo đường toàn thân không có ý nghĩa khi dùng Levofloxacin nhỏ mắt.

Nếu sử dụng đồng thời với các thuốc nhỏ mắt khác, lên nhỏ 2 loại cách nhau ít nhất khoảng 15 phút.

9. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?

Nếu quên dùng thuốc một lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều lượng sau khi quên dùng thuốc một lần.

10. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?

Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. Đậy kỹ nắp sau mỗi lần sử dụng, không sờ vào phía trong nắp và miệng lọ.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng quá liều?

Quá liều thuốc nhỏ mắt Levofloxacin là rất hiếm khi xảy ra. Triệu chứng quá liều như tác dụng không mong muốn.

12. Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Trường hợp quá liều cần rửa mắt bằng nước sạch ấm. Điều trị triệu chứng.

13. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

13.1 Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc:

Cũng như các thuốc kháng khuẩn khác, sử dụng lâu ngày có thể gây ra sự phát triển của các chủng vi khuẩn không nhạy cảm khác, bao gồm cả nấm. Nếu xảy ra hiện tượng này, không nên sử dụng thuốc và thay thế bằng biện pháp điều trị khác.

Bệnh nhân không nên đeo kính áp tròng nếu có thể các dấu hiệu và triệu chứng của viêm màng kết.

Do có chứa tá dược Benzalkonium clorid nên thận trọng: Thuốc có thể gây kích ứng mắt. Tránh dùng thuốc khi sử dụng kính áp tròng mềm. Nếu sử dụng kính áp tròng thì bỏ kính trước khi nhỏ thuốc và đợi 15 phút rồi mới trở lại. Sản phẩm có thể làm biến đổi màu của kính áp tròng.

13.2 Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai: Chưa có nghiên cứu thích hợp và có kiểm soát đầy đủ, ở người mang thai. Chỉ dùng thuốc này trong thai kỳ khi lợi ích cho mẹ vượt hẳn nguy cơ cho thai.

Thời kỳ cho con bú: Nên dùng cho con bú khi dùng thuốc hoặc đổi thuốc khác.

13.3 Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác): Tác dụng không mong muốn của thuốc có thể ảnh hưởng lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác. Thận trọng khi sử dụng.

14. Khi nào cần tham vấn bác sĩ?

Cần tham vấn của bác sĩ khi dùng kết hợp nhiều thuốc hay khi có dấu hiệu bất thường nào khác.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

15. Hạn dùng của thuốc: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày.

1. Các đặc tính dược lực học, dược động học:

1.1 Dược lực học:

Levofloxacin là một kháng sinh tổng hợp có phổ rộng thuộc nhóm fluoroquinolon. Cũng như các fluoroquinolon khác, levofloxacin có tác dụng diệt khuẩn do ức chế enzym topoisomerase II (ADN-gyrase) và/hoặc topoisomerase IV là những enzym thiết yếu của vi khuẩn tham gia xúc tác trong quá trình sao chép, phiên mã và tu sửa ADN của vi khuẩn. Levofloxacin là đồng phân L-isome của ofloxacin, nó có tác dụng diệt khuẩn mạnh gấp 8 - 128 lần so với đồng phân D-isome và tác dụng mạnh gấp khoảng 2 lần so với ofloxacin racemic. Levofloxacin, cũng như các fluoroquinolon khác là kháng sinh phổ rộng, có tác dụng trên nhiều chủng vi khuẩn Gram âm và Gram dương.

Phổ tác dụng:

Vi khuẩn nhạy cảm in vitro và nhiễm khuẩn trong lâm sàng:

- Vi khuẩn ưa khí Gram âm: *Enterobacter cloacae*, *E. coli*, *H. influenza*, *H. parainfluenza*, *Moraxella catarrhalis*, *Proteus mirabilis*, *Pseudomonas aeruginosa*.

- Vi khuẩn khác: *Chlamydia pneumoniae*, *Mycoplasma pneumoniae*.

- Vi khuẩn ưa khí Gram dương: *Bacillus anthracis*, *Staphylococcus aureus* nhạy cảm methicilin (meti-S), *Staphylococcus coagulase âm tính* nhạy cảm methicilin, *Streptococcus pneumoniae*.

- Vi khuẩn kỵ khí: *Fusobacterium*, *peptostreptococcus*, *propionibacterium*.

Các loại vi khuẩn nhạy cảm trung gian in vitro:

- Vi khuẩn ưa khí Gram dương: *Eterococcus faecalis*.

- Vi khuẩn kỵ khí: *Bacteroid fragilis*, *prevotella*.

Các loại vi khuẩn kháng levofloxacin:

- Vi khuẩn ưa khí Gram dương: *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus* meti -R, *Staphylococcus coagulase âm tính* meti-R.

Kháng chéo: In vitro, có kháng chéo giữa levofloxacin và các fluoroquinolon khác. Do cơ chế tác dụng, thường không có kháng chéo giữa levofloxacin và các họ kháng sinh khác.

1.2 Dược động học:

Chưa có số liệu về mức độ hấp thu toàn thân của dung dịch thuốc nhỏ mắt Levofloxacin.

2. Chỉ định, liều dùng, cách dùng, chống chỉ định:

2.1 Chỉ định:

- Điều trị các nhiễm khuẩn mắt như viêm mí mắt, viêm túi lệ, viêm màng kết, viêm giác mạc, loét giác mạc gây ra bởi các chủng vi khuẩn nhạy cảm.

2.2 Liều dùng – cách dùng:

- Ngày thứ nhất và thứ 2: nhỏ 1 đến 2 giọt vào mắt bị nhiễm khuẩn cứ mỗi 2 giờ khi thức. Không nhỏ quá 8 lần trong một ngày.

- Ngày thứ 3 đến ngày thứ 7: nhỏ 1 đến 2 giọt vào mắt bị nhiễm khuẩn cứ mỗi 4 giờ khi thức. Không nhỏ quá 4 lần trong một ngày.

2.3 Chống chỉ định:

Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với Levofloxacin, với các kháng sinh khác thuộc nhóm quinolon, hoặc mẫn cảm với các thành phần của thuốc.

3. Thận trọng:

3.1 Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc:

Cũng như các thuốc kháng khuẩn khác, sử dụng lâu ngày có thể gây ra sự phát triển của các chủng vi khuẩn không nhạy cảm khác, bao gồm cả nấm. Nếu xảy ra hiện tượng này, không nên sử dụng thuốc và thay thế bằng biện pháp điều trị khác.

Bệnh nhân không nên đeo kính áp tròng nếu có thể các dấu hiệu và triệu chứng của viêm màng kết.

Do có chứa tá dược Benzalkonium clorid nên thận trọng: Thuốc có thể gây kích ứng mắt. Tránh dùng thuốc khi sử dụng kính áp tròng mềm. Nếu sử dụng kính áp tròng thì bỏ kính trước khi nhỏ thuốc và đợi 15 phút rồi mới trở lại. Sản phẩm có thể làm biến đổi màu của kính áp tròng.

3.2 Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai: Chưa có nghiên cứu thích hợp và có kiểm soát đầy đủ, ở người mang thai. Chỉ dùng thuốc này trong thai kỳ khi lợi ích cho mẹ vượt hẳn nguy cơ cho thai.

Thời kỳ cho con bú: Nên dùng cho con bú khi dùng thuốc hoặc đổi thuốc khác.

3.3 Ảnh hưởng của thuốc đối với công việc (người vận hành máy móc, đang lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác): Tác dụng không mong muốn của thuốc có thể ảnh hưởng lên khả năng vận hành máy móc, lái tàu xe, người làm việc trên cao và các trường hợp khác. Thận trọng khi sử dụng.

4. Tương tác với các thuốc khác:

Các nghiên cứu về tương tác thuốc cụ thể với thuốc nhỏ mắt Levofloxacin chưa được tiến hành.

Nồng độ đỉnh của Levofloxacin trong huyết tương sau khi nhỏ mắt thấp hơn ít nhất 1000 lần so với khi uống, do đó tương tác thuốc khi dùng Levofloxacin theo đường toàn thân không có ý nghĩa khi dùng Levofloxacin nhỏ mắt.

Nếu sử dụng đồng thời với các thuốc nhỏ mắt khác, lên nhỏ 2 loại cách nhau ít nhất khoảng 15 phút.

5. Tác dụng không mong muốn:

Các tác dụng không mong muốn được ghi nhận là giảm thị lực thoáng qua, sốt, đau đầu nóng mắt, đau mắt, viêm họng và sợ ánh sáng (chiếm 1-3%). Các phản ứng khác như phản ứng dị ứng, phù mắt, khô mắt và ngứa mắt (dưới 1%).

6. Quá liều, cách xử trí:

Quá liều thuốc nhỏ mắt Levofloxacin là rất hiếm khi xảy ra. Triệu chứng quá liều như tác dụng không mong muốn.

Trường hợp quá liều cần rửa mắt bằng nước sạch ấm. Điều trị triệu chứng.

7. Các dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo: Không có.

Cơ sở sản xuất:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 0220.3 853848 - Fax: 0220.3 853848

Hotline: 0982111177 - Website: ndpharma.vn