



R_x Thuốc bán theo đơn

DUNG DỊCH THUỐC NHỎ MẮT, MŨI, TAI

NEOMEZOLS

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH

Tên thuốc: NEOMEZOLS

"Để xa tầm tay trẻ em"

"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"

"Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc."

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ

Thành phần, hàm lượng: Mỗi lọ 5 ml có chứa:

Neomycin sulfat (Tương đương với Neomycin base 17000 IU).....25 mg

Dexamethason sodium phosphat5 mg

Tá dược (Thimerosal, Natri clorid, Acid boric, Natri borat, Nước cất)vừa đủ 5 ml

Mô tả sản phẩm:

Dung dịch trong suốt, không màu.

Trình bày: Hộp 1 lọ x 5ml, 8ml, kèm hướng dẫn sử dụng.

Thuốc dùng cho bệnh gì:

- Mắt: Viêm kết mạc, viêm mí mắt, viêm túi lệ, viêm giác mạc. Ngừa nhiễm khuẩn trước và sau khi phẫu thuật, nhiễm khuẩn do chấn thương.

- Mũi: Các chứng viêm mũi dị ứng, nhất là các trường hợp chỉ đáp ứng với một trị liệu bằng corticoid. Viêm mũi, viêm xoang. Polyp mũi bội nhiễm.

- Tai: Viêm tai ngoài (khi không bị thủng màng nhĩ), đặc biệt là các chứng eczema, nhiễm trùng ống tai.

Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng:

- Mắt, mũi: Điều trị tấn công: Nhỏ 1-2 giọt/lần, 4 giờ một lần. Điều trị duy trì: Nhỏ 1 – 2 giọt /lần mỗi 4 – 6 giờ.

- Tai: Nhỏ 2 giọt/lần. Ngày 2 lần. Không nên dùng áp lực để bơm thuốc vào tai. Nếu dùng thuốc quá 10 ngày nên tái khám.

Khi nào không nên dùng thuốc này:

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, trẻ em dưới 1 tuổi.

- Thủng màng nhĩ, nhiễm virus.

- Loét giác mạc. Người có tiền sử glaucoma, nấm mắt, lao mắt.

- Không dùng thuốc trong thời gian dài.

Tác dụng không mong muốn:

- Dexamethason: Khi nhỏ mũi, thuốc có thể hấp thu đủ để gây tác dụng toàn thân. Khi dùng dài ngày có thể làm tăng nhãn áp và đục thủy tinh thể.

- Neomycin: Phản ứng tăng mẫn cảm như viêm da, ngứa, sốt do thuốc và phản vệ.

Dùng thuốc kéo dài có thể dẫn tới chóng mặt, rung giật nhãn cầu và điếc, ngay cả sau khi đã ngừng thuốc.

Nên tránh dùng thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này.

Thuốc nhỏ mắt, mũi, tai có tác dụng tại chỗ nên không có tương tác với các thuốc dùng theo đường khác.

Khi dùng đồng thời với các thuốc nhỏ mắt – mũi – tai khác nên dùng cách xa nhau ít nhất 1 giờ.

Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc:

Nếu quên không dùng thuốc một lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều lượng chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều dùng sau khi quên thuốc một lần.

Cần bảo quản thuốc này như thế nào:

Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.

Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều:

Khi dùng quá liều làm tăng nguy cơ xảy ra các tác dụng không mong muốn.

Cần làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo:

Ngừng dùng thuốc và tham vấn nhân viên y tế khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo.

Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này:

Các tình trạng cần thận trọng khi dùng thuốc:

- Dùng thuốc tại tai khi vết thương quá rộng có thể gây điếc.

- Thận trọng ở người bệnh thận, gan, thính lực giảm. Thận trọng khi dùng thuốc liên tục trong thời gian dài. Cần theo dõi nhãn áp và thủy tinh thể khi cần sử dụng kéo dài.

Các khuyến cáo dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú: Không dùng thuốc cho phụ nữ mang thai và cho con bú. Chỉ dùng khi thật sự cần thiết. Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Ảnh hưởng của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc dùng được khi đang lái xe hoặc vận hành máy móc.

Khi nào cần tham vấn bác sĩ, dược sĩ:

Cần tham vấn bác sĩ khi đang dùng thuốc khác, hoặc khi có bất cứ dấu hiệu bất thường nào.

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ.

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: 102 Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (0220)3.853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn