



R_x Thuốc kê đơn

NƯỚC CẮT TIÊM

**Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc.**

1. Thành phần công thức thuốc (cho 1 ống 10ml):

Thành phần hoạt chất	Hàm lượng
Nước để pha thuốc tiêm	10 ml

2. Dạng bào chế: Dung môi pha tiêm. Dung dịch trong suốt không màu.

3. Chỉ định: Dùng để hòa tan các thuốc tiêm bột hoặc pha loãng các chế phẩm thuốc tiêm trước khi sử dụng.

4. Cách dùng - Liều dùng:

4.1 Cách dùng: Dung môi để pha tiêm

4.2 Liều dùng: Tùy lượng thuốc dùng để pha

5. Chống chỉ định:

- Nước cắt pha tiêm không nên dùng một mình
- Cần xem xét các chống chỉ định liên quan đến thuốc được pha loãng.

6. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:

- Nước để Tiêm là thuốc rất nhược trương nên chỉ được tiêm tĩnh mạch khi đã pha các loại thuốc tiêm khác để đạt độ đẳng trương thích hợp.
- Nước cắt pha tiêm không nên dùng một mình.
- Khi nước cắt tiêm được sử dụng làm chất pha loãng của các dung dịch ưu trương, nên áp dụng độ pha loãng thích hợp để đưa dung dịch gần đến độ đẳng trương.
- Tan máu có thể xảy ra sau khi truyền nước vô trùng để tiêm. Suy thận do hemoglobin đã được báo cáo sau khi tan máu.
- Khi sử dụng một lượng lớn, cần thường xuyên theo dõi cân bằng ion.

7. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Các rủi ro trong quá trình sử dụng thuốc ở phụ nữ có thai và cho con bú được xác định bởi bản chất của thuốc được pha loãng.

8. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc:

- Thuốc dùng được cho người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

9. Tương tác thuốc, tương kỵ của thuốc: Không có

10. Tác dụng không mong muốn của thuốc (ADR)

Chưa có báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc.

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

11. Quá liều và cách xử trí

- Tan máu có thể xảy ra sau khi truyền quá nhiều dung dịch giảm trương lực bằng cách sử dụng nước vô trùng để pha loãng thuốc tiêm.
- **Cách xử trí:** Trong trường hợp vô tình dùng quá liều, nên ngừng điều trị và bệnh nhân phải được theo dõi các dấu hiệu và triệu chứng thích hợp liên quan đến sản phẩm thuốc được sử dụng. Tích cực theo dõi để có biện pháp xử trí kịp thời.

12. Đặc tính dược lực học:

Nhóm dược lý: Dung môi và chất pha loãng

Mã ATC: V07AB.

Nước cắt tiêm chỉ là dung môi pha loãng thuốc tiêm, dược lực học sẽ phụ thuộc vào bản chất của loại thuốc phối hợp.

13. Đặc tính dược động học:

- Nước cắt tiêm chỉ là dung môi pha loãng thuốc tiêm, dược động học sẽ phụ thuộc vào bản chất của loại thuốc phối hợp.

14. Quy cách đóng gói: Ống 10ml. Hộp 10 ống, 20 ống, 50 ống; kèm hướng dẫn sử dụng.

15. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng của thuốc

- **Điều kiện bảo quản:** Bảo quản ở nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
- **Hạn dùng:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
- **Tiêu chuẩn chất lượng:** ĐDVNN

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG

Địa chỉ: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.3 853848 - Hotline: 18001107 - Website: hdpharma.vn