

OSTENIL® PLUS

Viscoelastic solution for
injection into the joint cavity

INSTRUCTIONS FOR USE

en

OSTENIL® PLUS

Sodium hyaluronate 2.0 %. Viscoelastic solution for injection into the joint cavity. Sterile by moist heat.

Composition:

Each pre-filled syringe of 40 mg/2.0 mL contains:

Principal component: sodium hyaluronate 2.0 %
Other components: sodium chloride, disodium phosphate, sodium dihydrogenphosphate, mannitol and water for injections.

Indications:

Temporary synovial fluid replacement for lubricating in degenerative and traumatic changes of knee joint and other synovial joints resulting in pain decrease and joint mobility improvement.

Contra-indications:

OSTENIL® PLUS should not be used in patients with ascertained hypersensitivity to one of the constituents.

Interactions:

No information on the incompatibility of OSTENIL® PLUS with other solutions for intra-articular use is available to date. The concomitant use of an oral analgesic or anti-inflammatory drug during the first few days of treatment may be helpful for the patient.

Undesirable effects:

Local secondary phenomena such as pain, feeling of heat, redness and swelling may occur in the joint treated with OSTENIL® PLUS. Application of an ice pack for five to ten minutes onto the treated joint will reduce the incidence of these events.

Dosage and administration:

The clinically recommended dose is a single injection of 2.0 mL (40 mg) of OSTENIL® PLUS into the affected joint. Several joints can be treated at the same time. Depend on situation and symptoms of disease, it can be requested up to 3 consecutive doses at 1 week interval. Repeated treatment cycles may be administered as required.

In case of joint effusion it is advisable to reduce the effusion by aspiration, rest, application of an ice pack and/or intra-articular corticosteroid injection. Treatment with OSTENIL® PLUS can be started two to three days later.

The content and the outer surface of the OSTENIL® PLUS pre-filled syringe are sterile as long as the sterile pack is intact. Take the pre-filled syringe out of the sterile pack, unscrew the Luer lock cap from the syringe, attach a suitable needle (for example 18 to 25 G) and secure it by turning slightly. Remove any air bubble, if present, before injection.

Precautions:

Caution should be exercised in patients with known hypersensitivity to one of the constituents. As with all invasive joint treatments in very rare cases an infection may occur. Hence, the general precautions for intra-articular injections should be observed, including measures to avoid joint infections. OSTENIL® PLUS should be injected accurately into the joint cavity, if necessary under imaging control. Avoid injections into blood vessels or surrounding tissues! As no clinical evidence is available on the use of hyaluronic acid in children, pregnant and lactating women or in inflammatory joint diseases such as rheumatoid arthritis or Bechterew disease, treatment with OSTENIL® PLUS is not recommended in these cases. Do not use if the pre-filled syringe or sterile pack are damaged. Any solution not used immediately after opening must be discarded. Otherwise the sterility is no longer guaranteed and this may be associated with a risk of infection. Store below 30° C! Do not use after the expiry date indicated on the box. Keep out of the reach of children!

Characteristics and mode of action:

Synovial fluid, which is viscoelastic due to the presence of hyaluronic acid, is found in all synovial joints, particularly the large weight bearing joints, where it ensures normal, painless movement due to its lubricating and shock-absorbing properties. It is also responsible for the nutrition of the cartilage. In degenerative joint disorders such as osteoarthritis, the viscoelasticity of the synovial fluid is markedly reduced thereby decreasing its lubricating and shock-absorbing functions. This increases mechanical loading of the joint and cartilage destruction which ultimately results in pain and restricted mobility of the affected joint. Supplementing this synovial fluid with intra-articular injections of highly purified hyaluronic acid can ameliorate the viscoelastic properties of synovial fluid. This improves its lubricating and shock-absorbing functions and reduces mechanical overload of the joint. As a rule this results in a decrease in pain and an improvement in joint mobility which may last for several months after a treatment cycle.

OSTENIL® PLUS is a transparent solution of natural and highly purified sodium hyaluronate obtained by fermentation and is devoid of animal protein. OSTENIL® PLUS also contains mannitol, a free radical scavenger, which helps to stabilise the chains of sodium hyaluronate. In biocompatibility studies, OSTENIL® PLUS was found to be particularly safe.

Presentation:

One pre-filled syringe of 40 mg/2.0 mL sodium hyaluronate in a sterile pack.

OSTENIL® PLUS is a medical device. To be used by a physician only.

LOT

Batch number



Expiry date



For single use only



Refer to instructions for use



Sterile by moist heat



Don't use if the sterile barrier
is damaged



Store below 30° C!



Product owner:

TRB CHEMEDICA AG
26 Otto-Lilienthal-Ring
85622 Feldkirchen/München, Germany

Manufacturer:

TRB CHEMEDICA SA
Chemin St-Marc 3,
1896 Vouyry, Switzerland

Origin: Switzerland

Importer and Distributor:.

vi

Natri hyaluronat 2,0%. Dung dịch nhớt dần hồi tiêm trong khớp. Tiệt khuẩn bằng nhiệt ẩm.

Mỗi bơm tiêm đóng sẵn 40 mg/2,0 mL, chứa:

Các thành phần khác: natri clorid, dinatri phosphat, natri dihydrogen phosphat, mannitol và nước pha thêm.

Tam thời thay thế chất hoạt dịch để bôi trơn cho khớp gối và những khớp hoạt dịch khác bị biến đổi do thoái hóa và chấn thương giúp giảm đau và cải thiện khả năng vận động khớp.

OSTENIL® PLUS không dùng cho bệnh nhân đã xác định bị quá mẫn với các thành phần của sản phẩm.

Cho đến nay không có thông tin về sự không tương thích của OSTENIL® PLUS với các dung dịch nội khớp khác. Việc sử dụng đồng thời với các thuốc giảm đau hoặc thuốc kháng viêm đường uống trong vài ngày đầu điều trị có thể hữu ích cho bệnh nhân.

Các hiện tượng như phát tại chỗ như đau, cảm giác nóng, đỏ và sưng có thể xảy ra ở khớp được điều trị bằng OSTENIL® PLUS. Dùng một túi nước đá trong năm đến mười phút khớp được điều trị sẽ làm giảm tần suất các trường hợp này.

Liều khuyến cáo làm sáng là thêm một liều duy nhất 2,0 mL (40 mg) OSTENIL® PLUS vào khớp bệnh. Có thể điều trị cùng một lúc với các khớp khác nhau. Tùy thuộc vào tình trạng và triệu chứng của bệnh mà có thể được thêm 3 liều liên tiếp cách nhau 1 tuần. Có thể lặp lại các chu kỳ điều trị khi cần.

Trường hợp khớp bị tràn dịch, nên giảm sự tràn dịch bằng cách hút, nghỉ ngơi, chườm đá và/hoặc tiêm corticosteroid nội khớp. Sau đó 2 hoặc 3 ngày có thể điều trị bằng OSTENIL® PLUS.

Dung dịch chứa bên trong và bề mặt bên ngoài của bơm tiêm đồng sẵn OSTENIL® PLUS là vô khuẩn khi bao gói còn nguyên vẹn. Lấy ống tiêm đồng sẵn ra khỏi gói vô khuẩn, tháo nắp khóa Luer khỏi ống tiêm, gắn kim thích hợp (ví dụ cỡ 18 đến 25 G) và cổ định kim bằng cách xoay nhẹ. Loại bỏ bất kỳ bọt khí nào, nếu có, trước khi tiêm.

Cần thận trọng ở những bệnh nhân đã biết quá mẫn cảm với một trong các thành phần của sản phẩm. Như với tất cả các điều trị khớp xâm lấn, rất hiếm gặp những trường hợp có thể xảy ra nhiễm khuẩn. Do đó, thận trọng chung khi tiêm nội khớp là nên theo dõi bao gồm cả đánh giá để tránh nhiễm trùng khớp. OSTENIL® PLUS phải được tiêm chính xác vào khoang khớp, dưới sự kiểm soát bằng siêu âm nếu cần thiết. Tránh tiêm vào mạch máu hoặc các mô xung quanh. Vì hiện không có bằng chứng lâm sàng về việc sử dụng acid hyaluronic ở trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú hoặc trong các bệnh viêm khớp như viêm khớp dạng thấp hoặc bệnh Bechterew, không khuyến cáo điều trị bằng OSTENIL® PLUS trong những trường hợp này. Không sử dụng nếu ống tiêm đóng sẵn hoặc gói vô khuẩn bị hư hại. Bất kỳ phần dung dịch nào không được sử dụng ngay sau khi mở phải được loại bỏ. Nếu không thì tính vô khuẩn không còn được đảm bảo nữa và dung dịch có thể gây ra nguy cơ nhiễm khuẩn. Bảo quản dưới 30 °C! Không sử dụng sau ngày hết hạn được ghi trên hộp. Để xa tầm tay trẻ em!

Chất hoạt dịch, có tính nhớt đàn hồi do sự hiện diện của acid hyaluronic, được tìm thấy trong tất cả các khớp hoạt dịch, đặc biệt là các khớp chịu trọng lượng lớn, để đảm bảo sự cử động bình thường, không đau do đặc tính làm trơn và giảm sốc. Acid hyaluronic cũng chịu trách nhiệm về dinh dưỡng của sụn. Trong các rối loạn suy biến của khớp như thoái hóa khớp, đặc tính nhớt đàn hồi của chất hoạt dịch bị giảm rõ rệt do làm giảm chức năng làm trơn và giảm sốc của nó. Điều này làm tăng tải cơ học của khớp và phá hủy từ từ sụn, cuối cùng dẫn đến đau và hạn chế khả năng cử động của khớp bị ảnh hưởng. Việc bổ sung chất hoạt dịch này bằng cách tiêm trong khớp acid hyaluronic tinh khiết cao có thể cải thiện đặc tính nhớt đàn hồi của chất hoạt dịch. Điều này cải thiện chức năng làm trơn và giảm sốc của nó và giảm quá tải cơ học của khớp. Theo nguyên tắc, điều này cần đến giảm đau và cải thiện khả năng cử động của khớp, có thể kéo dài trong vài tháng sau một chu kỳ điều trị.

Một bơm tiêm đóng sẵn chứa 40 mg/2,0 mL natri hyaluronat được đóng trong gói vô khuẩn.

OSTENIL® PLUS là một trang thiết bị y tế. Chỉ được sử dụng bởi cán bộ y tế.

Ngày sửa đổi cuối cùng: 2022-11



Số lổ SX



Hạn dùng



Chỉ dùng 1 lần duy nhất



Tham khảo hướng dẫn sử dụng



Tiệt khuẩn bằng nhiệt ẩm



Không sử dụng nếu gọi vô khuẩn bị hư hại



Bảo quản dưới 30 °C!



Chủ sở hữu sản phẩm:

TRB CHEMEDICA AG
26 Otto-Lilienthal-Ring
85622 Feldkirchen/München, D.Üc.

Nhà sản xuất:

TRB CHEMEDICA SA
Chemin St-Marc 3
1896 Vouvr, Thuy Si.

Xuất xứ: Thụy Sĩ.

Nhập khẩu và phân phối:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam,