

Transda-S

Viên nén bao phim

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

MÔ TẢ SẢN PHẨM: TRANSDA - S là sản phẩm do sự kết hợp của các thành phần sau:

- Rotundin (L-Tetrahydropalmatin) là alkaloid được chiết từ củ Bình vôi, có tên khoa học là *Stephania rotunda*, họ Tiết dê (*Menispermaceae*). Rotundin có tác dụng an thần, gây ngủ, chống co giật, giãn cơ trơn, do đó có thể làm giảm các cơn đau do co thắt cơ trơn. Ngoài ra, rotundin còn dùng trong điều trị một số trường hợp rối loạn tâm thần chức năng, trạng thái căng thẳng thần kinh, mất ngủ dai dẳng có nguyên nhân tâm thần.

- Lá sen (*Folium Nelumbinis*): Các công trình nghiên cứu trên cây sen mọc ở Việt Nam cho thấy dịch chiết và alkaloid toàn phần của lá sen có tác dụng an thần, tăng trương lực cơ tử cung, chống co thắt cơ trơn ruột. Ngoài ra lá sen còn có tác dụng chống choáng phần vệ, chống loạn nhịp tim.

- Lá vông (*Folium Erythrinae*): Đã được dân gian Việt Nam sử dụng làm thuốc an thần từ lâu đời. Các công trình nghiên cứu (của Trường sĩ quan quân y) cho thấy lá vông có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, làm yên tĩnh, gây ngủ, hạ nhiệt và hạ huyết áp.

Thuốc được bào chế ở dạng viên nén bao phim, đóng gói hộp 2 vi hoặc 10 vi x 10 viên (vi nhóm -PVC), hộp 2 vi x 10 viên (vi nhóm - nhôm).

THÀNH PHẦN VÀ HẠM LƯỢNG: Mỗi viên nén bao phim chứa

- Cao khô lá sen (*Extractum Folium Nelumbinis nuciferae*) 80 mg (tương đương với 1g lá sen khô)

- Cao khô lá vông (*Extractum Folium Erythrinae variegatae*) 95 mg (tương đương với 1g lá vông khô)

- Rotundin 15 mg

Và các tá được gồm: Lactose monohydrat, tinh bột ngô, natri starch glycolat, silic dioxyd dạng keo khan, talc, magnesii stearat, hydroxypropyl methylcellulose 6cPs vừa đủ.

THUỐC DÙNG CHO BỆNH GÌ?

Thuốc này được dùng để:

- An thần, gây ngủ, làm êm dịu thần kinh trong các trường hợp mất ngủ, lo âu, căng thẳng.

- Hỗ trợ giảm đau do co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa, tử cung. Đau đầu, đau thần kinh, co giật.

NÊN DÙNG THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO VÀ LIỀU LƯỢNG?

- Người lớn: Uống mỗi lần 2-3 viên, mỗi ngày 2-3 lần (hoặc 2-3 viên trước khi đi ngủ).

- Trẻ em: Uống mỗi lần 1-2 viên, mỗi ngày 2-3 lần tùy theo tuổi.

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHO CÁN BỘ Y TẾ

Rx.

Transda-S

THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN THUỐC.

ĐỂ XA TÂM TAY TRẺ EM.

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SĨ.

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa

- Cao khô lá sen (*Extractum Folium Nelumbinis nuciferae*) 80 mg (tương đương với 1g lá sen khô)

- Cao khô lá vông (*Extractum Folium Erythrinae variegatae*) 95 mg (tương đương với 1g lá vông khô)

- Rotundin 15 mg

Và các tá được gồm: Lactose monohydrat, tinh bột ngô, natri starch glycolat, silic dioxyd dạng keo khan, talc, magnesii stearat, hydroxypropyl methylcellulose 6cPs vừa đủ.

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim.

QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 2 vi hoặc 10 vi x 10 viên (vi nhóm -PVC), hộp 2 vi x 10 viên (vi nhóm - nhôm).

DƯỢC LỰC: TRANSDA - S là sản phẩm do sự kết hợp của các thành phần sau:

- Rotundin (L-Tetrahydropalmatin) là alkaloid được chiết từ củ Bình vôi, có tên khoa học là *Stephania rotunda*, họ Tiết dê (*Menispermaceae*). Rotundin có tác dụng an thần, gây ngủ, chống co giật, giãn cơ trơn, do đó có thể làm giảm các cơn đau do co thắt cơ trơn. Ngoài ra, Rotundin còn dùng trong điều trị một số trường hợp rối loạn tâm thần chức năng, trạng thái căng thẳng thần kinh, mất ngủ dai dẳng có nguyên nhân tâm thần.

- Lá sen (*Folium Nelumbinis*): Các công trình nghiên cứu trên cây sen mọc ở Việt Nam cho thấy dịch chiết và alkaloid toàn phần của lá sen có tác dụng an thần, tăng trương lực cơ tử cung, chống co thắt cơ trơn ruột. Ngoài ra lá sen còn có tác dụng chống choáng phần vệ, chống loạn nhịp tim.

- Lá vông (*Folium Erythrinae*): Đã được dân gian Việt Nam sử dụng làm thuốc an thần từ lâu đời. Các công trình nghiên cứu (của Trường sĩ quan quân y) cho thấy lá vông có tác dụng ức chế thần kinh trung ương, làm yên tĩnh, gây ngủ, hạ nhiệt và hạ huyết áp.

CHỈ ĐỊNH ĐIỀU TRỊ:

- An thần, gây ngủ, làm êm dịu thần kinh trong các trường hợp mất ngủ, lo âu, căng thẳng.

- Hỗ trợ giảm đau do co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa, tử cung. Đau đầu, đau thần kinh, co giật.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

- Người lớn: Uống mỗi lần 2-3 viên, mỗi ngày 2-3 lần (hoặc 2-3 viên

KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY?

Không dùng thuốc này khi bị quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Người có nhịp tim tăng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN THẬN TRỌNG KHI DÙNG THUỐC NÀY:

Các trường hợp bị chóng mặt, biểu hiện dị ứng thì phải ngưng thuốc. Tránh dùng thuốc cho người lái xe hoặc vận hành máy móc.

NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHẨM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY?

Không có báo cáo.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ CÓ DÙNG ĐƯỢC KHÔNG?

Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN CỦA THUỐC:

Có thể gặp một số ít trường hợp chóng mặt hay dị ứng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CẦN LÀM GÌ KHI MỘT LẦN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC?

Nếu quên một lần không dùng thuốc thì dùng bù ngay một liều thuốc khi bạn nhớ ra, ngoại trừ lúc đó đã sát gần thời điểm phải dùng liều thuốc tiếp theo. Không được dùng 2 liều thuốc cùng một lúc. Các liều thuốc còn lại nên dùng cho đúng giờ.

NHỮNG DẤU HIỆU VÀ TRIỆU CHỨNG KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU:

Do thuốc có chứa rotundin, các nghiên cứu cho thấy nếu dùng quá liều rotundin (từ 300 -1200 mg) có thể gây các rối loạn về nhịp tim và điện tim.

CẦN PHẢI LÀM GÌ KHI DÙNG THUỐC QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO:

Nếu như lỡ dùng thuốc quá liều cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được xử trí thích hợp.

KHI NÀO CẦN THAM VẤN BÁC SĨ?

Khi bạn có dấu chi thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin, đừng ngần ngại hỏi ngay ý kiến của bác sĩ.

HẠN DÙNG CỦA THUỐC LÀ BAO LÂU:

36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc khi đã hết hạn sử dụng được ghi trên nhãn hộp.

CẦN BẢO QUẢN THUỐC NÀY NHƯ THẾ NÀO?

Bảo quản nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

Để xa tầm tay trẻ em.

NGÀY XEM XÉT TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN: 08/01/2018.

NGÀY CẬP NHẬT: 08/03/2019 THEO CV SỐ 2763/QLD-ĐK.

WHO-GMP

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH BRV HEALTHCARE

Địa chỉ: Khu A, số 18, Đường số 09, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.

trước khi đi ngủ).

- Trẻ em: Uống mỗi lần 1-2 viên, mỗi ngày 2-3 lần tùy theo tuổi.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH:

- Quá mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.

- Người có nhịp tim tăng.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG:

Các trường hợp bị chóng mặt, biểu hiện dị ứng thì phải ngưng thuốc.

TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không dùng thuốc này cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.

TÁC DỤNG ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:

Không dùng thuốc này cho người lái xe hay vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Không có báo cáo.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Do sản phẩm có chứa rotundin, các nghiên cứu cho thấy nếu dùng quá liều rotundin (từ 300 -1200 mg) có thể gây các rối loạn về nhịp tim và điện tim. Xử trí: Điều trị triệu chứng và hỗ trợ, không có thuốc giải độc đặc hiệu. Có thể dùng atropin để điều trị nhịp chậm, đặt nội khí quản và hỗ trợ hô hấp có thể rất cần thiết.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Có thể gặp một số ít trường hợp chóng mặt hay dị ứng.

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

BẢO QUẢN: Nơi nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng và ẩm.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

WHO-GMP

TOA TRANSDA-S 23-D

Nhà sản xuất:

CÔNG TY TNHH BRV HEALTHCARE

Địa chỉ: Khu A, số 18, Đường số 09, Ấp 2A, Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM.